

84.4

Library of the Museum

of


COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

Deposited by ALEX. AGASSIZ.

No. 77 4-4. Jew. 15, 1890 - Apr. 29, 1891





BEITRÄGE

ZUR

PALÄONTOLOGIE ÖSTERREICH-UNGARNS

UND DES ORIENTS

HERAUSGEGEBEN VON

E. v. MOJSISOVICS UND M. NEUMAYR.

VIII. BAND.

HERAUSGEGEBEN MIT UNTERSTÜTZUNG DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

MIT 21 TAFELN.

WIEN, 1891.

ALFRED HÖLDER

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER.

ROTHENTHURMSTRASSE 15.

\$188887 \$288888 \$4888888888

Alle Rechte vorbehalten.

INHALT.

Heft I bis III.

(1. November 1890. S. 1—240. Tat. 1—XV.)
M. Schlosser, Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Marsupialier, Creodonten und Carnivoren des europäischen Tertiärs und deren Beziehungen zu ihren lebenden und fossilen aussereuropäischen Verwandten. III. Theil (Schluss)
K. A. Weithofer, Die fossilen Proboscidier des Arnothales in Toscana (Taf. I—XV)
Heft IV.
(15. März 1891. S. 241—268. Taf. XVI—XXI.)
F. Wähner, Beiträge zur Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. VI. Theil 241
(Die Autoren sind allein für Form und Inhalt der Aufsätze verantwortlich.)





Der Mitbegründer und Mitherausgeber dieser Beiträge

Herr Dr. Melchior Neumayr

k. k. o. ö. Professor der Paläontologie an der Universität zu Wien, corresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften etc. etc.

wurde uns am 29. Jänner 1890 nach langwieriger Krankheit durch den Tod entrissen.

In ihm betrauert die Wissenschaft einen ihrer begabtesten und fruchtbarsten jüngeren Meister — Alle, welche ihm im Leben näher standen, beklagen den Verlust eines der charaktervollsten, edelsten Menschen!

Allenthalben gibt sich die lebhafteste Trauer um diesen ausgezeichneten Mann kund, welcher mit würdigem Ernste stets nur der Erkenntniss der Wahrheit nachstrebte, dessen Blick nie durch vorgefasste Meinungen getrübt und dessen Gesinnungen nie durch die Strömungen des Tages beeinflusst waren! Die zahlreichen Nekrologe, welche sein Andenken ehren, beweisen, wie tief und nachhaltig allenthalben der Verlust empfunden und gewürdigt wird, welchen die Wissenschaft erlitten hat!



mytimuusii valtalakt att ilaatt

The second second

DIE AFFEN, LEMUREN, CHIROPTEREN, INSECTIVOREN, MARSUPIALIER, CREODONTEN UND CARNIVOREN DES EUROPÄISCHEN TERTIÄRS

UND DEREN

BEZIEHUNGEN ZU IHREN LEBENDEN UND FOSSILEN AUSSEREUROPÄISCHEN VERWANDTEN

VON

MAX SCHLOSSER

IN MÜNCHEN.

III. THEIL

Die Viverriden.

Dieser Stamm hat sich bis in die Gegenwart erhalten ohne wesentliche Veränderungen. Ausgangspunkt desselben war etwa eine Cynodictis- oder Didymictis-ähnliche Form. In dem letzteren Falle wären von Anfang an nur zwei untere M vorhanden gewesen; soferne wir aber mit Filhol die Viverren von einer Cynodictis-Rasse, deren unterer M_3 verloren gegangen ist, ableiten wollten, müsste eben bei dem Ahnen dieser Gruppe auch noch ein M_3 im Unterkiefer existirt haben. Dass dieselben in der That ursprünglich von einer Form mit $\frac{2}{3}M$ hervorgegangen sind, kann freilich keinem Zweifel unterliegen, sehr fraglich ist es jedoch, ob dieser Process erst so spät stattgefunden hat, wie Filhol meint. Ueberdies sind auch die Zähne, namentlich die oberen M von Cynodictis viel complicirter als jene der alten Viverren — sie haben Zwischenhöcker und einen viel stärkeren Basalwulst, und können daher die eigentlichen Cynodictis nie und nimmer als die directen Ahnen der Viverren ernstlich in Betracht kommen.

Die Gattung Didymictis, gleichzeitig oder sogar noch eher auftretend als Cynodictis, hat nur noch $\frac{2}{2}$ M wie die echten Viverren und kommt denselben hiemit anscheinend noch näher. Doch ist auch sie kaum die ursprüngliche Stammform, sondern erweist sich bereits als ein fortgeschrittener Typus, insoferne am unteren M_2 der Talon eine auffallende Verlängerung erfahren hat und noch einen besonderen Höcker trägt, der dem Anfang des dritten Lobus des M_3 bei den Hufthieren entspricht. Die oberen M sind allerdings noch sehr einfach.

Die Viverriden haben $\frac{3}{3}\mathcal{F}^{\frac{1}{1}}C^{\frac{4}{4}}Pr^{\frac{2}{2}}M$. Für die ursprüngliche, jetzt freilich noch nicht direct ermittelte Stammform haben wir etwa folgende Organisation zu supponiren: Pr einfach, nur der letzte Pr im Unterkiefer und die Pr_1 und Pr_2 des Oberkiefers sind mit Nebenzacken versehen. Der

Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns. VIII. 1.

obere Pr_1 hat einen mässig grossen, ziemlich weit vorne gelegenen Innenhöcker und einen zweiten als relativ kurze Schneide entwickelten Aussenhöcker. Dazu kommt der Anfang eines Basalwulstes, der sich in der Ecke von Aussen- und Vorderrand als schwacher Knopf ausgebildet hat. Die oberen M sind echt trituberculär; sie bestehen aus zwei Aussenhöckern und einem Innenhöcker; der Basalwulst entwickelt noch keinen zweiten Innenhöcker. Die unteren M tragen in ihrer Vorderpartie je drei Zacken, von denen der Aussen- und der Innenzacken in gleicher Linie stehen; am M_1 besitzen dieselben eine sehr beträchtliche Höhe. Der Talon ist wohl ziemlich lang und weist gleichfalls drei Zacken auf, von denen der äussere am höchsten ist und auch die gleiche Länge hat wie der Talon selbst. Der Innenzacken ist etwas nach hinten gerückt, so dass der von diesen drei Zacken umschlossene Raum nach der Innenwand des Zahnes zu einen Ausgang erhält. Die Kiefer haben eine sehr beträchtliche Länge, und stehen die Zähne zum grössten Theil isolirt. Die Schädelkapsel hat nur mässigen Umfang, und liegen alle das Schädeldach zusammensetzenden Knochen in einer Ebene, vom Occiput an bis zur Nasenspitze. Eine Vorstellung vom Schädelbau dieser hypothetischen Stammform gibt die Gattung Viverra selbst. Die Zehenzahl ist natürlich fünf.

Es haben alle Metacarpalien nahezu die gleiche, aber relativ geringe Länge. Dies gilt auch von den Metatarsalien. Nur Metacarpale I, sowie Metatarsale I haben schon einige Verkürzung erfahren. Die Oberarm- und Oberschenkelknochen zeichnen sich gleich den Metapodien durch ihre geringe Länge aus. Der Humerus hat noch ein Epicondylarforamen; die Dicke der Fibula ist noch ziemlich beträchtlich.

Bei der Gattung Viverra äussern sich die Modificationen des Gebisses in der Verstärkung gewisser Zacken, namentlich des Innenhöckers am oberen Pr_1 , im Auftreten verschiedener Nebenhöcker auf den sonst sehr primitiv bleibenden oberen M und endlich in Verkürzung des Talons des unteren M_1 und Reduction des unteren M_2 . Am Talon des M_1 schiebt sich auch der Innenzacken etwas nach hinten und die Pr bekommen Nebenzacken. Der Schädelbau bleibt noch ganz primitiv — lange Kiefer, hoher Pfeilnahtkamm, kleines Cranium, dessen Scheitel mit der Nasenspitze nahezu in der gleichen Ebene liegt. Auch die Extremitäten zeigen gar keine nennenswerthen Fortschritte, nur das Epicondylarforamen des Humerus hat sich bei V. zibetha geschlossen.

Ictitherium hat gegenüber Viverra noch stärkere Reduction des M_2 in beiden Kiefern aufzuweisen; am oberen Pr_1 hat sich noch ein vorderer Höcker entwickelt, und am unteren M_1 ist der Innenzacken kleiner geworden und etwas weiter nach hinten gerückt. Auch haben die Pr fast sämmtlich Nebenhöcker angesetzt. Ferner ist die Bildung der Orbital-Ringe doch schon etwas weiter fortgeschritten als bei Viverra, und als wesentliche Neuerung ist die Reduction der ersten Zehe zu bezeichnen. Dafür hat sich freilich am Humerus noch das Epicondylarforamen erhalten.

Der Formenkreis der Herpestiden geht auch von einem Viverra-ähnlichen Typus aus. Bei der grossen Mannigfaltigkeit dieser Formen ziehe ich es jedoch vor, dieselben gesondert zu behandeln, und verweise hier nur darauf, dass dieser Kreis auf Verkürzung der Kiefer, Reduction der Pr-Zahl und die Bildung von Orbital-Ringen abzielt. Ferner kann es zum Verlust der ersten Zehe kommen. Dagegen ist die Gestalt der einzelnen Zähne, namentlich der M und des oberen Pr_1 meist sogar noch primitiver als bei Viverra.

Die Gattungen Arctogale und Paradoxurus lassen Reduction des M_2 in beiden Kiefern erkennen. Die Zacken und Höcker der Pr und M werden sehr massiv, nehmen aber grösstentheils an Höhe ab. Der Schädel und die Extremitäten sind ebenfalls eher plumper als bei Viverra.

¹⁾ Bei den Cynodictis vom Typus des lacustris, welche nach Filhol die Ahnen der Viverren darstellen, ist dieser Ausgang schon durch einen Secundärhöcker geschlossen; es hat der Zahn mithin bereits eine Complication erfahren, die bei Viverra nicht zu beobachten ist, und kann daher Cynodictis schon aus diesem Grunde nicht der Ahne von Viverra sein.

Hemigalea (Paradoxurus Derbyanus, Blainville, Ostéogr. Viverra, pl. XII.) bewahrt einen schlankeren Bau der Pr; dieselben entwickeln Nebenzacken. Der untere M_1 wird zugleich sehr niedrig, der obere Pr_1 sucht die Gestalt eines M nachzuahmen.

Cynogale zeigt gleichfalls Erniedrigung der M-Zacken; ferner lösen sich dieselben gleich den Höckern der oberen M in zahlreiche Knöpfchen auf, welche die Höhlung des Zahnes umgeben. Dafür werden jedoch die Pr sehr spitz und mit Zacken ausgerüstet. Am Humerus hat sich das Epicondylarforamen geschlossen. Der Schwanz hat eine nicht unbedeutende Verkürzung erfahren. Hand und Fuss sind dagegen noch primitiver als bei Viverra — relativ kürzer und alle Metapodien nahezu von gleicher Länge.

Eupleres stellt einen sehr aberranten Typus dar, insoferne das Gebiss eine eigenartige Differencirung, und zwar im Sinne der Insectivoren, aufweist; die Zahl der Zähne ist die nämliche wie bei Viverra — also $\frac{3}{3}$ $\mathcal{F}^{\frac{1}{1}}$ $C^{\frac{4}{4}} Pr^{\frac{2}{2}} M$. Im Gegensatz zu allen übrigen Carnivoren schliessen die 7 hier noch nicht dicht aneinander und sind auch anstatt als Meissel als spitze Stifte entwickelt wie bei Didelphys. Es ist dies ein ganz auffallend alterthümliches Merkmal. Der untere M, hat zwar hier wie bei Didymictis die für alle Carnivoren charakteristische Erniedrigung des Hauptzackens erfahren, dafür hat sich jedoch der Hinterzacken des Talons ganz beträchtlich vergrössert, was als eigenartige Differenzirung gedeutet werden muss. Der Canin ist auffallend schwach geblieben; das Gleiche gilt auch von allen Backzähnen, und ist auch deshalb die Gesichtspartie im Verhältniss zum Cranium sehr zierlich, was dem Thier ein ganz merkwürdiges Aussehen verleiht. Das Extremitätenskelet stimmt im Ganzen mit jenem der Viverren, ist aber immerhin noch etwas primitiver - alle Zehen so ziemlich gleich lang. Auch die Endphalangen sind für Carnivoren noch sehr spitz; sie sind auch noch nicht als echte Krallen ausgebildet. Jedenfalls laufen die Ahnen dieser Form als besondere Reihe lange Zeit neben den Viverren her und kommen erst mittelst eines sehr weit zurückliegenden Repräsentanten mit denselben in directe Beziehung. Die gemeinsame Stammform muss noch jene primitive Organisation der 7 und der Endphalangen besessen haben, welche wir bei Eupleres treffen.

An die Viverren schliessen sich auch zwei Formenkreise an, die zugleich zu den Mustelen in naher Beziehung stehen.

Der eine hat in der Gegenwart noch einen Vertreter in Poiana, der andere in Bassaris. Der erstere beginnt mit Palacoprionodon und unterscheidet sich von den echten Viverren durch den sehr schlanken Bau der Backzähne und die sehr weit gehende Reduction der M; der M_2 ist in beiden Kiefern sehr klein geworden, ebenso hat sich der Talon des unteren M_1 auffallend verkürzt. Der ursprüngliche Typus der M lässt sich jedoch immer noch wahrnehmen. Das Extremitätenskelet ist sehr schlank, die Metapodien besitzen eine relativ sehr beträchtliche Länge. Der Schädel erscheint schmal und langgestreckt. Aus solchen Formen haben sich einerseits Musteliden entwickelt, und zwar die Putorius-Reihe unter immer weiter gehender Reduction der M— 2) andrerseits die lebenden Gattungen Poiana und Prionodon, die noch ganz den echten Viverren-Habitus aufweisen.

Auch die lebende Gattung Cryptoprocta ist vielleicht auf eine Palacoprionodon ähnliche Form zurückzuführen. Gleichwie bei der fossilen Haplogale ist auch hier die Reduction der M nach Form und Zahl soweit fortgeschritten, dass hieraus zuletzt Feliden-artige Typen resultirten. Die

¹⁾ In Bronn's Classen und Ordnungen Bd. V. p. 192 wird die Formel des definitiven Gebisses zwar richtig angegeben dagegen die des Milchgebisses zu $\frac{3}{3}$ F $\frac{1}{1}$ C $\frac{3}{3}$ Pr D statt $\frac{4}{4}$ Fr D.

 $^{^2}$) Es wurde jedoch der obere M_1 hiebei in eigenthümlicher Weise modificirt. Seine beiden Aussenhöcker rückten näher zusammen, und den Innenhöcker umfasste ein massiver Basalwulst. Der untere M_1 verlor den Innenzacken.

Beschaffenheit des Skelettes von Cryptoprocta lässt kaum einen Zweifel darüber aufkommen, dass wir hier wirklich einen Viverriden, oder besser einen Rest der Stammgruppe der Viverren und Musteliden und nicht etwa einen Feliden vor uns haben, wie man bei oberflächlicher Betrachtung des Gebisses glauben könnte. Es ist dies zugleich ein Beispiel dafür, dass die blosse Aehnlichkeit im Zahnbau nicht immer über die wahre Verwandtschaft gewisser Säuger vollkommenen Aufschluss gibt.

Im Bau des Schädels — Anwesenheit eines sehr kräftigen langen Scheitelkammes, Länge der Gesichtspartie, sehr allmälige Breitenzunahme des Gaumens — erinnert *Cryptoprocta* viel eher an Viverren und selbst Musteliden als an Feliden.


Das Gleiche gilt auch hinsichtlich der Beschaffenheit der so wichtigen Metapodien, Carpalien und Tarsalien. Namentlich weicht Cryptoprocta iusoferne von den Feliden ab, als das für diese letzteren so charakteristische Herüberragen des proximalen Theils des Mc III über Mc III und des Mc III über Mc IV absolut nicht zu beobachten ist, eine Organisation, die schon den ältesten Feliden — Aelurogale — eigen war. Endlich stehen auch die Incisiven nicht in einer Reihe, sondern es ist der untere \mathcal{F}_2 wie bei fast gar allen Raubthieren aus der Reihe gedrängt. Im äusseren Habitus freilich zeigt Cryptoprocta ziemliche Aehnlichkeit mit den Katzen.

Die Bassaris-Reihe geht von Amphictis oder noch besser von dem "Cynodictis" dubius aus und unterscheidet sich dieser Formenkreis von jenem der Viverren durch die schneidenartige Entwicklung des Talons am unteren M_1 , d. h. es ist der Hinterzacken verschwunden, der Innenzacken erscheint als lange aber niedrige Innenwand, und der Aussenzacken ist zu einer hohen Schneide geworden. Die oberen M sind noch sehr einfach, ebenso der obere Pr_1 .

Bei Bassaris hat sich dann wie bei den Musteliden an dem oberen M_1 ein Basalhöcker entwickelt — bei Amphictis erst als Knöpfchen angedeutet — und zugleich ein secundärer Innenhöcker am oberen Pr_1 angesetzt. Die Zahnzahl stimmt noch mit jener von Viverra. Eine Nebenreihe von Amphictis bilden ferner Plesictis und Martes.

Ich habe die fossilen Gattungen Amphictis, Palaeoprionodon etc. bei den Musteliden behandelt, obwohl dies hätte ebenso gut an dieser Stelle geschehen können. Bei den innigen Beziehungen jedoch, die zwischen den genannten Formen und den Musteliden bestehen, namentlich wenn man die zahlreichen fossilen Zwischenglieder berücksichtigt, erschien es mir vortheilhafter, sie mit dieser letzteren Familie zusammen zu besprechen.

Die Verwandtschaft der Viverren untereinander und deren Beziehungen zu den Musteliden und Caniden gestalten sich etwa folgendermassen:



Viverra (?) simplicidens n. sp.

Taf. IX, Fig. 10, 10a, 13, 39, 43, 45, 54.

? Cynodictis compressidens. Var. viverroides Filhol, Toulouse 1882, p. 56.

Das Münchener Museum besitzt von dieser Form vier vollständige Unterkiefer nebst mehreren Fragmenten, einen Unterkiefer mit den Milchzähnen und ein Oberkieferfragment mit Pr_1 und M_1 nebst den Alveolen des M_2 .

Unterkiefer: Länge vom Gelenkfortsatz bis zur Alveole des $\mathcal{F}_1 = 67.5 \text{ mm}$.

Höhe desselben hinter C = 5.2 mm, hinter $M_1 = 9 \text{ mm}$.

Abstand des Oberrandes des Kronfortsatzes vom Eckfortsatz = 26 mm.

Länge der Zahnreihe $(Pr_4 - M_2) = 36 \text{ mm}.$

 $Pr_4 - Pr_1 = 24 \text{ mm}; M_1 - M_2 = 12.2 \text{ mm}.$

Länge des $Pr_1 = 7 \text{ mm}$; Höhe desselben = 6 mm; Breite = 2.6 mm.

,, ,, $M_{\rm I}$ (R) = 8.5-9 mm; Höhe desselben = 7 mm; Breite = 4 mm; Höhe des Talons = 2 mm.

Länge des $M_2 = 4 \,\mathrm{mm}$; Breite desselben = 2.5 mm.

Das vordere Mentalforamen liegt schräg vor dem Pr_3 , das hintere schräg vor Pr_1 . Der Kiefer ist ungemein schlank und zierlich. Er sieht dem von Cynodictis inlermedius nicht unähnlich, ist aber im Verhältniss noch viel schlanker. Die beiden ersten Pr stehen isolirt. Die Zähne sind gleich dem Kiefer sehr viel zierlicher als die von Cynodictis intermedius. Die Zacken sind noch schärfer, dagegen fehlt ein Basalband vollständig, ebenso auch der Zacken auf der Hinterseite der Pr_2 und Pr_3 . Der Talon des unteren M_1 ist etwas kürzer und zeigt auch einen ziemlich abweichenden Bau. Der Innenzacken des Talons ist sehr klein geblieben und steht ausserdem sehr weit zurück, so dass der Talon nach der Innenseite des Zahnes einen Ausgang hat. Der M. hat einen sehr viel schwächeren Talon als der von Cynodictis ist. Im Ganzen ist jedoch die Aehnlichkeit mit Cynodictis vom Typus des lacustris eine ziemlich weitgehende. Ich glaube daher kaum fehlzugreifen, wenn ich die vorliegende Form, die von Filhol indess trotz ihrer relativen Häufigkeit in den Phosphoriten auffallenderweise gar nicht erwähnt wird, als einen Theil des "Cynodictis compressidens" Var. viverroides Filh. deute. Dass von diesem Cynodictis wirklich Exemplare gefunden werden, bei welchen der M3 vollständig verschwunden ist, will ich keineswegs in Abrede stellen, es liegt mir vielmehr selbst eine kleine Zahl solcher Kiefer vor - deren specifische Bestimmung jedoch Schwierigkeiten bietet -; alle etwaigen Zweifel über deren Existenz wären ohnehin schon durch die vortreffliche, von Lydekker gegebene Zeichnung beseitigt. Indess weichen diese Exemplare durch ihren ungemein plumpen Bau noch mehr von der vorliegenden Viverre ab als die echten Cynodictis compressidens mit erhaltenem M3.

Was den allgemeinen Habitus anlangt, so schliesst sich unsere Viverre auf's Allerengste an die Gruppe Stenoplesictis, Palacoprionodon an, sie unterscheidet sich aber durch den noch sehr viel kräftigeren Innenzacken des unteren M_1 und die stärkere Entwicklung des Talons dieses Zahnes, sowie durch die relative Grösse des M_2 und durch das Fehlen der Nebenzacken auf Pr_2 und Pr_3 .

Der untere D_1 hat eine Länge von 6.5 mm und eine Höhe von 5.5 mm.

Von dem entsprechenden Zahne des Cynodictis unterscheidet sich der D_1 wesentlich durch die schwache Entwicklung des Innenzackens am Talon.

Oberkiefer. Länge des $Pr_1(R) = 9$ mm; Breite desselben = 5.3 mm.

$$,, \quad ,, \quad M_1 = 6.4 ,, \quad ,, \quad , = 8.2 ,$$

Im Ganzen sehen diese Zähne denen von Cynodictis sehr ähnlich, doch fehlt auf der Aussenseite des Pr_1 der kleine vordere Basalhöcker und am M_1 ist der zwischen dem vorderen Aussenhöcker und dem grossen Innenhöcker befindliche Zwischenhöcker noch nicht zur Entwicklung gelangt. Auch ist der Basalwulst viel schwächer geblieben. Der M_2 scheint den Alveolen nach etwas breiter gewesen zu sein wie jener von Cynodictis.

Am nächsten steht dieser Art wohl Viverra Hastingsiae Davies, doch war dieselbe grösser und auch überdies sehr viel plumper.

Von der vorliegenden Art ist anscheinend auch das Skelet vorhanden. Die einzelnen Knochen sind ungemein schlank, wenig gebogen, ihr Durchmesser bleibt fast an allen Stellen gleich, auch an den proximalen, beziehungsweise distalen Enden hat nur verhältnissmässig sehr geringe Verbreiterung stattgefunden.

Unter den lebenden Zibethkatzen hat Viverra genetta die meiste Aehnlichkeit.

Von den Knochen der gleichzeitigen *Palaeoprionoden* und *Stenoplesictis*, die ja auch im Zahnbau unserer Form ziemlich nahestehen, sind die vorliegenden Reste, abgesehen von ihren Dimensionen, kaum zu unterscheiden, umso leichter aber von den plumpen *Cynodictis*.

Der Humerus ist fast ganz gerade und in seinem Röhrentheil an allen Stellen nahezu gleich breit; das Caput hat sehr geringen Durchmesser. Die distale Partie weist wie voraus zu sehen ist immer ein Epicondylarforamen auf; der Abstand der Epicondyli ist sehr mässig.

Länge = 72 mm, Durchmesser des Caput = 10 mm, Breite des Humerus in Mitte = 5.5mm. Abstand der Epicondyli = 15 mm.

Radius. Dieser Knochen ist fast völlig gerade und an allen Stellen gleich breit. Das obere Ende ist sehr schmal. Der eigenthümliche, für *Cynodictis* charakteristische Fortsatz am distalen Ende fehlt hier vollständig.

Länge = 60 mm, Breite oben = 7,3 mm, Breite in Mitte = 5 mm, Breite unten = 11.5 mm. Femur. Dieser Knochen besitzt ein sehr zierliches Caput. Die Condyli stehen verhältnissmässig sehr dicht beisammen.

Länge = 76 mm, Durchmesser des Caput = 7 mm. Abstand der Condyli = 13 mm. Breite des Femur in Mitte = 6.5 mm.

Tibia. Diese zeichnet sich durch ihre Zierlichkeit aus; die distale Partie ist sehr schmal, auch am proximalen Ende verbreitert sich die Achse nur ganz unbedeutend. Die Epiphyse hat einen relativ sehr geringen Breitendurchmesser.

Länge = 81 mm, Breite = 14 mm, Breite in Mitte = 4.5 mm, Breite am distalen Ende = 9 mm. Diese beiden Knochen sind, wenn man die Masse von *Viverra genetta* zu Grunde legt, im Verhältniss zur Vorderextremität etwas zu kurz.

Die Metacarpalien und Metatarsalien sehen denen von Cynodictis sehr ähnlich, sind aber viel schlanker, auch erreichen die seitlichen — Mc II und V, beziehungsweise Mt II und V — eine viel beträchtlichere Länge; sie sind fast eben so lang wie die mittleren. Bei den lebenden Viverren sind diese Knochen relativ viel kürzer.

		Län	ge	Breite	in Mitte.				Län	ge	Breite in Mitte.		
Metacarpale	II.	19.3	mm;	2°3	mm.	\mathbf{M}	etatarsale	I.	21.2	mm;	2	mm.	
,,	III.	24.7	11	2.4	,,		"	II.	30	"	2.8	,,	
,,	IV.	24	"	2.8	"		27	III.	35	22 .	3°5	"	
							"	IV.	35°5	**	3	,,	
							17	V.	29.5	"	3	,,	

Von Cynodictis unterscheidet sich die vorliegende Art, abgesehen von ihrer ganzen Habitus, auch durch die abweichende Knochenconsistenz — hier entschieden eher faserig — und den durchaus abweichenden Erhaltungszustand. Es ist nicht ganz unmöglich, dass diese Form in naher verwandtschaftlicher Beziehung steht zu den untermiocänen Herpestes-Arten. Die Umwandlung äusserte sich in diesem Falle lediglich in Reduction des M_2 beider Kiefer, in Verstärkung des oberen und unteren M_1 und in Verkürzung der Kiefer.

Vorkommen: In den Phosphoriten von Escamps (Lot)

Taf. IX, Fig. 10. Unterkiefer Pr_1-M_2 von innen. Fig. 10 a von oben.

Fig. 13. Oberkiefer mit Pr_1 — M_1 nebst Alveole des M_2 von unten.

Fig. 39. D_1 und D_2 von innen. Fig. 43 von aussen. Fig. 45 von oben.

Fig. 54. Unterkiefer von aussen. Idem Fig. 10.

Viverra angustidens Filh.

? Rütimeyer. Cynodon helveticus. Bohnerze, p. 86, Taf. V, fig 86. Filhol. Viverra angustidens. Ann. scienc. géol. T. VII, p. 144, pl. 26, fig. 121, 122. Lydekker. Viverra angustidens. Catalogue 1885, p. 102.

Der C ist sehr stark entwickelt. Der Pr_1 besitzt noch einen Zacken auf seiner Hinterseite, die übrigen Pr blos ein Basalband, das vorne und namentlich hinten etwas anschwillt. Beim Pr_1 ist dieser Basalwulst zu einem förmlichen Talon geworden. Der M_1 zeichnet sich durch die gewaltige Höhe seiner überdies sehr scharfen Zacken aus. Der Talon ist dafür auffallend klein, niedrig und schmal, wie bei keinem anderen Viverriden. Der M_2 hat drei Zacken, von denen der auf Aussenseite befindliche der stärkste ist. Der Raum für die \mathcal{F} ist sehr klein, und waren dieselben jedenfalls alternirend gestellt. Der Unterrand des Unterkiefers verläuft vollkommen geradlinig.

Länge des $Pr_3 = 4 \text{ mm}$; Länge des $M_2 = 7 \text{ mm}$.

- " $R(M_1) = 8-15 \text{ mm}$ (?) Höhe desselben = 8-9 mm.
- " $M_2 = 5 \text{ mm}$; Breite desselben = 4 mm.

Kieferhöhe unterhalb des $M_1 = 12-16.5 \text{ mm}$.

Bei den recenten Viverren sind die Pr viel kräftiger geworden, ebenso hat der Talon der M einen complicirteren Bau erreicht. Am nächsten steht noch Mangusta brachyura hinsichtlich der Beschaffenheit des Talons; der M_1 selbst ist jedoch viel niedriger. Auch Filhol — T. VIII, p. 317 — erkennt die grosse Verschiedenheit dieser Viverre gegenüber den lebenden Formen an und ist geneigt, diesen Typus für vollständig erloschen anzusehen. Der von Rütimeyer beschriebene "Cynodon" helveticus — siehe diesen — dürfte mit dieser Art nahe verwandt, wenn nicht gar identisch sein.

Viverra Hastingsiae Davies.

Davies. Geological Magazine 1884, p. 437 mit einer Tafel. Lydekker. Catalogue 1885, p. 100, fig. 11, 12.

Das Thier, von welchem diese übrigens ziemlich dürftigen Reste herrühren, hatte die Grösse eines Fuchses. Alsnächster Verwandter wird Viverra antiqua aus St. Gérand-le-Puy angegeben. Der untere M_1 (R) hat sehr hohe Zacken und einen grubigen Talon. Mit Herpestes hat diese Art gemein die Beschaffenheit des Nebenzackens am oberen Pr_2 und dem unteren Pr_1 und die Structur der oberen M. Der obere Pr_1 hat zwar noch keinen so starken Innentuberkel entwickelt wie bei den meisten lebenden Viverren; doch ist derselbe schon viel kräftiger als bei Cynodictis. Der

obere M_1 sieht dem von Cynodictis — Typus des lacustris — sehr ähnlich, ist aber noch massiver; auch fehlt der Basalwulst der Innenseite hier beinahe vollständig, wie überhaupt bei Viverra.

Von der vorigen Species unterscheidet sich V. Hastingsiae vor Allem durch die starke Entwicklung des Talons an den unteren M.

Die restaurirte Abbildung des Unterkiefers, welche Davies gibt, ist entschieden falsch. Der hintere Kieferast steigt sicher viel sanfter an, wahrscheinlich genau wie bei Cynodictis intermedius Filh.

Vorkommen: Im Oligocan (Headon-bed) von Hordwell.

Viverra Steinheimensis Fraas.

Fraas. Steinheim p. 9, Taf. I, fig. 16, 17.

Synonyme: Palaeomephitis Steinheimensis. Jäger.

Depéret. Archives du Museum d'hist. nat. Lyon 1887, p. 137, pl. XIII, fig. 10.

Von diesem Thiere beschreibt Fraas den Schädel und den Unterkiefer.

Der Schädel passt besser zu Viverra als zu Bassaris, indem der Pfeilnahtkamm sich auch bis zu den Stirnbeinen erstreckt, unterscheidet sich jedoch von Viverra dadurch, dass die Mittellinie des Hinterhauptbeines mit der Mittellinie der Scheitelbeine unter einem nahezurechten Winkel zusammenstösst, statt mit derselben einen stumpfen Winkel zu bilden.

Von den vier Pr des Unterkiefers ist der vorderste sehr klein und blos mit einer Wurzel versehen. Die Pr nehmen ziemlich regelmässig von vorne nach hinten zu. Die letzten besitzen hinter dem Hauptzacken noch einen Nebenzacken und ausserdem noch einen Basalwulst, entstanden durch Anschwellung des Basalbandes. Der M_1-R — besteht aus einem hohen Hauptzacken und je einem etwas niedrigeren Vorder- und Innenzacken. Der Talon bildet eine Grube, begrenzt von der schneidenähnlichen Aussenwand, dem Hinterzacken und einem diese Höhlung nur unvollständig schliessenden kleinen Innenhöcker.

Länge des $Pr_4 = 3 \text{ mm}$.

",
$$r_3 = 7$$
",

$$,, n, Pr_2 = 8,$$

$$Pr_1 = 9$$

$$,,$$
 $M_1 = 12$ $,,$

Höhe des Eckzahnes = 14 mm; Breite desselben = 4 mm.

Depéret beschreibt unter der Bezeichnung aff. Steinheimensis einen Pr von 11 mm Länge aus Grive St. Alban. Nach den obigen Zahlen ist derselbe doch fast zu gross für diese Art.

Viverra sansaniensis Lartet ist nach Fraas identisch mit dieser Art. Der von P. Gervais gegebenen Abbildung nach scheint jedoch die Lartet'sche Species sehr viel kleiner zu sein. Es messen die zwei letzten Pr und der M_1 zusammen 24.8 mm, bei Steinheimensis etwa 30 mm. Der Talon ist grubig; im Verhältniss erscheint er bedeutend kleiner als der von Steinheimensis. Es erinnert überhaupt der M_1 eher an Stenoplesictis und Palaeoprionodon als an Viverra. Seine Länge beträgt blos 10.5 mm.

Vorkommen: Im Obermiocan von Steinheim und vielleicht auch von Grive St. Alban.

Viverra minima Filhol.

Filhol. Ann. scienc. géol., T. VII, p. 150, T. VIII, pl. 20, fig. 334, 336. (non fig. 377 — ein *Cynodictis*). Lydekker: *Herpestes minimus*. Catalogue 1885, p. 104, fig. 13.

Der Pr_3 ist ziemlich schwach entwickelt; Pr_4 relativ gross. Der Fr_1 besitzt nebst dem Talon noch einen hohen Zacken auf seiner Rückseite. Der M_1 (R) zeigt ausser dem Haupt- und

der Innenzacken einen grubigen Talon und einen kräftigen Zacken in seiner Vorderhälfte und hat ziemlich grosse Aehnlichkeit mit Cynodictis.

Länge der unteren Zahnreihe = $(Pr_4 - M_2) = 22 \text{ mm}$.

Länge des $Pr_1=4\,\mathrm{mm};$ Länge des M_1 (R) = 5.5 mm; Höhe desselben = 3.5 mm. Länge des $M_2=2.6\,\mathrm{mm}.$

Der aufsteigende Kieferast ist unverhältnissmässig massiv im Vergleich zur Länge des Kiefers. Lydekker — welcher von dem Exemplar des britischen Museums eine vergrösserte Abbildung gibt $(\frac{3}{2}$ fach) — findet grosse Aehnlichkeit mit Herpestes nipalensis. Der M_2 dieser recenten Form ist indess etwas kürzer, und steht auch der auf der Rückseite des Pr_1 befindliche Zacken ziemlich weit aussen, wie bei allen lebenden Viverren und Herpesten. Ausserdem steigt auch der Kronfortsatz bei Herpestes nipalensis steiler an. Der fossile Kiefer erinnert in seinem Habitus mehr an Genetta.

Vorkommen: In den Phosphoriten des Quercy.

Viverra leptorhyncha Filh.

Filhol. Mammifères fossiles de l'époque miocène. 1881—82, p. 67, pl. IV, fig. 16—19. Depéret. Archives du Mus. d'hist. nat. Lyon 1887, p. 136.

Als Viverra bestimmt der erstere Autor einen Unterkiefer mit M_1 und M_2 und einen oberen Pr_1 . Der Kiefer ist stark in die Länge gezogen und ziemlich schlank. Die Pr waren jedenfalls in der Vierzahl vorhanden; bei dem grossen Raum, den ihre Alveolen einnehmen, und der geringen Dicke des Körpers darf auch auf einen sehr schlanken Bau dieser Pr geschlossen werden. Sie besetzen einen Raum von 20 mm. Die Länge des Pr_1 war etwa 7 mm. Der M_1 erinnert an Viverra zibetha; die drei Hauptzacken stossen an ihrer Basis nicht mehr zusammen, wie dies bei Cynodictis der Fall ist, welcher hinsichtlich der Zusammensetzung der Vorderpartie des M_2 sehr viele Anklänge zeigen soll. Es sind nämlich an diesem M_2 noch die ursprünglichen drei Zacken der Vorderpartie erhalten. Der Talon ist anscheinend als Grube entwickelt, sowohl am M_1 als auch am M_2 . Der M_2 hat eine auffallende Länge, und bedingt derselbe geradezu die Anwesenheit eines oberen M_2 . Der obere Pr_1 trägt einen sehr kräftigen Innenzacken. Im Gegensatze zu Viverra antiqua und Cynodictis hat sich dieser Zacken sehr weit nach vorne verschoben, im Uebrigen aber sieht der Pr_1 dem entsprechenden Zahn dieser letzteren Formen sehr ähnlich. Der untere M_1 hat eine Länge von 10 mm und eine Höhe von 7 mm, der M_2 misst in der Länge 7 mm, der obere Pr_1 9 mm. Jourdan hat für diese Reste den Namen Ichneugale gewählt.

Der untere M_2 der Viverra simplicidens aus den Phosphoriten — Taf. IX, Fig. 10, 54 — scheint viel spitziger zu sein, hat aber dafür einen viel kürzeren Talon. Die Zusammensetzung der Vorderhälfte des M_2 dürfte dagegen sehr gut harmoniren. Von Amphictis, sowohl von jenem aus den Phosphoriten als auch von jenem aus Eckingen unterscheidet sich diese Viverra leporhyncha durch den Besitz eines Vorderzackens am unteren M_2 ; der M_1 hat dagegen grosse Aehnlichkeit insbesondere bezüglich des Aussehens seines Talons. Fast bin ich versucht, mit dieser Art den zweifelhaften "Cynodictis Göriachensis" mit Ausnahme des unteren M_2 zu vereinigen. Die Dimensionen, sowie das Aussehen des oberen Pr_1 und des unteren M_1 , der einzigen Zähne, die überhaupt bei der Unvollständigkeit dieser Reste miteinander verglichen werden können, machen es ziemlich wahrscheinlich, dass diese Viverra und jener "Cynodictis" auf die nämliche Art bezogen werden müssen.

Vorkommen: Im Untermiocän von Grive-St.-Alban (Isère) (und der Braunkohle von Göriach).

Viverra Pepratxi Depéret.

Depéret Ch. Description des vertébrés du terrain pliocène du Rousillon. Ann. scienc. géol. T. 17, p. 137, pl. 4, fig. 1-6.

Der Oberkiefer trägt zwei M. Der M_2 scheint oval gewesen zu sein, der M_1 dreieckig. Der letztere stimmt am besten mit dem entsprechenden Zahn von Viverra genetta einerseits und Ictitherium robustum andererseits. Der obere Pr_1 ist verhältnissmässig länger, als dies bei den Viverren sonst der Fall ist. Von Ictitherium unterscheidet er sich durch das Fehlen des Vorderhöckers. Der untere M_1 hat gleich dem entsprechenden Zahn von Ictitherium für einen Viverriden sehr niedrige Zacken. Namentlich ist der Innenzacken sehr schwach geworden und hat sich überdies auch nach rückwärts verschoben. Der Talon gleicht jenem der echten Viverra; er trägt wie bei dieser drei Zacken; seine Grube ist nach innen zu offen. Der M_2 besteht blos aus zwei Aussenund zwei Innenzacken, die miteinander alterniren. Hinsichtlich der Grösse kommt die Viverra antiqua dieser V. Pepratxi am nächsten. Dass wir es hier mit einer wohlbegründeten Species zu thun haben, kann keinen Augenblick zweifelhaft sein.

Vorkommen: Im Oberpliocan von Roussillon.

Viverra sansaniensis Lartet.

P. Gervais. Zool. et Pal. fr. p. 222, pl. 22, fig. 1.

Nur Unterkiefer bekannt mit $Pr_2 - M_1$ und den Alveolen von Pr_3 und Pr_4 . Der entscheidende M_2 fehlt vollständig und bleibt es daher bei der auffallenden Schlankheit der Pr und M überaus zweifelhaft, ob wir es hier mit einer Viverra zu thun haben. Die Kürze des grubig entwickelten Talons macht es viel eher wahrscheinlich, dass dieser Kiefer zu Palaeoprionodon oder Stenoplesictis gehört. Ich werde kaum irren, wenn ich diese Viverra direkt mit der geologisch gleichaltrigen $_nPlesictis^n$ mutata Filh. von Grive-St.-Alban vereinige.

Die von Fraas vermuthete Identität mit der Viverra Steinheimensis ist höchst problematisch. Die letztere hat viel ansehnlichere Dimensionen.

Vorkommen: Im Obermiocan von Sansan.

Alle im Folgenden angeführten Arten gehören gar nicht zu Viverra, sondern theils zu Herpestes, theils zu Cephalogale, Cynodon und Amphicyon (?).

Viverra miocaenica Peters.

Peters: Denkschriften der k. k. Wiener Akad. Math.-nat. Classe, Bd. XXIX, 1869, p. 194, Taf. III, Fig 8-10.

Das Original besteht aus einem Unterkieferbruchstück mit dem C und den Pr. Der so wichtige M_1 fehlt leider vollständig. Der Kiefer ist gleich den Pr auffallend massiv. Der Pr_4 hat blos eine Wurzel, die übrigen sind zweiwurzlig. Pr_1 und Pr_2 zeichnen sich durch den Besitz eines sehr kräftigen Basalbandes, sowie eines Vorder- und eines Hinterzackens aus. Das Basalband bildet ausserdem eine Art von Talon. Charakteristisch ist die Dicke dieser Zähne. Den Pr_1 hat Peters fälschlicherweise als M_1 bestimmt. Der Kiefer selbst ist sehr gedrungen. Seine Höhe beim $Pr_1=18$ mm.

Die vier Pr messen zusammen 29 mm. Der Pr_1 hat eine Länge von 9.6 mm, eine Breite von 5.5 mm und eine Höhe von 6.4 mm.

Peters glaubt, es sei dieses Thier mit Viverra zibethoides von Sansan ziemlich nahe verwandt; da diese letztere Form aber wahrscheinlich zu Amphicyon gehört, wofür wenigstens die

Kleinheit und der einfache Bau seines Pr_1 , sowie die Beschaffenheit des M_1 zu sprechen scheint, so dürfte diese Annahme doch wohl hinfällig sein. Eher könnte noch *Ictitherium* in Betracht kommen. Unter den lebenden Viverriden hat *Viverra* selbst, sowie *Herpestes* immerhin einige Aehnlichkeit im Bau der Pr, doch wird der Kiefer wohl niemals so plump. Wahrscheinlich haben wir es mit einer gänzlich erloschenen Form zu thun, deren Verwandtschaft, solange nicht wenigstens der M_1 bekannt sein wird, durchaus nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann.

Vorkommen: Im Obermiocan von Eibiswald in Steiermark.

Viverra zibethoides Blainville.

Blainville: Ostéographie. Viverra, p. 75, pl. XIII.

Ist zweifellos von Viverra verschieden und wird von Gervais wohl mit mehr Recht zu Amphicyon gestellt. Siehe Amphicyon zibethoides.

Viverra sp.

```
Filhol. Ann. scienc. géol. T. III, p. 29, pl. XVI, fig. 26, 27, fig. 45, 46.
```

Aus den Phosphoriten von St. Antonin bildet Filhol zwei sehr unvollkommene Unterkiefer ab, deren Zähne allerdings gewisse Aehnlichkeit mit *Viverra* haben. Es fehlt jedoch jede genauere Beschreibung.

Zu dem gleichen Thier stellt der genannte Autor auch zwei Humerus, deren Zugehörigkeit zu Viverra ebenfalls sehr in Frage steht. Der eine davon — Fig. 46 — könnte eher von Palaeoprionodon stammen.

Viverra ambigua P. Gerv.

```
P. Gervais Zool. et Pal. gén. II, p. 51, pl. XIII, fig. 10.
" Journal de Zool. T. II, pl. XVI, fig. 1.
Siehe Amphictis.
```

Viverra exilis Blainville.

```
Blainville. Ostéographie Viverra, p. 73, pl. XIII.
P. Gervais. Zool. et Pal. fr. p. 224, pl. XXVIII, fig. 5.
```

Siehe Parasorex socialis.

Viverra antiqua Blainville.

Siehe nach Herpestes priscus.

Viverra suevica H. v. Mey.

Siehe Herpestes priscus.

Depéret erwähnt — in Archives du Musée d'hist. nat. Lyon 1887 — eine Viverra simorrensis, die indess offenbar niemals genauer beschrieben worden ist.

Zu Viverra stellt Quenstedt eine Anzahl Kiefer aus den schwäbischen Bohnerzen. Es hat jedoch keiner derselben etwas mit Viverra zu thun, vielmehr sind dieselben zum Theil auf Cephalogale, zum Theil auf Cynodon zu beziehen.

Viverra ferrata Quenstedt. Petrefactenkunde. 1881. 1. Bd., p. 46, Taf. II, Fig. 9, 10, Fig. 13. In den Bohnerzen von Vehringen fanden sich Unterkieferfragmente, welche unter obigen Namen angeführt und abgebildet werden. Ein Stück enthält den M_1 und drei Pr. Dem Aussehen dieser Zähne nach gehört dasselbe zu Cephalogale, und zwar zu Cephalogale minor Filh. pl. V, fig. 4, oder noch eher zu Cephalogale curvirostris. Auf das nämliche Thier darf wohl auch der Fig. 13 abgebildete untere M_2 bezogen werden.

Viverra, ibidem, p. 46, Taf. II, Fig. 12, als fr. Steinheimensis bestimmt. Dass dies keine Viverra sein kann, geht aus der Anwesenheit eines unteren M_3 deutlich genug hervor. Auch dieses Stück hat auffallende Aehnlichkeit mit Cephalogale minor — und zwar den kleineren — aus den Phosphoriten.

Viverra p. 47, Taf. II, Fig. 14 wird von Quenstedt mit Cynodon velaunus identificirt. Es hat dieses Kieferfragment mit jenem Kiefer aus dem Bohnerz des Eselsberges, welches ich bei Cynodon speciosus erwähnte, sehr grosse Aehnlichkeit und dürfte diese letztere Bestimmung den Vorzug verdienen.

Das Fig. 15 abgebildete Oberkieferstück enthält blos den Pr_1 (R) nebst den Alveolen des M_1 . Bei der auffallenden Kürze und dem gedrungenen Bau dieses Zahnes wird es sehr wahrscheinlich, dass wir diesen Kieferrest auf ein dem *Cephalogale Gryei* ähnliches Thier beziehen müssen.

Im Pliocän der Siwalis Hills fanden sich Reste von zwei echten Viverren-Arten: Viverra Bakeri Bose. Quarterly Journal of the Geological Society 1880. p. 131, pl. VI, fig. 2. Viverra Durandi Lydekker. Paleontologia Indica. Ser. X, Vol. II, p. 271, pl. XXXIII, fig. 1—3. Die erstere nach Lydekker vielleicht der directe Ahne von Viverra zibetha.

Der eben genannte Autor beschreibt endlich auch eine Viverra Karnuliensis — ibidem, Ser. X, Vol. IV, p. 31, pl. VI, fig. 6, 6a.

Genus Ictitherium.

Zahnformel:
$$\frac{3}{3} \mathcal{F} \frac{1}{1} C \frac{4}{4} Pr \frac{2}{2} M$$
.

Die \mathcal{I} und C bieten nichts Auffälliges; der untere \mathcal{I}_2 ist wie bei den meisten Carnivoren aus der Reihe gedrängt. Die Pr und M sehen denen der Viverren sehr ähnlich und erinnern besonders an V. zibetha. Der obere Pr_1 gleicht ebenfalls dem entsprechenden Zahn von Viverra, er besitzt wie dieser einen relativ kräftigen Innenhöcker; sein Vorderhöcker ist stärker als bei Viverra. Die übrigen Pr haben mit Ausnahme des allervordersten je einen Talon und einen Höcker auf ihrer Rückseite, und zwar sind diese Höcker aus der Mittellinie nach auswärts gerückt. Bei der Gattung Herpestes sind die Pr indess noch massiver geworden. Im Oberkiefer scheinen die M noch etwas einfacher gebaut zu sein als jene von Viverra, indem Basalbildungen auf der Innenseite sowie Zwischenhöcker ganz fehlen. Dagegen können auf der Oberfläche des Zahnes und zwischen den Aussenhöckern körnige Rauhigkeiten auftreten, besonders bei \mathcal{I} . Orbignyi. Die oberen M von Viverra zibetha sind im Verhältniss etwas kürzer als bei Ictitherium.

Im Unterkiefer gleicht der M_1 —R— fast ganz dem entsprechenden Zahne von V. zibetha; doch ist hier der Innenzacken etwas schwächer geworden. Der Talon weist die drei Zacken des

Viverren-Zahnes auf, auch genau in der nämlichen Anordnung. Der M_2 scheint etwas mehr vereinfacht zu sein, als dies bei den meisten Viverren der Fall ist. Wie im Oberkiefer so ist auch im Unterkiefer die Reduction des Pr_4 weiter fortgeschritten als bei diesen.

Im Schädelbau zeigt *Ictitherium* mit *Viverra* ebenfalls nahezu völlige Uebereinstimmung. Der einzige Unterschied besteht nur darin, dass der die Augenhöhle nach hintenzu begrenzende Fortsatz des Stirnbeins noch länger geworden ist. Die Gesichtspartie ist noch sehr lang.

Das Extremitätenskelet lässt ebenfalls nur wenig Abweichungen erkennen von dem der lebenden Gattung *Viverra*, nur ist hier bei *Ictitherium* die Reduction der ersten Zehe an Vorder- und Hinterfuss, namentlich aber an letzterem sehr viel weiter fortgeschritten; jedoch sind noch sämmtliche Phalangen erhalten.

Die Gattung Ictitherium zeigt eigentlich weniger Verschiedenheit von Viverra zibetha als die sonstigen noch mit Viverra vereinigten Formen untereinander, einzig und allein die weiter fortgeschrittene Reduction der ersten Zehe, sowie die weiter gediehene Consolidation des Gebisses durch Verstärkung des hintersten Pr und des ersten M — welche auf Kosten des vordersten Pr und des hintersten M erfolgt ist — rechtfertigen die generische Trennung.

P. Gervais hat diese Gattung Palhyaena, Nordmann Thalassictis genannt; von Wagner stammt der Name Galcotherium.

Ictitherium hipparionum Gerv. sp.

Es ist dies die grösste aller bekannten lebenden und fossilen Viverriden.

Von dem am besten studirten *Ictitherium robustum* unterscheidet sich diese Art nicht blos durch ihre viel beträchtlicheren Dimensionen, sondern auch durch die verhältnissmässig viel weiter fortgeschrittene Reduction des oberen M_2 , der hier nur noch halb so gross ist wie der M_1 .

Auch besitzt dieser Zahn hier ovalen Querschnitt. Im Ganzen sind die Zähne insgesammt viel massiver als bei *robustum*, die *M* aber schon sehr viel kürzer. Jedenfalls steht diese Art den Hyänen morphologisch noch näher als die übrigen *Ictitherium*-Arten; in Wirklichkeit aber sind wohl alle drei Species dieser Gattung doch nur Viverren, die eine Reduction des Gebisses erfahren haben nach Art der Hyänen. Für diese Ansicht spricht die Gestalt der *Pr* und der Kiefer.

Länge des oberen $Pr_2 = 16 \text{ mm}$.

```
,, ,, ,, Pr_1= 29 (Pikermi), 26 (Cucuron) mm. Breite desselben = 15 mm. ,, ,, M_1= 9 mm; Breite desselben = 14 mm. ,, ,, M_2= 4 ,, ,, = 7 ,, ,, unteren M_1= 20 ,, Länge des unteren Pr_1= 16 mm. ,, ,, M_2= 7 mm.
```

Schon Gervais hatte vermuthet, dass diese den Hyänen scheinbar so ähnliche Art gleichwohl zu *Ictitherium* gestellt werden müsste. Skelet nicht bekannt.

Vorkommen: Im Pliocän von Pikermi, Cucuron und Mont Lebéron; ferner auch in Maragha.

Ictitherium Orbignyi Gaudry.

Gaudry: Attique, p. 74, pl. XI.

Mont Lebéron, p. 21, pl. II, fig. 11.

" Enchainements, p. 216, fig. 284.

Depéret et Rerolle: Bull. soc. géol. 1884, 85, p. 504.

Synonyma: Viverra Orbignyi und Thalassictis Orbignyi.

Diese Art steht der Grösse nach zwischen Viverra genetta und zibetha. Die Zacken der unteren M sind spitzer und schlanker als bei Ictitherium robustum, auch hat sich der M_2 hier noch nicht so sehr verkürzt. Die M des Oberkiefers besitzen eine relativ nicht unbeträchtliche Breite; ihre Oberfläche weist zahlreiche Rauhigkeiten auf.

Länge des oberen $Pr_1 = 10 \text{ mm}$; Breite desselben = 6 mm.

,, ,, ,,
$$M_1 = 5$$
 ,, ,, =8 ,, Breite des oberen $M_2 = 6$ mm.

" " unteren
$$M_1 = 9$$
 "

$$M_2 = 7 ,$$

Länge der unteren Zahnreihe = 50 mm; Länge des Unterkiefers = 78 mm.

Vorkommen: Im Pliocän von Pikermi, Mont Lebéron und in der Cerdaigne (Pyrénées).

Ictitherium robustum Nordm. sp.

Wagner: Galeotherium, Abhandl. d. k. bayr. Akad. d. Wiss., math.-phys. Cl. 1840. Bd. III, Abth. I, p. 163, Taf. I, Fig. 45.

" Ictitherium viverrinum, Ibidem, 1854, Bd. VII, p. 22, Taf. VIII, fig. 3-5.

Nordmann: Thalassictis robusta, Palaeontologie Südrusslands p. 151, Taf. I, fig. 1-8, 10.

P. Gervais: "Zool. et. Pal. fr. p. 222, fig. 24, 25 (Holzschnitt).

Gaudry: Ictitherium robustum, Attique, p. 52, pl. VII-X.

" Enchainements, p. 217, fig. 285.

Lydekker: " Catalogue, p. 94.

Das Thier hat etwa die Grösse eines Schakals. Die Kaufläche der oberen M ist in frischem Zustand anscheinend mit Wülsten bedeckt. Der M_1 ist nur wenig breiter als lang.

Schädellänge = 150 mm. Breite desselben incl. der Jochbogen = 100 mm.

Obere Zahnreihe = 86 mm.

Die beiden M messen zusammen 15 mm.

Länge des oberen $Pr_1 = 20 \text{ mm}$; die vier Pr messen zusammen = 49 mm.

", " ",
$$M_1 = 9$$
", Breite desselben = 13 mm.

$$M_2 = 6 , m_2 = 8 ,$$

Untere Zahnreihe = 81 mm.

Länge des $Pr_1 = 15 \text{ mm}$; die vier Pr zusammen = 43 mm.

", " ",
$$M_1 = 17$$
 ", " zwei M ", = 24 ",

$$M_2 = 9 \text{ mm}.$$

Länge des Kiefers = 120 mm. Höhe desselben unter dem $M_1 =$ 16 mm.

Das Skelet ist von dieser Art vollständig bekannt.

Vorkommen: Im Pliocan von Pikermi und Bessarabien.

Thalassictis incerta.

P. Gervais: Zool. et. Pal. fr. p. 221, pl. 23, Fig. 3.

Dieser Name bezieht sich auf einen unteren M_1 aus dem Obermiocän von Sansan, der in seiner Zusammensetzung sehr lebhaft an *Ictitherium robustum* erinnert und auch so ziemlich

die gleichen Dimensionen aufweist. Der Innenzacken des Talons steht weit zurück, wie bei *Viverra* selbst. Der Hinterzacken scheint noch erhalten zu sein. Der Talon hat eine ziemlich beträchtliche Grösse. Um so kleiner ist aber dafür der Innenzacken der Vorderpartie. Letztere hat überhaupt bedeutend an Höhe verloren.

Herpestidae.

Diese Familie stellt einen Seitenzweig der Viverren dar, dessen Herkunft sich jedoch noch nicht mit voller-Bestimmtheit ermitteln lässt, denn die ältesten fossilen Viverren, die man kennt, sind in mehreren Punkten schon weiter fortgeschritten als manche der lebenden Herpestiden. Es gilt dies sowohl hinsichtlich der Reduction des unteren M_2 als auch hinsichtlich der Differenzirung des oberen Pr₁. Der zweite Aussenhöcker dieses letzteren Zahnes ist nämlich oft noch als kurzer niedriger Kamm, statt als langgestreckte Schneide entwickelt, wie wir dies sonst bei fast allen Carnivoren und durchgehends bei Viverra beobachten können; nur gewisse Paradoxurus stimmen hierin mit der Gruppe der Herpestiden überein. Auch die oberen M sowie der untere M_{2} haben den ursprünglichen Typus noch ziemlich gut bewahrt. Der untere M_{2} besitzt nicht selten noch eine auffallende Grösse und weicht in seiner Zusammensetzung nur ganz wenig vom M, ab; der Unterschied besteht blos in der geringeren Entwicklung seines Vorder- und Aussenzackens. Die oberen M sind echt trituberculär; sie sind fast ausschliesslich aus zwei Aussenhöckern und einem weit hereinragenden Innenhöcker zusammengesetzt. Basalbildungen fehlen nahezu vollständig. Der untere M, hat drei hohe Zacken in seiner Vorderpartie und einen ziemlich mächtigen, nach der Innenseite zu sanft abfallenden Talon. Die drei ursprünglichen Zacken dieses Talons sind mit Ausnahme des Aussenzackens ziemlich undeutlich geworden; der Hinterzacken lässt sich zwar noch zur Noth erkennen, dagegen ist der Innenzacken sehr leicht zu übersehen, umsomehr als derselbe ziemlich weit nach hinten gerückt ist. Vor demselben öffnet sich die Talongrube. Bei den miocänen Arten sind diese drei Zacken des Talons noch sehr deutlich, und geben dieselben daher auch einigermassen Aufschluss darüber, wie das Gebiss bei der Stammform aller Herpestiden beschaffen war. Als solche kann nur ein Viverra-ähnlicher Typus gelten, doch muss bei demselben der obere Pr, noch kürzer und der untere M, noch mächtiger und complicirter gewesen sein, als dies bei Viverra selbst der Fall ist.

In dieser Beziehung genügen für einen Theil der Herpestiden die fossilen Viverra simplicidens und minima ziemlich gut, noch besser freilich die miocänen Herpestes. Es sind dies die echten Herpestes mit kleinem M_2 und langem oberen Pr_1 .

Die untermiocänen Formen haben folgende Merkmale:

Die Pr bekommen sehr leicht Nebenzacken; zugleich tritt ein Basalwulst auf, sowohl am Vorder- als auch am Hinterrande. Der obere Pr_1 besitzt einen ziemlich starken Innenzacken. Am unteren M_1 ist der Innenzacken im Gegensatz zu dem entsprechenden Zahn der recenten Formen noch immer sehr deutlich, steht aber auch schon sehr weit zurück, so dass die Talongrube nach der Innenseite des Zahnes einen Ausgang erhält. Der untere M_2 ist bis jetzt noch nicht bekannt; beeine ehemals getrennten Wurzeln sind zu einer einzigen verschmolzen, doch zeigt diese Wurzel noch in der Mitte eine Einschnürung. Der obere M_1 hat dreiseitigen, der M_2 jedoch ovalen Quer-

¹⁾ Nach der Zeichnung H. v. Meyer's war der Talon sehr kurz, der Innen- und Aussenzacken der Vorderpartie sind deutlich zu erkennen; etwas weniger ist dies mit dem Vorderzacken der Fall.

schnitt. Dieser letztere M ist auch viel kleiner als der erstere, lässt aber doch ungefähr die gleiche Zusammensetzung erkennen. Der Unterkiefer ist schon ziemlich kurz geworden; sein Unterrand weist eine starke Krümmung auf. Die Stirne ist wie bei den lebenden Herpestes ziemlich stark gewölbt.

Viverra (oder Herpestes) minima aus den Phosphoriten kann allenfalls für den directen Vorläufer dieser untermiocänen Herpestes gelten. Die Veränderungen, die hiebei erfolgt sein müssen, bestehen lediglich in Verkürzung des unteren M_2 , in Verschmälerung des oberen M_2 und in Verkürzung der Kiefer.

Von den miocänen oder richtiger von diesen nahe verwandten Herpestiden gehen wohl die den Namen Herpestes, Ichneumon, Mangusta und Atylax beschriebenen Formen aus. Die grösste Aehnlichkeit mit jenen fossilen Arten finden wir bei Herpestes pulverulentus, ichneumon und caffer. Der untere M_2 ist bei allen dreien noch schwächer geworden, hat aber seine ursprüngliche Zusammensetzung noch ziemlich gut bewahrt. Der Pr_4 des Unterkiefers ist eben im Verschwinden begriffen. Gegen einen directen Zusammenhang dieser lebenden Arten mit den erwähnten fossilen Formen spricht indess der Umstand, dass der obere M_2 bei den ersteren noch immer einen dreiseitigen Querschnitt besitzt gleich dem M_1 , während dieser Zahn bei den letzteren einen ovalen Umriss erhalten, seine ursprüngliche Gestalt also schon mehr verändert hat. Bei Mangusta paludinosa sind die Zähne viel massiver als bei den Herpestiden aus dem Miocän. Der Innenzacken am Talon des unteren M_1 hat sich fast ganz verloren. Die Grösse des unteren M_2 ist noch viel zu beträchtlich, als dass diese Art von den bisher bekannten fossilen Formen abgeleitet werden könnte. Wohl aber könnte Herpestes vitticolis mit seinem kleinen M_2 der Nachkomme von lemanensis etc. sein.

Bei Herpestes javanicus und pallidus ist der M_2 in beiden Kiefern noch viel massiver und grösser als bei den fossilen europäischen Arten. Es müssen diese ersteren also wohl auf Formen bezogen werden, deren M noch ursprünglicher waren als bei diesen letzteren Typen.

Die Gattungen Galidictis und Galidia — in Madagascar lebend — haben Reduction der Pr-Zahl erlitten; der Pr_4 ist in beiden Kiefern verloren gegangen. Der untere M_2 hat noch complicirteren Bau als der von H. lemanensis etc., stimmt aber vermuthlich ganz gut mit minimus. Im Vergleich zu diesem erscheinen die Kiefer stark verkürzt. Der Pr_1 des Oberkiefers sowie die beiden oberen M sehen denen von "Viverra antiqua" sehr ähnlich.

Die folgenden Gattungen zeichnen sich durch den sehr primitiven Bau ihrer M und ihres oberen Pr_1 aus. Die Fortschritte im Gebiss äussern sich fast ausschliesslich in Reduction der Zahl der Pr, die meist auf $\frac{3}{3}$ zurückgegangen ist, sowie in Verstärkung des unteren Pr_1 und des oberen Pr_2 . — Der letztere hat einen Innenhöcker, der erstere einen kräftigen Nebenzacken erhalten. Auch der Innenhöcker des Pr_1 hat sich bedeutend vergrössert. Ich bin sehr versucht, diese Formen als einen ganz besonderen Zweig zu betrachten, der möglicherweise gar auf Didymictis-ähnliche Typen zurückgreift. Bemerkenswerth ist auch die auffallende Verkürzung der Gesichtspartie, die Bildung eines geschlossenen Orbital-Ringes und die starke Reduction der Seitenzehen.

Die fortgeschrittenste Form ist Suricata (Rhizaena). Die Verkürzung der Gesichtspartie erreicht hier den höchsten Grad; die erste Zehe ist vollständig verschwunden. Die Zahl der Pr ist blos mehr $\frac{3}{3}$. Daneben hat allerdings der M_2 des Unterkiefers noch die normale Zusammensetzung und überdies auch nahezu seine ursprüngliche Grösse bewahrt. Auch der obere M_2 ist fast noch ebenso gross wie der M_1 . Der obere Pr_1 hat zwar seinen Innenhöcker weit nach innen vorgeschoben, sein zweiter Aussenhöcker ist aber noch sehr schwach geblieben; auch hat der Zahn so gut wie gar keine Verlängerung erfahren.

Crossarchus hat mit der vorigen Gattung die Zahnzahl $(\frac{3}{3} Pr)$ gemein. Der obere Pr_1 ist noch immer sehr kurz. Der untere M_2 hat zwar noch ansehnliche Grösse, allein der Vorderzacken ist schon ziemlich schwach geworden.


Cynictis und Ichneumia haben den Pr_4 noch in beiden Kiefern bewahrt; die erstere Gattung schliesst sich im Zahnbau noch sehr enge an Crossarchus an, doch ist die Zahl der Pr noch die ursprüngliche. Auch lässt sich hier der Vorderzacken noch am unteren M_2 besser erkennen als bei dieser letztgenannten Gattung. Dafür hat sich jedoch der obere Pr_1 schon mehr in die Länge gezogen. Auch ist die erste Zehe am Hinterfuss schon völlig verschwunden.

Ichneumia sieht hinsichtlich der Bezahnung dem Cynictis sehr ähnlich, nur besitzt der Talon der beiden unteren M einen eigenthümlichen Kegel in seiner Mitte.

Alle diese auf Afrika beschränkten Gattungen gehen wahrscheinlich auf eine gemeinsame Stammform zurück mit $\frac{4}{4}$ Pr. Die Zähne derselben dürften wohl denen von Cynictis am ähnlichsten gewesen sein, nur war der obere Pr_1 vermuthlich noch sehr kurz — wie bei Suricata — und sein Innenhöcker noch relativ ziemlich klein. Die Gesichtspartie hatte jedenfalls noch eine beträchtliche Länge; der Orbital-Ring war noch nicht geschlossen, und die erste Zehe war sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterextremität sehr vollständig entwickelt. Die Heimat dieser etwa obermiocänen Form dürfen wir wohl in Afrika suchen.

Diesem Formenkreis gehören vermuthlich auch Bdeogale, Rhinogale und Helogale an; da ich dieselben jedoch nicht aus eigener Anschauung kenne, muss ich von ihrer Besprechung absehen.

Der Zusammenhang der Herpestiden unter einander wäre etwa folgender:



Herpestes minimus Lyd.

Siehe Viverra minima Filh.

Herpestes lemanensis Pomel.

Pomel. Catalogue méthodique, p. 65.

Filhol. Ann. scienc. géol. T. X, p. 166, pl. 23. fig. 1-12.

Lydekker. Catalogue Part. V, p. 317.

Diese Art ist die grösste von den im Untermiocän vorkommenden Herpesten. Unter den recenten steht Herpestes paludinosus am nächsten. Nach Pomel soll Lutrictis Valetoni P. Gerv. identisch sein, eine Angabe, die indess als vollkommen irrig bezeichnet werden muss.

 $^{^{1}}$) Der obere Pr_{1} hier immer noch einfacher und der untere M_{2} immer noch grösser, als dass der alttertiäre Herpestes minimus als directer Ahnen dieser Formen gelten könnte.

Die Dimensionen dieser Art können nach Filhol beträchtlich variiren. Die Pr besitzen einen grossen Tuberkel auf ihrer Rückseite und ausserdem ein kräftiges Basalband, der untere M hat ziemlich bedeutende Dimensionen.

Die Länge des Unterkiefers = 78 mm, die Länge der unteren Zahnreihe = 38 mm bis 42 mm. Die vier Pr messen zusammen 24 mm. Die Länge des $M_1 = 9$ mm, seine Höhe = 6 mm.

Höhe des Kiefers ungemein schwankend. Der Pr_1 kann fast ebenso gross werden wie der M_1 .

Herpestes primaevus Pom. ist nach Filhol ein lemanensis, dessen Pr sehr nahe beisammenstehen. Pr_1 und M_2 sind ziemlich schwach.

Im Untermiocan von St.-Gérand-le-Puy.

Hieher oder zu dem folgenden gehört wohl der von Filhol beschriebene Schädel der Viverra antiqua von der gleichen Localität.

Herpestes priscus Filh.

Taf. VIII, Fig. 45. 59. Taf. IX, Fig. 31. 36.

Filhol. Ann. sienc. géol. T. X, p. 161, pl. 24, fig. 5-9.

Die Länge des Unterkiefers beträgt nach Filhol 76 mm, die Länge der Zahnreihe 42 (bei einem zweiten Exemplar 38) mm. Die vier Fr nehmen einen Raum ein von 27 (bei einem zweiten nur 23) mm. Der M_1 hat eine Länge von 115 mm. Die Breite desselben = 5 mm; seine Höhe = 7 mm (bei einem zweiten Exemplar hat dieser Zahn eine Länge von nur 9, eine Breite von 4 und eine Höhe von 6 mm). Das Minimum der Länge der Zahnreihe ist nach dem genannten Autor 33 mm.

Filhol glaubt, dass der Schädel von "Viverra antiqua" von dem gleichen Thier herrühren dürfte, was wohl sehr wahrscheinlich ist.

Auch diese Art findet sich in St.-Gérand-le-Puy.

Die Unterschiede in den Dimensionen von *H. lemanensis* und *priscus* sind so unbedeutend, dass ich fast Bedenken trage, diese specifische Trennung aufrecht zu halten. Immerhin scheinen wirklich in St.-Gérand-le-Puy mehrere Arten von *Herpestes* vorzukommen.

I. Vor Allem dürfte der Pomel'sche Herpestes primaeva — Catalogue meth. p. 65 sehr gut begründet sein. Mir liegen von St.-Gerand drei Unterkiefer vor, die sich durch die Länge des Pr_1 auszeichnen und deren Pr dicht aneinander stehen, wie dies bei Pomel's primaeva der Fall ist. In ihren Dimensionen steht diese Form dem lemanensis nach.

Der Pr_1 hat eine Länge von 8 mm. Das Basalband bildet einen wirklichen Talon. Der Nebenzacken ist sehr weit nach aussen gerückt. Die Breite des $Pr_1 = 4.5$ mm. Auch am Pr_2 ist ein kräftiger Nebenzacken entwickelt.

Der M_1 hat eine Länge von 10 mm.

2. Dem typischen lemanensis scheinen von den Exemplaren des Münchener Museums 8 Stücke anzugehören. Die Kiefer sind eher noch grösser als bei primaeva. Der M_1 aber bleibt kleiner; die Pr sind schwächer, namentlich viel schmäler. Die Nebenzacken werden nicht so kräftig wie beim Vorigen. Einer dieser Kiefer hat eine Totallänge von 82 mm (ohne C). Die Dimensionen der Zähne stimmen mit den von Filhol angegebenen überein. Der mir vorliegende Gypsabguss des Schädels der "Viverra lemanensis" aus Treteau (Allier) passt sehr gut zu diesen Unterkiefern, desgleichen ein Oberkiefer-Fragment mit M_1 und den Alveolen des Pr_1 und M_2 . Der M_1 hat eine Länge von 7.5 und eine Breite von 9.5 mm. Der Pr_1 hat eine Länge von 9.5 mm (?).

Mit dieser Form ist die "Viverra suevica" H. v. Mey. aus dem Ulmer Untermiocän sicher identisch und wohl auch mehrere in H. v. Meyer's Manuscript abgebildete Kiefer aus Weissenau.

3. Eine dritte Form aus St.-Gérand-le-Puy — vertreten durch vier Kiefer — ist um ein volles Viertel kleiner als die grösseren Exemplare des *lemanensis*. Der Grösse des Kiefers nach dürfte Filhol's *H. lemanensis*, pl. 23, fig. 1, zu dieser dritten Form zu rechnen sein. Wahrscheinlich haben wir es hier mit jenem Typus zu thun, welchen Pomel als *antiquus* bezeichnet hat, doch müssen wohl die von ihm erwähnten Oberkiefer hier abgetrennt und zu *lemanensis* gestellt werden.

Der Unterkiefer hat eine Länge von 60 mm. Die Höhe desselben unterhalb des $M_1 = 10.5$ mm. Die Länge der Zahnreihe = 30-33 mm. Die vier Pr messen zusammen 21 mm. Der Pr_1 hat eine Länge von 6.5-7 mm. Der Nebenzacken ist blos am Pr deutlich entwickelt. Im Ganzen sehen die Zähne denen des *lemanensis* sehr ähnlich.

Die Länge des $M_1 = 8-8.8 \text{ mm}$; seine Höhe = 5.5 mm; seine Breite = 4.2 mm.

Es scheint diese Form auch in Weissenau vorzukommen, wenigstens stimmen den Dimensionen nach mehrere von H. v. Meyer gezeichnete Kiefer. Ausserdem fand ich einen solchen auch unter dem Eckinger Materiale.

Von dem Herpestes lemanensis liegen wir sowohl aus St.-Gérand-le-Puy als auch aus Eckingen bei Ulm zahlreiche Extremitätenknochen vor. Dieselben sind ziemlich schlank, wenig gebogen und stimmen in ihren Dimensionen am besten mit jenen von Paradoxurus typus überein. Die Metacarpalien, Tarsalien und Metatarsalien sind sehr viel länger und schlanker. Sie kommen denen von Herpestes Ichneumon am nächsten.

Von einer eingehenderen Beschreibung dieser Knochen glaube ich absehen zu dürfen, nur darauf möchte ich hinweisen, dass die Anordnung und das Aussehen der Metapodien mit denen von *Cynodictis* sehr viele Aehnlichkeit besitzt, doch haben dieselben hier nahezu kreisrunden Querschnitt.

```
Die Länge des Mt III = 35 mm; die Dicke in Mitte = 3.5 mm; die Breite der Rolle = 5 mm.

"""""IV = 36 """""""" = 3.5 """"""" """ "" = 4.8 "

""""Mc II = 19.5 """"" "" " = 3 "" " " " " " " " = 4.2 "

"""""V = 18 """" " " " = 3 " " " " " " " " " — 4.5 "

Die Länge des Radius = 72 mm.
```

Vorkommen: Im Untermiocän von St.-Gérand-le-Puy, Eckingen bei Ulm und Weissenau bei Mainz.

```
Taf. VIII, Fig. 45. Oberer M_1 von unten beide aus Eckingen bei Ulm. (6.5 mm lang, Fig. 59. Oberer M_2 ,, ,, g mm breit.)
```

Taf. IX, Fig. 31. Untere M_1-Pr_3 von oben.

Fig. 36. " " " " innen und von aussen, eben daher, Original zu "Viverra suevica" H. v. Meyer.

Viverra antiqua Blainville.

```
Blainville. Ostéographie Viverra, pl. XII.

Pomel. Catalogue methodique. p. 63.

P. Gervais. Zool. et Pal. franç., p. 223, pl. 28, fig. 7.

Filhol. Ann. scienc. géol. T. X, p. 152, pl. 26, fig. I, non pl. 19, fig. I—7.

Lydekker. Catalogue, 1885, p. 102.
```

Der Name Viverra antiqua bezieht sich auf ein Oberkiefer-Fragment und einen Unterkiefer, dessen Zähne jedoch ausgefallen sind. Der zweite von Blainville abgebildete Kieferrest gestattet

überhaupt keine nähere Bestimmung. Der erstere Kiefer gehört dagegen wohl zweifellos zu Herpestes lemanensis.

Was die von Gervais gezeichneten Reste betrifft, so ist das Oberkiefer-Fragment anscheinend eine Copie des Blainville'schen Originals; der Unterkiefer — Fig. 8 — dagegen darf wegen der auffallenden Länge des M_2 überhaupt nicht zu Viverra beziehungsweise Herpestes gestellt werden, sondern ist ganz sicher ein Amphictis.

Filhol bildet einen vollständigen Schädel und ein Oberkiefer-Fragment ab. Die Zähne dieses Schädels sind entschieden zu gross für die Viverra antiqua Blainville's. Auch hat der M_2 hier einen dreieckigen Umriss, während der des Blainville'schen Originals nahezu oval erscheint.

Der Schädel gehört jedenfalls zu einem grossen Exemplar des Herpestes lemanensis, wie Filhol sehr richtig bemerkt. Von den lebenden Viverren weicht derselbe ziemlich bedeutend ab; am besten stimmt noch Civetta, während die hinteren Zähne mehr an Genetta erinnern. Die Gesichtspartie ist viel kürzer als bei den Viverren und verhält sich hierin wie bei den Herpesten; im Gegensatze zu diesen ist jedoch die Schädelkapsel viel kleiner und viel weniger gewölbt. Es nähert sich der fossile Schädel hierin wieder mehr den Viverren, desgleichen in der Entwicklung der Jochbogen und des Pfeilnahtkammes. Das Ictitherium von Pikermi schliesst sich wohl noch enger an die Viverren an.

Das Gehirn hat Lartet beschrieben. Es ist im Verhältniss kleiner als bei den Viverren und erstreckt sich auch nicht so weit nach vorne, obwohl die Riechlappen viel kräftiger sind wie bei diesen.

Hinsichtlich des Gebisses steht Herpestes paludinosus sowie Viverra zibetha unbedingt am nächsten, doch weicht die Gestalt des M_2 ganz bedeutend ab. Derselbe hat dreiseitigen Querschnitt — bei Viverra oval, bei Mangusta oblong. In dieser Beziehung hat Bassaris entschieden die grösste Aehnlichkeit. Was den M_1 betrifft, so sieht derselbe unbedingt dem von Herpestes paludinosus am ähnlichsten. Er hat ebenfalls dreiseitigen Querschnitt. Der Vorderrand ist jedoch hier bei dem fossilen noch viel gerader, wofür jedoch die Aussenseite eine ziemlich tiefe Einbuchtung aufweist. Während bei paludinosus der zweite Aussenhöcker sehr kräftig entwickelt erscheint, ist derselbe bei dem Filhol'schen Original sehr klein geblieben. Der Innenhöcker des Pr_1 hat noch nicht die gleiche Grösse erreicht wie der des paludinosus. Bei der Verschiedenheit der recenten Herpestes untereinander darf jedoch dieser Schädel unbedenklich bei Herpestes belassen werden, da er von dem des paludinosus sehr viel weniger abweicht, als jener mancher lebenden Arten, die trotzdem noch zu Herpestes gerechnet werden.

Die Länge dieses Schädels = 123 mm von den \mathcal{F} bis zum Occipitalforamen und 137 bis zum Occiputrande. Die Breite = 77 mm. Die Zahnreihe hinter dem C=38 mm. Davon treffen auf die vier Pr 26 mm. (?) Die Länge des $Pr_1=11$ mm. Die Länge des $M_1=6.5$ mm. Länge des $M_2=3$ mm.

Das kleinere Kieferstück, welches Filhol pl. 26 fig. 1 abgebildet hat, scheint wohl zu einem ganz ähnlichen Thier zu gehören wie das Blainville'sche Original. Beide stehen in ihren Dimensionen sehr weit zurück hinter denen des eben besprochenen Schädels. Auch weicht die Beschaffenheit des M_2 etwas ab, wenigstens hat der M_2 des Blainville'schen Originals entschieden gerundeten Querschnitt — beim Filhol'schen Exemplar fehlt derselbe. — Blainville vergleicht dieses Stück mit $Viverra\ indica$.

Wahrscheinlich müssen diese kleineren Oberkiefer der "Viverra antiqua" auf Herpestes sp. die grösseren, darunter der erwähnte Schädel, auf Herpestes lemanensis bezogen werden.

Herpestes sp.

Die bei lemanensis erwähnten kleinen Kiefer dürften wohl für die Existenz einer dritten untermiocänen Herpestes-Art sprechen. Wie ich schon oben bemerkt habe, bezieht sich vermuthlich auf solche Stücke der Pomel'sche Name Herpertes antiquus.

Vorkommen: In den untermiocänen Ablagerungen von St. Gérand-le-Puy, Eckingen und Weissenau.

Herpestes crassus. Filh.

Filhol. Mammiféres fossiles de l'époque miocène. Arch. du Mus. d' Hist. nat. Lyon 1881. p. 63, pl. IV, fig. 10-11. Depéret. Archives du Museum d' Hist. nat. Lyon 1887. p. 135.

Diese Art wurde auf ein Unterkiefer-Fragment gegründet, mit C und dem Pr_2 und Pr_3 . Der Pr_4 war bereits sehr klein, der Alveole nach zu schliessen. Umso gewaltiger und massiver sind die beiden folgenden Pr. Ihre Höhe ist freilich ziemlich gering, die Spitze wenig scharf. Es erinnern diese Zähne lebhaft an jene der Herpestes von St. Gérand-le-Puy. Der Pr_2 trägt einen deutlichen Nebenzacken. An Vorder- und Hinterrand ist das sonst sehr schwache Basalband zu einem Wulst angeschwollen. Der Pr_3 hat eine Länge von 9 mm und eine Höhe von 5 mm, der Pr_2 misst 10 mm in der Länge und 6 mm in der Höhe. Jourdan hatte diesen Kiefer mit dem Namen Hypopleurus belegt.

Vorkommen: Im Obermiocan von Grive-St. Alban (Isère).

Subursi.

Diese in der Gegenwart durch sehr mannigfaltige Formen ausgezeichnete Gruppe ist im Tertiär so gut wie gar nicht vertreten. Wahrscheinlich hatte dieselbe schon damals die gleichen Wohnsitze inne wie heutzutage; aus diesen Gegenden sind aber bis jetzt überhaupt keine oder doch nur sehr wenige Tertiär-Ablagerungen bekannt; das scheinbare Fehlen fossiler Subursen erklärt sich also ganz ungezwungen durch die Lückenhaftigkeit der paläontologischen Ueberlieferung.

Die Organisation der Subursen deutet mit Entschiedenheit darauf hin, dass dieselben schon geraume Zeit als selbstständiger Formenkreis existiren müssen, denn wir finden neben der ganz primitiven Beschaffenheit des Extremitätenskelettes doch auch sehr weitgehende Differenzirung, so bei manchen Verkürzung der Kiefer, bei gar allen aber eine sehr bedeutende Verstärkung und Complication der M nebst Reduction der Pr.

Die Subursen besitzen sämmtlich noch ein Epicondylarforamen am Humerus, kurze Metacarpalien und Metatarsalien — immer in der Fünfzahl vorhanden — wenig differenzirte Endphalangen — kurz aber spitz und wenig gebogen; ferner sind bei ihnen die Rudimente der rückgebildeten Finger und Zehen noch am deutlichsten entwickelt unter allen Carnivoren, und endlich stimmt der Schädel in den wesentlichsten Punkten mit jenem der Hunde und Bären überein, deren Schädel noch als der ursprünglichste aller Carnivoren betrachtet werden kann. Die Modernisirung desselben äussert sich bei den Subursen nur in der Verkürzung der Kiefer.

Auch die Subursen müssen unbedingt auf einen Typus mit mindestens $\frac{3}{3}\mathcal{F}_{1}^{1}C\frac{4}{4}Pr\frac{3}{3}M$ zurückgeführt werden. Die Pr dieser Stammform waren gleich jenen der Hunde und Viverren noch sehr schlank; der obere Pr_{1} hatte einen sehr schwachen Innenhöcker. Die unteren M hatten

drei Zacken in der Vorderhälfte und einen Talon, nach Art der Viverren. Die oberen M waren echt trituberculär, also aus zwei Aussen- und einem Innenhöcker gebildet; das innere Basalband kann nur sehr schmal und dünn gewesen sein.

Die Zahl der Pr hat sehr oft eine Beschränkung erlitten $-\frac{3}{3}$ — und nebenbei ist auch zuweilen noch Verkürzung der bleibenden Pr erfolgt. Das auf diese Weise ersparte Material kam freilich den M, vor Allem dem M_1 des Unterkiefers und den beiden oberen M, ausserdem aber auch noch dem oberen Pr_1 zu Gute. Dieser letztere ist zwar meist sehr kurz geblieben, hat aber eine bedeutende Verdickung seines Innenhöcker erfahren, und ausserdem hat sich auch noch ein zweiter Innenhöcker, manchmal sogar auch noch ein secundärer Aussenhöcker gebildet. Die Reduction des unteren M_2 beschränkte sich in den meisten Fällen auf das Niedrigerwerden der drei Zacken der Vorderpartie, auch kam es nicht einmal immer zum Verschwinden des Vorderzackens. Die Zahl der M war früher wohl jedenfallss $\frac{3}{3}$, doch muss dieser dritte M in beiden Kiefern schon sehr frühzeitig verloren gegangen sein.

Die Beschaffenheit des Talons der unteren M, soferne derselbe eben noch nicht allzusehr modificirt ist, stimmt am besten mit jenem der geologisch älteren Viverren. Wie bei diesen besitzt auch hier der Talon eine sehr hohe Aussenwand, so dass dieser Theil der M mehr oder weniger als Schneide entwickelt erscheint; doch weist derselbe eben ganz wie bei den Viverren auf seiner Innenseite einen Höcker auf, so dass seine Grube noch einen schmalen Ausgang behält, und zwar unmittelbar hinter dem grossen Innenzacken der Vorderpartie. Am Talon des unteren M_2 zeigt sich manchmal z. B. bei Procyon der Anfang eines dritten Lobus.

 $\frac{3}{3}$ Pr $\frac{2}{3}$ M. Pr sehr kurz, untere M mit sehr niedrigen Zacken.

Cercoleptes zeigt auffallende Verkürzung der Kiefer. Die Wurzeln der Pr_2 und $_3$ sind schon dicht aneinander gerückt und sogar mit einander verschmolzen. Zacken der Pr sehr niedrig, jene der unteren M nahezu völlig verschwunden. M_2 noch zweiwurzelig, wenig reducirt. Obere M trituberculär; ziemlich breiter Basalwulst auf Innenseite. Der Pr_1 des Oberkiefers hat einen zweiten Aussenhöcker erhalten. Der Schwanz hat eine sehr beträchtliche Länge. Von den übrigen Subursen unterscheidet sich diese Gattung sehr wesentlich, doch hat sie wohl die gleiche Stammform wie die folgende Gattung.

Arctictis. Pr_2 und $_3$ noch zweiwurzelig, hochzackig. Am oberen Pr_1 fehlt noch der zweite Aussenzacken. Der untere und obere M_1 ist relativ noch wenig verändert. Die Vorderpartie des unteren M_1 bleibt noch sehr viel höher als die Hinterpartie; der Talon stellt eine deutliche Grube dar. Ein alterthümliches Merkmal ist ferner auch die Länge der Kiefer. Als Fortschritt erweist sich die Reduction der M_2 . Sie bestehen blos mehr aus einer Wurzel und einer knopfförmigen Krone.

Die beiden Gattungen gemeinsame, aber sehr weit zurück liegende Stammform stimmt vermuthlich mit Arctictis hinsichtlich der Länge der Kiefer und demzufolge auch in der ursprünglichen Ausbildung der Pr— Zweizahl der Wurzeln und Höhe der Zacken. Mit Cercoleptes theilte dieser hypothetische Typus die primitivere Ausbildung der M_2 . Der Schädel von Arctictis und daher jedenfalls auch der seiner Ahnen erinnert an Cynodictis und Amphicyon— ist also ziemlich primitiv. Die Extremitäten von Arctictis und Cercoleptes gleichen einander in allen wesentlichen Punkten. Auch die Länge des Schwanzes ist bei beiden im Verhältniss gleich und für Carnivoren sehr bedeutend.

 4 $^{(3)}$ Pr 2 2 M. Oberer Pr_1 sehr beträchtlich verstärkt durch einen secundären Innenhöcker und secundäre Aussenhöcker. Unterer Pr_1 hat einen deutlichen Talon erhalten. Unterer M_2 noch

sehr vollständig, nur der Vorderzacken ist undeutlich geworden. In der Vorderhälfte des unteren M_1 hat die Höhe der Zacken etwas abgenommen; Talon sehr gross. Oberer M_1 sehr deutlich trituberculär, hat jedoch einen secundären Innenhöcker und ein schwaches Basalband bekommen. M_2 echt trituberculär. Kiefer sehr lang, Unterkieferrand hinten noch ziemlich stark abgeplattet (Rest des einspringenden Lappens der Marsupsialier?). Diese Merkmale kommen der Stammform von Ailurus, Procyon und Nasua zu.


Nasua ist die primitivste dieser drei Gattungen. Kiefer noch ungemein lang. Der obere Pr_1 hat erst einen secundären Aussenzacken. Die übrigen Pr noch sehr einfach gebaut. Zacken der unteren M noch ziemlich spitz. Basalband an den oberen M noch sehr schwach. Der ganze Fortschritt beschränkt sich fast blos auf die eigenartige Differenzirung der C, die hier zweikantig geworden sind und so eher an die Eckzähne von Dicotyles und anderen Artiodactylen als an solche von Carnivoren erinnern.

Procyon. Die Complication des oberen Pr_1 und der oberen M ist noch ein wenig weiter gediehen als bei Nasua, aber ganz in dem gleichen Sinne, dafür hat sich jedoch der Canin noch gar nicht verändert. Der Schädel hat eine relativ nicht unbeträchtliche Verkürzung der Kiefer erfahren. Das auf diese Weise ersparte Material ist jedoch dem Cranium zu Gute gekommen.

Beide gehen auf einen gemeinsamen, etwa obermiocänen Ahnen zurück, der von Nasua den Schädel, von Procyon die Caninen besass. Seine M und Pr waren mindestens noch ebenso einfach wie jene von Nasua. Der Schwanz hatte noch eine sehr beträchtliche Länge.

Ailurus hat den oberen Pr_4 verloren; auch sind nicht blos die Zacken des unteren M_2 , sondern auch die des M_1 ebenso niedrig geworden wie der Talon. Nicht blos der Pr_1 , sondern sogar der Pr_2 hat verschiedene Secundärhöcker angesetzt. Solche haben sich auch allenthalben an den M entwickelt, so dass die Zähne beinahe eher den Zähnen mancher Hufthiere, z. B. Anoplotherium, als Carnivoren-Zähnen ähnlich sehen.

Die Verwandtschaft der Subursen-Gattungen untereinander und ihre Beziehung zu den übrigen Carnivoren lässt sich etwa in beiliegendem Schema zur Darstellung bringen.



Fossile Subursi sind in der alten und neuen Welt immer nur in spärlichen Resten bekannt.

Aelurus anglicus Boyd Dawkins.

1888. Quarterly Journal geolog. Soc. London p. 228, pl. X.

Aus dem Red Crag von Felixstowe beschreibt der genannte Autor ein Kieferfragment, das sich im Zahnbau sowohl als auch hinsichtlich der auffallenden Krümmung seines Unterrandes als das eines Aelurus herausstellte. Von Zähnen ist nur noch der M_2 vorhanden. Derselbe besteht

aus dem ursprünglichen Innen- und Aussenzacken und einem sehr complicirten Talon — grosser Aussenhöcker und vielen Nebenhöckern, die sich namentlich am Innen- und Hinterrande und zwischen allen grösseren Höckern entwickelt haben. Der ursprüngliche Vorderzacken ist hier sehr niedrig geworden; beim lebenden Aelurus hat sich derselbe noch besser erhalten, ist aber dafür etwas nach hinten gerückt. Die fossile Art übertrifft hinsichtlich ihrer Dimensionen den lebenden Aelurus fulgens um ein volles Drittel. Länge des $M_2 = 70$ mm, Breite desselben vorne = 40 mm, Höhe des Hauptzackens frisch = 10 mm? Höhe des Kiefers vor $M_2 = 87$ mm.

Florentino Ameghino nennt einen *Cynonasua* — Bolletin. Academia Nacional. Córdoba 1885. 8. p. 5.

Leidy beschreibt den oberen Pr_1 eines Leptarctus aus dem Miocän — White-River — von Nebraska. — Extinct-Fauna Nebraska 1869. p. 370, 70. pl. I, fig. 15, 16 — und einen Arctodus pristinus aus dem Postpliocän von Süd-Carolina, ferner einen Procyon lotor fossilis von eben daher und einen Procyon priscus aus dem Postpliocän von Illinois.

Auch Cope macht uns mit einen fossilen Subursen bekannt, dem Myxophagus spelaeus aus den Höhlen in Virginien, und endlich hat auch schon Lund in den brasilianischen Höhlen einen Nasua brasilianisch gefunden.

Ich glaube bei dem geringen geologischen Alter dieser Reste von einer genaueren Besprechung derselben absehen zu dürfen. Was aber den miocänen *Leptarctus* betrifft, so scheint mir dessen Zugehörigkeit zu den Subursen doch nicht so ganz sicher zu sein.

Die Gattung Didymictis aus dem nordamerikanischen Eocän steht dem Ausgangspunkt der Subursen offenbar nicht allzu ferne. Wie bei diesen, so hat auch hier am unteren M_2 die Bildung eines dritten Lobus begonnen. Allein bei der ganz im Sinne der älteren Viverren und Caniden erfolgten Differenzirung des oberen Pr_1 und des oberen M_1 verliert die Annahme, dass wir hier in Didymictis selbst den Ausgangspunkt der Subursen zu suchen hätten, sehr viel an Wahrscheinlichkeit, denn gerade die Zähne dieser lassen trotz aller moderner Zuthat die ursprüngliche Beschaffenheit noch recht wohl erkennen. Der Pr_1 ist noch auffallend kurz geblieben und die M zeigen den Trituberculartypus noch in relativ reiner Form. Auch ist der M_2 noch sehr gross, während er bei Didymictis schon bedeutende Reduction erlitten hat. Auch die Extremitäten sind im Vergleich zu jenen der übrigen Carnivoren und selbst der bisher bekannten Creodonten noch viel primitiver geblieben. Sie erinnern in manchen Beziehungen — so namentlich Humerus und Femur sogar an jene der Lemuren und Affen 1), die ja ebenfalls noch als durchaus ursprünglich bezeichnet werden müssen.

Hyaenidae.

Echte Hyänen treten erst im Pliocän auf, doch gibt es in Nordamerika im Obermiocän Formen, welche eigentlich nichts weiter sind als Hyänen mit noch ursprünglicherer Bezahnung.

Es gilt diese Familie nach den neueren Untersuchungen lediglich als eine Nebenlinie der Viverriden und kann ich mich auch vom paläontologischen Standpunkt mit dieser Anschauung ganz wohl einverstanden erklären. Sie verhält sich alsdann zu den Viverriden wie die Ursiden zu den Caniden, nur ist die Art der Specialisirung in beiden Fällen insoferne verschieden, als bei den Ursiden die Reduction des Gebisses sich auf die Pr beschränkte, die M aber einen sehr

¹⁾ Auf diese Aehnlichkeit, die zwischen Nasua und Tomitherium besteht, hat S. Lockwood in "American Naturalist" 1886, p. 321—325, aufmerksam gemacht, dieselbe aber freilich auch stark überschätzt.

viel kräftigeren Bau erlangten und die Extremitäten sich zu einer eigenartigen Plantigradie ausbildeten, während bei den Hyäniden die Reduction des Gebisses sich fast ausschliesslich in Verlust der meisten M und Vereinfachung der bleibenden M äusserte und die Differenzirung der Extremitäten in der Verlängerung der bleibenden Metapodien und dem Verlust der ersten Zehe (Daumen) zum Ausdruck gelangte.

Die Gattung Ictitherium hat auch schon ähnliche Specialisirung erlangt, schliesst sich jedoch in ihrem ganzen Habitus noch viel enger an die Viverren als an die Hyänen an. Ihre Zahnzahl ist noch höher $-\frac{2}{2}M$ — doch wäre dies an und für sich freilich kein Grund, die Gattung Ictitherium deshalb den Viverren zuzutheilen, allein der Bau der einzelnen Zähne weicht doch noch allzusehr von dem der Hyänen ab; es sind die Zähne hier viel schlanker und kommen auch in ihrer Zusammensetzung jenen der ersteren noch näher als denen der letzteren. Doch theilt Ictitherium mit den Hyänen die Anwesenheit eines sehr kräftigen Vorderhöckers am oberen Pr_1 . Dagegen hat der untere M_1 entschieden viel mehr Anklänge an Viverra als an Hyaena, und das Gleiche gilt auch von den M des Oberkiefers und dem M_2 des Unterkiefers. Ich ziehe es daher vor, Ictitherium bei den Viverren zu belassen und als einen Typus derselben zu betrachten, der einen ähnlichen Entwicklungsgang eingeschlagen hat wie die Hyänen.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass sich die beiden folgenden Formen als Ahnen der Hyänen erweisen werden.

Prohyaena n. gen.

Mit diesem Namen bezeichne ich den "Aclurodon" Wheelerianus Cope — Am. Naturalist 1883, p. 245, fig. 11 a—b. Extinct Dogs — der von dem ursprünglichen Aclurodon saevus Leidy total abweicht. Der letztere ist ein wirklicher Canide, der erstere jedoch zweifellos der Stammvater der Hyänen. Auch Cope hat bereits die Verwandtschaft desselben mit den Hyänen anerkannt, ihn aber trotzdem bei den Hunden belassen, weil sein Vorderfuss wahrscheinlich noch einen Daumen besessen hat. Da jedoch die Ahnen gar aller lebenden Carnivorentypen einmal fünf vollständige Zehen an jeder Extremität besessen haben müssen und überdies die Hyänen — siehe Crocuta Blainville, Ostéographie Hyaena, pl. V — selbst noch ganz deutliche Rudimente des Daumens aufweisen, so kann dieser Grund wohl kaum als triftig bezeichnet werden.

Mit den Hyänen hat dieser "Aelurodon" gemein den eigenthümlich massigen und gedrungenen Bau der Pr. Der obere Pr_1 stimmt hinsichtlich seiner Zusammensetzung ganz mit dem der eben genannten Gruppe. Wie bei dieser hat sich ausser dem Innen- und Haupthöcker und der Schneide noch ein kräftiger Vorderhöcker entwickelt. Der untere M_1 hat noch Talon und Innenzacken, beide sind aber schon sehr klein geworden. Der Talon besitzt noch einen Innenzacken, ganz wie bei den Viverren. Der obere M_1 ist noch echt trituberculär, nur hat sich an seiner Innenseite ein ziemlich dicker Basalwulst entwickelt, der übrigens auch bei Crocuta zu sehen ist. Der M_2 ist wohl ähnlich, aber viel schwächer als dieser M_1 . Der untere M_2 hat jedenfalls noch zwei, der untere M_3 dagegen wohl nur mehr eine-Wurzel. Am M_1 lässt sich noch ein Talon und anscheinend auch ein Innenzacken unterscheiden, am M_3 hat sich die ursprüngliche Zusammensetzung wohl ganz verwischt. Loup-Forkbed von Neumexico und Nebraska.

Als "Aclurodon" hyacnoides bezeichnet Cope — Am. Naturalist 1883. Extinct Dogs, p. 245. fig. 11 c — einen Oberkiefer, welcher mit dem eben erwähnten grosse Aehnlichkeit erkennen lässt, hinsichtlich der Reduction des Gebisses jedoch schon sehr viel weiter fortgeschritten ist. So hat sich der Pr_4 und der M_1 schon wesentlich vereinfacht. Der erstere ist zu einem einwurzligen Stift geworden, am letzteren sind die beiden Aussenhöcker offenbar schon im Begriff zu verschmelzen,

Der obere M_2 war wohl nur noch als ovaler Knopf entwickelt. Bei dieser Reduction der oberen M halte ich es für überaus wahrscheinlich, dass im Unterkiefer, der indess noch nicht bekannt ist, der M_3 bereits ganz verloren gegangen war und der M_2 auch schon eine bedeutende Verkürzung erfahren hatte. Loup-Forkbed von Nebraska.

Hyaenocyon. Cope beschreibt — in Tert. Vert. p. 943, pl. LXX, fig. 1 und Am. Nat. 1883. Extinct Dogs, p. 246, fig. 13 d — einen Oberkiefer als Hyaenocyon sectorius, der sich durch den eigenartigen Bau des M_1 und des Pr_1 auszeichnet. Der erstere Zahn hat offenbar zwei Aussen- und einen Innenhöcker; dazu kommt wohl noch ein Basalwulst auf der Innenseite und ein Zwischenhöcker. Die Länge dieses Zahnes ist sehr gering im Verhältnisse zu seiner Breite. Der Pr_1 zeigt einen mässigen Vorderhöcker und einen wohl gleichfalls nicht allzu starken Innenhöcker. Die Schneide hat eine ziemliche Ausdehnung. Wie bei den übrigen Pr, so ist auch hier die Breite im Verhältniss zur Länge sehr gering. Der Pr_2 besitzt einen schwachen Nebenzacken. Der Pr_4 fehlt anscheinend gänzlich.

Es darf dieser Oberkiefer wohl eher auf einen Feliden als auf einen Hyäniden bezogen werden, sicher gehört derselbe keinem Caniden an, als welche ihn Cope bestimmt hat. Gegen die Verwandtschaft mit den beiden letztgenannten Familien spricht das Fehlen des Pr_4 . Für einen Feliden ist der obere M_1 freilich sehr kräftig entwickelt.

Im Unterkiefer hatte der M_1 jedenfalls noch einen sehr wohl entwickelten Talon nebst Innenzacken. Auch der M_2 war sicher noch ziemlich gross.

Hyaenocyon basilatus Cope — Am. Nat. 1883, p. 246, fig. 13 c. Tert. Vert., p. 942, pl. LXXV, fig. 3 — Unterkiefer allein bekannt mit 3 Pr. Dieselben haben je zwei Wurzeln und insgesammt Basalband und Nebenzacken. Der Symphysen-Theil hat sich bedeutend verschmälert. Die Zähne sind ziemlich massiv, aber doch viel mehr in die Länge gestreckt wie die von Hyaena. John-Day-bed-Oregon. Die nähere Verwandtschaft mit Hyaena ist sehr wahrscheinlich.

Lepthyaena Lydekker. Siwalik Carnivora, p. 135 (312), pl. XLV, fig. 8, 9.

Diese Gattung ist gegründet auf einige Unterkieferfragmente. Der M_1 hat sehr grosse Aehnlichkeit mit dem Zahn der Hyänen mit schwachem Talon und kleinem Innenzacken und könnte also nur Cryptoprocta zum Vergleiche herangezogen werden, wenn man von Hyaena absehen wollte. Zum Unterschied von dieser ist aber auch noch ein freilich sehr kleiner M_2 vorhanden. Von Hyaena weicht diese Gattung auch insoferne ab, als die Pr hier noch eine beträchtliche Länge besitzen und auch viel schlanker geblieben sind. Sie erinnern in dieser Beziehung an Ictitherium, bei welchem auch am Pr_1 ganz wie hier ein Talon mit Nebenzacken zum Vorschein gekommen ist. Wir haben es wohl mit einem Ausläufer dieser letzteren Gattung zu thun, der sich eben im Sinne von Hyaena differenzirt hat.

Lycyaena hat noch vier Pr in jedem Kiefer. Die Zähne sind noch nicht so massiv wie bei Hyaena und stehen auch weiter auseinander. Sie erscheinen als steil ansteigende Kegel mit stark verlängertem und verbreitertem Basalwulst auf ihrer Rückseite. Der untere M_1 hat noch einen kräftigen Talon und einen Innenzacken. Dieser letztere ist jedoch schon ziemlich klein geworden wie bei Hyaena selbst, aber noch nicht so weit nach hinten gerückt. Oben war höchstwahrscheinlich noch ein schwacher M_2 vorhanden. Die Kiefer hatten noch sehr schlanke Form, und erinnerte überhaupt der ganze Habitus dieses Thieres wohl eher an Ictitherium als an Hyaena.

Hyaenictis. Diese Gattung kommt den echten Hyänen schon näher, unterscheidet sich jedoch durch ihre noch viel schlankeren Zähne. Die Pr haben jedoch schon ein ganz ähnliches Aussehen wie bei Hyaena; sie zeigen ebenfalls jene charakteristische Glockenform, nur sind sie im Verhältniss sehr viel schmäler. Im Unterkiefer hat sich der M_2 noch erhalten, freilich nur als

einwurzliger Stift. Der obere M_1 ist noch immer sehr kräftig. Der untere M_1 trägt einen relativ grossen Talon mit drei Zacken und einen ziemlich starken Innenzacken, der indess schon sehr weit nach hinten gerückt ist — hierin an Hyaena striata erinnernd.

Hyaena selbst stellt nur eine weiter fortgeschrittene Prohyaena dar. Der M_2 ist im Unterund Oberkiefer verschwunden; im Unterkiefer tritt er höchstens noch atavistisch auf, im Oberkiefer fehlt er stets. Der obere M_1 zeigt bei den verschiedenen Hyänen-Arten einen sehr verschiedenen Grad der Rückbildung. Zuweilen bemerkt man noch die beiden primären Aussenhöcker und den Innenhöcker — ein eigentlicher Basalwulst fehlt durchgehends, nur crocuta zeigt eine leichte Anschwellung — bei anderen Arten stellt der M_1 jedoch blos mehr einen einfachen Knopf dar. Der untere M_1 hat je nach der Stärke des Talons und des Innenzackens ein sehr wechselndes Aussehen. Es gibt Formen, bei welchen beide Bestandtheile scheinbar vollständig fehlen, und zugleich wieder andere, bei welchen beide eine Entwicklung aufweisen ganz ähnlich wie die von Prohyaena oder selbst Ictitherium. Die Pr sind durchgehends sehr massiv. Im Unterkiefer geht sehr oft der Pr_4 ganz verloren. Es lassen sich diese Verhältnisse bei den lebenden und fossilen Arten in folgender Weise veranschaulichen.

```
Oberer M_1 klein, einwurzlig.
Unterer M_1 ohne Talon und ohne Innenzacken (beide höchstens rudimentär).
```

Oberer M_1 etwas grösser, in die Breite gezogen zweiwurzlig; unterer M_1 mit Talon, aber ohne Innenzacken.

Oberer M_1 relativ sehr gross, dreiwurzlig. Unterer M_1 mit Innenzacken und Talon.

```
II. maculata (fossil in Sicilien)

H. spelaea (intermedia)¹)

II. crocuta²) (zuweilen mit Rudiment des

Talons und Innenzackens.

H. Perrieri (= topariensis²)

H. cximia²)

II. Colvini

H. felina

H. macrostoma?³)

H. brevirostris.⁴)

II. robusta

H. fusca (brunnea)

H. striata (vulgaris)

II. arvernensis⟩

II. sivalensis⟩

II. sivalensis⟩
```

H. sincusis

Von der Grösse des oberen M_1 hängt ausser dem Umfang des Talons des unteren M_1 auch die Anwesenheit eines Innenzacken an diesem Zahne ab. Ist nämlich der obere M_1 sehr kräftig, so wird auch der Innenzacken noch stärker entwickelt erscheinen, da derselbe ja zum Theil einen Antagonisten bildet für den oberen M_1 . Uebrigens kann auch selbst bei jenen Arten, welche sich für gewöhnlich durch die relative Stärke ihres Oberkiefer-M auszeichnen, dieser Zahn bei einzelnen Individuen ganz fehlen. — z. B. bei eximia, felina. Ebenso ist auch die Stärke des Talons am unteren M_1 individuell sehr verschieden.

¹⁾ Hyaena intermedia ist keine eigene Art, sondern umfasst nur Individuen von spelaea mit Innenzacken am unteren M_1 . Auch crocuta und spelaea sollen nach den neuesten Untersuchungen identisch sein, was ich aber bei der jetzigen Verbreitung der crocuta nicht recht glauben kann.

²⁾ Hat noch vier Pr im Unterkiefer. Der Fortschritt besteht in Reduction des Innenhöckers am oberen Pr1.

³⁾ Der untere M_1 ist von dieser Art nicht bekannt.

⁴⁾ Wohl identisch mit Perrieri.

 $^{^{5}}$, Bei keiner dieser beiden Arten ist der Innenzacken am M_{1} so kräftig wie bei der recenten striata.

Der Schädel ist im Ganzen viverrenartig, doch fehlt der Alisphenoidcanal und die Zweitheilung der knöchernen Gehörblase; das Condyloidforamen ist geschlossen. Der Jochbogen steht weit ab vom Schädel. Die Gesichtspartie hat sich schon beträchtlich verkürzt, und steigt die Mittellinie zwischen den beiden Nasenbeinen ziemlich steil an. Der Pfeilnahtkamm ist sehr kräftig.

Im Extremitäten-Skelet ergeben sich beträchtliche Differenzen gegenüber *Viverra*. So ist bei gar allen Arten das Epicondylarforamen geschlossen, der Daumen hat sich beträchtlich verkürzt und stellt nur noch einen ungegliederten Stummel dar, desgleichen die erste Zehe am Hinterfuss. Bei keinem anderen Carnivoren ist eine ebenso weitgehende Zehenreduction zu verzeichnen. Ein weiterer Fortschritt besteht in der auffallenden Verlängerung der Vorderextremität, welche dem Thier eine eigenthümliche Haltung gibt. Die Endphalangen zeigen keinerlei besondere Differenzirung.

Die Einlenkung der Metatarpalien, im Carpus sowie die gegenseitige Verbindung der Metacarpalien von Hyaena konnte ich leider nicht studiren, nur so viel ersehe ich aus den Abbildungen, welche Blainville gegeben hat, dass die inneren Metacarpalien, namentlich Mc III und Mc II weder so weit in den Carpus hereinragen, noch auch sich so weit über Mc IV beziehungsweise Mc III mit ihren proximalen Enden herüberlegen, als dies bei den Viverren und überhaupt allen primitiveren Carnivoren der Fall ist. Die Hyänen verhalten sich vielmehr in dieser Beziehung ganz so zu den Viverren, wie die Hunde gegenüber Cynodictis. Auch hier enden vielmehr alle Metacarpalien nach oben zu beinahe in einer Ebene und greifen auch nicht so weit übereinander über, wohl aber drängen sie sich seitlich sehr innig ineinander, wodurch die Hand grössere Festigkeit gewinnt.

Die Metatarsalien zeigen, wie ich das selbst beobachten konnte, ganz die nämliche Erscheinung, nur Metatarsale II liegt wesentlich höher als Metatarsale III. Die seitlichen Fortsätze am Oberende des Mt V haben sich beträchtlich verkürzt, ebenso die hinteren Fortsätze am Oberende der Mt III und IV, die bei Viverra noch so weit hervorragen.


Proteles zeichnet sich durch die auffallende Reduction der Backzähne aus. Die vordersten derselben erweisen sich ihrer Form nach als Pr und haben je zwei Wurzeln oder doch noch die Andeutung hievon. Der untere M_1 besitzt nur mehr eine Wurzel und lässt eben noch die Theilung in einen hohen Vorder- und einen sehr niedrigen Hinterzacken erkennen. Der obere Pr_1 hat drei Wurzeln, und scheint seine ganz einfache Krone den Vorderhöcker, den Hauptaussenhöcker und den Innenhöcker zugleich zu repräsentiren. Im Gegensatz zu Hyaena hat hier der Schädel sehr schwache, lange Zeit getrennte Scheitelkämme; die Gehörblase weist ein Septum auf. Der Alisphenoidcanal fehlt. Der Daumen ist noch als Finger mit Phalangen entwickelt und nicht als ungegliedeter Stummel. Auch am Hinterfuss ist die Reduction der ersten Zehe noch nicht so weit fortgeschritten wie bei Hyaena, obschon die freien Phalangen verschwunden sind.

Die Hyäniden theilen sich in folgende Gattungen:

$$\frac{4}{4} Pr \frac{2}{3} M.$$
Die Pr massiv und kurz $\begin{vmatrix} Prohyaena & (Aelurodon \ Wheelerianus \ Cope). \\ Aelurodon & hyaenoides \ Cope. \\ \frac{4}{4} Pr \frac{1}{2} M. & Pr & ziemlich \ schlank \\ Aelurodon & hyaenoides & (Abnorm \frac{1}{2} M \ auch \ bei & Hyaena \ sivalensis). \\ \frac{4}{4} Pr \frac{1}{2} M. & Pr & lang, \ zapfenförmig \ Lycyaena & (Hyaena \ chaeretis). \\ \end{vmatrix}$

 $\frac{4}{3}$ $Pr \frac{1}{1}$ M (nur die älteren mit $\frac{4}{4}$ Pr). Pr glockenförmig Hyaena. Zähne rudimentär Proteles.

Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Hyänen-Arten und ihre Beziehungen zu den Gattungen Hyaenictis, Lycyaena, Ictitherium und den Viverriden ist etwa folgender:



Gaudry hält das *Ictitherium* für den Ahnen von *Hyaena*. Ich kann mich hiemit aus verschiedenen Gründen nicht einverstanden erklären.

Für's Erste lebte diese Gattung gleichzeitig mit den ersten Hyänen; geologisch ältere Ictitherium-Arten sind nicht bekannt. Es hat deshalb auch nicht einmal die Annahme, dass die pliocänen Ictitherium-Arten lediglich als die letzten Ausläufer dieses Formenkreises aufzufassen seien, die sich eben noch eine Zeitlang neben ihren Nachkommen erhalten haben, besonders viel Wahrscheinlichkeit für sich. Der Umstand, dass im Pliocän und an einer Localität drei Arten von Ictitherium nebeneinander gelebt haben, spricht sogar viel eher dafür, dass die Gattung überhaupt hier eben erst als solche aufgetreten ist, wenn schon im Obermiocän — Sansan — eine ähnliche Form, der Thalassictis gelebt hat.

Für's Zweite wird die Ableitung der Gattung Hyaena von Ictitherium noch dadurch erschwert, dass jener Umgestaltungs-Process nicht etwa direct verlaufen konnte, sondern noch ein Zwischenglied bedingt, was Gaudry auch selbst gefühlt zu haben scheint und als welches er die Gattung Hyaenictis betrachtete. Wenn dieselbe auch wirklich gewissermassen den morphologischen

 $^{^{1}}$) Dieser hat Innenzacken am unteren M_{1} sowie kräftigen Talon; der obere M_{1} noch echt trituberculär. Die Pr massiv.

²) Hat $\frac{2}{3}M$ wie *Prohyaena*. Diese selbst ist aber erst im John Daybed zusammen mit *Aelurodon hyaenoides* gefunden und kann diese gleichzeitig existirende Art nicht der Ahne dieser letzteren sein.

 $^{^{3}}$) $\frac{4}{4}$ $Pr - \frac{2}{3}$ M. Viverride mit mehr Zähnen, als bei allen bisher bekannten Viverren existiren. Die Anwesenheit einer solchen M-Zahl ist wegen der hohen Zahnzahl der Prohyaena nothwendig.

⁴⁾ Die wahre Natur von Lycyaena ist ziemlich unsicher, und basirt ihre Einschaltung an dieser Stelle lediglich auf der Gestalt der Pr.

Uebergang zwischen den beiden Gattungen bildet, so ist eben doch zu bedenken, dass auch sie vollkommen gleichzeitig mit diesen existirt hat. Auch scheinen ihre Zähne schlanker zu sein, wie die von *Hyaena* sowohl als auch wie die von *Ictitherium*. Es hätte alsdann das Mittelglied eine Eigenschaft der Stammform aufgegeben, welche bei dem Nachkommen wieder zur Geltung gekommen wäre. Eine solche sprunghafte und repetirende Entwicklung ist aber wenig wahrscheinlich. Wir werden also *Hyaenictis* besser als eine Nebenlinie betrachten.

Für's Dritte gibt es im Obermiocän von Nordamerika Formen, welche in gar jeder Beziehung den Anforderungen genügen, welche wir an die Ahnen der Hyänen stellen müssen. Es sind dies die schon erwähnten Aelurodon. Sie passen hiefür nicht nur hinsichtlich ihres geologischen Alters recht gut, sondern stehen auch morphologisch den Hyänen noch näher als das Ictitherium. Namentlich besteht hinsichtlich der Beschaffenheit der Pr und des unteren M_1 eine noch viel grössere Aehnlichkeit als zwischen Ictitherium und Hyaena.

Nach den englischen Autoren sind die Hyänen nichts Anderes als specialisirte Viverriden, beziehungsweise Herpestiden. Ich kann mich auch vom paläontologischen Standpunkt aus hiermit einverstanden erklären, jedoch mit der Einschränkung, dass die Trennung von den eigentlichen Viverren doch schon sehr weit zurückliegen muss. Es ist diese Annahme absolut nothwendig, denn der eben erwähnte Aclurodon — besser Prohyaena — besitzt noch einen Zahn, M_3 , der selbst bei den ältesten bekannten Viverren schon verloren gegangen ist. Im Uebrigen erweist sich Aclurodon in der That als Mittelform zwischen den Hyänen und Viverren.

Hyaena eximia. Roth und Wagner.

```
Wagner. Abhandl. der k. bayr. Akad. Vol. VII, p. 26, Taf. VIII (II), Fig. 6.

" " " " " " Vol. VIII, p. 12, Taf. V (III), Fig. 9, 10.

Süss. Hyaena hipparionum. Sitzber. der k. k. Akad. Vol. XLIII, p. 221, Taf. I, Fig. 3 (a-c) (non Fig. 2 a-c).

P. Gervais. Hyaena hipparionum. Zool. et Pal. fr. pl. XXIV, fig. 2-5.

Gaudry. Hyaena eximia. Pikermi. p. 80, pl. XII, fig. 4-6, pl. XIII. XIV.

Pethö. " Jahresb. d. k. ung. geolog. Anstalt für 1884, p. 67.

Lydekker. " Geological Magazine 1886, p. 174.

Kittl. Annal. d. k. k. Hofmuseums 1887, p. 332, Taf. XVII, Fig. I, 2.
```

Das Gebiss zählt nach Gaudry $\frac{4}{4}$ $Pr\frac{1}{1}M$. Der untere C steht ziemlich weit ab von Pr_4 . In frischem Zustande zeigt der untere M_1 einen relativ mächtigen Talon mit zwei Zacken. Es hat dieser Zahn sehr viel Aehnlichkeit mit dem M_1 von H. arvernensis. Am oberen $Pr_1 - R$ — ist der Innenhöcker stark reducirt, dem Zahne dicht angedrückt. Unter den fossilen Formen gibt es keine, bei welcher dieser Höcker nicht wohlentwickelt wäre, und unterscheiden sich dieselben hierin also leicht von eximia. Die lebende crocuta hat ebenfalls einen ziemlich schwachen Innenhöcker, doch ist derselbe noch sofort als solcher kenntlich.

Der obere M_1 ist zum mindesten ebenso kräftig wie jener von *striata* oder *aryernensis*. Die unteren Pr schliessen noch nicht dicht aneinander. Der Pr_1 ist verhältnissmässig klein. Der Pr_4 hat sich stets erhalten. Der obere D_1 — letzter Milchzahn — besitzt einen grossen Innenhöcker und zwar steht derselbe in der Mitte des Innenrandes. Am unteren D_1 ist der Innenzacken verschwunden.

Der Kronfortsatz hat eine sehr beträchtliche Höhe. Der Schädel kommt in seinem ganzen Bau dem von *H. crocuta* am nächsten. Die Extremitätenknochen sind wesentlich plumper wie bei striata.

```
Länge des oberen Pr_1 = 40 mm. Die obere Zahnreihe hat eine Länge von 85 mm. "
"
unteren M_1 = 28 mm. "
untere "
"
"
"
"
88 mm.
```

Hieher muss auch der von Suess als "Hyaena hipparionum" beschriebene Unterkiefer aus Baltavar gerechnet werden, während der Oberkiefer dieser "Hyaena" zu Hyaenictis graeca gehört. Auch müssen auf Hyaena eximia jene Oberkieferzähne aus Cucuron bezogen werden, welche P. Gervais 1. c. abgebildet hat.

Vorkommen: In Pikermi, Cucuron, Baltavar und Maragha.

Hyaena Perrieri. Croiz.

Croizet Rech. sur les oss. foss. 1828, p. 178, pl. II.

Diese Art hat einen ganz einfachen unteren M_1 .

Hyaena arvernensis. Croiz.

Croizet Rech. sur les oss. foss. 1828, p. 180, pl. III.

Diese Art ist ein wenig grösser als die vorige. Der untere M_1 besitzt einen freilich schon ziemlich schwachen Talon und ein Rudiment des Innenzackens, beides bei der lebenden striata viel kräftiger entwickelt. Lydekker — Quart. Journal geol. Soc. 1886. p. 364 — ist geneigt, die als arvenensis beschriebenen Reste mit der Hyaena striata zu vereinigen, indess scheinen doch immerhin einige Differenzen zu bestehen, und dürfte jene Identificirung auch schon aus statigraphischen Gründen wenig stichhaltig sein.

Croizet nennt ausserdem noch eine Hyacna dubia, Forsyth Major — Kosmos Bd. XIII, 1883 — auch noch eine topariensis.

Weithofer beschreibt dieselbe ausführlich nebst einer Hyaena robusta. — Denkschrift d. k. k. Acad. math. naturw. Classe. 1889. Bd. LV. — Diese beiden letzteren Arten stammen aus Val d'Arno und sind im Nachtrag eingehender besprochen.

Hyaena prisca, Marcel de S.

Ist wohl identisch mit arvernensis. Das Gleiche gilt auch von monspessulana.

Hyaena spelaea Goldf.

wird von Gaudry und Lydekker jetzt immer für identisch mit der recenten *crocuta* gehalten. Es bestehen indess ganz beträchtliche Grössendifferenzen, und ist es auch an und für sich sehr fraglich, ob diese jetzt doch auf eine sehr warme Zone beschränkte Art zur Diluvialzeit in Mitteleuropa eine solche Verbreitung besessen hat.

Lydekker beschreibt — Siwalik Carnivora — folgende Arten:

Hyaena sivalensis, p. 303 (126), pl. XXXIV, pl. XXXVIII, fig. 2, 5, pl. XXXIX, fig. 5, 7.

" macrostoma, p. 298 (121), pl. XXXVI, fig. 2, pl. XXXVII, pl. XXXVIII, fig. 4, pl. XXXIX, fig. 6.

Hyaena Colvini, p. 290 (113), pl. XXXV, fig. 1, 2, 4.5, pl. XXXV a, fig. 1, 3, pl. XXXVI, fig. 1, pl. XXXVIII, fig. 3, pl. XXXIX, fig. 4.

Hyaena felina, p. 278 (101), pl. XXXV, fig. 3, pl. XXXVa, fig. 2, pl. XXXVIII, fig. 1, pl. XXXIX, fig. 1, 2 (3, ?).

Hyaena sp., p. 309 (132), pl. XXXV a, fig. 4 und (?), pl. XXXIX, fig. 3.

Hiezu kommt noch *Hyaena sinensis* Owen. Koken. Paläontolog. Abhandlungen, Berlin 1885. III Bd., 2. Heft, p. 72, Taf. II, Fig. 5—12.

Hyaenictis graeca. Gaudry.

Suess. Hyaena hipparionum. Sitzber. der Wien. Akad. Vol. XLIII, p. 221, Taf. II. Fig. 2a-c (non 3a-c). Gaudry. Hyaenictis graeca. Pikermi p. 95, pl. XV, fig. 6-8.

Dieses Thier unterscheidet sich von den echten Hyänen durch die Anwesenheit eines unteren M_2 . Der Unterkiefer ist viel länger als bei den eigentlichen Hyänen, der zahntragende Theil dagegen viel niedriger wie bei diesen. Der obere M_1 besitzt eine ziemlich ansehnliche Grösse.

Er trägt anscheinend zwei Aussenhöcker und einen Innenhöcker, neben welchem sich noch ein Basalhöcker befindet, der bei Hyaena fehlt. Der obere Pr_1 weist einen grossen Innenhöcker auf und sieht dem entsprechenden Zahn von Hyaena sehr ähnlich. Der untere Pr_1 ist mit einem breiten Basalband und einem stumpfen Nebenzacken versehen. Der untere M_1 hat einen grubigen, von drei Zacken umgebenen Talon, doch fehlt diesem Zahn bereits der bei Hyaena striata noch vorhandene Innenzacken. Der M_1 ist einwurzlig und hat eine knopfförmige Krone.

Hieher gehört jedenfalls der von Suess unter obigem Namen beschriebene Oberkiefer aus Baltavar, während der Unterkiefer von dort auf Hyaena eximia bezogen werden muss.

Gaudry fand unter seinem Material auch Milchzähne. Der letzte D des Oberkiefers ist mit einem grossen Innenhöcker versehen, der in der Mitte des Zahnes ansetzt, ganz wie bei Hyaena und den Feliden. Der unter C D ist verhältnissmässig ungemein kräftig, desgleichen die Pr D. Der untere D_1 weicht nicht blos von dem entsprechenden Zahne der meisten Hyaena, sondern auch von dem M_1 von Hyaenictis dadurch schon wesentlich ab, dass er noch einen Innentuberkel besitzt, das Rudiment des ursprünglichen Innenzackens. Hyaena striata besitzt übrigens selbst am M_1 noch einen solchen Innentuberkel und ist mithin noch primitiver als Hyaenictis. Die letztere Gattung ist jedoch insoferne ursprünglicher, als sich hier noch ein M_2 erhalten hat.

Hyaenictis germanica. Fraas.

Siehe: Machairodus Jourdani.

Lycyaena Hensel.

Kaup. Agnotherium. Oss. foss., p. 28, Tab. I, fig. 4a, b.

Kaup. Agnocyon Pomeli. Beiträge, 5. Heft, p. 16, Tab. II, Fig. 3.

Hensel. Lycyaena. Monatsberichte der Berliner Akademie, 1862. p. 567.

Gaudry. Hyaena chaeretis. Attique, p. 92, pl. XV, fig. 1—5.

Die Zahnformel ist hier wie bei den älteren Hyänen wohl $\frac{3}{3} \mathcal{F} \frac{1}{1} C \frac{4}{4} Pr \frac{1}{2} M$, doch lässt sich dies nicht mit absoluter Sicherheit ermitteln, da die hintere Partie von beiden Kiefern bis jetzt noch nicht bekannt ist.

Von Hyaena unterscheiden sich die Pr, abgesehen davon, dass sie ziemlich weiten Abstand haben, schon durch ihren viel schlankeren Bau. Der Pr₄ hat in beiden Kiefern nur mehr eine Wurzel, ist aber noch ziemlich mächtig. Die letzten Pr tragen vorne und hinten einen Basalwulst und auf der Hinterseite noch einen Nebenzacken. Ihre Hauptzacken erscheinen als steil ansteigende, am Gipfel aber abgestumpfte Kegel, während jene von Hyaena sanfter ansteigen und auch nicht so stark abgestumpft erscheinen, sondern gewissermassen Glockenform aufweisen. Es stehen diese Pr von Lycyaena geradezu in der Mitte zwischen jenen von Ictitherium und Hyaena, doch ist Ictitherium im Sinne der Viverren schon weiter fortgeschritten, indem der letzte untere Pr bereits einen förmlichen Talon mit zwei Nebenzacken angesetzt hat, während bei Lycyaena nur

ein Nebenzacken vorhanden ist. Der obere Pr_1 sieht dementsprechend dem Zahn von *Ictitherium* sehr ähnlich. Sein Innenhöcker steht sehr weit vorne. Der untere M_1 — R — hat einen kräftigen Innenzacken und einen wohl entwickelten Talon mit drei Zacken.

Die Länge des unteren $M_1=24\,\mathrm{mm}$; die Länge des unteren $Pr_1=22\,\mathrm{mm}$.

", oberen $Pr_1 = 34 \text{ mm}$; die Breite des oberen $Pr_1 = 7 \text{ mm}$.

Der obere M ist zur Zeit noch nicht ermittelt, ebensowenig der untere M_2 .

Ihre Grösse und Zusammensetzung dürfte jedoch so ziemlich mit der von Hyaenictis übereinstimmen. Den Unterkiefer hat Gaudry beschrieben, dagegen lag ihm von den oberen Zähnen nur der Pr_1 vor. Die vorderen Pr kennen wir aus der von Hensel gegebenen Schilderung. Das Original dieses letzteren Autors befindet sich im Münchener Museum.

Höchstwahrscheinlich gehört hieher der von Kaup als "Agnotherium" und später als "Agnocyon" bezeichnete untere M_1 von Eppelsheim. Seine Dimensionen sind freilich etwas gross für die vorliegende Art, seine Zusammensetzung stimmt dagegen absolut mit jener des M_1 von Lycyaena überein. Auch Blainville hatte bereits darauf hingewiesen, dass dieser Zahn auf einen Hyäniden bezogen werden müsse. Mit Agnocyon und also auch mit Lycyaena ist auch ein Theil der H. v. Meyer'schen Harpogodon identisch. Die meisten gehören freilich zu Dinocyon.

Vorkommen: Im Pliocan von Pikermi und Eppelsheim.

Palhyaena hipparionum. Gervais.

Kittl. Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums 1887, p. 333, Taf. XV, Fig. 3, Taf. XVIII, Fig. 2-7.

Kittl trennt diese Form von der Gattung Ictitherium ab, bei welcher ich sie besprochen habe. Es lässt sich nun freilich nicht leugnen, dass die M denen von Hyaenictis, einem zweifellosen Hyäniden, viel ähnlicher sehen, als denen der übrigen Ictitherium-Arten. Die Pr jedoch sowie die Kiefer selbst haben viel mehr Anklänge an diese letztgenannte Gattung. Es ist daher recht gut möglich, dass die Aehnlichkeit der M mit jenen von Hyaenictis nicht als Zeichen wirklicher Verwandtschaft, sondern lediglich als Folge gleichartiger Reduction aufgefasst werden muss. In der That können auch die Molaren innerhalb der verschiedensten Gruppen der Raubthiere, sei es durch Differenzirung, sei es durch gleichartige Reduction, ein ganz ähnliches Aussehen erlangen, das leicht über die wahre Verwandtschaft täuschen kann.

Felidae.

Diese Familie nimmt eine ganz gesonderte Stellung unter den Carnivoren ein; zu den Hyänen allein steht sie vielleicht in engeren Beziehungen. Die von den englischen Autoren fort und fort betonte Aehnlichkeit mit den Viverriden erscheint mir im höchsten Grade problematisch, und kann ich mich daher nicht entschliessen, die Unterordnung der sogenannten "Aeluroidea" zu acceptiren. Die Gründe hiefür habe ich schon bei Besprechung der Carnivoren im Allgemeinen angegeben.

Was die Herkunft der Feliden betrifft, so scheint mir diese Frage durchaus noch nicht entschieden zu sein, obgleich viele Autoren sich der Filhol'schen Hypothese, dass die Feliden von Stenoplesictis- und diese dann von Cynodictis-ähnlichen Formen ausgegangen seien, sehr bereitwillig angeschlossen haben. Einer schärferen Kritik gegenüber erweist sich diese Annahme als absolut unstichhaltig.

Ein sehr triftiger Einwand, den schon Oscar Schmidt — die Säugethiere in ihrem Verhältniss zur Vorwelt, 1884, p. 250 — erhoben hat, besteht darin, dass die Katzen unter allen Carnivoren noch die vollständigsten Rudimente der Schlüsselbeine besitzen. Von Stenoplesichis liegen die betreffenden Skelettheile nun freilich nicht vor, und muss also von directen paläontologischen Beweisen für oder gegen abgesehen werden, doch ist es bei der grossen Aehnlichkeit, die im übrigen Skelet zwischen dieser Gattung und den Viverren und Musteliden besteht, überaus wahrscheinlich, dass sie in diesem Punkte schon weiter fortgeschritten war als die Katzen, ihre angeblichen Nachkommen. Jedenfalls ist es ein dringendes Postulat, dass der wirkliche Vorläufer zum Mindesten noch ebenso vollständige Schlüsselbeinreste besessen haben muss wie die Katzen selbst.

Dass eine Regenerirung dieser Knochen stattgefunden hätte, ist ganz undenkbar; es gibt kein einziges Beispiel, wo ein rudimentär gewordenes Organ sich wieder vervollständigt hätte. Es wird sich vielmehr höchst wahrscheinlich herausstellen, dass in Fällen, die allenfalls in dieser Weise gedeutet werden könnten, das betreffende Organ nur durch andere vorübergehend verdeckt war und dann wieder deutlich hervorgetreten ist.

Was ferner die von Filholso sehr hervorgehobene Aehnlichkeit der *Proailurus*, *Cryptoprocta* und *Pseudaelurus* mit den Feliden betrifft, so muss ich gleich bemerken, dass die eine angebliche *Pseudaelurus*-Art *Edwardsi* in Wirklichkeit eine echte Katze ist, während die zweite — *intermedius* — einem ganz anderen Formenkreis, den *Palaeprionodon* etc. angehört. Zu diesem letzteren sind auch die *Proailurus* und vielleicht auch die räthselhafte *Cryptoprocta* zu zählen.

Von Cryptoprocta liegt mir nun freilich blos die von Blainville — Ostéographie Viverra pl. VI und pl. XII — gegebene Abbildung des Schädels vor, und die Zeichnung des Gebisses in P. Gervais' Zool. et Pal. gén. II, p. 54, sowie die Abhandlung von Milne-Edwards et Grandidier in Annales des scienc. natur. Zoologie. 5. Ser. VII. Tom. 1867. p. 314 pl. VII—X.¹)

¹⁾ Die Trouessart'sche Angabe — Catalogue 1886, p. 92 — dass *Cryptoprocta* in Blainville's Ostéographie bei *Felis* pl. VI und XII abgebildet sei, ist entschieden irrig. Es ist dieselbe vielmehr lediglich pl. VI Viverra dargestellt.

Das Blainville'sche Original hat noch das Milchgebiss und scheinen seine Zähne im Vergleich zu denen, welche Gervais abgebildet hat, sehr klein zu sein. In ihrem Bau erinnern die Milchzähne sowohl als auch die definitiven freilich an jene der Feliden, doch kann dies auch ebensowohl als ein Beispiel gleichartiger Differenzirung aufgefasst werden, wie ja auch die Hyänen in dieser Beziehung viele Anklänge an die Katzen aufweisen, ohne deshalb zu ihnen in einem besonders engen Verwandtschafts-Verhältnisse zu stehen. St. George Mivart, ') welcher Cryptoprocta genau studiert hat, spricht sich mit aller Entschiedenheit für deren Zugehörigkeit zu den Viverriden aus. Ihre Extremitäten stimmen auch eher mit jenen der Viverriden, weichen hingegen von jenen der Feliden sehr wesentlich ab, namentlich gilt dies von den Metacarpalien und Metatarsalien hinsichtlich ihrer gegenseitigen Artikulation. Gleich dem Proailurus fehlen auch der Gattung Cryptoprocta zwei Merkmale, die meiner Ansicht nach für die Feliden insgesammt höchst charakteristisch sind. Für's Erste verjüngt sich der Unterkiefer gegen den Vorderrand hin ganz allmälig wie bei der Mehrzahl aller Carnivoren, so dass der Unterrand derselben eine sehr mässig gebogene Linie darstellt, auch wird der Symphysen-Theil sehr schmal, so dass der 3 ganz aus der Reihe gedrängt wird und hinter den 31 und 32 zu stehen kommt. Für's Zweite liegen die Postorbital-Fortsätze am Schädel von Proailurus und Cryptoprocta so weit vorne, dass sie kaum mehr zum Vorschein kommen, wenn man den Schädel von unten betrachtet. Bei den Katzen fallen sie bei der Unteransicht des Schädels ziemlich genau in die Mitte des Orbital-Ringes (in diesem Fall aus Jochbogen, Frontalia etc. gebildet). Ausserdem fehlt auch der bei den Feliden stets vorhandene aufsteigende Fortsatz des Malarbeins. Auf die Anwesenheit des Alisphenoidcanals und die Beschaffenheit der Formina der Schädelbasis möchte ich hingegen weniger Gewicht legen. Der Unterkiefer der Katzen ist vor dem C scharfkantig abgestutzt; die 3 stehen nicht vor, sondern neben demselben und hat sich auch der J2, da für denselben ziemlich viel Platz vorhanden ist, nur wenig nach hinten verschoben.

Ein weiterer Punkt, der sehr gegen die angenommene Verwandtschaft der Stenoplesietis-Proailurus einerseits und der Acturogale und Katzen andererseits in's Gewicht fällt, ist der, dass die Metacarpalien und Metatarsalien unter sich und mit dem Carpus, respective Tarsus in den beiden Gruppen eine ganz abweichende Articulation aufweisen. Jene von Stenoplesietis etc. verhalten sich ganz wie die der Viverriden und Musteliden und Cynodictis, bei den Acturogale und den Katzen hingegen treffen wir sehr eigenthümliche Verhältnisse, die nur bei Hyacnodon in gewissem Grade wieder vorkommen, einem Creodonten, dessen Abstammung ebenfalls sehr dunkel ist.

Auch die zeitliche Verbreitung der ältesten Feliden spricht keineswegs für die Filholsche Hypothese. Wäre dieselbe richtig, so müsste Aclurogale entschieden jünger sein als Proialurus. Das eigentliche Alter der Aclurogale aus den Phosphoriten und den schwäbischen Bohnerzen lässt sich nun freilich auch nicht einmal annähernd feststellen; dem Erhaltungszustande nach, dem localen Vorkommen²) und der doch noch ziemlich primitiven Beschaffenheit der Extremitäten nach — kurz und plump — hat es jedoch fast den Anschein, als ob dieselbe sogar älter wäre als Palacoprionodon, Stenoplesictis, Proailurus. Auch darf nicht übersehen werden, dass die Feliden

¹⁾ St. George Mivart. On the Classification of the Aeluroidea. Proceedings of the Zoological Society of London 1883.
2) Die Aelurogale-Reste finden sich vornehmlich in den Phosphoriten von Escamps und Bach bei Lalbenque (Dép. Lot.),

wo thatsächlich die älteren Formen wie *Pterodon* entschieden vorherrschen, die *Stenoplesictis*, namentlich aber die "*Pseudaelurus intermedius*" und der *Proailurus* sind am häufigsten an der Localität Mouillac (Caylux. Dép. Tarn et Garonne), wo die jüngeren Formen, wie *Prodremotherium* offenbar das Uebergewicht besitzen. Es sind auch die Knochen von dieser letzteren Localität bei Weitem nicht so stark verändert, glasig, sondern meistens sehr porös.

Auf das Vorkommen der Aelurogale in Schwaben darf freilich nicht allzu viel Gewicht gelegt werden, da jene Bohnerze von Veringendorf nach Quenstedt selbst pliocäne Formen enthalten.

im White-Riverbed von Nebraska in grosser Anzahl auftreten, einer Ablagerung, deren Fauna in vielen Fällen wirklich als die Fortsetzung der Fauna des älteren europäischen Tertiärs erscheint. Es ist auch gar nicht unmöglich, dass verschiedene dieser nordamerikanischen Feliden — fast sicher ist dies für die Gattung Nimravus — sich wirklich als Nachkommen von Aelurogale erweisen werden. Aelurogale könnte sich demnach recht wohl sogar als ein sehr altes Genus herausstellen, während der Proailurus, wenigstens jener, welcher der directe Vorläufer von jenen Feliden sein soll, thatsächlich erst dem Untermiocän angehört. Entscheiden lässt sich diese Frage natürlich nicht eher, als bis eben Aelurogale, und zwar eine der Arten aus den Phosphoriten in einer Ablagerung nachgewiesen sein wird, deren Alter genau bekannt ist.

Es ist mir ziemlich wahrscheinlich, dass die Feliden einen ganz besonderen Zweig der Carnivoren darstellen, der sich während der älteren Tertiärzeit etwa in Asien aufgehalten und erst zur Miocänzeit zahlreichere Vertreter nach Europa sowohl als nach Amerika entsendet hat.

Eine Form, die möglicherweise zu den Katzen in näherer Beziehung stehen könnte, ist der Protopsalis Cope aus dem Puercobed von Neumexico, wenigstens erinnern die allerdings höchst spärlichen Zähne immerhin an jene der Katzen; freilich kann dies auch die Folge einer gleichartigen Differenzirung sein. So viel steht aber jedenfalls fest, dass die Herkunft derselben noch nicht sicher erwiesen ist. Mir ist, wie gesagt, ein näherer directer Zusammenhang mit den Creodonten sehr viel wahrscheinlicher als die Abstammung von hunde- oder viverrenartigen Carnivoren. Auch Cope¹) hat einen solchen Zusammenhang mit den Creodonten — Oxyaena — vermuthet, freilich aber nicht genauer zu begründen gesucht. Oxyaena kann jedoch bei der sehr starken Reduction ihrer unteren 3 auf keinen Fall in Betracht kommen; es ist nur etwa so viel richtig, dass beide, die Feliden und die Oxyaeniden, von einem gemeinsamen Stammvater ausgegangen sein könnten.

Wie in allen Gruppen der Carnivoren, so hat auch bei den Feliden Reduction des Gebisses, und zwar nicht blos der Zahnzahl nach, sondern auch hinsichtlich der Zusammensetzung der M stattgefunden, ja es haben die Feliden in dieser Beziehung sogar entschieden das Maximum erreicht; wir finden hier selbst Reduction zu $\frac{2}{1}$ $Pr \frac{1}{1}M$. Das vollständigste Gebiss enthält noch $\frac{4}{4}$ $Pr \frac{1}{2}$ M. Am ehesten verschwindet der Pr_4 , und zwar der untere, und der untere M_2 . Der letztere stellt selbst in seiner vollständigen Erhaltung nur noch einen einwurzligen Stift mit knopfförmiger Krone dar. Der obere M_1 war ursprünglich jedenfalls echt trituberculär. Er ist meist nur noch als kurzer aber ziemlich breiter Kamm entwickelt. Der von Felis lynx lässt jedoch in der That noch zwei deutliche Aussenhöcker und einen Innenhöcker erkennen.

Der untere M_1 hatte ursprünglich jedenfalls einen ziemlich langen, schneidenden Talon. Die Vorderpartie bestand aus je einem Vorder-, Aussen- und Innenzacken; von diesen rückt der Innenzacken sehr weit nach hinten und wird immer kleiner, um zuletzt ganz zu verschwinden. Ebenso wird der Talon immer schwächer und erscheint zuletzt blos mehr als Anschwellung des Basalbandes. Dafür verlängern sich der Aussen- und Vorderzacken und verwandeln sich zugleich in ein weitklaffendes Scheerenpaar.

Die Pr zeichnen sich durch die eigenthümliche Zuspitzung aus. Vorder- und Hinterrand sind ziemlich stark convex. Ausser dem Auftreten eines sehr kräftigen, allerdings ebenfalls comprimirten Nebenzackens ist noch die starke Anschwellung des Basalbandes am Vorder- und Hinterrande bemerkenswerth, während dasselbe sonst nur sehr undeutlich entwickelt erscheint.

¹⁾ Tert, Vert. p. 951.

Am oberen Pr_1 erreicht der secundäre vordere Aussenhöcker eine sehr beträchtliche Grösse, der secundäre hintere Aussenhöcker stellt eine langgestreckte Schneide dar. Der Innenhöcker kann dagegen sehr beträchtliche Reduction erleiden — Aelurogale etc. Der C wird in vielen Fällen stark comprimirt; sein Vorder- und Hinterrand weist sehr oft Zähnelung auf. Die Grösse des C ist zuweilen ganz erstaunlich.

Die Incisiven werden manchmal kegelförmig, auch kann der \mathcal{F}_2 des Unterkiefers ganz verloren gehen. — Eusmilus P. Gervais. —

Ganz eigenartige Differenzirungen finden wir am Unterkiefer. Vor Allem bilden Aussenund Vorderseite eine sehr scharfe Kante. Auch ist der die 7 tragende Theil vorne scharf abgestutzt. Bei Verlängerung des oberen C verwandelt sich der Unterrand des Unterkiefers vorne zu einem weit herabhängenden Lappen; auch schnürt sich der Kiefer so weit ein, dass der genannte Zahn hinreichenden Spielraum findet.

Ober- und Unterkiefer sind fast stets sehr beträchtlich verkürzt; keiner der übrigen anderer Carnivoren — abgesehen von Cercoleptes — kann hierin mit den Feliden concurriren. Die Jochbogen verschieben sich weit nach auswärts und rückwärts und stehen weit vom Schädel ab.

Ebenso kommen die Postorbital-Fortsätze sehr weit nach hinten zu liegen. Das Cranium wölbt sich sehr stark, auch geht es bedeutend in die Breite. Der höchste Punkt liegt noch innerhalb der Frontalia, die grösste Breite zwischen den Temporalia. Das Occiput erleidet eine ziemliche Verkürzung, und legen sich daher die Paroccipitalia dicht an die Bullae osscae an. Dagegen unterbleibt die Bildung eines Alisphenoid-Canals.

Die Metacarpalien und Metatarsalien unterscheiden sich nicht unwesentlich von jenen der übrigen Carnivoren durch die Art und Weise der gegenseitigen Einlenkung und der Articulation am Carpus, beziehungsweise Tarsus. So schmiegt sich das Metacarpale IV sehr dicht an das Mc III. Das Metacarpale II greift zugleich sehr weit über die proximale Facette dieses Mc III herüber.

Die Reduction des Daumens und der ersten Zehe ist hier sehr weit fortgeschritten, doch hat der erste noch immer zwei Phalangen, und erscheint die Endphalange als echte Kralle entwickelt. Die Zurückziehbarkeit der Krallen muss als eine besondere Differenzirung betrachtet werden. Die Katzen sind im Ganzen ziemlich hochbeinig, stammen jedoch zweifellos von kurzbeinigen Formen. Schon die Achtrogale aus den Phosphoriten hat sehr viel kürzere und plumpere Extremitäten als die gleich grossen lebenden Feliden.

Was die fossilen Katzenreste anlangt, so stammen die ältesten derselben aus den Phosphoriten des Quercy, doch kann ihr wirkliches geologisches Alter nicht mit voller Genauigkeit festgestellt werden. Das im Alter kaum allzusehr verschiedene, aber immerhin etwas jüngere White-Riverbed Nordamerikas liefert eine grosse Menge fossiler Feliden, fünf Gattungen angehörig. Das Merkwürdige ist, dass die Reduction des Gebisses bei manchen dieser alten Formen schon eben so weit fortgeschritten ist wie bei den lebenden Katzen. Die Zähne zeichnen sich insgesammt durch ihre auffallende Schlankheit aus; sie bilden sehr scharfe Schneiden und Zacken. Cope,¹) der die Schädel dieser fossilen Formen genauer untersucht hat, findet gewisse Unterschiede: Es haben dieselben im Gegensatz zu den modernen Feliden einen Alisphenoid-Canal und Postparietalund Postglenoid-Foramina und Carotis-Canal, ausserdem ist auch das Condylar-Foramen noch nicht mit dem Foramen lacerum posterius verschmolzen.

Es haben hienach die "Nimraviden", wie Cope diese alten Formen nennt, im Schädelbau noch alterthümliche Charaktere, wie wir sie bei den Hunden finden, bewahrt, während ihr

¹⁾ Tert. Vert. p. 948 und Am. Nat. 1880, p. 834.

Gebiss ausserordentliche Fortschritte in der Differenzirung aufzuweisen hat, die sich freilich bei der geringen Stärke dieser Zähne nicht besonders bewährt haben dürfte. Die modernen Katzen besitzen massive Zähne und ein sehr vereinfachtes Canalsystem des Schädels. Echte Katzen treffen wir im europäischen Obermiocän zum ersten Male an.

Cope gibt folgende Unterscheidung der Nimraviden-Gattungen:

I. Kein herabhängender Lappen in der Vorderpartie des Unterkiefers. \mathcal{F} abgestutzt spatelförmig. Am oberen Pr_1 kein Basalhöcker. Unterer M_1 mit Talon.

II. Unterkiefer mit herabhängendem Lappen. \mathcal{F} konisch. C gezähnelt. Kein vorderer Höcker am oberen Pr_1 unterer M_1 mit Talon. Kein Nebenzacken an den Pr.

Die echten Katzen theilt Cope in folgende Gattungen ein:

- I. Die Aussenseite und der Vorderrand durch eine scharfe Kante getrennt.
- a. Unterkiefer-Unterrand vorne zu einem herabhängenden Lappen ausgezogen.
- $\beta.$ Unterer M_1 ohne Talon. Die Prmit Nebenzacken. Der obere Pr_1 mit Vorderhöcker versehen.

$$Pr^{\frac{2}{2}}$$
 Pr_{2} im Unterkiefer einwurzlig $Drepanodon$, $Pr^{\frac{2}{2}}$. . . $Smilodon$.

- II. Aussen- und Vorderseite des Unterkiefers sind nicht scharf getrennt.
- α . Unterer M_1 ohne Talon. Die Prhaben hinten Nebenzacken, der obere Pr_1 einen Vorderhöcker.
- β . Oberer Pr_1 ohne Innenhöcker. Krallen ohne unteren Fortsatz.

$$\frac{2}{2}$$
 Pr. Orbita hinten offen . . . - Cynaclurus.

 $\beta\beta$. Oberer Pr_1 mit Talon. Krallen mit unteren Fortsatz.

γγ. Pupille vertical. Orbita hinten geschlossen. $\frac{2}{2}$ Pr . . . Catolynx.

,, offen
$$\frac{2}{2} Pr$$
 . . . Felis.
,, , , $\frac{1}{2} Pr$. . . Lynx.

¹⁾ Lydekker, Catalogue, Supplément pag. 313, identificirt diese Gattung mit Aelurogale, weil das Fehlen oder die Anwesenheit eines dritten unteren Praemolaren hier eine ganz nebensächliche Bedeutung hat, wie die zahlreichen Exemplare aus den Phosphoriten sehr deutlich zeigen.

Zu den Nimraviden stellt der genannte Autor auch die Gattungen Proaelurus und Pseudaelurus. Die älteren "Proaelurus" müssen indess von den jüngeren als selbstständige Gattung getrennt werden — Haplogale — und unter Pseudaelurus sind ebenfalls ganz verschiedene Formen vereinigt — so intermedius — Stenogale — und echte Feliden. Der wahre Pseudaelurus Leidy hat 3 Pr 1 M im Unterkiefer. Der Ps. Edwardsi aus den Phosphoriten ist kaum verschieden von Aelurogale und zeigt auch die Abstutzung des Unterkiefers recht wohl.

Die Proaelurus sowie den "Pseudaelurus" intermedius Filh. betrachte ich dagegen als Ausläufer von Palaeoprionodon und somit von Viverren oder Musteliden. Für sie gilt das von Cope angegebene Merkmal: Vorder- und Aussenwand des Unterkiefers gehen ganz allmälig in einander über.

Echte Feliden treten in Europa erst im Obermiocän auf. Häufig werden sie im Pliocän (Pikermi und Auvergne); viele derselben sind auch aus den Siwalik-Hügeln bekannt.

So leicht es nun auch bei diesen Resten ist, ihre Zugehörigkeit zu den Feliden festzustellen, so schwierig wird eine genauere Bestimmung. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Gattung Felis als solche viel weiter zerlegt werden muss, denn es sind hier viel zu verschiedene Typen vereinigt, namentlich wenn man obige Gliederung der Nimraviden als Maassstab nimmt. Freilich darf auch nicht übersehen werden, dass auch diese keineswegs als vollkommen sichergestellt betrachtet werden darf, denn die Zahnformel kann wenigstens bei Aelurogale ganz gewaltig variiren — von $\frac{3}{4}$ Pr $\frac{1}{2}$ M bis zu $\frac{3}{2}$ Pr $\frac{1}{1}$ M — und bietet daher für die Berechtigung eines Genus an und für sich noch keine genügende Garantie. Wir sind daher jedenfalls zur Zeit noch nicht befugt, die fossilen Katzen als gut erforschte Gruppe anzusehen, noch weniger aber dürfen wir es versuchen, auf den Zusammenhang derselben mit den lebenden Formen näher einzugehen.

Ich gebe daher nur der Vollständigkeit halber eine kurze Besprechung der fossilen Formen, ohne die Gattungsdifferenzen eigens hervorzuheben. In dieser Beziehung verweise ich auf die im Obigen enthaltene Uebersicht, wie sie Cope gegeben hat. Einzig und allein die Gattungen Pseudachurus und Achturogale musste ich eingehender behandeln.

Pseudaelurus. (P. Gerv.)

Dieser Gattungsname bezieht sich in erster Linie auf einen Feliden von Sansan mit $\frac{3}{3}$ Pr $\frac{1}{1}$ M. Der vorderste untere Pr steht bei diesem typischen Pscudaclurus weit entfernt vom Pr_2 und C, und muss sehr klein gewesen sein. Die so wichtige hintere Partie des M_1 ist an jenem Original gar nicht erhalten. Schon von dem Schädel aus Sansan — Fclis quadridentata Blainville — ist es höchst fraglich, ob er der gleichen Art angehört wie der typische Unterkiefer, denn sein Pr_1 würde sicher mehr vom unteren Pr_1 und M_1 decken, als es bei geschlossenem Kiefer der Fall sein sollte — es wird bei Katzen stets nur die Hinterhälfte des unteren Pr_1 und der ganze untere M verdeckt, hier bei quadridentata, beziehungsweise tetraodon ist die Länge des oberen Pr_1 ebenso gross wie jene von den unteren Pr_1 und M_1 zusammen.

Weiter hat Leidy einen Unterkiefer aus Nebraska beschrieben, der sich durch seine sehr gute Erhaltung auszeichnet, doch muss es bei der ungenügenden Conservirung des eigentlichen Originals von Pscudaclurus durchaus unentschieden bleiben, ob wir dieses Stück auch wirklich auf die gleiche Gattung beziehen dürfen. Die Zahnzahl stimmt zwar anscheinend überein, doch dürften die Zähne des Leidy'schen Originals sehr viel schlanker sein. Auch trägt der M_1 eine Art

Talon mit Nebenzacken. Da indess keine Innenansicht gegeben ist, lässt sich selbst mit diesen "Pseudaelurus" wenig anfangen.

Auf die Anwesenheit des erwähnten unteren Pr_3 möchte ich absolut gar kein Gewicht legen, denn wie die Verhältnisse bei *Aelurogale* zeigen, kann dies ebensowohl eine individuelle Bildung, als auch wirklich die Norm sein.

Die *Pseudaelurus* aus den Phosphoriten endlich sind auf zwei ganz verschiedene Gattungen zu vertheilen. Nur der grössere — *Edwardsi* — kann eigentlich hier weiter in Betracht kommen, der kleinere — *intermedius* — ist eine *Stenogale*.

Als Merkmale für diese Gattung *Pseudaelurus* würden sich etwa ergeben, soferne man den Leidy'schen *intrepidus* zu Grunde legt:¹)

Die Pr haben ziemlich hohe Zacken; ihr Vorder- und Hinterrand ist deutlich convex. Am Hinter- und am Vorderrande der Pr ist das ziemlich stark entwickelte Basalband zu einem Wulst angeschwollen. Jeder der beiden letzten Pr trägt überdies einen Nebenzacken. Der M_1 ist mit einem kurzen schneidenden Talon versehen, auch hat sich ein Innenzacken noch erhalten, ist aber freilich sehr klein geworden und weit nach hinten gerückt. Der Unterkiefer zeigt vor dem C eine sehr scharfe Kante und ist dieser die $\mathcal F$ tragende Theil scharf abgestutzt, so dass die $\mathcal F$ unmittelbar neben, nicht vor den C zu stehen kommen. Der für viele F eliden charakteristische, mehr oder weniger tief herabhängende Lappen fehlt noch vollständig, der aufsteigende Kieferast bildet mit der Zahnreihe einen sehr stumpfen Winkel. Die Zähne scheinen insgesammt sehr schlank zu sein. Die Zahnformel wäre etwa $\frac{3}{3}$ I $\frac{1}{1}$ C $\frac{2}{3}$ Pr $\frac{1}{1}$ M.

Oberkiefer sind gar nicht bekannt, man müsste denn etwa Archaelurus Cope noch zu Pseudaelurus stellen oder den Gervais'schen Cryptoprocta aus den Phosphoriten. Der erstere könnte recht wohl noch mit dem Leidy'schen intrepidus identisch sein, denn die Anwesenheit von vier oberen Pr und einem unteren M_2 beweist gar nichts, insoferne diese Zähne auch bei Aelurogale auftreten können — für Aelurogale ist dieses Auftreten abnormer, atavistischer, Zähne absolut sicher erwiesen, und haben sie auch ganz das nämliche Aussehen. — Ferner ist der Unterkiefer von Pseudaelurus wirklich vorne scharf abgestutzt; die Rinne für den oberen C fehlt freilich noch, doch kann dies auch darin seinen Grund haben, dass das Leidy'sche Original vielleicht von einem weiblichen Individuum herrührt.

Sollte sich diese Vermuthung bestätigen, so wäre dies sehr erfreulich, da alsdann auch der so viel missbrauchte Name *Pseudaelurus* ganz beseitigt werden könnte. Es hätte dann der Name *Archaelurus* den Vorzug.

Pseudaelurus Edwardsi (Filh).

Filhol. Ann. scienc. géol. T. III, p. 3, pl. 13.
" Ibidem. T. VII, p. 158 p. 27, fig. 125—134 (129—130 fraglich).
Gaudry. Enchainem. Mammiféres. p. 220.
Filhol. Toulouse. 1882, p. 85.
Lydekker. Catalogue. 1887. Part V, p. 312.

Von diesem Thier hat Filhol nur den Unterkiefer beschrieben.

Die Zahnformel lautet normal 3 \mathcal{F} , 1 \mathcal{C} , 4 $\mathcal{P}r$, 2 M, doch kann die Zahl der $\mathcal{P}r$ auf drei, die der M auf eins reducirt sein, so dass auch die Formel sich in 3 $\mathcal{P}r$ 2 M, und 4 $\mathcal{P}r$ 1 M und 3 $\mathcal{P}r$ 1 M umändern kann. Selbst wenn der $\mathcal{P}r_4$ vorhanden ist, kann seine Grösse beträchtlich

¹⁾ Cope hat bei seiner Diagnose l. c. offenbar den *Pseudaelurus Edwardsi* ganz ausser Acht gelassen, von dem Leidy'schen nur die Formel entnommen und die Beschaffenheit des Unterkiefers von dem *Pseudaelurus intermedius* als die normale betrachtet, doch gehört dieser letztere eben gar nicht zu den Feliden.

variiren. Dieses Verschwinden und anderseits das Wiederauftauchen im normalen Zustande nicht mehr vorhandener Zähne ist bei Katzen nicht so selten. So bildet Blainville ein Exemplar von Felis lynx ab mit M_2 im Unterkiefer.

An dem unteren M_1 ist der Innenzacken angeblich stets verschwunden, die Abbildungen, welche Filhol gebracht hat — Fig. 125—127 und 132—134 — zeigen denselben jedoch ganz deutlich. Der Talon stellt eine ziemlich lange Schneide dar. Die Pr sind ziemlich spitz und schlank; die Nebenzacken erreichen nur mässige Höhe. Der C lässt eine feine Zähnelung wahrnehmen.

Nicht blos hinsichtlich der Zahnformel, sondern auch hinsichtlich der Dimensionen kann Pseudaelurus Edwardsi stark variiren; Filhol nennt für die untere Zahnreihe folgende Zahlen: 49, 47, 45, 43, 38, 36, 33 mm hinter dem C, und als Höhe des Kiefers unter dem M_1 : 19, 16, 17, 15, 13, 13, 13. Diese Zahlen dürften indess einige Einschränkung erfahren, denn das Maximum bezieht sich auf das Original zu Filhol's Fig. 129-130, das wohl viel eher zu Achurogale gehört. Die drei nächstfolgenden (47-43) und 16, 17, 15 dürften einer besonderen Art zuzutheilen sein und ebenso die drei letzten.

Aehnliche Dimensionen haben die von P. Gervais — Zool. et Pal. gén, II, p. 54, pl. XIII, fig. 5—7 erwähnten und als Cryptoprocta (?) bestimmten Kiefer (ein Oberkiefer, zwei Unterkiefer). Die unteren Pr sind viel länger gestreckt und stumpfer als jene der Filhol'schen Originale (abgesehen eben von dessen fig. 129—130). Merkwürdig ist die Kleinheit ihres Pr_3 ; allein trotzdem besitzt derselbe doch zwei Wurzeln, und ist überdies noch ein Pr_4 vorhanden. Der untere M_1 sieht dem von Aelurogale sehr ähnlich — langer Talon, bei den einen mit Spur von Theilung. Von Cryptoprocta unterscheiden sich diese Reste durch die Kleinheit des Pr_3 . Der Oberkiefer trägt nur drei Pr_4 davon der Pr_3 bereits sehr klein, aber doch noch mit zwei Wurzeln versehen. Der obere Pr_1 hat anscheinend nur einen sehr schwachen, aber ziemlich langgestreckten Vorderhöcker; der etwaige Innenhöcker ist an der Abbildung nicht zu sehen; eine Innen- oder Unteransicht existirt nicht. Wahrscheinlich gehören alle diese Reste zu Aelurogale minor Filhol (Toulouse 1882, pl. IV, fig. 9—11), wenigstens stimmen sie mit dieser Art hinsichtlich ihrer Dimensionen sehr gut überein. Auch ist bei dieser der untere Pr_3 ebenfalls sehr beträchtlich reducirt, und ebenso hat sich auch deren Pr_4 noch erhalten.

Aelurogale.

Aelurogale intermedia Filh.

Taf. IX, Fig. 23-25, 55.

```
Filhol, Ann. scienc. géol. 1872, T. III, p. 10, fig. 23—25.

" " " " 1877, T. VIII, p. 30, pl. 3, fig. 209—212.

P. Gervais, Zool. et Pal., gén. II, p. 55.

Filhol, Mammiféres tertiaires, Toulouse 1882, p. 1, pl. IV, fig. 9—11, V. minor.

Quenstedt, Handbuch der Petrefact. Pseudaclurus, p. 47, tab. II, fig. 17.

Lydekker, Catalogue 1885, p. 65.
```

Die Zahnformel ist normal $\frac{3}{3}$ \mathcal{F} $\frac{1}{1}$ C $\frac{3}{3}$ Pr_2 $\frac{1}{2}$ M. Da jedoch im Unterkiefer nicht blos ein Pr_2 verschwinden, sondern auch ein weiterer hinzutreten kann und ausserdem auch der Tuberkelzahn nicht allzuselten gänzlich verloren geht, so gibt es eine bedeutende Zahl von Modificationen. Es kann das Gebiss folgendermassen umgeändert werden:

 $\frac{3}{4}$ Pr $\frac{1}{2}$ Maximum; $\frac{3}{4}$ Pr $\frac{1}{1}$ M; $\frac{3}{3}$ Pr $\frac{1}{1}$ M; $\frac{3}{2}$ Pr $\frac{1}{2}$ M; $\frac{3}{2}$ Pr $\frac{1}{1}$ Minimum. Eine weitere Modification wird zuweilen dadurch hervorgerufen, dass der Pr_3 eine zweite Wurzel bekommt.

Die normale Zahnformel von Aelurogale stimmt ganz mit Dinictis felina Leidy, Nebraska 1869, p. 64, pl. V, fig. 1—4, doch differiren beide hinsichtlich des Abstandes des unteren C vom

vordersten Pr— es ist dieser Abstand bei Dinictis viel bedeutender,—ferner auch bezüglich der relativen Grösse des oberen C— bei Dinictis viel länger und dolchartig gestaltet;—demzufolge hat sich auch am Unterkiefer ein herabhängender Lappen gebildet, der bei Aelurogale fehlt. Soviel ich aus den Leidy'schen Abbildungen entnehmen kann, ist auch der obere und der untere M_1 ganz abweichend gestaltet. Dieser letztere Zahn trägt bei Aelurogale einen wohlentwickelten Talon, bei Dinictis ist der Talon kleiner, und befindet sich zwischen ihm und dem zweiten Lappen—dem Hauptzacken— noch ein selbstständiger Zacken, der reducirte und nach hinten geschobene Innenzacken.

Der obere M_1 von *Dinictis* ist sehr in die Breite gezogen, aber dabei sehr kurz, so dass er sich als schmaler, senkrecht zur Zahnreihe stehender Kamm darstellt. Bei *Aelurogale* hat derselbe anscheinend kreisrunden Querschnitt und ist auch mit drei Wurzeln versehen.

Die drei unteren \mathcal{F} stehen in einer Reihe und haben, wie bei allen Katzen, gleiche Grösse. Der untere C ist ziemlich schwach; er besitzt dreiseitigen Querschnitt und hat zwei gezähnelte Kanten.

Gewöhnlich ist der Pr_3 der vorderste aller Pr_3 doch kann auch der Pr_4 anwesend sein. Der Pr_3 besitzt bald zwei, bald auch nur eine Wurzel. Pr_2 und Pr_1 sind immer zweiwurzelig. Vorderund Hinterrand dieser Zähne sind sehr scharf. An ihrer Basis tragen die beiden hintersten Pr noch je einen schneidenden Tuberkel, sowohl vorne als hinten. Der Pr_1 ist nicht besonders hoch, dafür aber ziemlich langgestreckt.

Der $R-M_1$ — ist echt katzenartig. Er besteht aus zwei sehr schmalen schneidenden Lappen und einem kleinen schneidenden Talon. Ungefähr in der Mitte ist der M_1 tief eingeschnitten. Auf seiner Innenseite zeigt er eine Einkerbung. Der M_2 hatte blos eine Wurzel. Er besass vermuthlich gerundeten Querschnitt.

Das Foramen mentale liegt unterhalb des Pr_3 . Dazu kommen noch einige kleinere Gefässöffnungen. Der Kiefer selbst ist vorne sehr scharf abgestutzt, fast wie bei Drepanodon.

Der obere C hat eine beträchtige Länge. An der Innenseite erscheint er abgeflacht; seine Kanten sind gezähnelt.

Der folgende Pr_3 ist einwurzelig; Pr_2 hat zwei Wurzeln. Er besteht aus einem hohen Hauptzacken und einem sehr viel niedrigeren Hinterzacken, hinter dem das Basalband ein wenig hervorragt. Am Vorderrande des Hauptzackens entwickelt sich noch ein winziger Innenzacken. Der Pr_1-R — ist auf seiner Aussenseite, gerade in der Mitte, sehr tief ausgebuchtet und eingekerbt. Der Innenzacken am Vorderrande ist sehr niedrig, greift aber sehr weit in den Kiefer herein. Dieser Pr_1 ist gleich dem kleinen M_1 dreiwurzelig; zwei Wurzeln auf Aussen- und eine auf Innenseite. Dieser letztere Zahn hatte wohl nahezu kreisrunden Querschnitt.

Das Foramen infraorbitale ist ziemlich weit und steht ziemlich hoch oben. Es befindet sich gerade oberhalb der Grenze von Pr_2 und Pr_1 .

Im Oberkiefer entspricht die Bezahnung ganz den echten Katzen; hier erfolgt die Reduction zuerst, während sich im Unterkiefer noch die ursprüngliche Bezahnung ziemlich hartnäckig erhält.

Filhol glaubt unter dem von ihm untersuchten Material keine verschiedenen Arten unterscheiden zu können, da sich in den Dimensionen der Unterkiefer alle Uebergänge von den kleinsten zu den grössten Stücken finden.

Oberkiefer: Nach Filhol steht der Pr_3 6 mm hinter dem C und der Pr_2 ebensoweit hinter dem Pr_3 . Pr_2 ist 17.5 mm lang und 9 mm hoch, der Pr_1 (R) hat eine Länge von 22.5 mm, eine Höhe von 6 mm und eine Breite von 12 mm (im Maximum). Der M_1 ist 7.5 mm lang und 7.5 mm breit. Abstand des Hinterrandes des C vom Hinterrande des M_1 anscheinend 65 mm.

Das Münchener Exemplar misst: Abstand des C vom M_1 (bei beiden am Hinterrand) 26 mm, Abstand des C vom Pr_3 (dessen Vorderrand) 8 mm, Länge des $Pr_2 = 17$ mm, Länge des

 Pr_1 (R) = 21 mm, Länge des M_1 = 5 mm. Die Zähne selbst sind sämmtlich ausgefallen. Die mir vorliegenden ob eren Pr_1 haben folgende Länge, Höhe und Dicke in Millimeter:

Länge	25.2	24	25	24.5	22.8	22.8	22	21.2	19
Höhe	14	12	15	14	13.2	14	13	11.2	10.2
Dicke	1.3	13	13'3	12.8	12	12	11.2	10.2	10

Es wurden nur tadellose Exemplare berücksichtigt.

Die drei Pr₂ messen:

Unterkiefer: Die im Münchener Museum befindlichen M_1 haben folgende Längenmaasse: 24.8, 23.5, 23 (2 Stück), 22.5 (2 Stück), 22, 21.5 (2 Stück), 21, 19, 18.4, 16.5, 14, 13.5.

Die beiden letzten M_1 gehören Kiefern an, bei welchen die Zahnreihe nur 43 mm misst, bei den übrigen beträgt die Zahnreihe wohl durchgehends zwischen 60 und 70 mm.

Filhol hat an dem von ihm untersuchten Material folgende Maasszahlen ermittelt:

IX. $\begin{vmatrix} 36 & - & 12 & - & 3 & 8 & 10 & - & - & 13 & - & 6 & 8 & 23 & 13 & Pr_3$ zweiwurzlig, M_2 fehlt X. $\begin{vmatrix} 33 & 12 & 11 & 1 & 5 & 2 & 5 & 7 & 8 & - & - & 11 & - & 5 & 7 & 22 & 11 & Pr_4$ vorhanden Pr_3 zweiwurzlig, M_2 fehlt XI. $\begin{vmatrix} 30 & 12 & 12 & 12 & 12 & 2 & 3 & 45 & 45 & 45 & 45 & 45 & 45 & 45 $		Länge der Zahnreihe hinter dem C	Höhe des Kiefers hinter dem C	Höhe des Kiefers urter	Länge des Pra	Länge des Pr3	Länge des Pr ₂	Länge des Pr ₁	Höhe des Fr ₂	Höhe des Pri	Länge des M, (R)	Länge des M2	Höbe des Vorderzackens am M ₁ (R)	Höbe des Hinterzackens am M. (R)	Reihe der Pr	$M_1 + M_2$	
III. 72 25 27 - 3 14 16 10 11 21 3·5 8 13 47 25	I.	85	30	36		4	16	17	_	_	24	4	10	13	55	30	Pr_3 einwurzlig, M_2 vorhanden
IV. 68 26 24 — 3 13 14 9 10 19 4 8 12 43 25 , zweiwurzlig , y V. 66 21 25 — 4 13 16 10 10 21 3 9 12 43 23 , n, n, n, VI. 64 19 22 — 3 11 15 — 9 20 3·5 8 12 41 23 , einwurzlig , n, VII. 55 15 19 — 4 11 13 — — 18 3 7 10 35 20 , zweiwurzlig , n, VIII. 43 13 14 2 3 8 10 6 7 13 2·5 6 8 29 14 Pr ₄ vorhanden, Pr ₃ zweiwurzlig , M ₂ vorhanden IX. 36 — 12 — 3 8 10 — — 13 — 6 8 23 13 Pr ₃ zweiwurzlig, M ₂ fehlt X. 33 12 11 1·5 2·5 7 8 — — 11 — 5 7 22 11 Pr ₄ vorhanden Pr ₃ zweiwurzlig, M ₂ fehlt	II.	74	28	30	_	4	15	17	11	-	22	_	9	13	52	22	" " " fehlt
V. 66 21 25 — 4 13 16 10 10 21 3 9 12 43 23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	III.	72	25	27	_	3	14	16	10	11	21	3.5	8	13	47	25	, , , vorhanden
VI. 64 19 22 $ 3$ 11 15 $ 9$ 20 3.5 8 12 41 23 , cinwurzlig , independent of the proof of the	IV.	68	26	24	_ :	3	13	14	9	10	19	4	8	12	43	25	" zweiwurzlig "
VII. 55 15 19 - 4 11 13 - - 18 3 7 10 35 20 , zweiwurzlig , , , . VIII. 43 13 14 2 3 8 10 6 7 13 2.5 6 8 29 14 Pr_4 vorhanden, Pr_3 zweiwurzlig M_2 vorhanden IX. 36 - 12 - 3 8 10 - - 13 - 6 8 23 13 Pr_3 zweiwurzlig, M_2 fehlt X. 33 12 11 1.5 2.5 7 8 - - 11 - 5 7 22 11 Pr_4 vorhanden Pr_3 zweiwurzlig, M_2 fehlt Pr_4 vorhanden Pr_3 zweiwurzlig, Pr_4 vorhanden	V.	66	21	25	-	4	13	16	10	10	21	-3	9	12	43	23	37 13 31 31
VIII. 43 13 14 2 3 8 10 6 7 13 2·5 6 8 29 14 Pr_4 vorhanden, Pr_3 zweiwurzlig, M_2 vorhanden IX. 36 — 12 — 3 8 10 — — 13 — 6 8 23 13 Pr_3 zweiwurzlig, M_2 fehlt X. 33 12 11 1·5 2·5 7 8 — — 11 — 5 7 22 11 Pr_4 vorhanden Pr_3 zweiwurzlig, M_2 fehlt	VI.	64	19	22		3	11	15	_	9	20	3.5	-8	12	41	23	" cinwurzlig " "
IX. $\begin{vmatrix} 36 & - & 12 & - & 3 & 8 & 10 & - & - & 13 & - & 6 & 8 & 23 & 13 & Pr_3$ zweiwurzlig, M_2 fehlt X. $\begin{vmatrix} 33 & 12 & 11 & 1 \cdot 5 & 2 \cdot 5 & 7 & 8 & - & - & 11 & - & 5 & 7 & 22 & 11 & Pr_4$ vorhanden Pr_3 zweiwurzlig, M_2 fehlt XI $\begin{vmatrix} 20 & 19 & 19 & 19 & 19 & 2 & 6 & 75 & 45 & 10 & & 5 & 7 & 90 & 10 & & & & & & & & & & $	VII.	55	15	19	_	4	11	13	_	-	18	3	7	10	35	20	" zweiwurzlig "
X. 33 12 11 15 25 7 8 — — 11 — 5 7 22 11 Pr_4 vorhanden Pr_3 zweiwurzlig, M_2 fehlt	VIII.	43	13	14	2	3	8	10	6	7	13	2.5	6	8	29	14	Pr_4 vorhanden, Pr_3 zweiwurzlig M_2 vorhanden
77 20 19 19 19 9 6 7 75 45 10 5 7 90 10 1	IX.	36	_	12	_	3	8	10	-	_	13		6	8	23	13	Pr_3 zweiwurzlig, M_2 fehlt
XI 30 12 12 12 2 6 75 45 - 10 - 5 7 20 10	X.	33	12	11	1.5	2.5	7	8			11	_	5	7	22	11	Pr_4 vorhanden Pr_3 zweiwurzlig, M_3 fehlt
	XI.	30	12	12	1.2	2	6	7.5	4.5	_	10	-	5	7	20	10	22 21 22 22 22

Zwei Columnen Filhols, die Angabe der Höhe des Pr_3 (nach Filhol's Zählweise Pr_2) und des Talons des unteren M_1 , habe ich ihrer geringen Bedeutung wegen weggelassen.

Als unwesentlich muss ich bezeichnen die Höhe des Kiefers unterhalb des M_1 und C, denn die Höhe desselben differirt je nach dem Alter und Geschlecht ganz beträchtlich, ferner die Länge des Pr_4 und Pr_3 (Filhol's Pr_1 und Pr_2), denn da dieselben überhaupt ganz fehlen können, kann ihren Dimensionen doch wohl nur geringe Bedeutung beigelegt werden. Auch die Höhe der Pr ist immer sehr variabel und mithin ziemlich unwichtig. Das Gleiche gilt auch von dem Raum, welchen die Pr zusammen einnehmen, weil ja die beiden vordersten Pr oder wenigstens einer derselben nicht selten ganz ausbleiben und auch der Pr_3 , selbst wenn er vorhanden ist, hinsichtlich seiner Länge starken Schwankungen unterworfen ist.

Es bleiben also als zuverlässige Maasse nur:

- ı. Die Länge der Zahnreihe hinter dem C (natürlich muss der M_z hiebei weggelassen werden, da derselbe überhaupt oft fehlen kann).
 - 2. Die Länge des M_1 und des Pr_1 .

Hiebei zeigt sich auf den ersten Blick, dass diese verschieden grossen Gebisse unmöglich ein und derselben Art angehören können, und wird es sehr viel wahrscheinlicher, dass in der That mindestens drei Arten von Aelurogale existiren, wie ja auch Filhol selbst ursprünglich die Existenz von drei Arten angenommen hat. Für diese Dreitheilung haben sich auch Cope und Lydekker erklärt.

Es ist schon eine gewisse Grenze bemerkbar zwischen Nr. III und IV, dann zwischen VI und VII (Münchner 19'3—16'5), noch schärfer aber zeigt sich eine solche zwischen Nr. VII und VIII.

Zu der kleinsten Art, Aelurogale minor Filh. (Toulouse 1882, pl. IV, fig. 9—11), rechne ich auch wenigstens einen Theil der P. Gervais'schen Cryptoprocta? — Zool. et Pal. gén. II, p. 54, pl. XIII, fig. 6; ferner die Filhol'schen Exemplare Nr. IX—XI (wohl auch noch Nr. VIII), sowie Nr. 11 und 12 des Münchener Museums.

Wie weit die Grenzen zwischen Maximum und Minimum ein und derselben lebenden Feliden-Art schwanken können, zeigt die folgende Tabelle.¹) Es ist nicht anzunehmen, dass beiden fossilen Vertretern dieser Raubthiergruppe die Grenzen bedeutend weiter oder enger gewesen sein sollten.

Unte	erkief	er	Zahnreihe hinter dem C	Höhe des Kiefers hinter dem C	Höhe des Kiefers unter dem R	Länge des R (M_1)	Länge von P_{r_1} und P_{r_2}	Länge von Pr	
Felis onca	Nr.	I II III IV	78 70 66 64	45 42 35 38	36 34 26 28	19·5 20 21 18	34 35 33 31	20 20 20 18	Der Talon fehlt am R Der R hat schwachen Talon """""""""""""""""""""""""""""""""""
Felis concolor	Nr. """"""""""""""""""""""""""""""""""""	V VII VIII IX X XII XII	61 59 56 55 55 54 54 54	36 31 31 32 29 27 26 25	25 27 28·5 23 24 23 19·5 20	18·5 19 19·5 20 17 17·5 17·5	30 29 31 29·3 27·5 27 28 26·5	17 16·5 17 17 15 15·5 15·5 15·5	Der Talon angedeutet Talon fehlt """ """ """ """ """ """ """ """ """
Lynx Concolo Lynx Concolo Lynx Caracal Caracal	r? " " " " " " " " " " " " " "	XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX	50 47 46 43 42 38 34	25·5 21 23·5 21 19·5 19 15·5	21 17·5 16 5 17 14·5 15	16 15 15·5 15·5 15 11	24 23 28 24 — 19	14 11 12 13·5 — 11	Fast kein Talon Doppelter Pfeilnahtkamm am Schädel Talon wohlentwickelt Doppelter Pfeilnahtkamm am Schädel Noch die Dvorhanden, aber R bereits in Action Talon fehlt ""

¹⁾ Ich muss vor Allem bemerken, dass hier unter Felis concolor die verschiedenen in Südamerika vorkommendea Feliden zusammengefasst sein können, von denen Giebel — Säugethiere — etwa vier Species unterscheidet. Ich habe indess die Bestimmungen genommen, wie sie eben bei den betreffenden Stücken im Münchener Museum gegeben sind, da es mir sowohl an Zeit als auch an Gelegenheit mangelt, jede dieser Bestimmungen genauer zu prüfen. Für den vorliegenden Fall ist es ja ohnehin von gar keiner Bedeutung, da es ja nur darauf ankommt, Herrn Filhol zu zeigen, wie wenig Werth eine blosse Zusammenstellung von Maasszahlen hat. Sind, wie das sehr wahrscheinlich ist, unter diesen Felis concolor alle von Giebel anerkannten Arten vertreten, so würde dies erst recht für meine Anschauung sprechen, wonach eben für eine Species-Bestimmung nicht blos genau fixirte Zahlenverhältnisse nothwendig sind, sondern auch eben gar alle Momente berücksichtigt werden müssen, die irgendwie in Betracht kommen können.

Milchgebiss: Das Münchener Museum besitzt von Aelurogale zwei Milchzähne, nämlich den oberen D_2 und den unteren D_1 . Dieselben sind überaus schlank, haben aber im Ganzen sehr viel Aehnlichkeit mit den entsprechenden Zähnen von Felis Leo und Tigris. Der obere D_2 unterscheidet sich jedoch von dem D_2 der genannten lebenden Arten durch das Fehlen des zweiten Vorderhöckers. Der Innenhöcker steht gleichfalls sehr weit zurück. Der untere D_1 hat einen viel kräftigeren Innenzacken und einen viel längeren Talon als jener des Löwen oder Tigers.

```
Länge des unteren D_1= 14.7 mm; Höhe desselben = 10.5 mm; Breite = 4.8 mm. 

" " oberen D_2= 16 " " " = 9 " " = 5.5 " 

Es gehören dieselben jedenfalls der grössten Aelurogale-Art an. 

Taf. IX, Fig. 23, Oberer D_2 von aussen 

Fig. 24, " D_2 " innen 

Fig. 25, Unterer D_1 " aussen 

Fig. 55, " D_1 " innen.
```

Aelurogale.

Extremitäten.

Taf. VI, Fig. 3, 14, 15, 19, 20, 23, 24, Taf. VII, Fig. 14.

Einen vielleicht zu Acturogale gehörigen Mittelfussknochen hat bereits Cuvier abgebildet, Rech. sur les oss. foss. T. I., 4. Ausgabe, pl. 151, fig. 89, denselben aber als Metacarpale eines Caniden bestimmt. Blainville, der diesen Knochen copirte, Ostéographie, Canis, p. 108, pl. XIII, hält denselben indess für das zweite Metatarsale, und zwar für das einer Katze.

Die Metapodien sehen im Ganzen den entsprechenden Skelettheilen des Cynodictis lacustris nicht unähnlich; sie unterscheiden sich nur durch die etwas abweichende Art der Einlenkung am Carpus, beziehungsweise Tarsus, und die etwas verschiedene gegenseitige Articulation. In dieser Beziehung erweisen sie sich als solche von Feliden, nur sind die für diese Gruppe so charakteristischen Differenzirungen hier noch nicht so stark ausgeprägt. Auch steht die Länge dieser Knochen hinter jener der lebenden Feliden noch ziemlich weit zurück, die Knochen sind insgesammt kürzer und plumper.

Das Metacarpale I ist schon sehr kurz geworden und fast ebenso stark reducirt wie bei den lebenden Feliden.

Das Metacarpale II. Seine dem Trapezoid entsprechende Facette ist hier nahezu vollkommen eben und von rechteckigem Umriss. Bei dem Cynodictis hat dieselbe dreiseitigen Umriss und erscheint ziemlich tief ausgefurcht; der Tiger nimmt in dieser Beziehung eine Mittelstellung zwischen Aelurogale und Cynodictis ein. Bei diesem letzteren greift das Mc II gar nicht, beim Tiger dagegen sehr weit über die proximale Partie des Mc III herüber. Bei Aclurogale nun ist dieses Uebergreifen noch nicht bis zu einem solchen Grade gediehen.

Das Metacarpale III ist von jenem des Tigers kaum zu unterscheiden, seine proximale Facette ist nur wenig schmäler als bei diesem. Umsomehr weicht dieser Knochen von jenem des *Cynodictis* ab. Bei diesem fehlt der hier wie bei allen Katzen vorhandene Vorsprung, welcher die Facette für *Mc II* trägt, vollständig, auch ist die Facette für das Magnum nicht so tief ausgeschnitten wie bei *Aelurogale*.

Das Metacarpale IV legt sich ganz wie beim Tiger viel weiter unten an das Mc III als bei Cynodictis, auch ist die Facette für Mc III hier viel schärfer von jener für das Unciforme abgesetzt wie bei Cynodictis. Ausserdem articulirt das Metacarpale V bei Aelurogale ganz wie beim Tiger sehr hoch oben am Mc IV. Die entsprechende Grube am Mc IV liegt fast unmittelbar unter der Facette für das Unciforme.

Das Metatarsale I ist nicht mit Sicherheit bekannt. Jedenfalls war es mindestens ebenso stark reducirt wie das $Mc\ I$.

Das Metatarsale II hat eine ziemlich lange, aber fast an allen Stellen gleich breite — eigentlich gleich schmale — Facette für das Mesocunëiforme. Beim Tiger sowohl als bei *Cynodictis* ist diese Facette vorne und hinten, besonders aber vorne sehr viel breiter als in der Mitte. Die Verbindung mit dem *Mt III* und dem Ectocunëiforme ist eine sehr viel losere als beim Tiger.

Das Metatarsale III hat mit jenem von Cynodictis fast grössere Aehnlichkeit als mit jenem des Tigers. Seine Facette für Mt IV liegt höher als bei diesem letzteren.

Das Metatarsale IV unterscheidet sich sowohl vom Tiger als von *Cynodictis* durch die auffallende Breite und Flachheit seiner Facette für das Cuboid. Der auf der Hinterseite unmittelbar neben dem Oberrande befindliche Fortsatz ist sehr viel kürzer, als dies sonst bei Carnivoren der Fall ist. Auch articulirt das Metatarsale V sehr hoch oben. Die ihm entsprechende Grube des *Mt IV* befindet sich fast unmittelbar unterhalb der Facette für das Cuboid.

Metacarpalien und Metatarsalien liegen in verschiedenen Grössen vor, und zwar entsprechen fast immer den Metacarpalien von bestimmter Grösse auch Metatarsalien von vollkommen übereinstimmenden Proportionen. Uebergänge zwischen den einzelnen Gruppen existiren so gut wie gar nicht, wir haben es daher wohl auch mit wirklichen Arten zu thun.

I. Metacarpalien und Metatarsalien:

```
mm; Breite in Mitte = 8.5 mm; Breite am distalen Ende = 11.5 mm;
Mc II Länge = 51
Mc III
                == 62
                                                                                        == 14
                                               = 11
Mc
               <del>==</del> 46
                                                               ,,
Mt II
                                                                                        == II'5 ,,
               = 67
                                                               ,,
                                                                     22
                                ,,
                                     22
Mt III
                == 75
                                               == II
                                                                                        = 13°5 ,,
                                                               ,,
                                                                     ,,
                                22
                                     22
Mt IV
               = 78
                                               == 10
                                                                                       == I3°5 ,,
                                                               ,,
                                                                     ,,
                                                                            2.7
                                ,,
                                     ,,
               =62.5 ,,
                                                                                       = 11'5 ,,
Mt
                                              = 7
                                                               22
                                22
                                     "
                                          22
```

Diese Knochen stammen aus Mouillac (Tarn et Garonne) und zeichnen sich durch ihren eigenartigen Erhaltungszustand aus — weisse Farbe und ungemein porös.

Zu dem gleichen Thier wie diese Knochen gehören auch ein Trapezoid, ein Hamatum, ein Scaphoid, zwei Magnum und ein Pisiforme, ferner zahlreiche Phalangen. Es sehen diese Knochen insgesammt den entsprechenden Theilen von Feliden sehr ähnlich, sind aber noch massiver und kürzer.

Vielleicht gehören diese Reste zu dem Machairodus insignis Filh.

II. Metacarpalien und Metatarsalien:

```
Mc II Länge = 45.5 mm; Breite in Mitte = 7.5 mm; Breite am distalen Ende = 11
                                                                                      mm;
Mc III
              = 58
                                          = 8
                                                                                       22
Mc IV
              =58.5 ,,
                                          = 8.5 ,,
McV
              = 41
                                          = 7.5 ,,
                             22
                                                                               = IO
Mt II
              =67.5 ,,
                                          = 8.5 ,,
                             22
                                 "
                                                              22
                                                                                              Originalien zu
                                                                               = 12.5
Mt~III
              = 7 I
                                          = 10
                             "
                                 "
                                                         ,,
                                                              22
                                                                                             Taf. VI, Fig.
Mt IV
                                                                               -- I I
              = 74
                                             9
                                                        22
                                                              "
                                                                   "
                             ,,
                                 "
                                      "
                                                                                              14a, 15, 23.
Mt V
                                          = 6.8 "
                                                                               = 10
              = 65
                                                        , 27
                                                                   "
                                                                                       ,,
                                 ,,
                                                              "
                             ,,
```

III. Metacarpalien und Metatarsalien — gehören wohl zur gleichen Art wie die vorigen.

```
mm; Breite in Mitte = 6 mm; Breite am distalen Ende = 10
Mc II Länge = 45
                                                                                        Originalien zu
Mc III
             = 54
                                        =7.2
                                                                                        Taf. VI, Fig.
Mc IV
                                                                          = 11
             = 53
                                        =7
                                                                                        3,14,19,20,24.
Mc V
                                                                          = 9.5
             = 37
                                        =6.5
Mt II
             = 60
                                        = 8
                                                                          = 10.5
Mt III
             =65.5
                                        = 9
Mt IV
                                        = 8
                                                                          = 10.5
             = 64
Mt V
             = 54
                                        = 5°5 ,,
```

Diese letzteren Metatarsalien stammen von Mouillac.

Zu der dritten Art mit R von 19—16.5 und Filhol's Nr. VII stelle ich noch Metacarpalien von folgenden Dimensionen:

 $Mc~III~{
m mit}$ 50, 7, 10 mm; $Mc~IV~{
m mit}$ 51, 6.8, 10.5 mm und $Mc~V~{
m mit}$ 34, 5.5 und 9 mm sowie Metatarsalien;

Mt II mit 60-62, 7.5 und 11.5 mm und Mt V mit 60, 6 und 9.5 mm.

IV. Metacarpalia. Vielleicht schon zu Pseudaelurus gehörig.

Mc II Länge = 34 mm; Breite in Mitte = 4.8 mm; Breite am distalen Ende = 7.3 mm;

$$Mc\ III\ , = 41^{\circ}5\ , \qquad , \qquad , = 5^{\circ}2\ , \qquad , \qquad , \qquad , = 8\ , \\ Mc\ IV\ , = 39\ , \qquad , \qquad , = 5^{\circ}5\ , \qquad , \qquad , \qquad , = 8\ ,$$

V. Ein Metacarpale II von 23'5 mm Länge und 4'5, beziehungsweise 6'5 mm Breite.

Der Calcaneus und Astragalus sehen jenen von Felis sehr ähnlich, ebenso die Handwurzelknochen.

Der Carpus ist nur im Verhältniss etwas breiter als bei den lebenden Katzen. Auch das Sacrum, das Becken und die Arm- und Schenkelknochen zeigen keine wesentlichen Differenzen.

Das Becken hat einen Pfannendurchmesser von 23 mm und gehört wohl zu der grössten Art.

Der Radius hat eine Länge von etwa 120 mm; seine Breite in der Mitte ist 12 mm.

Der grösste Durchmesser der proximalen Facette = 18 mm.

Taf. VI. Fig. 3. Metacarpus von oben. Idem Fig. 19. 3te Grösse.

Fig. 14. Metacarpale II von aussen (Facette für Mc III). Idem Fig. 3, 19.

Fig. 14a. Metatarsale II von aussen (Facette für Mt III). Idem Fig. 15, 23.

Fig. 15. Metatarsus von oben. Idem Fig. 14 a, 23, 3te Grösse.

Fig. 19. Metacarpus von hinten. Idem Fig. 3.

Fig. 20. Metacarpale IV von aussen (Facette für Mc V). Idem Fig. 3, 19.

Fig. 23. Metatarsus von hinten. Idem Fig. 14 a, 15.

Fig. 24. Metacarpale III von innen. (Facette für Mc II). Idem Fig. 3, 19.

Lydekker¹) beschreibt eine Aclurogale sivalensis aus dem Tertiär der Siwalik-Hügel.

Es wäre schliesslich nicht unmöglich, dass sich dieses Gattung wirklich so lange erhalten konnte. Besonderes Interesse verdient der Kiefer insoferne, als der Pr_3 hier vom Pr_2 sehr weit entfernt steht und sehr klein geworden ist, was zwar auch bisweilen bei Exemplaren aus den Phosphoriten des Quercy vorkommt, bei dieser jungtertiären Form aber vermuthlich für alle Individuen zur Regel geworden sein dürfte, wenigstens ist dies nach dem Gesetz der Reduction überaus wahrscheinlich.

¹⁾ Memoirs of the Geological Survey of India. Ser. X, Vol. II, p. 317 (140), pl. XLIV, fig. 7.

Man könnte diesen Unterkiefer indess mit ebensoviel Berechtigung als *Pseudaelurus* (im Sinne Leidy's) bestimmen.

Drepanodon bidentatus Filh. sp.

```
Taf. IX, Fig. 22, 50, 53.
```

```
Filhol. Machairodus bidentatus (im Text, auf der Tafel "Drepanodon") Ann. sc. géol. T. VII, p. 153, pi. 28.
P. Gervais. Eusmilus perarmatus. Zool. et Pal. gén. II, p. 53, pl. XII, fig. 8—12.
Lydekker. "bidentatus. Catalogue 1887, Part. V, p. 311, fig. 47.
```

Der Vorderrand des Kiefers, welcher den C und die \mathcal{F} trägt, ist scharf, nahezu vertical abgestutzt und nach unten zu einem weit herabhängenden Lappen umgestaltet, welcher als Schutzvorrichtung für den ungemein langen, aber messerklingenartigen Oberkiefer-Eckzahn zu dienen hat. Die Zahl der unteren \mathcal{F} ist hier nur noch zwei. Dieselben erscheinen konisch zugespitzt. Der untere C hat sehr geringe Grösse und gleicht fast eher einem dritten \mathcal{F} . Zwischen ihm und dem Pr_1 befindet sich eine lange Zahnlücke, ohne alle Spur von einstiger Anwesenheit weiterer Pr. Die hintere Wurzel des unteren Pr_1 ist viel massiver und hat auch einen viel ansehnlicheren Längsdurchmesser als die vordere. Am M_1 finden wir das umgekehrte Verhältniss. Die Zahnlücke erscheint sehr kantig.

Der Pr_1 besteht aus einem hohen Hauptzacken und je einem etwas niedrigeren Vor- und Hinterzacken, der M_1 aus zwei gegeneinander geneigten, weitgeöffneten Klingen und einem schneidenden, ziemlich langen Talon. Der Innenzacken fehlt vollständig. Der Pr_1 sowie der M_1 zeichnen sich durch ihre beträchtliche Dicke aus und unterscheiden sich hiedurch wesentlich von den echten Nimraviden. Beide Zähne, der Pr_1 sowie der M_1 legen sich stark nach hinten, statt dass ihre Zacken eine verticale Stellung einnähmen. Das Thier hatte die Grösse des Ozelots.

```
Länge des Unterkiefers total = 105 mm?
```

- ,, der Zahnlücke = 19 mm.
- " des $Pr_1 = 8 \text{ mm}$; Höhe desselben = 5 mm.
- ,, des $M_1 = 15 \text{ mm}$; ,, == 8 mm; Dicke desselben = 6 mm.

Ober kiefer sind den französischen Autoren anscheinend nicht bekannt; sie sprechen nur von dem oberen Eckzahn, der eine sehr ansehnliche Grösse besitzt. Eine Zähnelung des Hinter- und Vorderrandes ist bei den Originalen Filhol's und Gervais' wohl nicht zu beobachten. Lydekker bildet ein Kieferstück ab mit dem oberen Pr_1 von 22 mm Länge. So lange der Schädel nicht gefunden ist, muss die generische Bestimmung dieser Reste — ob Machairodus, Drepanodon, Smilodon oder Eusmilus — durchaus zweifelhaft bleiben. Der Dicke der Zähne nach bin ich fast versucht, dieselben zu den echten Feliden zu rechnen. Der Zahnformel nach wäre der Name Smilodon wohl an ehesten zutreffend, denn bei der schrägen Stellung des unteren Pr_1 hat die Anwesenheit eines oberen Pr_2 von vorneherein sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich.

Drepanodon? sp.

Das Münchener Museum besitzt ausser einigen Unterkieferfragmenten auch ein Oberkieferbruchstück mit den Pr_1 und Pr_2 und einen isolirten oberen Pr_1 , die wohl auf Drepanodonbezogen werden dürfen. Der Pr_2 zeichnet sich durch seine auffallende Kleinheit aus und ist gleich dem unteren Pr_1 stark nach rückwärts geneigt. Der Vorderzacken ist ganz niedrig, dagegen hat der Hinterzacken eine ziemlich beträchtliche Höhe. Am Pr_1 ist der Vorderhöcker wohl entwickelt, der Innenhöcker dagegen nicht besonders kräftig und dem Hauptzacken dicht angedrückt. Die hintere Schneide hat eine ansehnliche Länge. Beide Zähne sind sehr schmal. Der Pr_2 hat zwei, der Pr_1 drei Wurzeln.

Die Länge des $Pr_1 = 17$ mm; die Höhe desselben = 11 mm; die Dicke desselben = 7 mm. Ich stelle hieher auch einen Taf. IX, Fig. 22, abgebildeten unteren M_1 . Derselbe hat im Ganzen mit dem entsprechenden Zahne des $Drepanodon\ palmidens$ von Sansan ziemlich grosse Aehnlichkeit, trägt jedoch einen freilich nicht besonders starken, schneidenden Talon und einen sehr kleinen, weit nach hintengerückten Innenzacken. Der letztere hat nur mässige Höhe und liegt dem Hauptzacken sehr dicht an.

Für Drepanodon bidentatus Filh, sp. sind diese Zähne doch wohl zu klein.

Länge des $M_1 = 18 \text{ mm}$ (?); Höhe desselben = 14 mm; Breite desselben = 6.8 mm.

Vorkommen: In den Phosphoriten von Escamps (Lot).

Taf. IX, Fig. 22. Unterer M_1 von aussen.

Fig. 50. Oberkiefer Pr_1 und Pr_1 von aussen, Fig. 53 von innen.

Drepanodon palmidens Blainv. sp.

Blainville, Felis palmidens. Ostéographie. Felis pl. XVII.

P. Gervais. Machzirodus palmidens. Zool. et. Pal. fr., p. 231.

P. Gervais. " Zool. et Pal. gén. II, p. 53, pl. XII, fig. 1-7.

Der C des Oberkiefers ist im Verhältniss wenig kleiner als bei Meganthereon. Die Zacken der unteren Pr sind sehr spitz und erreichen eine sehr beträchtliche Höhe, selbst der Vorderzacken des Pr_2 ist schon auffallend hoch. Der Pr_1 trägt hinter dem Hauptzacken noch zwei Nebenzacken. Der dem oberen C entsprechende Unterkieferlappen hängt sehr weit herab. Die Zahl der \mathcal{F} hat sich wie bei $Drepanodon\ bidentatus\ Filhol\ auf\ zwei\ verringert;\ der untere\ <math>C$ ist sehr schwach geworden. Der untere M_1 besteht ausschliesslich aus dem ursprünglichen Vorderund Aussenzacken, die zusammen eine sehr weitgeöffnete Scheere darstellen.

Der von P. Gervais gezeichnete obere Pr_1 besitzt anscheinend einen kräftigen Innenhöcker, während ein solcher bei dem Blainville'schen Original ziemlich schwach gewesen sein dürfte. Zu diesem Thier gehört höchst wahrscheinlich auch der von Blainville—Ostéographie Felis, pl. XIII— als "Felis quadridentata" bestimmte Schädel.

Vorkommen: Im Obermiocan von Sansan.

Machairodus Jourdani Filh.

Filhol. Notes sur quelques mammifères, 1881, p. 57, pl. IV, fig. 3—5 Fraas. Würtembergische Jahreshefte, 1885, p. 319, Taf. IV. Fig. 2a und b. Depéret. Archives du Museum d'Hist. nat. Lyon 1887, p. 127, pl. XIII, fig. 4.

Die Filhol'schen Originale bestehen aus einem oberen C und aus einem Unterkieferstück mit Pr_1 und M_1 . Der Pr ist etwas complicirter als beim typischen Machairodus, indem er an seinem Hinterrande noch einen besonderen Höcker trägt. Alle Höcker sind viel spitzer als dies sonst bei Machairodus der Fall ist, — mit Ausnahme von M. palmidens —.

Der Name Hyaenictis germanica gründet sich auf ein Oberkieferfragment mit grossem Pr_1 . Derselbe ist sehr schlank, ganz entsprechend den erwähnten Resten aus St. Alban. An seinem Vorderrande trägt er noch einen Höcker mehr als die Pr der übrigen Machairodus.

Legt man die gepauste Zeichnung des Steinheimer Exemplars auf die Zeichnung des von Filhol abgebildeten Unterkiefers, so dass der obere Pr_1 seine natürliche Lage zwischen dem Pr_1 und dem M_1 des Unterkiefers einnimmt, so ergibt sich, dass diese Reste höchst wahrscheinlich der gleichen Art angehören. Die Dimensionen passen ausgezeichnet. Dass das Fraas'sche Original nicht von Hyaenictis herrühren kann, geht aus der Schwäche des Innenhöckers des oberen Pr_1 zur Genüge hervor. Der gleichaltrige Machairodus palmidens steht in den Dimensionen seines unteren M_1 doch zu sehr zurück gegen jenen des fourdan1, und ist deshalb die Identität beider wohl vollständig ausgeschlossen.

Vorkommen: Im Obermiocän von Grive-St. Alban (1sère) und Steinheim.

Machairodus leoninus Roth und Wagner.

```
Kaup. Felis aphanista. Oss. fos., p 18, Tab. II, Fig. 1 a, b.

Wagner. Felis gigantea. Abhandl. d. k. bayr. Akademie. Vol. V, p. 375, Taf. II, Fig. 6.

" Machairodus leoninus. Ibidem, Vol. VII, p. 30, Taf. IX, Vol. VIII, p. 13, Taf. V, Fig. 11.

Kaup. " cultridens. Beiträge, 5. Heft, p. 13, Taf. II, Fig. 1, 2.

Gaudry. " Pikermi, p. 105, pl. XVI, fig. 1—6.

" Mont Léberon, p. 12, pl. II, fig. 1, 2.

Lydekker. " Catalogue 1884, p. 42 und 1887, p. 310.

Pethö. " K. ung. geol, Anstalt, Bericht für 1884, p. 67.
```

Eine vollständigere Angabe der Synonyma findet sich bei Lydekker 1. c.

Bei der genauen Beschreibung der vorhandenen Reste kann ich mit einer kurzen Notiz begnügen.

Die Zahl der Backzähne ist $\frac{4}{3}$, davon $\frac{3}{2}$ Pr.

Der riesige obere C besitzt einen gekerbten Hinterrand. Die Länge dieses Zahnes = 150 bis 160 mm.

Der untere M_1-R- entbehrt vollständig eines Talons; er zeigt nur noch eine Einkerbung an seinem Hinterrande. Seine Länge beträgt 31 mm.

```
Die Länge des unteren Pr_1=27, die des Pr_2=21 mm.

,, ,, oberen Pr_2=23, ,, ,, Pr_1(R)=42 mm;

Der obere M_1 hat eine Länge von 11 mm.
```

Die Gestalt der einzelnen Zähne stimmt am besten mit denen des Löwen.

Der Humerus hat in seiner distalen Partie grössere Aehnlichkeit mit dem Tiger, als mit dem Löwen. Die Krallen sind breiter und kürzer als jene des Löwen, die Tatzen selbst zwar stärker als bei Felis leo, aber schwächer als die des Höhlenlöwen. Der Daumen ist noch besser entwickelt als bei den lebenden Katzen. Im Ganzen hat die Vorderextremität mehr Aehnlichkeit mit der des Tigers als mit der des Löwen. Die Tibia ist sehr plump.

Die ebenfalls als Machairodus cultridens (meganthereon Croiz. et Jobert) bezeichneten Reste aus der Auvergne und Val d'Arno deuten auf ein wesentlich kleineres Thier hin, wie dies auch Lydekker bemerkt hat; es dürfte sich daher empfehlen, beide Formen als gesonderte Arten zu betrachten, was auch insoferne zweckmässiger erscheint, als bis jetzt keine einzige der für Pikermi charakteristischen Arten im Pliocän der Auvergne und des Val d'Arno nachgewiesen werden konnte. Da der Name Machairodus cultridens zuerst für die aus Val d'Arno stammende Art angewandt worden ist, so wäre für diese ältere und grössere Art eigentlich der Name aphanista zu wählen.

Cope rechnet diesen Machairodus zu Drepanodon wegen der Anwesenheit von zwei Wurzeln am unteren Pr_2 — Am. Nat. 1880, p. 853. Bei der sicher bestehenden Variabilität möchte ich auf dieses Merkmal nicht allzu viel Gewicht legen.

Vorkommen: In Pikermi, Eppelsheim, Baltavár und Mont Lébéron.

Machairodus cultridens Cuv sp. und Machairodus meganthereon Croiz. et Job.

Diese Namen beziehen sich auf anscheinend drei verschieden grosse Arten aus dem Oberpliocän der Auvergne und des Arnothales.

Von den im Val d'Arno gefundenen Resten besitzt das Münchener Museum eine Anzahl Gypsabgüsse, die sich hinsichtlich ihrer Dimensionen folgendermassen gruppiren.

- A. Ein sehr grosser oberer Eckzahn, zwei Unterkiefer von ein und demselben Individuum und noch miteinander verbunden, ein isolirter Unterkiefer und die Vorderpartie eines Schädels mit dem nahezu vollständigen Gebiss. Alle diese Stücke tragen die Bezeichnung Machairodus meganthereon. Dazu kommt noch der obere Pr_1 eines "Machairodus sp."
- B. Ein oberer Eckzahn von ziemlicher Grösse, als "M. cultridens" bestimmt, ein Unterkieferfragment mit den Backzähnen und ein Oberkieferfragment mit dem Pr_1 , die letzteren Stücke sind als "Machairodus sp." bezeichnet.

Herrn Weithofer verdanke ich folgende briefliche Notiz: Was hier im Museum — Florenz — liegt, ist Folgendes: Ausser jenem typischen M. cultridens (eine vordere Schädelhälfte mit Canin-Oberkieferfragment, jener Eckzahn etc.) gewiss noch ein zweiter (Schädel, mehrere Kiefer, einzelne Zähne) mit breiten, beiderseits gezähnelten, in ihrer Form ungefähr zwischen leoninus und latidens stehenden oberen Eckzähnen, und jedenfalls noch ein dritter (also zwei nov. sp.) nämlich einem Schädel mit Unterkiefer von sehr robuster Gestalt und mitfolgender Zahnformel: $\frac{3}{3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2R1}{2R0}$ also $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2R1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{$

Leider geht aus dieser Notiz nicht hervor, wie gross dieser dritte Machairodus ist; auch kann ich unmöglich glauben, dass jenes Original Cuvier's derselben Art angehören sollte, wie die erwähnte Vorderpartie des Schädels, von welcher wohl der oben unter A angeführte Gypsabguss stammt. Ich halte es jedoch für zweckmässiger von jenen Stücken abzusehen, die mir weder in Zeichnungen noch in Abgüssen vorliegen und komme zu den Schluss: Alles unter A angeführte Material darf als cultridens, alles unter B erwähnte darf als Machairodus meganthereon bezeichnet werden, soferne man den von Blainville und P. Gervais abgebildeten Schädel und Unterkiefer des Machairodus meganthereon aus der Auvergne zu Grunde legt, was sich umsomehr empfiehlt, als mit den isolirten Eckzähnen allein doch nur wenig anzufangen ist.

Zu cultridens kommt ferner noch der von Lydekker und Backhouse beschriebene Unterkiefer aus dem Forestbed — Quart. Journ. Geol. Soc. 1886, p. 509, pl. X — und der grösste der von Bainville — Felis, pl. XVII — abgebildeten oberen Caninen aus der Auvergne sowie der obere \mathcal{F}_3 des M. latidens Owen 1) Das Lydekker'sche Original hat nur mehr einen unteren Pr. An den Stücken aus Val d'Arno ist zwar noch der Pr_2 vorhanden, hat aber in beiden Kiefern schon bedeutende Reduction erfahren. Im Uebrigen ist an der specifischen Identität der englischen

¹⁾ Zweiselhaft ob hieher gehörig bleibt der obere Canin der "Felis cultridens d'Angleterre ex Mac Enry" in Blainville Ostéogr., Felis, pl. XVII. Hinsichtlich seiner Grösse steht er zwischen dem echten cultridens und dem meg inthereon in der Mitte, seinem Fundorte nach wird er wohl doch als einer besonderen Species angehörig zu betrachten sein. Auf die starke Zähnelung möchte ich absolut kein besonderes Gewicht legen, da derartige Bildungen individuell ausserordentlich variiren können, und was die Grösse anbelangt, so werden wir bei isolirten Caninen wohl nie entscheiden können, ob wir ein schwächeres Individuum einer grösseren Art oder ein stärkeres Individuum einer kleineren Art vor uns haben.

und der italienischen Reste nicht zu zweifeln. Dieser M. cultridens ist etwa um ein Drittel grösser als der echte meganthereon.

Machairodus meganthereon umfasst ausser dem Blainville-Gervais'schen Original und den unter B aufgezählten Resten den oberen Canin und das Unterkieferfragment des "Felis cultridens" des Val d'Arno" und den kleineren oberen Canin der "Felis cultridens d'Auvergne" — Blainville Felis pl. XVII.

Als Typus einer dritten Form wären endlich jene kleinen Oberkieferzähne aufzufassen, welche Blainville als "Ursus cultridens d'Auvergne" — Ursus, pl. XV. — und als "Felis meganthenero d'Auvergne" — Felis, pl. XVII, rechts unten — abgebildet hat.

Machairodus Schlosseri Weithofer.

Weithofer, Beiträge zur Paleont. Oesterr.-Ungarns. Bd. VI. p. 233 (9), Taf. XI, Fig. 1—7.

Kittl. Machairodus orientalis. Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseum 1887, p. 329, Taf. XIV, Fig. 1—5, Taf. XV, Fig. 1—2.

Dieser Name bezieht sich auf einen Machairodus aus Pikermi, der hinsichtlich seiner Grösse dem Machairodus parvulus und der Felis ogygia sehr nahe steht. Der erstere ist wie aus seinen bei Felis antediluviana angegebenen Massen hervorgeht, wohl doch etwas zu klein, als dass man ihn noch zur gleichen Art zählen könnte wie jene beiden Unterkiefer, auf welche Weithofer die neue Species gegründet hat, dagegen ist die Identität mit der Felis ogygia durchaus nicht so ganz von der Hand zu weisen. Freilich fällt es bei der mangelhaften Erhaltung des Kaup'schen Originals sehr schwer, eine directe Entscheidung zu treffen. Die geringeren Dimensionen dieser Felis ogygia können recht wohl auf der Verschiedenheit des Geschlechts beruhen, und ist diese Differenz in den Maasszahlen keineswegs so beträchtlich, dass die letztgenannte Form nicht doch noch zu der nämlichen Species gehören könnte wie die von Weithofer beschriebenen Reste aus Pikermi.

Der C steht vom Pr_1 17, beziehungsweise 13.4 mm ab. Die Höhe des Kiefers vor dem $Pr_1 = 24.5$ mm, resp. 25.5 mm.

Länge des $Pr_2 = 12.5$ (12.7) mm, Länge des $Pr_1 = 18.8$ mm, Länge des $M_1 = 21.3$ mm.

Höhe des $Pr_2 = 6.6$, Höhe des $Pr_1 = 10.5$ mm, Höhe des $M_1 = 11$ mm (circa).

Der Canin ist vollkommen glatt. Der Kiefer zeigt vor dem C die für Machairodus charakteristische vorspringende Kante. Auch vom Skelet nennt Weithofer einige Stücke.

Aus dem Pliocän von Maragha in Persien beschreibt Kittl einen Machairodus-Schädel von mässiger Grösse — M. orientalis — der offenbar der eben besprochenen Form aus Pikermi ungemein nahe steht. Legt man nämlich die Pause der Zeichnung der von Weithofer abgebildeten Unterkiefer in entsprechender Position an die Abbildung jenes Schädels, so passen die oberen und unteren Zähne so gut in einander wie dies nur bei ein und derselben Art der Fall sein kann, ja es könnten diese Reste fast von dem gleichen Individuum herrühren.

Es würde sich demnach allenfalls für "Felis ogygia" Kaup eine ziemlich beträchtliche räumliche Verbreitung ergeben, nämlich: Eppelsheim, Pikermi und Maragha.

Machairodus parvulus Hensel.

Siehe Felis antediluviana.

Machairodus maritimus de Cristol.

P. Gervais. Zool. et Pal. franç., p. 230.

Im Pliocän von Südfrankreich. Jedenfalls näher zu prüfen auf etwaige Identität mit Pliocän-Formen der Auvergne und des Arnothales.

Machairodus latidens Owen.

P, Gervais. Zool. et Pal. gén. I, p. 78, pl. 18. fig. 3, 4.

Lydekker. Catalogue, p. 54.

Falconer vermuthete die Identität dieser Reste mit meganthereon. Die auffallend starke Zähnelung des Canins sowie das geologische Vorkommen, besonders Höhlen in Kent, also Pleistocän machen es jedoch wahrscheinlich, dass wir es hier mit einer selbstständigen Art zu thun haben.

Machairodus insignis Filh.

Filhol. Ann. scienc. géol., T. VII. p. 152.

Dieser Name bezieht sich auf Bruchstücke von oberen Caninen eines grossen Feliden. Es stammen diese Reste aus den Phosphoriten des Quercy.

Machairodus?

P. Gervais. Zool. et Pal. franç., p. 230. pl. XVIII, fig. 1.

In den Schichten mit Lophiodon issclense fand sich ein Canin, den Gervais einem Machairodus zuschreiben möchte. Derselbe darf wohl doch mit mehr Berechtigung auf einen Creodonten bezogen werden.

In Asien gibt es ebenfalls mehrere Machairodus-Arten. Lydekker beschreibt aus den Siwalikhills einen Machairodus palacindicus, Siw. Carnivora p. 341 (164), pl. XLIII, fig. 8, 9, und pl. XLIV, fig. 3, und einen M. sivalensis ibidem, p. 334 (157), pl. XLIV, fig. 1,2, 4—6. Kittl führt aus Maragha einen M. orientalis auf, Annalen des k. k. Hofmuseums 1887, p. 329, Taf. XIV, Fig. 1—5, Taf. XV, Fig. 12, der indess wohl der gleichen Art angehört, wie jene Unterkiefer aus Pikermi, welche Weithofer als Machairodus Schlosseri beschrieben hat, und vermuthlich auch nichts Anderes sind als vollständiger erhaltene Reste jenes Thieres, welches Kaup Felis ogygia genannt hat.

Die altweltlichen Arten stellt Cope — Am. Nat. 1880, p. 853. — sämmtlich zum Genus Drepanodon. Dagegen bilden die neuweltlichen Species neogaeus, necator und gracilis die Gattung Smilodon, von der ersteren verschieden durch die Einwurzligkeit des unteren Pr_2 . Der Machairodus vom Val d'Arno vermittelt aber offenbar den Uebergang zwischen beiden Gruppen.

Felis (im weitesten Sinne).

Bei der grossen Aehnlichkeit, welche alle lebenden Felis-Formen hinsichtlich ihres Gebisses aufzuweisen haben, ist es überaus wahrscheinlich, dass auch die zahlreichen fossilen, als Felis schlechtweg beschriebenen Formen in mehrere Subgenera zerlegt werden müssen. Wie das geschehen soll, ist freilich eine andere Frage. Wer sich dieser Aufgabe unterziehen wollte, müsste

vorerst gründliche Studien an recentem Material vornehmen, dann aber gar alle Museen, in welche die zahlreichen fossilen Reste zerstreut sind, selbst besuchen und die Originalien aus eigener Anschauung kennen lernen.

Zu Machairodus gehören vielleicht noch:

Felis antediluviana Kaup.

```
Kaup. Osst. foss., p. 23, pl. II, fig. 5.
?Gaudry. Attique, p. 118, pl. XVII, fig. 5—7 und 8 (non fig. 4).
?Hensel. Machairodus parvulus. Monatshefte der Berliner Akad., 1862, p. 5.
?Kittl. Felis cfr. brevirostris. Annalen des naturh. Hofmuseums, Wien 1887, p. 331, Taf. XIV, Fig. 6.
?Köppen. Felis. Palaeontographica, Bd. XVII, p. 141
```

Das Kaup'sche Original besteht nur aus dem unteren Pr_1 und dem sehr schadhaften M_1 . Beide Zähne haben eine Länge von 31 mm; davon treffen auf den Pr_1 12.5 mm. Die Höhe des Kiefers hinter dem Pr_1 = 20 mm.

Ganz ähnliche Dimensionen finden wir vermuthlich auch bei dem Hensel'schen — Machairodus parvulus — nur Unterkieferfragment bekannt — wenigstens stimmt die Kieferhöhe und die Länge des Pr_1 vollkommen überein. Der Pr_2 hat eine Länge von 10 5 mm und eine Höhe von 8 mm. Der Kiefer erscheint vor dem C sehr scharf abgestutzt. Seine Höhe ist beim C noch die gleiche wie hinter dem Pr_1 . Die hintere Partie mit dem M_1 fehlt vollständig. Der Abstand des C vom Pr_2 = 10.5 mm, die Zahnreihe des Unterkiefers wäre etwa 40 mm.

Der von Köppen beschriebene und abgebildete Unterkieferast aus Eppelsheim stimmt der Grösse nach mit dem Kaup'schen Originale so ziemlich überein, hat jedoch am M_1 einen offenbar etwas stärker entwickelten Talon. Im Vergleich zu dem *Machairodus parvulus* ist seine Zahnlücke sehr lang. Die Zähne selbst — d. h. die Pr — lassen keine nennenswerthen Differenzen erkennen.

Ob der von Kittl beschriebene Felis cfr. brevirostris aus Maragha nicht mit antediluviana identisch ist, lässt sich freilich nicht mit absoluter Sicherheit entscheiden, denn auch hier ist der Talon des M_1 etwas kräftiger als bei antediluviana. Die Dimensionen zeigen jedoch keine nennenswerthe Abweichung. Jedenfalls ist es befremdend, dass Kittl dieser doch immerhin sehr nahestehenden Formen aus Eppelsheim nicht die geringste Erwähnung gethan hat. Das Köppen'sche Original unterscheidet sich von dem Kiefer aus Maragha insoferne, als der Talon seines unteren M_1 nicht mehr in der Mittellinie des Zahnes liegt, sondern mehr nach der Innenseite gerückt ist.

In Pikermi fand sich ausser dem bereits erwähnten *Machairodus parvulus* noch ein Felide *Felis leiodon* Weithofer, der mit der Kaup'schen Art wohl auch in näherer Beziehung stehen dürfte.

Höchst wahrscheinlich gehört zu antediluviana oder doch zu dem oben genannten Felis leiodon—soferne die beiden wirklich verschieden sein sollten—ein Theilder von Gaudry angeführten Knochen aus Pikermi, nämlich die "seconde espèce", pl. XVII, fig. 5—7. Doch muss hievon der Radius (fig. 4) abgetrennt werden, da derselbe im Verhältniss zur Tibia offenbar viel zu gross ist. Dagegen passt hieher der Radius der "troisième espèce" — fig. 8 — Es reducirt sich hiemit die Zahl der Felis-Arten von Pikermi von 4 auf 3; die dritte ist Felis attica.

Vorkommen: Im Pliocan von Eppelsheim, Pikermi und Maragha. (?)

Felis leiodon Weithofer.

Weithofer, Beiträge zur Palaeont, Oesterreich-Ungarns, 1887, p. 242, Taf. XI, Fig. 8.

Diese Art basirt auf einem Unterkiefer, der auf ein Thier von der Grösse von Felis onca hinweist. Der Canin ist schlank und spitz und zeigt keinerlei Rauhigkeit oder Zähnelung. Das Kinn bildet einen ziemlich starken Wulst aus — ähnlich wie bei Machairodus — der die Vorderfläche des Kieferknochens von dessen Flanke trennt, während bei Felis dieselben in einer einfachen, aber doch ziemlich deutlichen Kante zusammenstossen. Die Zahnlücke hat nur sehr geringe Ausdehnung (7.5 mm). In dieser Beziehung nähert sich die vorliegende Art den echten Felis, hinsichtlich der Gestalt des Eckzahnes und der Vorderpartie des Kiefers dagegen der Gattung Machairodus.

Die Zähne (vom Vorderrande des C bis zum Hinterrande des M_1) nehmen einen Raum von 59 mm ein; die Höhe des Kiefers in der Zahnlücke = 20·8 mm, der Abstand des Pr_2 vom C beträgt nur 7·5 mm. Die Höhe des Canins = 17·5 mm, sein Längsdurchmesser 9 mm. Länge des Pr_2 = 11 mm, Länge des Pr_1 = 15 mm; Höhe desselben = 9·3 mm. Grösste Breite = 6·5 mm. Länge des M_1 = 17·8 mm. Grösste Höhe 9·8 mm.

Der M_1 besitzt im Gegensatz zu den echten Felis noch einen ziemlich deutlichen Talon. Er ist zugleich sehr schmal.

Obwohl die Zahnlücke hier auffallend kurz erscheint, dürfte es doch noch sehr fraglich sein, ob wir es hier in der That mit einer selbstständigen Species zu thun haben, es könnte vielmehr dieser Kiefer doch noch zu der antediluviana gehören. Die Identität mit der Felis cfr. brevirostris Kittl aus Maragha und der von Köppen beschriebenen Form aus Eppelsheim ist insoferne etwas zweifelhaft, als diese letzteren am unteren M_1 einen viel kräftigeren Talon aufzuweisen haben; doch betont Kittl die grosse Aehnlichkeit zwischen dem Kiefer von Pikermi und jenem von Maragha. Vermuthlich gehören hieher die Reste der seconde espèce Gaudry aus Pikermi, bestehend in Tibia.

Vorkommen: Ausschliesslich in Pikermi.

Felis ogygia Kaup.

Kaup. Oss. Foss., p. 21, pl. II., fig. 3, 4, und pl. I, fig. 6.

Gaudry. Attique, p. 116, pl. XVII, fig. 1—3 (und fig. 4).

Köppen. Felis. Palaeontographica, Bd. XVII, p. 141 mit Holzschnitt.

Weithofer. Beiträge zur Palaeont. Oesterreich-Ungarns, 1887, p. 242, Taf. VII, Fig. 9.

*Kittl. Machairodus orientalis. Annalen des k. k. Hofmuseums, 1887, p. 329, Taf. XIV, Fig. 1—5, Taf. XV, Fig. 1, 2.

Die untere Zahnreihe hat bei dem Kaup'schen Original eine Länge von etwa 40—45 mm. Der M_1 fehlt, daher lässt sich die Länge nur sehr schwer ermitteln, dürfte aber bei der nicht unbeträchtlichen Höhe des Kiefers ziemlich gross gewesen sein. Der Pr_2 misst wahrscheinlich 10.8 mm, der Pr_1 allein 16 mm. Das Diastem hat eine Länge von 16 mm, die Höhe des Kiefers, hinter dem Pr_1 beträgt 26 mm.

Warum Köppen den von ihm beschriebenen Kieferrest nicht mit ogygia identificirt hat ist wirklich schwer einzusehen. Die Zahnreihe Pr_2-M_1 beträgt hier 40 mm. Die Länge des Pr_2 = 17 mm. Das Diastem scheint allerdings ein klein wenig kürzer zu sein als beim Kaup'schen Original, doch ist die Differenz zu unbedeutend, um als Species-Merkmal zu dienen.

Ich bin sehr geneigt, auf diese Art die von Gaudry erwähnten und zum Theil abgebildeten Knochen der première éspèce zu bezeichnen. Es sind dies Humerus, Ulna, Femur, Tibia, Phalangen nebst Tarsus und Metatarsus. Doch dürfte hieher auch der — Fig. 4 — dargestellte Radius anzureihen sein. Es ist dieses Stück unbedingt zu gross, als dass er der nämlichen Art angehören könnte wie die Fig. 7 abgebildete Tibia, 1) dagegen stimmt er im Verhältniss ganz gut mit der Fig. 2 gezeichneten grösseren Tibia aus Pikermi überein.

Wie ich schon bei *Machairodus Schlosseri* erwähnt habe, ist die Möglichkeit sehr inniger Beziehungen zwischen dieser ebengenannten Art und der Kaup'schen Species keineswegs ausser Acht zu lassen, ja es ist nicht einmal allzu unwahrscheinlich, dass beide Formen in eine einzige Art zusammengezogen werden müssen. Ganz das Gleiche gilt natürlich auch von dem Kittl'schen *Machairodus orientalis* aus Maragha, der von jener erwähnten Art aus Pikermi überhaupt kaum getrennt werden kann.

Cope rechnet auch Felis ogygia zur Gattung Drepanodon,²) da der Vorderrand des Unterkiefers sehr scharf abgestutzt erscheint und mit dem Unterrand nahezu einen rechten Winkel bildet.

Die von Kaup so ausführlich widerlegte Identität mit Felis issiodorensis ist schon bei der Verschiedenheit des geologischen Alters der betreffenden Ablagerungen wenig wahrscheinlich.

Vorkommen: Im Pliocan von Eppelsheim und Pikermi (?).

Felis prisca Kaup.

Kaup. Oss. foss. p. 20, pl. II, Fig. 2.

Diese Art gründet sich auf einen oberen Fr_1 , der für ogygia entschieden zu gross, für Machairodus leoninus aber doch etwas zu klein ist. In seiner Zusammensetzung stimmt er freilich besser mit Machairodus als mit Felis überein.

Vorkommen: Im Pliocän von Eppelsheim.

Gaudry beschreibt aus Pikermi Skelettheile von vier Felis-Arten. 1. c. p. 116—121, die grösste noch den Jaguar übertreffend, die zweite von den Dimensionen des afrikanischen Panthers, die dritte zwischen diesem und dem Caracal in der Mitte stehend und die vierte etwa von den Dimensionen der Wildkatze. Auf die letztere komme ich noch zu sprechen. Die grössten Stücke habe ich vorläufig mit ogygia vereinigt, die zweiten und dritten zusammengezogen und zu antediluviana, resp. leiodon gestellt.

Die folgenden Arten sind als "Felis" anzusprechen. Aus dem Miocän kennt man:

Felis media — P. Gervais, Zool. et Pal. fr. p. 229 — viel grösser als die Hauskatze, und Felis pygmaea — ibidem, p. 229 — nicht grösser als Mustela putorius, beide aus Sansan. Die erstere könnte vielleicht mit Felis turnauensis identisch sein.

Zu diesen kommen noch Felis tetraodon, Blainville Ostéographie, Felis, pl. XIV, Felis pardus ibidem und quadridentatus — Felis pl. XIII, ebenfalls aus Sansan. Die erste Art basirt auf einem Unterkiefer, die zweite auf einem isolirten unteren M_1 , die dritte auf einem Schädel. Es gehören alle diese Stücke jedenfalls der gleichen Species an. Lydekker stellt dieselbe — Catalogue, Supplement p. 312 — zu Pseudaelurus, allein dem Aussehen der Zähne nach dürfte doch

 $^{^{1}}$) Bei der Schlankheit dieser Reste geht es nicht an, der specifischen Bestimmung die Maasszahlen von Felis leo oder tigris zu Grunde zu legen. Viel besser eignet sich hiezu Caracal. Seine Dimensionen sind: Länge der untern Zahnreihe = 30.5, Länge des untern $M_1 = 11$ mm. Länge der Tibia = 175 mm. Breite der Facette für den Astragalus = 13.5 mm. Länge des Radius = 135 mm. Breite der Scapholunarfacette = 13.5 mm.

²⁾ American Naturalist 1880, p. 853.

der Genusname Felis den Vorzug verdienen. Felis tetraodon findet sich anscheinend auch in der obermiocänen Braunkohle von Göriach, wenigstens besitzt Prof. Hofmann in Leoben einen Unterkiefer, dessen Zähne ganz ähnliche Dimensionen aufweisen wie jene des Blainville'schen Originals; auch sonst sind sie von jenen des tetraodon kaum zu unterscheiden. Es fehlt zwar der Pr_3 , doch ist auf die Abwesenheit eines so rudimentären Gebildes sicher kein Gewicht zu legen.

Felis turnauensis Hoernes.

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1882, p. 154, Taf. III, Fig. 1, 2.

Das Thier hatte sehr mässige Dimensionen, ist aber immerhin noch grösser als die Katze von Voitsberg. Die Zahl der unteren Pr war vermuthlich nur zwei, für einen dritten wäre kaum noch genügend Platz gewesen. Die Anwesenheit eines zweiten unteren M ist wenig wahrscheinlich.

Die Gesammtlänge des Unterkiefers mag etwa 72 mm betragen haben.

Die Identität mit dem gleichaltrigen Felis tetraodon von Sansan ist durchaus ausgeschlossen, derselbe ist viel grösser, die Katze von Voitsberg viel kleiner.

Vorkommen: In den obermiocänen Kohlen von Göriach in Steiermark.

Felis sp.

Die Katze von Voitsberg.

Hoernes: Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1882, p. 155.

Die Länge des Unterkiefers wird von Hoernes zu 50 mm, die Länge der Pr und des M_1 zu 30 mm angegeben.

Die erste echte Katze findet sich erst im Unterpliocän. Es ist dies:

Felis attica Wagner.

Roth und Wagner Abhandl, der Münchener Akademie, Bd. VIII, p. 122 (14), Taf. III, Fig. 4. Gaudry: Attique, p. 120, pl. XVII, fig. 9.

Diese Art kommt in ihren Dimensionen der Wildkatze sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die viel gewaltigeren Zähne. Der untere Pr_2 hat mehr Aehnlichkeit mit Felis planiceps — Blainville Ostéographie — als mit catus, dafür stimmt aber der obere Pr_2 in Folge seiner Kleinheit sehr viel besser mit dieser letzteren Art. Die Zusammensetzung der Zähne selbst ist bei attica und catus gleich, nur der obere M_1 der ersteren Art zeichnet sich durch seine auffallende Breite aus, wie dies von der geologisch älteren Form auch nicht wohl anders zu erwarten ist, denn dieselbe dürfte doch der ursprünglichen Organisation noch näher stehen. Zahnreihe im Unterkiefer $(Pr_2-M_1) = 25$ mm. Länge des unteren $M_1 = 10.5$ (bei catus nur 9) mm.

Zahnreihe im Oberkiefer $(Pr_2-M_1)=24$ mm. Länge des oberen R $(Pr_2)=12$ mm.

Aus den pliocänen Ablagerungen der Auvergne werden von Croizet und Jobert angegeben: Felis pardinensis, arvernensis, brevirostris und issiodorensis. Die letztgenannte Art soll auch im Val d'Arno vorkommen. Wie ich einer brieflichen Notiz entnehme, die ich Herrn Dr. Weithofer verdanke, finden sich an letzterer Localität drei Felis-Arten. Eine derselben ist zweifellos mit arvernensis identisch — mir liegt ein hieher gehöriges, aber als pardinensis be-

stimmtes Schädelmodell vor — dagegen sind weitere, gleichfalls als arvernensis bestimmte Reste für diese Species entschieden zu klein und gehören doch wohl eher zu issiodorensis. Was aber als issiodorensis bezeichnet wurde, steht hinsichtlich der Dimensionen der echten issiodorensis viel zu sehr nach, als dass noch diese Benennung statthaft wäre. Soviel ich aus einem mir vorliegenden Unterkiefer-Gipsabguss ersehen kann, dürfte es sich hier wohl eher um Felis Christolii handeln. Es scheint aber auch pardinensis im Val d'Arno vorzukommen, wenigstens bildet Blainville ein von dort stammendes Unterkieferfragment ab — Felis, pl. XVI.

Felis Christolii — P. Gervais, Zool. et Pal. fr., p. 228, pl. VIII, fig. 2 — aus dem marinen Pliocän von Montpellier hat etwa die Dimensionen eines Luchses und dürfte, wie eben erwähnt, wohl auch im Val d'Arno vorkommen.

Lydekker¹) hat in der Fauna der Siwalik-Hügel sechs verschiedene Katzenarten nachgewiesen.

Es ist wohl kaum zu zweifeln, dass zwischen all diesen Formen und den lebenden genetische Beziehungen bestehen, doch dürfte der directe Nachweis hiefür schwer zu erbringen sein, und würden derartige Untersuchungen weit über den Rahmen der vorliegenden Abhandlung hinausgehen. Zudem ist es absolut unmöglich, mit Hilfe der Literatur allein zu brauchbaren Resultaten zu gelangen. Ich muss also auch aus dem Grunde von diesbezüglichen Untersuchungen absehen, weil das mir zu Gebote stehende fossile und recente Material durchaus unzulänglich erscheint.

Als Aeluropsis annectans beschreibt Lydekker — Siwalik Carnivora, p. 316 (139), pl. XXXIII, fig. 4 — ein Unterkieferfragment mit M_1 und Pr_1 und den Alveolen des Pr_2 und M_2 . Der letztere Zahn hat nur eine Wurzel und muss sehr klein gewesen sein. Wahrscheinlich war die ursprüngliche Zusammensetzung nicht mehr deutlich wahrzunehmen. Der M_1 besitzt ausser den beiden Hauptzacken noch jedenfalls einen Innenzacken und einen kurzen, aber wohlentwickelten Talon. Derselbe besteht aus einer ziemlich hohen Schneide und einer daneben befindlichen kleinen Grube. Der Pr_1 hat einen Nebenzacken und am Vorder- und Hinterrande noch einen ziemlich hohen Basalwulst. Die Länge dieses Pr_1 übertrifft die des M_1 , was, wie Lydekker glaubt, nur bei Katzen vorkommt. Beide Zähne sind sehr schlank.

Ich bin von der näheren Verwandtschaft dieses Aeluropsis mit den Feliden keineswegs überzeugt und halte denselben fast eher für einen Nachkommen von Haplogale; mit diesem Genus stimmt der ganze Habitus ausgezeichnet, und insbesondere die Beschaffenheit des Talons. Die grössere Länge des Pr würde sich dann als Differenzirung herausstellen. Uebrigens ist auch bei Haplogale der Pr_1 fast ebensolang wie der M_1 . (Siehe den Nachtrag.)

Im Miocän von Nordamerika sind Feliden sehr häufig, doch gehören diese Reste durchgehends ausgestorbenen Gattungen an.

Sie vertheilen sich auf folgende Formen:

Archaelurus debilis, Cope, Tert. Vert., p. 953, pl. LXXII., fig. 8—16, pl. LXXII, Am. Nat. 1880, p. 842, fig. 3—6, Miocan von Oregon.

Nimravus gomphodus, Cope, Tert. Vert., p. 964, pl. LXXIII; LXXIV, fig. 1—2, Am. Nat. 1880, p. 844, fig. 7, Miocän von Oregon.

Nimravus confestus, Cope, Tert. Vert., p. 972, pl. LXXI a., fig. 17, Am. Nat. 1880, p. 844, fig. 10, Miocän von Oregon.

Dinictis felina, Cope, Tert. Vert., p. 978. Leidy, Nebraska, p. 64, pl. V., fig. 1-4 f.

¹⁾ Memoirs of the Geol. Surv. of India. Tertiary Vertebrata. Ser. X, Vol. II, p. 320 (143).

[445]

Dinictis cyclops, Cope, Tert. Vert., p. 974, pl. LXXV, fig. 1, Am. Nat. 1880, p. 846, fig. 8, Colorado. Dinictis squalidens, Cope, Tert. Vert., p. 979, pl. LXVIIa, fig. 15, 16, Colorado.

Pogonodon platycopis, Cope, Tert. Vert., p. 982, pl. LXXIVa, Am. Nat. 1880, p. 848, fig. 9, Oregon. Pogonodon brachyops, Cope, Tert. Vert., p. 987, pl. LXXIVb, LXXIV, fig. 3—10, Oregon.

Hoplophoneus oreodontis, Cope, Tert. Vert., p. 993, pl. LXVII a, fig. 17, LXXV a, fig. 1, 2, Colorado.

Hoplophoneus cerebralis, Cope, Tert. Vert., p. 997, pl. LXXV a, fig. 3-5, Oregon.

Hoplophoneus stringidens, Cope, Tert. Vert., p. 1001, pl. LXXVa, fig. 6, Oregon.

Hoplophoneus primaevus, Cope, Am. Nat. 1880, p. 850 = Drepanodon primaevus Leidy, Nebraska, p. 54, pl. IV.

Pseudaelurus intermedius, Leidy, Nebraska, p. 52, pl. I, fig. 8.

Drepanodon occidentalis, Leidy, Nebraska, p. 63, pl. V, fig. 5.

Creodonta adaptiva.

Mit diesem Namen liessen sich wohl am besten jene eigenartigen Fleischfresser charakterisiren, welche als *Didymictis* und *Miacis* aus dem Eocän von Nordamerika beschrieben worden sind. Die eine dieser beiden Gattungen, *Miacis*, steht aller Wahrscheinlichkeit nach in näherer Beziehung zu *Cynodictis*, und habe ich dieselbe daher auch im Anschlusse an dieses Genus besprochen. Die Gattung *Didymictis* dagegen scheint erloschen zu sein, ohne Hinterlassung von Nachkommen; sie könnte höchstens als Stammform der Subursen in Betracht kommen.

Mit den echten Carnivoren haben die genannten Gattungen gemein die Reduction der hinteren M, eine Eigenschaft, die praktisch von der allergrössten Wichtigkeit ist, denn gerade jener Theil des Skeletts, der Unterkiefer, welcher dieses Merkmal an sich trägt, kommt noch am häufigsten zum Vorschein. In unserem Falle nun weichen diese Kiefer von jenen der echten Creodonten in Folge der Rückbildung und Vereinfachung der hinteren M schon beim ersten Anblick ganz bedeutend ab, während sie von jenen vieler Carnivoren, nämlich der Hunde, beziehungsweise Viverren, kaum zu unterscheiden sind.

An die Creodonten erinnert die Art und Weise der gegenseitigen Verbindung der Lendenwirbel (sehr lange concave Prae- und cylindrische Postzygapophysen), die auffallende Höhe des Olecranons, die dauernde Trennung von Scaphoid und Lunatum, die Fünfzahl der Zehen und die Plantigradie, die deutliche Ausbildung des dritten Femurtrochanters, die tiefe Grube zwischen Astragalus-Rolle und Astragalus-Hals, entsprechend dem kräftigen Malleolus der Tibia, die geringe Ausfurchung der proximalen Astragulus-Facette, die Dicke des distalen Fibula-Endes und endlich auch die geringe Ausbreitung des Iliums.¹)

Dem stehen gegenüber eine Anzahl Charaktere, die auch den echten Carnivoren eigen sind. An die Viverren erinnert die Beschaffenheit der Halswirbel, der Scapula, des Humerus, der einzelnen Metacarpalien, Metatarsalien und Phalangen, wie bei Cynogale. Auch stösst wie bei den echten Carnivoren das Cuboid nicht mehr an den Astragalus. Metacarpale II kommt noch nicht in Berührung mit dem Magnum, Metacarpale III stösst noch nicht an das Unciforme, wie das bei den eigentlichen Creodonten der Fall ist.

Mag man nun über die Stellung dieser beiden Gattungen denken wie man will,²) so darf man sie doch auf keinen Fall als echte Creodonten behandeln, denn hiefür sind sie doch schon viel zu sehr fortgeschritten, und zwar ganz im Sinne der echten Carnivoren. Freilich soll hiemit auch nicht gesagt sein, dass die übrigen Creodonten gar keiner Modernisirung fähig gewesen seien; eine solche ist vielmehr auch zu beobachten bei Hyaenodon, und zwar äussert sie sich in der eigenartigen Differenzirung der Molaren, und ausserdem auch bei Mesonyx, wo sie in der Reduction

¹) Scott glaubt auch hier ein Centrale Carpi annehmen zu dürfen; auch meint er, dass die Zahl der J bereits auf zwei zurückgegangen war, und dieselben auch ein Creodonten-ähnliches Aussehen hatten. — Journal of the Academy of Natural Sciences. Philadelphia 1886, p. 169—173.

²⁾ Jede Entscheidung ist ja hier wie so oft ganz und gar willkürlich.

der Zehenzahl besteht. Wir haben es eben aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Ueberrest jener Gruppe zu thun, aus welcher die Carnivoren hervorgegangen sind, und welche ihrerseits wieder auf noch sehr wenig differenzirte Creodonten zurückgeht. Es zeigen also diese beiden Genera gegenüber den Carnivoren einerseits und den primitiveren Creodonten andrerseits ein ganz ähnliches Verhältniss wie etwa die Gattung Paloplotherium gegenüber der echten Pferdereihe einerseits und den Phenacodus andrerseits, und lässt sich dieses Verhältniss durch folgendes Schema ausdrücken:



Didymictis Cope.

Die Zahnformel ist hier $\frac{2}{2}$? $\mathcal{F}\frac{1}{1}$ $C\frac{4}{4}$ $Pr\frac{2}{2}$ M. Die unteren Caninen stossen beinahe unmittelbar an einander wie bei Oxyaena, so dass die Annahme, es müsste bei dem Mangel an Raum für die Incisiven eine Verminderung dieser Zähne erfolgt sein, ziemlich viele Berechtigung hat.

Der untere echte M besteht aus einem sehr hohen scharfen Hauptzacken, einem Vorderund einem Innenzacken. Der Talon scheint einen Aussen- und einen Hinterhöcker zu besitzen. Der Innenhöcker dürfte ziemlich schwach sein. Der untere M, hat bei einigen Arten einen dritten Lobus am Talon angesetzt - eigentlich ist es freilich nur der zurückgeschobene Hinterhöcker. Diese Formen (mit * bezeichnet) dürften wohl von den übrigen als selbstständige Gattung abgetrennt werden. Die letzteren sehen der Viverra simplicidens aus den Phosphoriten sehr ähnlich; unterscheiden sich aber wieder durch die Kürze des Talons am unteren Mo. Die Länge des Talons am unteren M_2 steht nach Cope bei den verschiedenen Arten in umgekehrter Proportion zur Grösse dieser Arten. Es ist dieser Talon wohl als Grube entwickelt. Der untere M_2 trägt in seiner Vorderhälfte noch die drei Zacken, nur haben sie hier im Gegensatz zum M1 sämmtlich gleiche Höhe. Der M_1 hat sehr grosse Aehnlichkeit mit jenem von Cynodictis vom Typus des lacustris. Der Unterschied von diesem besteht blos in der auffallenden Entwicklung des Hinterhöckers am Talon des unteren M_2 und in der geringeren Molarenzahl. Die beiden Species Didymictisund curtidens und massetericus unterscheiden sich dagegen, abgesehen von der Zahnzahl durch die Kürze des Talons am M2. Cynodictis steht hinsichtlich der Länge des Talons so ziemlich genau in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen, die in der Gattung Didymictis vereinigt sind.

Die beiden oberen M besitzen je zwei Aussenhöcker, von denen jedoch der zweite, namentlich am M_2 , sehr viel schwächer ist als der erste, und je einen sehr kräftigen Innenhöcker. Dazu kommt ein wohlentwickeltes Basalband. Ein Zwischenhöcker scheint zwar vorhanden zu sein, doch ist derselbe jedenfalls sehr klein geblieben. Von den correspondirenden Zähnen des Cynodictis unterscheiden sich diese oberen M durch die Kleinheit der erwähnten Zwischenhöcker, der M_1 überdies noch durch die Entwicklung eines mächtigen, weitvorspringenden Wulstes in der Ecke von Vorder- und Aussenrand. Der obere Pr_1 hat einen sehr kräftigen und ziemlich weit hinten stehenden Innenhöcker erhalten; bei Cynodictis ist dieser letztere sehr viel schwächer, auch befindet er sich unmittelbar am Vorderrande des Zahnes.

Der Unterkiefer ist nach der restaurirten Abbildung ausgezeichnet durch die nahezu verticale Richtung des Vorderrandes des aufsteigenden Astes — ähnlich wie bei *Mustela*. Es scheint diese Restauration indess nicht ganz richtig zu sein und bildet, wie ich glaube, auch hier ganz wie bei *Cynodictis* dieser Rand mit der Zahnreihe einen ziemlich stumpfen Winkel.

Vorkommen: Ausschliesslich im Eocän von Nordamerika.

Didymictis protenus* Cope 100 th. Meridian, p. 123, pl. XXXIX, fig. 1-9, Tertiary Vertebrata p. 311, pl. XXV d. fig. 4, 5.

- " haydenianus* Tert. Vert. p. 306, pl. XXIIIe, fig. 12, 13. Am. Nat. 1884, p. 484, fig. 30 d—f.
- " altidens* " " p. 307, pl. XXVa, fig 13, 14. Scott. Journ. Acad. Nat. Scienc. Philad. 1886, Vol. IX, p. 169.
- " leptomylus* Tert. Vert. p. 309, pl. XXVa, fig. 12 (und pl. XXVd, fig. 6?).
- " dawkinsianus* " " p. 310, pl. XXV a, fig. 11. Am. Nat. 1884, p. 484, fig. 30 a—c.
- " massetericus " " p. 312, pl. XXIVe, fig. 11. Ibidem p. 484, fig. 29.
- " curtidens " " p. 313, pl. XXIV e, fig. 10.

Die von Marsh beschriebenen Fleischfresser des nordamerikanischen Tertiärs.

Canis montanus — p. 124, Juli 1871. — Die Reste bestehen in einem Pr_1 — oberen R — einem C und einigen Knochen. Der Pr. hat eine kurze, comprimirte Krone. Hauptzacken konisch, mit ziemlich scharfen Schneiden, davon die vordere doppelt so lang wie die hintere. Dazu vorne noch ein grosser dreieckiger Aussenhöcker. Grösse des Wolfes. Green Riverbed. Eocän.

Vulpavus palustris n. g. n. sp. — p. 124 (p. 16) ibid. — Marsh fand hievon obere M kleiner als die vom Fuchs. Ein oberer M_2 hat die gleiche Zusammensetzung, wie der ent sprechende Zahn von Vulpes fulvus, nur ist seine Rückseite noch länger, was auf eine grössere Breite des Schädels schliessen lässt. Der Vorder- und Hinterrand des oberen M_2 ist verhältnissmässig kürzer als bei dem M_1 der genannten lebenden Art. Eocän.

Amphicyon angustidens — p. 125 (p. 17) ibid. — Unterkiefer mit C und den letzten drei Pr. Diese letzteren sehr niedrig und stark comprimirt. Am Vorderrande befindet sich ein Höcker; die Hinterseite des Pr_1 und Pr_2 ist dreitheilig. Grösse von Amphicyon gracilis Leidy. Der hinterste Pr ist niedriger und zugleich schmäler wie bei diesem, auch sind die Nebenzacken schwächer. Miocän Nebraska.

Limnocyon vetus n. g. n. sp. — p. 126 (p. 6). August 1872. — Grösser als Fuchs. Es ist vorhanden ein Schädel mit Zähnen. Die Pr sind comprimirt und abgestumpft wie bei den Caniden. Der vorderste obere Pr hat auffallende Grösse und steht dicht hinter dem C. Echte Reisszähne sind nicht vorhanden (?). Die Krone des oberen M_1 und M_2 hat dreiseitigen Querschnitt. Der M_1 zeigt in jeder Ecke einen Höcker und einen grossen comprimirten Höcker im Centrum. Der M_2 ist der grösste von allen Zähnen. Er besitzt ebenfalls in jeder Ecke einen kantigen Höcker. Der in der Mitte befindliche Höcker lässt eine Zweitheilung erkennen. Der letzte M ist der Beschreibung nach sehr kurz, aber stark in die Quere gezogen. Es scheint dieses Thier mit den Viverriden verwandt zu sein (bei drei M?). Die drei letzten Zähne messen zusammen 23 mm.

Limnocyon agilis — ibidem p. 204 (p. 11). — Schädel mit Zähnen. Viel kleiner als riparius. Die Pr des Unterkiefers stossen nicht aneinander. Der vorderste ist nur einwurzlig. Der vorderste Pr des Oberkiefers steht weit vom C ab; die erhabenen Aussenzacken des vorletzten oberen M stehen näher beisammen als bei riparius. Langer Schwanz. Krallen wie beim Fuchs. Zahnreihe 27.6 mm. Eocän.

Limnocyon riparius — p. 204 (p. 11 ibidem). — Fuchsgrösse. Unterkiefer und ein oberer M. Der Unterkiefer sehr verlängert, namentlich der Symphysen-Theil. 6 Zähne hinter C, jeder zweiwurzlig, alle dicht zusammenstossend. Die beiden letzten sind Höckerzähne, Wyoming Eocän. Zahnreihe — 47 mm. M_1 —3 — 26 mm. Nach Scott wäre Limnocyon — Miacis.

Thinocyon velox. n. g. n. sp. — p. 204 (p. 12). ibidem. — Katzengrösse. Unterkiefer erinnert in seinen Proportionen an jenen von Limnocyon, ist aber doch noch mehr in die Länge gezogen. Der Unterkiefer-Eckfortsatz ist einwärts gebogen, daher vielleicht Marsupialier. 2 \mathcal{F} , 1 \mathcal{E} . 6 Backzähne. Die letzten zwei M sind Höckerzähne, die vier vorderen comprimirt, jeder zweiwurzlig. Pr_4 — M_2 — 30·5 mm. Wyoming, Eocän.

Viverravus gracilis, n. g. n. sp. — p. 127 (p. 7) ibidem — Grösse des Wiesels. Unterkiefer lang und schmal. Die beiden letzten M tuberkulär; die Hinterhälfte der Kronen sehr niedrig, die Vorderhälfte ziemlich hoch und aus drei Zacken gebildet. Die vier Pr stark comprimirt; der obere $R-Pr_1$ — stimmt ganz mit dem der Viverren, mit denen dieses Thier auch vereinigt werden dürfte. Eocän, Wyoming. $Pr_4-M_2=28$ mm. — Wird wohl ein Didymiclis sein.

Viverravus? nitidus — p. 204 (p. 12) ibidem. — Wieselgrösse. Vertreten durch den vorletzten unteren M, der ganz mit dem von V. gracilis übereinstimmt. Die Krone hat hinten einen Zacken nahe dem Aussenrande, dann folgt ein äusserer und ein innerer Zacken, beide gleich gross und vorne noch ein sehr kleiner Zacken, undeutlich zweitheilig. 4 mm Länge. Wyoming. Eocän.

Limnofelis ferox, n. g. n. sp. - p. 202 (p. 10) ibidem - Löwengrösse, Schädel und Unterkiefer. Der Reisszahn -R- gleicht dem des Löwen, ist jedoch vorne breiter, die Basis der Krone ist dreiseitig, die Innenseite am längsten. Der Jochbogenfortsatz des Squamosum ähnlich wie beim Löwen, nur stärker. Wyoming. Eocän oder Unter-Miocän, Länge des unteren R=- 245 mm. Dazu gehören noch Wirbel.

L. latidens — p. 203 ibidem. Erhalten, der obere Pr_1 —R— kleiner, als dass er zu fcrox passen könnte. Er hat eine ungewöhnliche Breite; sein hinterer Höcker ist sehr mächtig, fast $\sqrt[2]{3}$ so gross wie der Hauptzacken. Der Vorderhöcker besitzt nur geringe Grösse. Basalband vorhanden. Zu dieser Art gehört wohl auch der Unterkiefer eines jungen Individuums mit C und drei Backzähnen. Wyoming. Eocän, Länge des oberen Pr_1 — 16.5 mm.

In einer späteren Publication (ibidem Nov. 1872, p. 406) wird auf diese Art das Genus Orcocyon gegründet. Der C und die Pr des Unterkiefers erinnern einigermassen an Hyacna. Die Zahl der \mathcal{F} ist auf zwei zurückgegangen. Die Zähne haben eine beträchtliche Breite und sind sehr kräftig; der vorderste Pr steht vom C sehr weit ab und schräg zur Zahnreihe.

Dromocyon vorax, Am. Journ. 1876, p. 403, hat die Grösse eines Wolfes. Das Skelet ist nahezu vollständig überliefert. Der Schädel und die Zähne erinnern an Hyaenodon. Der Unterkiefer trägt nur zwei I. Die Zahl der Pr ist vier, die der M drei. Der letzte M hat nur sehr geringe Dimensionen. Der Schädel ist mit einem hohen Scheitelkamm versehen. Das Gehirn besass nur mässige Grösse. Der Unterkiefer hat beträchtliche Länge und ist dabei sehr schlank. Das Femur weist einen dritten Trochanter auf, der Astragalus articulirte auch mit dem Cuboid. Die Zehenzahl war an allen vier Extremitäten auf vier reducirt. Eocän von Wyoming.

Ziphacodon rugatus (wohl Xiphacodon?) Am. Journ. 1872, p. 216 (p. 25), hat die Grösse einer Zibethkatze. Die Gattung basirt auf der Vorderpartie des Unterkiefers. Die Hauptzacken der Pr sind sehr spitz und zeigen kräftige Entwicklung. Diese Pr besitzen auch am Vorder- und Hinterrand je einen spitzen Basaltuberkel. Der Pr_4 hat eine ansehnliche Grösse, er folgt dicht hinter dem C. Dieser letztere ist ziemlich schwach und steht nahezu vertical. Der äusserste \mathcal{F} ist dafür auffallend gross. Die Pr zeigen dichte Runzeln der Schmelzschicht.

Harpalodon sylvestris, ibidem p. 216 (p. 25), ist mit Viverravus verwandt. Man kennt von diesem Thier den Unterkiefer mit den beiden letzten Pr und dem folgenden Höckerzahn. Der Pr_1 hat hier im Gegensatz zu Viverravus nur einen Tuberkel auf seiner Rückseite. Am Pr_2 ist dieser Tuberkel wohl vorhanden, aber noch sehr klein. Die Pr erscheinen ziemlich stark comprimirt; ihr Vorderhöcker ist gut ausgebildet.

 $H. \ vulpinus.$ p. 217 (p. 26). Vorhanden ist ein Unterkiefer mit dem Pr_1 , grösser als jener von sylvestris. Der hintere Tuberkel ist auch grösser als bei diesem, der Zahn selbst hinten breiter, die Hauptzacken jedoch niedriger.

Ich habe hiezu Folgendes zu bemerken:

Canis montanus ist aus den vorliegenden Resten überhaupt nicht näher bestimmbar.

Vulpavus ist wohl sicher einer der von Cope beschriebenen Miacis, desgleichen der Thinocyon. Auf die Angabe, dass der Unterkiefer-Eckfortsatz einwärts gebogen sei, darf man sich auf keinen Fall verlassen, da Marsh es mit diesem Criterium anscheinend keineswegs genau nimmt; er führt z. B. dieses Merkmal auch bei Mesacodon an, wo es eben, soferne dieses Thier wirklich mit Limnotherium (= Hyopsodus) verwandt ist, doch absolut nicht gegeben sein kann.

Limnocyon vetus ist wohl ein Miacis, ebenso L. agilis; Limnocyon riparius mit nur sechs unteren Backzähnen gehört dagegen, sofern sich die Anwesenheit von nur 6 Zähnen bestätigen sollte, vermuthlich zu Didymictis, desgleichen die Gattung Viverravus.

Amphicyon angustidens ist allenfalls mit einer der von Cope beschriebenen Amphicyon-Arten identisch.

Die Angabe, dass die Zähne und der Schädel an *Hyaenodon* erinnern, lässt vermuthen, dass es sich hier um *Oxyaena* oder *Mesonyx* handelt, und zwar eher um *Mesonyx*, da die Zahl der *Pr* vier, die Zahl der *M* drei sein soll.

Dromocyon scheint = Mesonyx zu sein.

Sehr interessant wäre die Anwesenheit eines Feliden im Eocän. Da aber Cope keine solchen im Eocän angibt, so liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass die betreffende Ablagerung doch wohl dem Miocän angehört, oder aber, dass die fraglichen Reste auf einen Creodonten, und zwar etwa auf *Protopsalis* bezogen werden müssen.

Thinocyon dürfte, da von einem langen Kiefer mit 2 I, 1 C und zwei Höckerzähnen gesprochen wird, allenfalls mit Miacis identisch sein; merkwürdigerweise erfahren wir nicht das Geringste über das Aussehen eines etwaigen Reisszahnes, und sind wir daher hinsichtlich der Deutung dieser Reste ganz und gar im Ungewissen.

Die Gattungen Ziphacodon und Harpalodon sind durchaus hinfällig, da sie blos auf Pr gegründet sind, mit solchen aber so gut wie gar nichts anzufangen ist. Von Harpalodon hat Marsh zwar einen M gefunden, jedoch keinerlei Angaben über dessen Beschaffenheit gemacht.

NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

ad Simiae.

Lydekker¹) nennt von Anthropomorphen *Troglodytes sivalensis* aus den Siwalik Hills und einen *Hylobates sp.* aus einer alluvialen Ablagerung auf Borneo.

Der *Pliopithecus antiquus sp.* hat sich nach Depéret²) auch in Grive St. Alban gefunden. Der Owen'sche *Macacus pliocaenus* aus dem Pleistocän von Grays in Essex gehört nach Lydekker³) zu *Macacus* oder *Cercocebus*.

Dieser Autor beschreibt ferner einen Cynocephalus Falconeri aus den Siwaliks und Reste eines Semnopithecus entellus und eines Cynocephalus sp. aus den Karnulhöhlen bei Madras — pleistocän.

ad Pseudolemuridae.

Rütimeyer⁴) unterscheidet zwischen dem Genus Caenopitheeus mit der Species lemuroides und der Gattung Adapis. Nach ihm wäre auch "Aphelotherium Duvernoyi" von Adapis parisiensis verschieden. In diesem letzteren Punkte glaube ich jedoch nicht mit Rütimeyer übereinstimmen zu sollen. Da der zweite Innenhöcker der oberen M bei Caenopitheeus noch viel schwächer entwickelt ist als bei Adapis, erscheint Caenopitheeus als der primitivere, doch dürfte er auch wohl kaum dessen directen Stammvater darstellen, insoferne das Basalband bei Adapis niemals so kräftig wird.

Der von demselben Autor als *Pelycodus* bestimmte Oberkiefer — ibidem, Taf. I, Fig. 12 — aus den Bohnerzen von Egerkingen kann recht wohl zu dieser Gattung gehören.

Lydekker⁵) fand Adapis magna im Oligocan von Hordwell.

Microchoerus erinaceus oder Heterohyus armatus sind jedenfalls durchaus verschieden von dem von mir — p. 33, Taf. IV, Fig. 55, 60, 62 — beschriebenen Unterkiefer aus Frohnstetten. Es gehört derselbe thatsächlich einem Pseudolemuriden an, und zwar anscheinend einem . Hyopsodiden. Ich belege dieses Object mit dem Namen Cryptopithecus sideroolithicus.

Die Gattung Microchoerus Wood mit $\frac{2}{?} \mathcal{F} \frac{1}{1} C \frac{3}{?} Pr \frac{3}{3} M$ oder $\frac{3}{?} \mathcal{F} \frac{1}{1} C \frac{2}{?} Pr \frac{3}{3} M$ wird von Lydekker⁶) als besondere Familie der Microchoeriden in die Nähe der Erinaceiden gestellt, also zu den Insectivoren wegen der viereckigen Form der oberen M. Sie unterscheidet sich jedoch durch die Anordnung der Höcker auf den hinteren Backzähnen und durch die relativ

¹⁾ Catalogue of the fossil Mammalia of the British Museum. Part. V, p. 297.

²⁾ Archives du Museum d'histoire naturelle de Lyon. 1887 Vol. IV, p. 120, pl. XIII, fig. 156.

³⁾ Catalogue Part. V, p. 298.

⁴⁾ Abhandlungen der schweizerischen paläont. Gesellschaft. Vgl. XV, 1888, p. 30 und p. 36, Taf. I, Fig. 1, 2 und Fig. 3, 4.

⁵⁾ Catalogue Part. V, p. 299.

⁶⁾ Catalogue Part. V, p. 303, fig. 44.

beträchtliche Grösse des vorletzten Pr (ebenso complicirt wie Pr_1). Die oberen \mathcal{F} schliessen nicht aneinander, sondern sind wie beim Igel durch eine Lücke getrennt. Die folgenden vier ersten Zähne sind comprimirt und schneidend, die letzten fünf viereckig und aus Höckern gebildet. Pr_1 und Pr_2 haben je einen Aussen- und einen Innenhöcker, die drei M je ein Paar Aussen- und Innenhöcker, nebst je zwei Zwischenhöckern und einem secundären Zwischenhügel auf der Aussenseite.

Ich glaube kaum zu irren, wenn ich den *Microchoerus erinaceus* für einen nahen Verwandten des *Necrolemur* halte, ja es will mir fast dünken, als bestände zwischen beiden überhaupt kein generischer Unterschied.

Was den *Heterohyus armatus* anbelangt, so zeigt eine genauere Betrachtung der von P. Gervais gegebenen Abbildung, noch besser aber die Zeichnung in Blainville's Ostéographie — *Arctomys de Buchsweiller* — dass hier offenbar ein Artefact vorliegt. Die hintere Partie des Kiefers ist ein *Adapis* oder vielleicht ein *Caenopithecus*, an welchen dann unmittelbar an den M_1 der Pr_2 oder gar Pr_4 angefügt wurde.

ad Prosimiae.

Diese Gruppe wird durch Hinzutreten des "Microchoerus erinaceus Wood" bereichert; die Identität mit einer der Necrolemur-Arten ist hiebei nicht ganz ausgeschlossen.

ad Chiroptera.

Lydekker gibt im Catalogue Part V, p. 300, Phyllorhina diadema und Taphozous sarcolaemus — zwei noch lebende Arten — auch für die Fauna der Karnul-Höhlen — Pleistocaen, Indien an.

Weithofer 1) beanstandet die Berechtigung der von mir aufgestellten fünf Species von Pseudorhinolophus, insbesondere soll die Variabilität hinsichtlich der Reduction des Pr_2 nicht existiren. Die erste Art — mit Zahnreihe von 8·9 mm (M_3-Pr_1) umfasst beinahe nur Kiefer mit Pr_2 , die zweite — Zahnreihe von 8·3 mm (M_3-Pr_1) umfasst nur Kiefer ohne diesen. Auch bestehen zwischen beiden Arten insoferne Unterschiede, als die Kiefer mit nur 2 Pr kurz und plump erscheinen und niedrigen Prozessus coronoideus, aber hohe Symphyse besitzen. Bei der ersten Art könnte gelegentlich der Pr_2 ausfallen, bei der zweiten fehlt er normal — dieselbe wäre also schon ein anderes Genus.

Rhinolophus hat oben drei, Phyllorhina nur 2 Pr. Der Pr_2 ist jedoch auch bei Rhinolophus schon sehr klein und kann seine Alveole nach seinem Ausfall zuwachsen. Die erste Art entspräche demnach der Gattung Rhinolophus, die zweite der Gattung Phyllorhina.

Bei der dritten Art $(Pr_1-M_3=7\cdot3 \text{ mm})$ hat etwa die Hälfte der Exemplare den Pr_2 , bei der anderen fehlt er. Von der vierten Art — $(Pr_1,-M_3=6\cdot5 \text{ mm})$ besitzt kaum mehr der achte Theil aller Individuen den Pr_2 . Der von mir citirte Fall, Pr_1 in der Zahnreihe stehend, wird eher für eine Abnormität als für eine normale Varietät angesehen, was auch wohl zutreffen dürfte.

Bei der fünften Art — $(Pr_1 - M_3 = 5.5 \text{ mm})$ — fehlt der Pr_2 durchgehends.

Dazu kommt noch eine sechste Art — M_1 — M_3 = 2.5 mm; M_3 — Pr_1 höchstens 4.7 mm, also viel kleiner als die vorige Art.

¹⁾ Zur Kenntniss der fossilen Chiropteren der französischen Phosphorite. Sitzungsber, der k. k. Akad. d. Wissensch., 1. Abth. 1887, Bd. XCVI, pr. 341. Novemberheft mit Tafel.

Die vierte Art unterscheidet sich von den übrigen Species der Gattung Pseudorhinolophus dadurch, dass der letzte obere M ausser den zwei Aussenhöckern und einem Innenhöcker noch einen kleinen secundären Innenhöcker besitzt, mithin nicht die Gestalt eines halben W, sondern eine V-ähnliche Form zeigt. Ich halte dieses Merkmal allerdings ebenfalls für hinreichend, um die fraglichen Reste von Pseudorhinolophus zu trennen und in ein besonderes Genus zu verweisen. Wären mir solche Oberkiefer seinerzeit zu Gebote gestanden, so würde ich mich hiezu ohne Weiteres entschlossen haben. Da in diesem Punkte mein Material sich nur auf Unterkiefer beschränkte, bei diesen aber thatsächlich in Bezug auf die Anwesenheit und Grösse des Pr_2 Variabilität herrscht, die auch Weithofer zugestehen muss, so wäre die Aufstellung eines besonderen Genus doch nicht unbedenklich gewesen.

Die Zahl der \mathcal{F} ist bei Pseudorhinolophus sicher $\frac{1}{2}$. Diese Gattung stellt nach Weithofer möglicherweise den Ausgangspunkt des Genus Phyllorhina dar, bei welcher ebenfalls vor der Sagittalcrista keine Depression zu bemerken ist, während eine solche für Rhinolophus sehr charakteristisch ist. Ebenso hat auch der Unterkiefer mehr Aehnlichkeit mit Phyllorhina.

Weithofer beschreibt ferner eine neue Gattung — Alastor heliophygas — l. c. p. 350, Fig. 5—8, nur durch einen Schädel repräsentirt, der auffallende Verkürzung der Nasenregion zeigt und demzufolge blos mehr 2 Pr besitzt. Der Pr_2 ist hier schon sehr klein geworden. Parietalcrista hoch, zugleich aber auch Depression vor derselben, wie bei Rhinolophus, bei Phyllorhina fehlend.

Derselbe Autor erwähnt einen *Rhinolophus? dubius n. f.* — 1. c. p. 351, Fig. 9—11. Unterkiefer mit 2 \mathcal{F} , 1 \mathcal{C} , 2 \mathcal{P} r, 3 \mathcal{M} , also *Rhinolophus* ähnlich, von diesem aber durch die eigenartige Verlängerung der Massetergrube zu unterscheiden.

Eben derselbe stellt ein neues Genus Nccromantis mit der Species adichaster auf -1. c. p. 353, Fig. 18-21 — zu den Vampyriden gehörig, die heutzutage neotropisch sind. Nur Unterkiefer. Pr_1 zweiwurzelig, Pr_2 sehr klein und nach innen zu aus der Reihe gedrängt. Pr_3 ziemlich gross. Die Incisiven waren möglicherweise schon ganz unterdrückt, wenigstens ist fast gar kein Raum für dieselben vorhanden, da die Caninen sich berühren. In dieser Beziehung ergibt sich eine gewisse Aehnlichkeit mit dem recenten Lophostoma, doch hat diese Gattung eine abweichende Form des Kieferknochens und eine andere Stellung der Pr. Mimon und Chrotopterus haben ebenfalls nur 1 \mathcal{F} , bei dem letzteren ist auch der Pr_2 reducirt und nach innen zu aus der Reihe gedrängt.

Länge der Zahnreihe $(Pr_3-M_3)=12^{\circ}4$. Länge der 3 $Pr=4^{\circ}4$ mm, Länge der drei M=8 mm. Von Taphozous? fanden sich angeblich zwei Arten, jede derselben allerdings blos durch einige wenige Humerus repräsentirt. (Fig. 12—15.)

Bei der einen Art hat der Humerus eine Länge von 40 mm, eine Dicke von 1.9 mm und eine Breite (unten) von 4.6 mm, bei der anderen sind die entsprechenden Masse 33.5 mm, 1.4 mm und 4.4 mm.

Von Vespertiliavus ist nur ein Kiefer vorhanden unter dem von Weithofer untersuchten Materiale.

Mir hingegen fehlen Kiefer und Knochen, die auf Alastor heliophygas, Rhinolophus? dubius, Taphozous? und Necromantis adichaster bezogen werden könnten, vollständig.

Jene vierte Art von Pseudorhinolophus wird nach dem oben Gesagten wohl besser als besonderes Genus betrachtet werden; die Zahl der Pr ist immer 3 im Unterkiefer. Der Pr_2 hat ansehnliche Grösse.

ad Insectivora.

Lydekker macht im Catalogue Part. V, p. 304, aufmerksam auf die Verwandtschaft von Parasorex und Tupaja, während Plesiosorex — mit welchem er gleich Fraas den H. v. Meyerschen Parasorex socialis aus Steinheim identificirt hatte — in Wirklichkeit eher der Gattung Myogale nahesteht.

Derselbe Autor erwähnt ferner — ibidem p. 300—301 — Talpa tyrrhenaica Fors. Maj. aus dem Pleistocän von Sardinien und Protalpa Cadurcensis Filh. aus den Phosphoriten des Quercy, Sorex similis aus dem Pleistocän von Sardinien, ferner Erinaceus öningensis aus dem Miocän von Oeningen, und zwei Arten von Neurogymnurus — minor Filh. und major Lydekker — der erstere aus den Phosphoriten des Quercy und dem Oberoligocän von Headonhill, der letztere aus dem Obereocän von Hordwell.

Filhol beschreibt in "Descriptions sur quelques mammifères fossiles des phosphorites du Quercy, Toulouse 1884" eine Anzahl Insectivoren. Es sind dies:

Cayluxotherium elegans (Filh.) — p. 1—5, pl. I, fig. 9—13. Oben sind 3 \mathcal{F} , 1 \mathcal{C} , 4 $\mathcal{P}r$, 3 \mathcal{M} . Die \mathcal{F} sind ausgefallen, doch muss der vorderste, der Alveole nach, sehr kräftig gewesen sein. \mathcal{C} hat wie bei \mathcal{G} mnura zwei Wurzeln und war vermuthlich etwas nach hinten gekrümmt. Die $\mathcal{P}r$ nehmen, wie bei dieser Gattung, von vorne nach hinten allmälig an Grösse zu. Der $\mathcal{P}r_4$ hat hier gleich dem $\mathcal{P}r_3$ im Gegensatz zu \mathcal{G} mnura und \mathcal{E} maceus zwei Wurzeln. Sein Vorderrand ist convex, der Hinterrand concav. $\mathcal{P}r_2$ hat drei Wurzeln und sieht dem von \mathcal{G} mnura ähnlich. Der zweite Aussenhöcker und der zweite Innenhöcker stehen jedoch bei dieser Gattung näher beisammen. Die Innenzacken sind hier noch schwach. Der $\mathcal{P}r_1$ besitzt schon nahezu die vollständige Zusammensetzung eines \mathcal{M} , zwei Aussenhöcker und zwei Innenhöcker, also wie bei \mathcal{E} maceus, doch stehen die Innenhöcker hier näher beisammen. Der $\mathcal{P}r_1$ hat quadratischen Querschnitt. Die \mathcal{M} sehen denen von \mathcal{G} mnura ähnlicher als jenen von \mathcal{E} maceus. Sie bestehen aus je zwei gerundeten Aussenhöckern und je zwei Innenhöckern; ihr Querschnitt ist vierseitig. Der \mathcal{M}_3 hat einfacheren Bau als der \mathcal{M}_2 , insbesonders erscheint der zweite Innenhöcker wesentlich reducirt.

Zahnreihe hinter $C-M_3=32$ mm, Länge des $M_1=3$, Höhe desselben o'8, Dicke desselben 3'2 mm.

Wie bei *Erinaceus* ist auch hier der Gaumen noch nicht vollständig geschlossen. Der Schädel zeigt viel mehr Anklänge an *Erinaceus* als an *Gymnura*. Filhol betrachtet *Cayluxotherium* als Ahnen des *Palaecerinaceus*.

Die Schädellänge = 48 mm, die Breite des Schädels an der Insertion der Jochbogen = 18 mm. Grösste Breite des Cranium = 22 mm.

Neurogymnurus Cayluxi. Filh., p. 5, pl. II, fig. 4-8, 10-11, 16.

Unterkiefer mit 3 \mathcal{F} , 1 \mathcal{C} , 4 $\mathcal{P}r$, 3 \mathcal{M} . Der $\mathcal{P}r_1$ allein ist noch vorhanden. Alle $\mathcal{P}r_2$, mit Ausnahme des $\mathcal{P}r_3$, sind zweiwurzlig, bei \mathcal{F} nur die beiden hintersten. Der $\mathcal{P}r_1$ hat hier noch ganz einfachen Bau. Die Grösse der \mathcal{F} nimmt nach hinten hin zu. Der \mathcal{C} hat nur eine Wurzel und war offenbar seitlich comprimirt. Die \mathcal{M} werden nach hinten zu immer kleiner. Der Kiefer besitzt eine ziemliche Länge, ist aber dafür um so niedriger. Der $\mathcal{P}r_1$ trägt eine Art Talon, ist aber sonst sehr einfach. Die \mathcal{M} gleichen jenen von \mathcal{F}

Länge der Zahnreihe = 21 mm ($C-M_3$), Länge der vier Pr = 10, Länge der drei M = 9 mm. Länge des Kiefers = 37 mm (von \mathcal{F} , bis zum Gelenkfortsatz).

Filhol bezweifelt die Zugehörigkeit dieses Unterkiefers zu dem von ihm als Cayluxotherium beschriebenen Schädel. In Wirklichkeit ist jedoch gegen die generische und wohl auch specifische Identität aller dieser Reste schwerlich ein triftiger Grund vorzubringen.

Neurogymnurus minor. Filh. ibidem p. 10, pl. II, fig. 13-15.

Zahnreihe hinter C= 12.5 mm, $Pr_{4-1}=$ 6.5 mm, Länge des $Pr_{1}=$ 1.8 mm, Länge des $M_{1}=$ 2.2 mm, Länge des $M_{2}=$ 2 mm, Länge des $M_{3}=$ 1 mm, Länge der drei M= 6 mm. Gomphotherium elegans. Filh. ibidem p. 11, pl. II, fig. 17—20.

Diese Unterkiefer sehen jenen von Amphidozotherium sehr ähnlich. Die \mathcal{F} sind nicht bekannt. Die beiden letzten der vier Pr haben je zwei Wurzeln, die beiden ersten sind einwurzlig. Die M erinnern an jene von Gymnura; sie verjüngen sich sehr rasch nach hinten zu. Die drei vordersten Pr sind auffallend klein im Verhältniss zu Pr_1 . Amphidozotherium hat im Gegensatz zu diesem Gomphotherium blos einen zweiwurzligen Pr, auch stehen die Pr sehr schief und haben konische Gestalt; hier bei Gomphotherium sind sie dreieckig.

Zahnreihe hinter C = 11.5 mm; davon treffen 6 mm auf die Pr, 5.5 auf die M. Der Pr_2 ist auffallend klein, doch kann er keinen Milchzahn darstellen, da er bei einem Exemplar noch im Kiefer steckt. Seine Spitze ist sehr scharf, die Kanten sind als Schneiden entwickelt. Der sehr kräftige Pr_1 besitzt eine Art von Talon und einen sehr kleinen vorderen Basalzacken. Alle M zeigen ein deutliches Basalband.

Länge des $Pr_2=$ 0.5 mm, Länge des $M_1=$ 2.2 mm, Höhe des Kiefers hinter C= 2.0 mm. , $Pr_1=$ 2.0 , , $M_2=$ 1.3 , , , , , , , $M_3=$ 2.2 , , , $M_3=$ 0.8 ,

Dass diese Form zu den Talpiden gerechnet werden muss, kann keinem Zweifel unterliegen, trotzdem sie von Filhol nur mit Gymnura verglichen wird.

Protalpa cadurcensis. Filhol ibidem p. 13, pl. I, fig. 4, 5, 7, 8.

Diese Art basirt auf einem Humerus, der sich in seinem Habitus an *Talpa* sehr innig anschliesst. Die Trochanter-Rauhigkeit hat eine beträchtliche Breite. Das Caput ist gestielt; der lange Dorn am Humerus von *Talpa* — und zwar am *Condylus internus* — fehlt hier, ist jedoch wohl nur abgebrochen. Länge des Humerus 14 mm. Grösste Breite oben 9, unten ebenfalls 9 mm. Von diesem Thiere bildet Filhol auch die Scapula ab.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass wir es hier mit den nämlichen Objecten zu thun haben, wie die sind, welche ich auf *Amphidozotherium* bezogen habe — Taf. IV, fig. 1 und 5. Es ist daher sowohl der Genus *Protalpa* als auch die Species *cadurcensis* zu cassiren.

Amphisorex primaevus. Filh. ibidem p. 15, pl. II, fig. 1, 3. Filhol gründet diese Art auf einen Unterkiefer, der in der That von einem Soriciden herrührt. Der \mathcal{F} ist wie bei allen diesen sehr lang, hat eine schräge Stellung und einen gezähnelten Oberrand. Die Vorderhälfte der M besteht aus drei, die Hinterhälfte aus nur zwei Zacken. Die letzteren sind untereinander durch einen Kamm verbunden.

Länge der Krone des $\mathcal{F}=4$ mm. Zahnreihe hinter $\mathcal{F}=6$ mm. Länge des $M_1=1.7$ mm. Höhe des Kiefers hinter \mathcal{F} und hinter M_1 je 2 mm. Kieferlänge total = 14 mm. Die Zähne zeigen eine braune Färbung.

Eine Oberansicht der Zahnreihe fehlt, ebenso eine Angabe über die Zahl der Alveolen der Pr; die nähere Verwandtschaft kann daher nicht ermittelt werden.

Depéret beschreibt aus Grive St. Alban einen Unterkiefer von Erinaccus sansaniensis, 1) $- M_{1-3} = 9 \text{ mm, bei dem Günzburger } C. \text{ dubius (?) nur 7:3 mm} - \text{ und Humerus und Unterkiefer}$

¹⁾ Archives du Musée d'histoire naturelle de Lyon, 1887. Vol. IV, p. 146, pl. XIII, fig. 11.

von Talpa telluris.¹) Der Unterkiefer gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zu Parasorex socialis und nicht zu Talpa.

ad Marsupialia.

Lydekker führt im Catalogue Part. V, p. 279-288, folgende Peratherium-Arten an:

Didelphys affinis, antiqua, arvenensis, Blainvillei, exilis, lemanensis, Lamandini, Aymardi und Cadurcensis. Ausserdem erwähnt er einen Didelphys sp. a. aus Hordwell, dessen drei letzte M zusammen 6 mm messen, ferner Didelphys sp. b. aus dem Untermiocän der Auvergne, mit Zahnreihe von 10 mm und 6 2 mm Molarreihe, ein Schädelfragment und einen Oberkiefer aus Cournon oder Sauvetat, ein Unterkieferfragment aus St. Gérand-le-Puy von der Grösse des lemanensis, aber gleichwohl von demselben verschieden; dann einen Unterkiefer aus Hordwell, jedoch ohne nähere Vergleichung, und endlich mehrere nicht näher bestimmbare Reste aus den Phosphoriten.

Dass die Identität von *Didelphys* und *Peratherium* schwer zu beweisen sein dürfte, brauche ich kaum mehr weiter auseinanderzusetzen.

Die Neoplagiaulax wurden von mir überhaupt nicht berücksichtigt. Allem Anschein nach haben wir es auch hier gar nicht mit Marsupialiern, sondern viel eher mit Monotremen zu thun, denn der junge Ornithorhynchus besitzt, wie Poulton kürzlich gezeigt hat, Zähne, die ganz an jene von Plagiaulax etc. erinnern.

ad Creodonta.

Pterodon dasyuroides. Filh.1) p. 22, pl. V, VI.

Der Autor beschreibt die Schädelbasis. Dieselbe hat nach ihm mehr Aehnlichkeit mit *Ursus* als mit *Hyaenodon*, entfernt sich aber noch mehr von *Dasyurus* und *Thylacinus*. Der Scheitelkamm ist sehr hoch, das Cranium dagegen hat nur sehr mässigen Umfang. Das Occipitale ist oben ziemlich breit, verschmälert sich aber ganz auffallend gegen unten zu. Die sehr kräftigen Jochbogen stehen weit vom Schädel ab.

Oxyaena Galliae. Filh.2) p. 23, pl. VII, fig. 6, 7 hat $\frac{3}{0}$ \mathcal{F} , oder besser $\frac{2}{0}$ \mathcal{F} , $\frac{1}{1}$ C, $\frac{4}{4}$ Pr, $\frac{2}{2}$ M.

Die beiden ersten oberen \mathcal{F} sind stark reducirt, der dritte ist dafür umso kräftiger und steht weit vom C ab. Die beiden letzten Pr sind gleich den M mit einem Innenhöcker versehen. Die oberen Pr_1 und Pr_2 haben je einen kegelförmigen Vorderzacken und einen schneidenden Hauptzacken. Der M_1 besteht wie bei Pterodon vorne aus zwei Höckern und hinten aus einem schneidenden Talon, der M_2 ist kurz und quergestellt. Pr_4 hat blos eine Wurzel. Der Oberkiefer besitzt eine ansehnliche Höhe. Das Infraorbitalforamen hat einen beträchtlichen Durchmesser. Es steht zwischen Pr_1 und Pr_2 .

 $Pr_4-Pr_1=57$ mm. Alveolen des $Pr_3=13.7$ mm. Länge von Pr_1 und $_2$ je 13 mm. Höhe derselben 12, resp. 13 mm, Breite 12, resp. 15 mm. Der Jochbogen ist 50 mm vom Vorderrand des Oberkiefers entfernt. Die Gesichtspartie ist auffallend verkürzt. Lydekker, Catalogue I, p. 35, fig. 3, constatirt das Fehlen des oberen \mathcal{F}_2 . Der Pr_4 steht dicht hinter C. Der Durchmesser der Alveole des C=21 mm, jener des $Pr_4=12$ mm.

Man kennt auch den Symphysentheil der Unterkiefer mit den Alveolen von C, Pr_4 und Pr_3 . Der Durchmesser des C beträgt an der Alveole 19 mm. Länge des $Pr_3 = 15,8$ mm. Die \mathcal{F} standen noch schräger als bei O. forcipata Cope.

¹⁾ Ibidem p. 148, pl. XIII, fig. 11, 12.

²⁾ Description des quelques mammifères fossiles des phosphorites du Quercy. Toulouse 1884.

Nach dem jetzt vorliegenden Materiale kann es allerdings nicht mehr zweifelhaft sein, dass Oxyaena wirklich auch in Europa gelebt hat, und ist demnach meine Angabe im ersten Theil der vorliegenden Abhandlung zu berichtigen. Dasyurodon flonheimense ist also generisch und specifisch von Oxyaena zu trennen. Das Gleiche gilt allenfalls auch von den von mir Taf. V, Fig. 1, 2, 5, 11, 12, 16, 19 und 21, abgebildeten Zähnen, doch bleibt deren Stellung immerhin eine durchaus unbestimmte.

Ich bin vorläufig durchaus nicht sicher, ob wir es hier mit Milchzähnen von *Pterodon* oder mit *Oxyaena* zu thun haben. Für die Deutung als Milchzähne spricht das starke Divergiren der Wurzeln; für *Pterodon* sind die Zähne jedoch zu gross. Sicher gehören sie nicht zu *Dasyurodon*. Ihre definitive Bestimmung als *D* von *Oxyaena* kann jedoch erst erfolgen, wenn einmal vollständigere Reste von dieser in Europa so überaus seltenen Gattung vorliegen werden.

Von Hyaenodon brachyrhynchus gibt Filhol 1. c. p. 18, pl. III und IV, weitere Abbildungen.

Wie bei *Pterodon* zeigt der Schädel auch hier einen Alisphenoidcanal, aber keinerlei Depression des hinteren und inneren Theils der Gehörblase, ebensowenig ein Septum in derselben. An *Mustela* erinnert die Entwicklung eines Condylar- und eines Carotidforamen, an die Hunde, Bären und Viverren die Anwesenheit eines Alisphenoidcanals.

Länge des oberen $Pr_4 = 6 \text{ mm}$, Höhe des $Pr_4 = 6 \text{ mm}$, Breite des $Pr_2 = 8 \text{ mm}$.

" "
$$Pr_3 = 11$$
 " " $Pr_3 = 13$ " " $Pr_1 = 11$ " " $Pr_1 = 11$ " " $Pr_2 = 13$ " " $Pr_2 = 9$ " Länge " $Pr_1 = 13$ " $Pr_2 = 13$ " $Pr_3 = 13$ " $Pr_4 =$

Die vier Pr messen zusammen 41 mm, die zwei M 28 mm.

Scott und Osborne 1) berichten von Hyaenodon horridus Leidy und leptocephalus Scott. Scott 2) beschreibt ausführlich Mesonyx obtusidens und Uintensis, Didymictis altidens, Miacis bathygnathus, Protopsalis tigrinus, Hyaenodon crucians, horridus, cruentus und leptocephalus. Protopsalis wäre dem Skelet nach in die Nähe von Oxyaena zu stellen.

Von Mesonyx liegt fast das ganze Skelet vor, so dass eine Restauration desselben möglich war. Interessant ist besonders die Beschaffenheit des Carpus. Scaphoid und Lunatum bleiben hier wie auch bei Hyaenodon — wenigstens den amerikanischen — zeitlebens getrennt. Die Anwesenheit eines Centrale Carpi ist für beide Gattungen überaus wahrscheinlich. Mesonyx hat am Hinterfuss nur mehr vier Zehen.

Lydekker erwähnt im Nachtrage — Cat. Part. V, p. 305 — noch Reste von Hyacnodon leptorhynchus und vulpinus, Pterodon dasyuroides und Proviverra Cayluxi aus den Phosphoriten des Quercy.

Die systematische Stellung der von mir als "Pseudopterodon ganodus" beschriebenen Zähne bleibt noch immer eine ziemlich unsichere. Scott hält dieselben — wie er mir brieflich mitgetheilt hat — für Milchzähne eines kleinen Hyaenodon, was auch anfangs meine Ansicht war, und wofür auch das starke Divergiren der Wurzeln bei manchen derselben sprechen würde. Für den Taf. V, Fig. 36, abgebildeten Zahn trifft dies ganz besonders zu. Die Zugehörigkeit zu Hyaenodon ist insoferne immerhin sehr zweifelhaft, als zwar der Fig. 25 dargestellte Zahn allenfalls den D_1 repräsentiren kann, eine Deutung des Fig. 29 abgebildeten Zahnes und noch mehr die des letzten

¹⁾ Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. 1887, p. 151, 152, mit Fig.

²⁾ Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Vol. IX, 1886, p. 155-185, mit 3 Tafeln.

Molaren aber nahezu unmöglich erscheint. Ein Querzahn kommt bei *Hyaenodon* überhaupt nicht vor, und für *Cynohyaenodon*, woran man allenfalls denken könnte, ist derselbe doch zu gross. Es will mir scheinen, dass hier wirklich ein Problematicum vorliegt, das noch der Lösung harrt.

ad Carnivora.

Leidy 1) beschreibt einen Canis primaevus aus dem Megalonyxbed von Indiana, vielleicht blos eine Varietät des Lupus americanus, ferner einen Ursus amplidens — ibidem fig. 13—16 — zwischen Ursus ferox und americanus in der Mitte stehend aus dem Megalonyxbed von Natchez (Mississippi), Ursus americanus fossilis aus dem Megalonyxbed von Tennessee, und einen Procyon priscus — fig. 17—24 — dem recenten Procyon lotor sehr ähnlich, aber um ein Sechstel grösser — gefunden neben Resten von Platygonus bei Galena (Illinois).

Scott und Osborne ²) berichten von einem Amphicyon? vulpinus aus dem Uintabed; die Art basirt auf einem unteren M_1 und einem Pr (2?). Der letztere zeigt zwar keinen Hinterzacken, dafür aber ein starkes Basalband, während bei den europäischen ein solches fehlen soll. Die Vorderpartie des unteren M_1 ist schwächer als bei Cynodictis, der Talon klein und niedrig und wenig ausgehöhlt. Aus geologischen Gründen werden die dürftigen Reste auf Amphicyon bezogen.

Die gleichen Autoren besprechen ferner³) Cynodictis (Amphicyon) gracilis Leidy. Amphicyon kommt nach ihnen ausser im Uintabed in Amerika überhaupt nicht vor. Der echte Galecynus ist nicht zu unterscheiden von Canis. Die amerikanischen Galecynus und Amphicyon gehören zu Cynodictis, der zwar dieselbe Zahnformel hat wie Canis, im Zahnbau jedoch Abweichungen zeigt. Diese Angaben bedürfen jedoch der Berichtigung, insoferne eigentlich nur die Temnocyon den echten Cynodictis — vom Typus des lacustris — nahestehen, die Galecynus aber sich auf's Engste an die europäischen Cynodon anschliessen. Möglicherweise gilt dies auch von den amerikanischen Amphicyon. Dass dieselben eher mit Canis als mit den typischen Amphicyon verwandt zu sein scheinen, habe ich schon im zweiten Theil meiner Arbeit, p. 86, angedeutet. Etwas Sicheres lässt sich jedoch nicht ermitteln, da Leid y keine Oberansicht der M gegeben hat. Der A. gracilis erinnert allerdings sehr an Cynodictis lacustris, er gehört daher wohl überhaupt eher zu Temnocyon.

Hofmann⁴) beschreibt eine Cephalogale brevirhinus aus der Kohle von Voitsberg in Steiermark. Ich habe dieselbe auch schon im zweiten Theil meiner Arbeit erwähnt. Jetzt, wo mir ausser einer genauen Abbildung dieser Reste — Unterkiefer — auch die Koken'sche 5) Abhandlung über Hyaenarctos minutus von Kieferstädtl in Schlesien vorliegt — diese betrifft allerdings nur Caninen und Oberkieferzähne — wird es mir überaus wahrscheinlich, dass alle diese Stücke auf ein und dieselbe Species, und zwar auf einen Hyaenarctos bezogen werden müssen. Hiefür spricht vor Allem die bei Cephalogale selbst niemals beobachtete Runzelung des Schmelzes am Talon von M_1 und an M_2 und M_3 und ausserdem auch die geringe Höhe des Hauptzackens am unteren M_1 und die Kleinheit der Pr. Hinsichtlich der Dimensionen stimmen diese Unterkiefer und Oberkiefer sehr gut überein. Was den Gattungsnamen anlangt, so muss derselbe in Hyaenarctos umgewandelt werden, dagegen hat der von Hofmann gegebene Speciesname die Priorität. Selbstverständlich ist hienach auch der Passus p. 87 im zweiten Theil meiner Arbeit zu corrigiren.

¹⁾ Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. II. Ser. Vol. III, p. 167, pl. XVII, fig. 11, 12.

²⁾ Proceedings of the American Philosophical Society. 1887, p. 255.

³⁾ Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College 1887, Vol. XIII, Nr. 5, p. 152.

⁴⁾ Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1887, p. 208, Taf. X, Fig. 1-6.

⁵⁾ Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1888, p. 44, Fig. 1, 2.

In Steiermark, und zwar in Voitsberg, hat Hofmann 1) nunmehr auch Trochictis taxodon P. Gerv. gefunden. Aller Wahrscheinlichkeit nach muss mit derselben auch die vielbesprochene Mustela Gamlitzensis H. v. Mey. — nur ein etwas defecter oberer M_1 — vereinigt werden. Dieser Zahn ist für Mustela selbst schon viel zu complicirt, hat aber ganz jene Zusammensetzung, wie sie bei dem Ausgangspunkt der Dachse gewesen sein muss, und als solcher erweist sich auch Trochictis taxodon. Zu diesem Trochictis gehört dann vielleicht auch der untere M_2 des "Cynodictis" Goriachensis Toula, während die übrigen Reste eher zu Viverra leptohyncha Filhol gestellt werden dürften.

Lydekker²) beansprucht die Priorität des Namens Aeluropsis, aufgestellt für eine Form aus den Siwalikhills. An dem betreffenden Kiefer ist nur Pr_1 und M_1 nebst der Alveole vorhanden, derselbe mithin zur Aufstellung eines besonderen Genus ohnehin kaum genügend, denn die relative Grösse der vorderen Pr lässt sich, wie das Beispiel von Stenogale zeigt, durchaus nicht immer von vorneherein ahnen. Auch ist bei dem Aeluropsis der Pr_1 länger als der M_1 , bei Haplogale dagegen Pr_1 viel kürzer als M_1 . Im Bau von Pr_1 und M_1 scheinen beide allerdings vollkommen übereinzustimmen.

Die Filhol'sche Monographie über *Proailurus* 3) kam mir erst vor Kurzem zu Handen. Ich kann dieselbe natürlich nicht übergehen.

Proailurus ist nach dem eben erwähnten Autor der Ahne von Felis. Die Zahnformel ist $\frac{3}{3}$ \mathcal{F}_1^{-1} $C\frac{4}{4}$ $Pr\frac{1}{2}$ M, wie bei Mustela, im Schädelbau dagegen ergeben sich Beziehungen zu Viverra und Felis. Der zweite untere \mathcal{F} steht hinter \mathcal{F}_1 und \mathcal{F}_3 , wie bei den meisten Fleischfressern, mit Ausnahme der Katzen. Der kräftige C zeigt auf seiner Rückseite Zähnelung. Pr_4 hat nur eine Wurzel. Seine Grösse ist im Ganzen gering, doch hat er eine relativ ansehnliche Länge. Pr_1 und Pr_2 tragen je einen Nebenzacken und ausserdem einen Talon und ein Basalband. Der Pr_1 sieht dem entsprechenden Zahne von Felis sehr ähnlich, der M_1 gleicht dem D_1 des Panthers, hat also wie dieser noch einen Innenzacken. Auch der M_1 von Pscudaclurus Edwardsi hat grosse Aehnlichkeit, doch fehlt diesem schon der Innenzacken. Der Talon ist offenbar als blosse Schneide entwickelt. Der M_1 hat eine kreisrunde Krone. Der obere Pr_1 deckt den M_1 inf. vollständig; der untere M_2 kommt mit dem oberen M_1 in gar keine Berührung.

Der Unterkiefer erinnert an Fclis, doch hat die Massetergrube unterhalb des Pr_1 eine viel grössere Tiefe. Die oberen \mathcal{F} zeigen nichts besonders Auffälliges. Der obere Pr_4 hat gleich dem untern nur sehr geringe Grösse und fiel wohl wie dieser bald aus. Der Pr_1 besitzt ein kräftiges Basalband und einen starken Innenzacken und ausserdem einen Vorderzacken. Die Länge des M ist sehr gering, umso beträchtlicher aber seine Breite.

Die Schnauze ist noch länger als bei Cryptoprocta und Felis. Der Gaumen hat hinten eine sehr viel grössere Breite. Bei den Katzen bleibt derselbe überall gleich breit. Die Stirn ist noch ganz flach; Aparietalia und Frontalia liegen noch in der nämlichen Ebene. Die Gesichtspartie erscheint vom Cranium scharf abgesetzt, jedoch nicht mehr in dem Masse wie bei den Viverren. Der den Katzen eigene aufsteigende Jochbogenfortsatz fehlt hier ganz wie bei Cryptoprocta, auch ist der Postorbitalfortsatz noch sehr schwach.

Der hintere Theil des Jochbogens ist sehr kräftig; er verbindet sich mit dem Occipitalkamm, den Gehörgang überspannend wie bei *Cryptoprocta*. Die Schläfenkämme vereinigen sich

¹⁾ Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1887, p. 211, Taf. X, Fig. 7-11, Taf. XII, Fig. 7, 8.

²⁾ Palaeontologia Indica. Tertiary and Posttertiary Vertebrata. Vol. II, 1884, p. 310 (139), pl. XXXIII, fig. 4.

³⁾ Observations sur le Genre Proailurus. Sep. 1880, 46 p., 5. pl.

⁴⁾ Vom C bis Pr₂ erfährt die Breite derselben gar keine Zunahme, dagegen beträgt sie zwischen den beiden M das Doppelte wie zwischen den C-Proailurus verhält sich hierin wie die Viverren.

nahe dem Postorbitalfortsatz sehr rasch und bilden einen hohen Scheitelkamm, dessen Länge die halbe Länge des ganzen Schädels einnimmt. *Proailurus* steht hierin den Viverren sehr nahe. Er unterscheidet sich ferner von den Katzen durch das Vorhandensein eines Alisphenoidcanals und eines Carotidcanals im Niveau der Vorderpartie der Gehörblase. Diese letztere gleicht jener der Viverren. Wie bei diesen, befindet sich auch der Carotidcanal auf der Innenseite der Gehörblase. An die Katzen erinnert nur die geringe Entwicklung des Postglenoidforamen, sowie Lage und Grösse von Condylarforamen und *Foramen lacerum posterum*. Die Gehörblase selbst ist nicht bekannt.

Proailurus zeigt im Bau des Schulterblattes Aehnlichkeit mit den Katzen. Sein Oberarm ist im Vergleich zu dem von Cryptoprocta sehr lang und relativ schlank, dagegen reicht das Epicondylarforamen nicht soweit hinauf, überhaupt stimmt dieser Knochen sehr viel besser mit Viverra als mit Cryptoprocta. Die Ulna weicht ganz wesentlich von Cryptoprocta ab und schliesst sich fast ganz an die Viverren und fast noch mehr an Foina an. Der Oberrand des Radius ist sehr viel mehr ausgeschnitten als bei Cryptoprocta. Dagegen stimmt mit dieser letzteren wieder das Längenverhältniss dieser Knochen besser überein als mit dem der Viverren und Musteliden. Das Ilium ist noch sehr viel schwächer als bei den Katzen, zeigt aber eine tiefere Höhlung. Das Femur besitzt eine beträchtlichere Länge als bei Cryptoprocta. Der grosse Trochanter ist mit dem kleinen verbunden; bei dem eben genannten Genus sind beide getrennt.

Humeruslänge verhält sich hier zur Femurlänge wie 1:116, ganz wie bei Foina, bei Cryptoprocta wie 1:184, abweichend jedoch ist das Längenverhältniss von Femur zu Tibia verglichen mit dem von Foina. Die distale Gelenkfläche der Tibia erscheint viel weniger ausgeschnitten als bei Cryptoprocta; überhaupt gleicht der untere Theil der Tibia eher jenem der Viverren und Musteliden, indem eine Apophyse zur Anheftung der Fibula vollständig fehlt; die Länge der Tibia übertrifft jene des Femur. Von Metapodien kennt man nur Metacarpale II und IV und Metatarsale I, IV und V. Die ersteren zeigen so gut wie gar keine Unterschiede gegenüber den entsprechenden Knochen der Marder — und wohl auch der Viverren! — umso grösser aber ist die Abweichung von jenen der Katzen. Die Metatarsalien sehen jenen von Cryptoprocta sehr ähnlich, doch scheint Proailurus noch in höherem Masse plantigrad gewesen zu sein.

Im Ganzen, d. h. im äusseren Habitus, ergibt sich eine nicht geringe Aehnlichkeit mit der eben genannten Gattung, nur weist *Proailurus* in Bezug auf Zahn- und Schädelbau noch etwas ursprünglichere Verhältnisse auf. Filhol hält daher beide für sehr nahe verwandt; als Zwischenglied erweist sich nach ihm der *Pseudaelurus Edwardsi* — der aller Wahrscheinlichkeit nach geologisch älter ist als *Proailurus!* —

Die morphologischen Anklänge an Cryptoprocta scheinen es nun freilich zu erlauben, diese Gattung als Nachkommen des Proailurus zu betrachten — gegen die directe Verwandtschaft spräche eigentlich nur der Umstand, dass Proailurus hochbeiniger ist — allein dann müssen wir unter allen Umständen auch Cryptoprocta von den Katzen ausscheiden, weil dieselbe gleich der eben genannten Gattung im Bau von Carpus, Tarsus und namentlich hinsichtlich der Articulation der einzelnen Metapodien sich sehr viel enger an die Viverren und Musteliden anschliesst als an die Feliden. Diese letzteren zeigen nämlich unter Anderem, und zwar schon bei den ältesten Formen — Aelurogale — ein eigenthümliches Herübergreifen des Metacarpale II über Mc III und des Mc III über Mc IV und unterscheiden sich hierin von gar allen übrigen Carnivoren. Einzig und allein Hyaenodon hat ähnliche Verhältnisse aufzuweisen. Die directe Verwandtschaft von Proailurus mit Cryptoprocta wird indess doch etwas unwahrscheinlich, wenn wir bedenken, dass die Heimat der letztgenannten Gattung, Madagascar, zur Zeit nur noch solche Säugethier-Typen beherbergt, welche eigentlich der älteren Tertiärzeit, nicht aber dem Miocän angehören,

mithin also offenbar schon sehr frühzeitig an ihren dermaligen Wohnsitz gelangt sind. Es wäre daher doch etwas sonderbar, wenn *Cryptoprocta* hievon eine Ausnahme machen und von einer Form des europäischen Miocän abstammen sollte.

Die Merkmale, welche *Proailurus* mit den Katzen gemein hat, sind recht nebensächlicher Natur. Sie bestehen lediglich in der weit fortgeschrittenen Reduction der Molaren, in einer gewissen Complication der *Pr*, in dem schlanken Bau und der Streckung der Extremitäten. Diese Momente bedingen auch keineswegs, wie Filhol meint, wirklich eine nähere Verwandtschaft, sondern können mit ebenso viel, wenn nicht gar mit noch grösserem Recht, als gleichartige Differenzirung betrachtet werden, umsomehr, als sie auch in anderen Formenkreisen wiederkehren. In allen übrigen Punkten, wie Schädelbau, Beschaffenheit der Schädelbasis, Form der Extremitätenknochen und namentlich in der Organisation von Carpus, Tarsus, Metacarpus und Metatarsus schliesst sich *Proailurus* sehr viel enger an die Viverren und Musteliden an, insbesondere aber an die ausgestorbenen Gattungen *Stenoplesictis*, *Palacoprionodon* etc., soweit wenigstens deren Skelet bis jetzt bekannt ist.

Ich ziehe es daher vor, *Proailurus* mit diesen eben erwähnten Typen als einen besonderen, zwischen Viverren und Musteliden stehenden Formenkreis zu betrachten, als dessen letzte Ausläufer höchstens noch *Cryptoprocta* und *Prionodon* gelten können. Allein auch in diesem Falle wäre *Cryptoprocta* schon von einem geologisch älteren Vorläufer abzuleiten, als dies *Proailurus* ist.

Proailurus lemanensis.

Der Talon am M_1 ist hier viel weniger entwickelt als bei *Proailurus Iulicni*.

Zahnreihe hinter C=47 mm, $Pr_1-_4=32$ mm, M_1 und $_2=15$ mm. Länge des $M_1=12$ bis 15 mm; Höhe desselben 8·5—10 mm; Dicke 5—6 mm. Länge des $M_2=2$ mm; Breite =2 mm.

Länge des $Pr_4 = 3$ mm; Höhe desselben = 1.5 mm;

", ",
$$Pr_3 = 4$$
 ", " " = 2 ",
", ", $Pr_2 = 7 - 8.5$ ", " " = 5 ",

", ", $Pr_1 = 10 - 10.5$ ", ", " = 6.5-7", Breite desselben = 4.2 mm.

Länge des Unterkiefers = 100 mm; Höhe desselben bei $Pr_3 = 17$ mm; Abstand des Kronfortsatzes vom Unterrand = 36-46 mm.

Abstand des oberen \mathcal{F}_3 von C = 4 mm.

Länge der oberen Zahnreihe hinter C = 41 mm, $Pr_4 - Pr_2 = 24$ mm, $Pr_1 - M_1 = 17$ mm.

Länge des oberen $Pr_3 = 5$ mm;

" "
$$Pr_2 = 10$$
 " Breite desselben = 5 mm; Höhe desselben = 6 mm
" " $Pr_1 = 15$ " " = 8.5 " " " = 8 mm.

Länge des oberen $M_1 = 1.5 \text{ mm}$; Breite = 8 mm.

Länge des Humerus = 134 mm; grösste Breite am oberen Ende = 31 mm; grösste Breite am unteren Ende = 33 mm.

Länge der Ulna = 130 mm; Länge des Radius = 105 mm.

Länge des Femurs = 157 , Durchmesser desselben in der Mitte = 12 mm.

Dinictis felina Leidy wird von Scott und Osborn 1) zu den Cryptoproctiden gerechnet, während dieselbe bisher für einen echten Feliden galt. Die genannten Autoren stützen sich hiebei auf die Beschaffenheit des Skelets. Der Radius hat allerdings mehr Aehnlichkeit mit jenem von Hoplophoneus, einem Nimraviden — dafür erscheint die Astragalusfacette der Tibia stark verbreitert und die Rolle des Astragalus weniger gefurcht als bei Hoplophoneus. Die Phalangen der

¹⁾ Bulletin of Comparat. Zoology, Harvard, 1887, p. 153.

zweiten Reihe deuten darauf hin, dass die Krallen zurückziehbar waren. Der Fuss ist fünfzehig und plantigrad. Die Endphalangen sind einfach und comprimirt, ohne knöcherne Haube.

Von Hoplophoneus (Drepanodon) primaevus Leidy geben die gleichen Autoren die Zeichnung des Hinterfusses und des restaurirten Skelets. Die Wirbel erinnern an jene der Katzen und Cryptoprocta. Scapula mit vorspringender Crista und Acromion und Metacromion. Der Humerus gleicht hinsichtlich der Trochlea ganz den echten Katzen, das Nämliche gilt auch von Ulna, Radius und Carpus. Die Zahl der Mc ist jedoch noch fünf, immerhin hat der Pollex schon Reduction erfahren. Die Endphalangen scheinen auch keineswegs von jenen der Feliden abzuweichen, umsomehr aber von Cryptoprocta und Dinictis. Die Tibia und der Tarsus schliessen sich auch der ersteren Gruppe näher an. Der Astragalus ist freilich am proximalen Theil etwas flacher, der Calcaneus besitzt einen Vorsprung wie jener der Bären. Die Articulation der drei äusseren Metatarsalien stimmt ganz mit jener der Katzen. Die Zahl der Mt ist fünf. Der Rumpf zeichnet sich wie jener von Cryptoprocta durch seine Länge aus. Der Fuss ist digitigrad, hat aber noch Anklänge an die plantigraden Vorfahren von Hoplophoncus, so die Articulation des Astragalus am Cuboid.

Boule beschreibt — Bulletin. soc. géol. de France 1889. Tome XVII, p. 321, pl. VII — einen Canis megamastoides, der hinsichtlich der Beschaffenheit des Unterkiefers sich den südamerikanischen Typen des azarae, cancrivorus und dem südafrikanischen Otocyon anschliesst, im Schädelbau aber mehr Anklänge an unseren Fuchs zeigt. Das Gebiss stimmt ebenfalls mit diesem besser überein, hat in gewisser Hinsicht aber noch mehr Aehnlichkeit mit den Cephalogalen, wenigstens bezüglich der Länge der oberen Molaren. Phylogenetisch ist diese Form jedenfalls ohne Bedeutung.

Weithofer A. gibt in den Denkschriften der k. k. Akademie der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe, Wien 1889, die Beschreibung von zwei neuen Arten von *Hyaena* aus Val d'Arno:

Hyaena Topariensis Fors. Major. — pag. 342, Taf. I, Fig. 1—4; Taf. II, Fig. 1, 2; Taf. III, Fig. 3; Taf. IV, Fig. 3, 4.

Der Kiefer stimmt in der Grösse mit Perrieri. Der untere \mathcal{F}_2 steht hier jedoch zwischen \mathcal{F}_1 und $_3$, bei Perrieri hinter denselben. Auch die Pr sind verschieden. Jene von Topariensis besitzen viel kräftigere Nebenzacken und ein deutlicher entwickeltes Basalband. Am unteren M_1 fehlt bei beiden Arten der Innenzacken. Der Talon hat drei Zacken aufzuweisen; seine Grösse ist ziemlich ansehnlich. Während aber bei Perrieri die Fortsetzung der Schneide des Zahnes in die Talongrube fallen würde, trifft sie bei Topariensis den Aussenzacken des Talons. Der horizontale Kieferast ist höher, das Kinn steiler als bei Perrieri. Die letztere Art hat überdies auch keinen so kräftigen aufsteigenden Kieferast.

Der obere M_1 gleicht jenem von *striata*, nur ist er etwas kleiner, der von *Perrieri* stimmt mit *spelaca*. Die einzelnen Skeletknochen verhalten sich in ihren Dimensionen zu jenen des Unterkiefers ganz wie die Knochen von *Hyaena striata*.

Jedenfalls steht diese Hyaena Topariensis der Perierri sehr nahe.

Hyaena robusta n. sp., p. 346, Taf. II, Fig. 3—5; Taf. III, Fig. 1, 2; Taf. IV, Fig. 1, 2. Diese Hyaena wurde bisher immer als die arvernensis von Val d'Arno bestimmt. Der Schädel zeichnet sich durch die Stärke seiner Crista und die Mächtigkeit der Postorbitalfortsätze aus. Die Frontomaxillar-Region erscheint hier auffallend kurz im Vergleich zu den lebenden Hyänen. Die Prämaxillen treten stark hervor. Was die Zähne betrifft, so ist der obere M_1 sehr gross und zeigt noch alle Elemente des entsprechenden Zahnes von striata. Dagegen stimmen die Pr ziemlich gut mit jenen von arvernensis; sie nehmen auch wie bei dieser von vorne nach hinten sehr allmälig an Grösse zu. Die unteren Pr besitzen ein kräftiges Basalband, während ein solches bei arvernensis nie vorhanden ist; dagegen fehlt stets am M_1 der bei arvernensis vorhandene Innen-

zacken. Der Talon erinnert etwas an striata, doch fällt die Fortsetzung der Schneide des Zahnes hier auf den Aussenzacken des Talons, bei striata in die Talongrube. Von arvernensis unter scheidet sich die robusta ausserdem durch den kräftigen Bau der Zähne und des Kiefers, die ansehnlichere Höhe und Breite des aufsteigenden Kieferastes und die tiefere Lage des Condylus. Da selbst am unteren D_1 der Innenzacken fehlt, so wird es zur Gewissheit, dass ein solcher auch am M_1 nicht mehr vorgekommen sein kann, selbst nicht einmal als individuelle Ausnahme.

Hyaena monspessulana, Christ, intermedia und prisca Marc. de Serres werden mit Hyaena striata identificirt, dagegen spricht sich Weithofer mit vollem Recht gegen die in neuerer Zeit mehrfach versuchte Vereinigung der H. arvernensis mit striata und der Perrieri mit crocuta aus. Gleich der lebenden brunnea nimmt auch arvernensis eine Mittelstellung ein zwischen striata und crocuta. Die arvernensis ist modernisirter als die striata, der geologisch jüngere Typus.

Enhydriodon Campani Menegh sp. Weithofer, Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1889, 1. Heft, p. 57, wird von dem genannten Autor gleich Lutra sivalensis von Lutra getrennt. Für Lutra sind die oberen Pr_1 und M_1 auch in der That schon viel zu complicirt. Bei Campani ist der M_1 mehr dachsähnlich, bei sivalensis dagegen stark in die Quere gezogen. Es liegt nunmehr auch ein Unterkieferfragment vor mit M_1 und M_2 und ein zweites von Casteani. Der M_1 erinnert an Lutra. Der M_2 hat elliptischen Querschnitt.

Mustela (Martes) Majori Weithofer, Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1889, p. 62. Von dieser Art kennt man ein Oberkieferfragment und den unteren M_1 obere $Pr_1 - 27$ mm. Am nächsten kommt Mustela Pentelici. Länge des unteren $M_1 = 15$ mm. Der Talon dieses Zahnes hat nur geringe Grösse. Der Innenhöcker des oberen Pr_1 sitzt mit breiter Basis auf. Vorder- und Hinterrand des oberen M_1 zeigen parallelen Verlauf. Auch diese Art stammt von Monte Bamboli.

Ilyaenarctos anthracites Weithofer, Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1889, p. 60. — Früher als Amphicyon Laurillardi von Pomel bestimmt. Der Species-Name Laurillardi ist zu verwerfen, weil sich derselbe auf eine ganz abweichende Form bezieht.

Ursus etruscus Weithofer, Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1889, p. 68, steht dem arvernensis ungemein nahe. Von demselben werden die Masszahlen der einzelnen Zähne angegeben. Die Knochen der Hand sind viel schlanker als bei den lebenden Bären.

Mustela sp. Weithofer, Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1889, p. 70, aus Val d'Arno. Der Unterkiefer hat die nämliche Grösse wie jener von M. canadensis. Der M_2 ist auffallend klein im Verhältniss zum M_1 . Der M_1 gleicht dem entsprechenden Zahn von canadensis, doch ist der Talon etwas grösser. Pr_1 besitzt keinen hinteren Secundärhöcker, doch ist es auch möglich, dass wir hier den Pr_2 vor uns haben, da der betreffende Kiefer aus zwei Stücken zusammengesetzt worden ist. Jedenfalls handelt es sich hier um eine neue Art.

Felis minima Weithofer, Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1889. p. 66, aus Val d'Arno, ist kleiner als issiodorensis und brevirostris aus der Auvergne. Die Entfernung des C_1 vom M_1 beträgt im Unterkiefer 51—58 mm. Ein Kiefer, bei dem der Raum zwischen Vorderrand des C und Hinterrand des M_1 62 mm misst, gehört doch wohl einer grösseren Art an. Länge des oberen $Pr_1 = 14$ mm.

Felis sp. media, ibidem p. 67, ist vertreten durch einen Schädel und ein Unterkieferfragment. Die Dimensionen stehen in der Mitte zwischen jenen von issiodorensis und arvernensis (pardinensis wird von Weithofer mit der letztgenannten Art vereinigt). Länge des oberen $Pr_1 = 27.5$ mm, Länge des unteren $M_1 = 19.5$ mm.

Felis arvernensis kommt nach Weithofer ebenfalls im Val d'Arno vor.

Machairodus, ibidem p. 67. Der Machairodus crenatidens Fabbr. erinnert bezüglich seines Gebisses an Machairodus sivalensis.

Die zeitliche und räumliche Verbreitung der Säugethierarten des europäischen Tertiärs.*)

ĺ			
	Reims.	X	52
	Londonthon.	•	51
genton (Indre).	Issel (Aude) u. Arg	•	20
	Grobkalk (Paris).	•	67
.(idgiW	Bembridge (Insel	•	<u></u>
	Vaucluse (Lignite)	X	75
	Pariser Gips.	× · ×	
	Canton Waadt		4
Bohnerze.	Egerkingen		4
	Sigmaringen]	· · X · · ·	
	Headonbed (Hord	X····X···	45
	Phosphorite (Que	$\times \times \cdot \cdot \cdot \times \times \times \cdot \cdot \cdot \cdot \times \times \times \times \times \times \times \times$	X4
-(11	Cadibona (Piemon		
	Fontainebleau.		39.
·(pu	Hempstead (Engla		90.
	Bohnerz von Ulm		.83
.(e)ire).	Ronzon (Haute Lo		36
Puy de Dome).	Marnes lacustres (<u> </u>
	St. Gerand-le-Puy		XX XX 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
	Mainz (Weissenau	XX	××
	Ulm (Haslach, Ec		\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(40041)	Sansan (Gers).		
			XX · · · <u>2</u>
	Kohle von Steiern	X	
•ч	Elgg und Käpfnac	X	X
	Leithakalk.		
ura).	Vermes (Berner J		
	Oeningen.	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	26
	Ries (Nördlingen).		
	Georgensgmünd.		24
	Steinheim.		× · · · × ×
	Simorre (Gers).		55
Tsere).	Grive St. Alban (χ	× · · · ×
	Sables d'Orléanais		20
	Günzburg.		X · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			<u>X</u>
	Dinotheriumsand		× · · · · 8
	Mte. Bamboli (Tos	·X	
.(nəi	Cerdaigne (Pyren		
	Alcoi (Spanien).		
.(9:	Lyon (Croix rouss		41
ron (Vaucluse).	Mt. Luberon. Cucu		
	Pikermi.	· · X	
	Baltavar.	X	
•1	Belvedère Schotter		<u> </u>
	Eppelsheim.	X	
219 II 61C	Bohnerz von Möss	X	
-40 dozist	Casino (Lignite).	X	
	Montpellier.	V V	
		X ·X · · . · . · · · · · · · · ·	
	Rousillon.		
	Suffolk (Red Crag		4
de Dôme),	Perrier etc. (Puy		<u> </u>
	.qus oniA'b laV	· · · · · X · · · · · · · · · · · · · ·	
	Norfolk.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • •
			i3)
		sis s s s s s s s s s s s s s s s s s s	· · · · · xi
		nni¹) . us . olii	ay
		atta no on	" tyrrhenaica")
ł		Dryopithecus Fonti Pilopithecus antiqu Orcopithecus Band Semnopithecus Band Semnopithecus Pent Macacus priscus . Aulaxinuus florenti Adapis magnus parisiensis parisiensis parisiensis mixtorotocus erina Microchocus erina Microchocus erina Microchocus erina Necrolemur Edwar " Zitteli " Zit	tyrrhenaica ^T minuta telluris brachychir , Meyeri dozotherium
		s F F Scus Scus P Scus	en ta ris ryc rri
		Dryopithecus For Pilopithecus antio Oreopithecus antio Oreopithecus Ban Banus 2)	tyrrhenaic minuta telluris brachychin Meyeri dozotheriu
		Dryopithecu Pilopithecu Semuopithecu Semuopithecu Semuopithecu Macacus pr Aulaxinuus Adapis ma par Caenopithec Cryptopithe cus 4) Microchoen Microchoen Necrolemur Necrolemur Rhinoloph Vespertilia Rhinoloph Vespertilia Taphozous Necromant Taphozous	de pre ido
		recopit inipith inipit	phi
		Pryder of the control	
		HAPEHAM WA AN AN WHAPHAMH	

67		···-		
15				******
9				
5				
348				• • • • •
148				
47				
146				
45				
44				
43				
42	7			XX · · · ·
1	X	X		XX · · · · ·
0				
68				
80				
12				
613				
$32 \mid 33 \mid 34 \mid 35 \mid 36 \mid 37 \mid 38 \mid 39 \mid 40 \mid 41 \mid 42 \mid 43 \mid 44 \mid 45 \mid 46 \mid 47 \mid 48 \mid 49 \mid 50 \mid 51 \mid 52 \mid 48 \mid 4$		×× ·	^	×
₩ ₩	· ×	~~ .	-	
33			· ×	
33	• •		XX	X · · · · · · · ·
			XX XX	
31	• 6. •	\cdot \cdot \times \cdot		×× · · · · · · · · · · ·
30		· ·× ·		× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$(112_{1}3_{1}4_{1}15_{1}16_{1}7_{1}18_{1}19_{2}20_{1}21_{1}22_{1}23_{1}24_{2}25_{1}26_{1}27_{1}28_{1}29_{1}30_{1}31_{1}$				
28		· ·× ·		
27		· ·× ·		
26				·,ı, ·× · · · · · · · · ·
25		· •× · ·		
24				
33		· ·× ·		
67				
2				V
012				
9.2				
811				
7		· · X ·	· · X · · ·	
1,		• • • •		
5116	• • •			
1	• • •			
14	• • •			
3				
112				
Ξ				
10				
9.1				
00				
~				
9				
2	٠			
2 3 4 5 6 7 8				
60				
03				
24	. ∨ .		/	
=				
				(01
	sus.	es	Sis	S. S
	60	oid oid).	us 1ep	Edwar niensis S ensis , Is nensis Caylus minor major dryi . villonii ensis , minimu
	el ita	der Sin is ⁹ is ⁹ na	ann ach	LS. (en list) in the last of t
	cha qua	uti oric sial prin lien	yri yri s . eri do: do: lasl	aceus Edwar sansaniensis dubius öningensis priscus arvernensis nurus Caylux minor major Caudryi Chevillonii remensis
	herium e moschata antiqua	ac soc soc foc	remnier mayrian Ilus losseri aradoxus n haslaci	ace sar du the the
	the an	us us	Neumayriani pusillus Schlosseri	us ymi "" " " orex oric oric oric
	phc	ryp oso oore	S P S oly	aceu
	Gomphotherium elegans	Geotrypus acutidens. Plesiosorex soricinoides Parasorex socialis ⁹) Amphisorex primaevus Crossopus fodiens	Sorex Neumayrianus pusillus	Palaeocrinaceus Edwardsin. Erinaceus sansaniensis dubius niningensis priscus neurogymnurus Cayluxi ¹⁰). minor najor Adapisorex Gaudtyi remensis Adapisoriculus minimus Orthaspidotherium
	A KG	Q P P P G G	S. C.D.	O'V A VO
-				

gén. I.; nach Die das Pliocin betreffenden Angaben sind ausammengestellt nach Deperct, Ann. scienc. geol. T. 17, 1885, und P. Gervais, Zool. et Pal. diesem letzteren ist auch die Rubrik Sables d'Orléanais ausgefüllt, doch hat dieselbe immerhin einige höchst nothwendige Correcturen erfahren. *) In der vorliegenden Tabelle ist zwischen den angeblichen zwei Horizonten des Val d'Arno nicht unterschieden.

T. VIII, 1877, p. 302, richtig wären, aber es liegt auf platter Hand, dass nicht z. B. Rhinoveras Goldfussi und Hyaenodon minor zusammen vorkommen können, ausser es befindet sich der eine auf seeundärer Lagerstätte, nachdem er aus seinem ursprünglichen Lager ausgewaschen worden war. Solche Mischungen kommen thatsächlich Eine sehr wunderliche Zusammenstellung würde die Fauna der Sande von Fontainebleau zeigen, wenn eben die Filhol'schen Angaben, Ann. sciene, geol. vor. Beispiele dafür sind die Sande von Eppelsheim und namentlich die jüngeren schwäbischen Bohnerze. Hier aber haben wir es mit einer Ablagerung und einer Fauna von ganz bestimmtem Alter zu thun. Dieselbe ist auch nach Filhol jünger als jene von Ronzon; Filhol gibt auch Palacomeryx medius und minor an, doch habe ich dieselben hier gar nicht angeführt, da ich unmöglich wissen kann, was er darunter versteht. Ich begreife überhaupt nicht recht, wie hier auf einmal der sonst in Frankreich so verpönte Name Palacomeryn zu Ehren kommt, umsoweniger als es sich doch um Formen handelt, die Niemand kennt, da II. v. Meyer unter

diesen beiden Namen ganz verschiedene Dinge zusammengeworfen hat.

P. Gerva is gibt auf p. 160, Zool. et Pal. gén. eine Uebersicht der Fauna von St. Henri-Bouche du Rhône, bestehend aus Archaeomys (?), Canis aff. viverroides und zibethoides. Ruminant ein Dittel kleiner als der "Cherrottin port muer", Rhinoceros ühnlich minutus und Hyopotamus borbonicus, Vielleicht handelt es sich hier um einen Horizont gleichaltrig mit Ronzon.

Anchitherium aurelianense, Rhinoceros, Aceratherium, Tapirus, Amphitragulus elegans. Hyaemoschus crassus, Palacochierus und Sur belsiacus, ist mithin ein Aequivalent von Sansan, Günzburg etc. Der Amphitragulus ist natürlich Deperet hat in Archives du Muscum d'hist, nat, Lyon 1887, eine umfassende Uebersicht über die Verbreitung der miocauen Saugethiere in Frankreich Der Calcaire de Beauce enthült nach dem gleichen Autor Cricetodon, Titunomys (Lagomys), als Dicrocerus elegans oder Palacomeryx furcatus zu deuten.

gegeben. Es ist hier natürlich nicht der Ort, alle einzelnen Localitäten namhaft zu machen, doch kann ich nicht umhin, auf diese Zusammenstellung zu verweisen und dieselbe geradezu als nothwendige Ergänzung der vorliegenden Tabelle zu bezeichnen.

apis. Zu demselben vielleicht der ⁶) Offenbar sehr nahe verwandt – ⁷) Nach Forsyth Major in sardinischen Höhlen. — ") = Protalpa cadurcensis Filh. — ") — Vraerra exilis = Galeris viverroides Talpa telluris p. p. (Unterkiefer von Depéret abgebildet).

10) = Cayluxotherium elegans Filh. Lydek ker unterscheidet zwei Arten, eine major und eine minor, der letztere scheint in der That eine eigene Art darzustellen. 1) In St. Gaudens (Haufe Garonne). — 2) Nach Deperct auch in Casino. — 3) Nach Rütimeyer verschieden von Adapis. Zu demselben vielleicht Heterohyus armatus P. Gerv, aus Buchsweiler, der angebliche Artomys Blainville's. — ') Schlosser, Taf. IV., Fig. 55, 60, 62. — mit Necrolemur, wenn nicht gar mit demselben und noch dazu mit N. Edwardsi identisch. — ') Im Süsswasserkalk von Aix, Provence, sardinischen Höhlen. — ') = Protafpa cadureensis Filh. — ') — Urverra exilis = Gabritz eiverroides — Talpa telluris p. p. (Unterkiel

	Reims.	X	X		XXXXXX	
*uoų:	Говидов	•	*		X···	
nde) u. Argenton (Indre).	A) Issal					
k (Paris).	Grobkall					
ge (Insel Wight).	Bembrid	· X		-		
.(clingid)	Ancluse	· X	$\cdot \times \times$			
(lips.	Pariser	· × ×	(· X			
Vandt	Canton					
gen Bohnerze.	Бкегкіпр	· · ×				
นอฮก	digmaria	·× ·	·× .	X		
ed (Hordwell).	Headonl			X		
rite (Quercy).	Б розБро	XXXXX	XXX · XXX	XXXXXXX		
a (Piemont).	Cadibon					
-hieau.	-mirino4			$\times \cdot \times \cdot \cdot$		
and (England).	Hempste					
von Ulm.	Войнета		0.			
(Hante Loire).	Копхоп		· · · ×	X		`
lacustres (Puy de Dôme).	Marnes			X ·X · · ·	· · · X	
nd-le-Pny (Allier).	St. Gera				···××	
Weissenau).	// sainM				· · · · · ××	X
slach, Eckingen).	eH) alU				· · · · ××	a. X X ·
(; Grs),	Sansau (X·X·
n Steiermark,	Koble ve					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
d Käpfnach.	Elgg un					· · · × · · · · ·
, Jlk.	Leithaka					
(Berner Jura).	Vermes					
'α	ogninoO					
.(aogailbri	Ries (Nö					X · X · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Georgens					
·uı	Steinheir					X X
(Gers),	Simorre					
. Alban (Isere).	ts ovivi)					0
'Orléanais.	Sables d			1 1 1 1		X 0.0
-9.	(tinzbar					× ×···
iumsand (Bayern).	Біпоєвег					XXXXXXX
nboli (Toscana).	Mte, Bar					
e (Pyrensen).	Cerdaign	. ,			,	· · · · · · · · ×
panien).	Alcoi (S)					
foix rousse).	Lyon (C					
eron. Cucuron (Vaucluse).	Mt, Lube					
	Pikermi,					
•	Baltavar					
e Schotter,	Belvedèr					
•mic	Eppelshe					
von Mösskirch etc.	Ворпет					·×
Lignite).	Casino (1					
ier,	Montpelli					
.0	Rousillor					
Red Crag).						
etc. (Puy de Dôme).						
'dns ou.	TA'b IsY					
	Morfolk,					
					<u> </u>	
		des	cayluxi m tenebrosum. gigantea²) Heberti sp brachyrhynchus Aymardi	minor 3) Cayluxi dubius leptorhynchus vulpinus 4)	um	giganteus 7)
			lux pros	r³)	pic. s. yi	sis (Sis (Sis Sis
		m ide	Cayluxi Cayluxi enebrosu untea²). erti chyrhync	uxi uxi us. us. rhy nus nus ores	liaj Svu: Ssi., Ilii., Idry	s 7) ss ren ins lide ide ide is s
		dotherium . dasyuroide biincisivus rium thyla	Cayli Cayli m tenebr gigantea Heberti sp brachyrli Aymardi	minor ³) Cayluxi dubius	lon flonheimer verium toliapic en primaevus. es Gervaisi. rus Duelii. odon ictis Gaudryi fis	giganteus 7)
		the usy inc um ypi	A Property H	E A P	find the state of	giganteus crassiden steinheim turicensis ulmensis heggbach intermed ? zibethoi crucians pyrenaicus
	İ	do de de la company de la comp	eriu eriu on	Ğ	lon leri lon la	gig cra stei stei tur uln heg inte inte
		Pleuraspidotherium Pterodon dasyuroides bimcisivus Thereutherium thylacodes Proviverra typica	Cynonyacnouch minor)	mino " Cayh " dubi " lepto " ' vulpi " comi " Filbe	Dasyurodon flonheimensis ⁵) Argillotherium toliapicum Arctocyon primaevus Hyodectes Gervaisi Tricuspiodon Tricuspiodon Hyaenodictis Gaudryi Procynictis Amphicyon lemanensis ⁶) Ieptorhynchus	·
		aura roc "" erei	erci aeo aen aen "		syu gill ctoc ode terc cus aen aen cyr	
		Ple Pte Pro	Pal Hy:	1xC	Arg Arg Hy Hy Hy Pro	
l .	'			0		

	୍ଦୀ						
1	51 52						plar oli-
1	პ ლ—						Exemplar dem oli-
1	<u> </u>				-		englische Exem odon aus dem heggbachensis
1	04 50 56 57 58 58 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50						che]
1	7	4				XX	isclesch a
1	59					Λ Χ	9) Das englis: Dasyurodon Meyer, hegg
1	<u>.</u>				X		round I
1	<i>r</i>						
	3					X · X··	
	T N						1 2 2
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	,, ,	X	X	X		a. a. a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	<u>,,</u> _						ger als Reims.
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	3			X			also jünger als Re, als Milchgebiss. 8 $= intermediu$
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	<u> </u>						als geb
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	-				·×		ch
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	2						üng Mij
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	3						o j
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	ř.					XXX	als, al
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	5					XX	- 135
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	1						" " " odu (?).
15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.							
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	_				· · ×	X	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	-						do)
2). 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3							
2). 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	-						gel opt
2). 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	2						aummangels angegcb "Pseudopterodon gan = major Depère et
2). 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	-						Pse Pse
Pseudamphicyon (Cytoodic Pseudamphicyon (Cytoodic Pseudamphicyon (Amphicyon (-	-					— g ':
Peardamphicyon (Armonic Pearlamphic) (Armonic Pe	-						hi er wegen Ra ⁴) Hiezu wohl Dôme). — ⁷
pseudamphityon (Cynodic) lists carsidens fis) carsidens fis) carsidens fis) carsidens fis) carsidens focus ambigures Freadamphityon (Amphicon (Amphico	-						— gei
eyon) (Agaday) Pseudamphicyon (Appolic Itis) crasifers Pseudamphicyon (Amphicyon (Amphicyon (Amphicyon) anbiguas Cyon) anbiguas Pseudamphicyon (Amphicyon (Amphicyon) anbiguas Pseudamphicyon (Amphicyon) In insignis In in	1				$\cdot \cdot \times \times$	0	we we ezu
eyon) Gauduyi Gauduyi Eseudamphisyon (Cytodic fis) crassidens Pseudamphisyon (Amphi- Seudamphisyon Inpinus Pseudamphisyon Pseudamphis							ierw Hiez Dôme)
Pseudamphiston (Cynodic- tis) crassidens Pseudamphiston (Amphi- cyon) ambiguous. (Amphi- cyon) ambiguous. (Amphi- cyon) helvettiens (Amphi- insignis " insignis " antticus." ")						— He
Psychol Gaudryly Sychol Gaudryly Sychol Gaudrylicyon (Cynodic- tis) crassidens Freudamphicyon (Amphi- cyon) ableticus. Freudamphicyon plutus. Freudamphicyon plutus. Freudamphicyon plutus. Dinocyon Themacdi. By an atticus. " atticus. " atticus. " brevitchinus 19, " spelacus. " atticus. "				4		4	is, aber l
Pseudamphicyon (Cynodic- tis) crassidens Pseudamphicyon (Amphi- cyon) anulyuus. Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon (Amphi- previos properties) " afticus. " atticus. " a						X	ab t, uy
Pseudamphicyon (Cynodic- tis) crassidens Cynodic- Steudamphicyon (Amphi- cyon) maniguns Cyon- Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Cyon- Pseudamphicyon (Amphi- Institute Cyon- Institute	2						(P \ S.
Pseudamphicyon (Cynodic- tis) crassidens Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon (Indipination of Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon lupinus Dinocyon Thenardi. Ryaenarctos sp. " göriachensis ") Hyaenarctos sp. " authracites 11) " atticus " authracites 11) " authracites 11	-					X	ona re at
Pseudamphicyon (Cynodic- tis) crassidens Pseudamphicyon (Amphi- cyon) mubiguus. Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus "gaicachensis 10." Hyaenarctos sp						· · · · × · · · · · · · · · · · · · · ·	issi
Pseudamphicyon (Cynodictis) crassidens Eseudamphicyon (Amphi- Pseudamphicyon (Amphi- Pseudamphicyon (Amphi- Cyon) anniguus. Pseudamphicyon (Amphi- Cyon) helveticus Eseudamphicyon (Injunus) Eseudamphicyon (Injunus) Eseudamphicyon (Injunus) Eseudamphicyon (Injunus) Injuncyon Theoretics 11) Injuncyon Theoretics 12) Injuncyon Theoretics 12) Injuncyon Theoretics 12) Injuncyon Theoretics 12) Injuncyon Etusons Injuncyon Injuncyon Injuncyon Injuncyon Injuncyon Injuncyon Injuncyo	_						So ar
Pseudamphicyon (Cynodic- Itis) crassidens Esendamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon lupinus Pseudamphicyon lupinus Dinocyon Thenardi. " göriachensis 10, " atticus. " authracites 10, " authracit	_						mus cht
Pseudamphicyon (Cynodic- tis) crasaidens Pseudamphicyon (Amphi- cyon) ambiguus Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon upfinus. Pseudamphicyon upfinus. Pseudamphicyon upfinus. Pseudamphicyon upfinus. Pseudamphicyon upfinus. " nisignis " atticus " afticus " afticus " afticompressidens " af	_						— diei
Pseudamphicyon (Cynodic- tis) crasidens Pseudamphicyon (Amphi- cyon) ambiguus. Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus Pseudamphicyon lupinus. Dinocyon Thenardi. Bediadensis 10). Hyaenarctos sp. " adticus. " anthracites 11). " attuscus. " anthracites 11). " anth	-						tlic viel
Pseudamphicyon (Cynodic- Itis) crassidens Pseudamphicyon (Amphicyon) ambiguus Cyon) ambiguus Pseudamphicyon (Amphicyon) Pseudamphicyon lupinus Pseudamphicyon lupinus Pseudamphicyon lupinus Boriachensis Insignis I	-					· · · · · X · · · · · · · · · · · · · ·	zen h
Pseudamphicyon (Granding) Itis) Cassidens Eseudamphicyon (Amphicyon) Eseudamphicyon (Amphicyon) Eseudamphicyon (Amphicyon) Eseudamphicyon (British of the properties of t					X .		Eigent doch v
Pseudamphicyon (Cynodic- tis) crassidens Pseudamphicyon (Amphi- cyon) ambiguus. Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus. Pseudamphicyon uppinus. Dinocyon Thenardi. " anthracites 11) " anthracites 12) " anthracites 11) " anthracites 12) " anthracites 13) " anthracites 13) " anthracites 14) " anthracites 15 " anthracites 17) " anthracites 18 " anthrac						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 5 H
cyon) Gaudryl							ahe ch
cyon) Gaudryl Pseudamphicyon (Cynodic- tis) Carssidens Pseudamphicyon (Amphi- cyon) ambiguus. Pseudamphicyon (Amphi- cyon) belveticus Pseudamphicyon (Amphi- cyon) belveticus " " " " " " " " " " " " " " " " " "							, d. Na
Pseudamphicyon (Gynodic- tis) crassidens Pseudamphicyon (Amphi- cyon) ambiguus. Pseudamphicyon (Amphi- cyon) helveticus. Pseudamphicyon lupinus. Pseudamphicyon lupinus. Pseudamphicyon lupinus. Pseudamphicyon lupinus. Pseudamphicyon lupinus. Breaticus. " anthracites 11) " an	_				x	(X	villen len
cyon) Gaudryl	_					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	uined iied
Pseudamphicyon (Cynodic- tis) crassidens	-					``````````````````````````````````````	Bla Bla Sch
cyon) Gaudryn (Cynodictis) crassidens cyon) ambiguus. Pseudamphicyon (Amphicyon) ambiguus. Pseudamphicyon (Amphicyon) belveticus. Pseudamphicyon lupinus. Pseudamphicyon lupinus. Pseudamphicyon lupinus. Pseudamphicyon lupinus. Pseudamphicyon lupinus. Bisiguis " anthracites 11) " anthr						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tr. ver
cyon) Gaudryl							yla yla
cyon) Gaudry1 Eseudamphicyon (Cyno Itis) Carssidens Cyon) Ambiguus. Pseudamphicyon (Amj Cyon) Dinocyon Thenardi. Beudamphicyon (Insue) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	dic.	- i	. id		(111) (111) (12) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (16) (16) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17	$egin{align*} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
cyon) Gaudryn (Cytis) crassidens . Pseudamphicyon (Acyon) ambiguus Pseudamphicyon (Acyon) ambiguus Pseudamphicyon (Acyon) plelveticus . Pseudamphicyon luginocyon Thenardi	-	ac.	mp	o an	nu s 10	tris :	ral.
cyon) Gaudry Pseudamphicyon tis) Crassidens Pseudamphicyon cyon) ambiguus Pseudamphicyon cyon) helveticus Pseudamphicyon Thenarc By cardamphicyon Dinocyon Thenarc " " anthr "	/Dt	<u>d</u> :Ů	: E	.∀	upi li . nsi	niis. In	= C
cyon) Gaudry Pseudamphicyo tis) Crassiden Pseudamphicyo cyon) ambigu Pseudamphicyo Cyon) Janbigu Pseudamphicyo Cyon) Janbigu By an an Dinocyon Then " an " a					cus ard ard	titor threeving sissing yei rulei will will will will will will will wil	$(1) = Galethylax\ Blainvillei.$ (2) Eigentlich aus Soisson ist nach Lydekker etwas verschieden, daher doch vielleicht andere gocänen Meeressande von Alzey. (2) Nach Lydekker in Sauvetat
cyon) Gau Pseudamphic tis) crassid Pseudamphic cyon) amb Pseudamphic Cyon) helv Pseudamphic Binocyon Ti Dinocyon Ti In		dry	len	igu	etit you ren riac	at in poly in the property of	r'dé ere
cyon) C Pseudamp tis) Pseudamp cyon) a Pseudamp cyon) b Pseudamp Dinocyon Hyaenarct " " " " " " " " " " " " " " " " " "		rau hic	ssid	mb	ely hic Th	affer	Ly
cyon Pseuda Fseuda Cyon Pseuda Cyon Pseuda Cyon Cyon Cyon Cyon Cyon Cyon Cyon Cyon		m G	ras	(a)	on du	arv effr tos spe fos oga j	, 45 g
Pset in Pset i	-	rseudamphicyon cyon) Gaudryi Pseudamphicyon	s) (s	Ton	ron orda	hall hall hall hall hall hall hall hall	nac nac
		cy	ti	cy	cy set)inc	Jrsu Jrsu Jrsu yn	- ist goo
		ч р	4 P-1	- С			

Reims.		
Londonthon.		
Issel (Aude) u. Argenton (Indre)		
Grobkalk (Paris).		
Bembridge (Insel Wight),		
Vaucluse (Lignite).		
Pariser Gips.		
Canton Waadt		
Egerkingen Bohnerze.		
Sigmaringen		
Headonbed (Hordwell),		
Phosphorite (Quercy).	a.XXXXX XX XXX	
Cadibona (Piemont).		
Fontainebleau.		
Hempsterd (England).		
Bohnerz von Ulm.		
	· · · X · · · X	
Ronzon (Haute Loire),	X··· X ··	
Marnes lacustres (Puy de Dôme)		
St. Gerand-le-Puy (Allier).	$\cdots \times	
Mainz (Weissenan).	· · · · · · XX · XX · XX · XX	
Ulm (Haslach, Eckingen).	··×··×· · ××··× × ××···	
Sansan (Gers).	X	
Kohle von Steiermarck.		X
Eleg und Käpfnach.		
Leithakalk.		
Легтея (Вегпет Лига).		
Оепіпуси,	····· X·····	-
Ries (Nördlingen).		
Georgensgmünd.		
Steinheim.		
Simorre (Gers).	^	Χ_
Grive St. Alban (Isère).		
Sables d'Orléanais.	X · · · X	٠
·Zin((zun;)		• .
Dinotheriumsand (Bayern),		•
Mte, Bamboli (Toscana).		٠
Cerdaigne (Pyrenhen).		·X
Alcoi (Spanien).		:
Lyon (Croix rousse).		
Mt. Luberon, Cucuron (Vaucluse)		
Pikermi,		:
	······································	. (
Baltavar,		
Belvedère Schotter,		
Eppelsheim.		
Bohners von Mösskirch etc.		
Casino (Lignite).		
Montpellier.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Rousillon.		
Suffolk (Red Crag).		
Perrier etc. (Pny de Dôme).	X X	
.que ourA'h IsV	X	
Norfolk.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		-
		: :
	nus sus viverroides viverroides viasi palustris nusis ooli 2) aisi quus mardi ens var. Groi- var. Groi- sus sus var. Groi- var. Groi- sus var. Groi- var. Groi- sus var. Groi- var. Gro	· · ·
	ins hynchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuc	(Fraas
	nus hypan hypa	
.	speciosus speciosus speciosus speciosus sp. leptorhynchus , viverroides (?) göriachensis 1) icynodon palustris. neschersensis etruscus vulpes magamastoides. nus öningensis yon Filholi²) ictis Gervaisi antiquus sictis Aymardi is palmidens. robustus pygmaeus robustus pygmaeus robustus pygmaeus sictis Aymardi is palmidens , elegans , genettoides minimus , genettoides minimus , genettoides minimus , sp. Sp. , genettoides minimus , sp. Filholi sp. Sp. Majori Aphori Majori Majori Majori Majori Lorteti minor Lorteti minor Lorteti minor Majori Lorteti Lortet	
	species gracil species gracil species gracil species s	eto. pa
	The part of the pa	Valetoni Campani
il	d te read	> O
	Cyno " Ampl Canis " Galec Plesic Propl Propl " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2 2
	ପ ଏଠ ଜରିବ ରିଥି ଓ ଅଟି ।	-

22				als ich
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51				
20				Cynodictis dubius Filh. — 4) Lydekker gibt Mit dieser darf vermuthl
5				r g
<u>x</u>				k e
7				dud
46				rd c
5				ictu Ly eso
4			174	iod di
123				# 1 % I
24			X	
=	XXXXXX XX	\times \times \times	XX · X	Filh. $ ^{9}$ $=$ $Goriachensis$. Alban. $ ^{0}$
<u>S</u>				ren 2
<u>e</u>				iac,
30			* * * *	Filh. – Göriac Alban
<u> </u>				
ణ ————				cha
<u>ත</u>		V		dic ive
				- ^ - July
<u>ත</u>			/ // /	
\$86.293.33				
80 .	· · · · · · ×	· X · X · · · · ·		ih e y
ವ× ××			· · · · · ×	X
8 · X ·		* * * * *	<u>···</u>	veise Trochictis, Oberkiefer Viverra leptorhyneha Filli. To ula abgebildete untere M. des "Cymodicits Görilierher wohl "Plesteiss mutata" Filli, von Grive St. Albi
8 ~ X · ·				fer ere
			<u> </u>	
24 25 26 27				 Ser
92				Ol
55				
54				
$\mathbb{R} \times \cdots \times$			· · · × · ·	cherweise Trochictis, von Toula abgebil
				Tala a
	· · · · · × · · ›	×	$\overline{\cdot \cdot \cdot \cdot \times \times \times \times}$. lse o u
19 20 21 22	X ·	·× · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		wei T
6]	X			herw on ()
<u> </u>	X			lich v
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	- de de la constant d
9				ch non
<u> </u>				terkiefer möglicherv und auch der von ad Cournon, — b) H
				Likic Conduction
60				nter
	\ /		X. X.	Meyer und auch d
<u> </u>			· · · · · · · ×××	
				N. Lan
<u> </u>				ymc
e×				
\$				ein
				cense in the contract of the c
$\sim \times \times \times \times$				tlic
<u> </u>			· · · · · · · · × · · · × · · · · · × ·	virl mul
d				8°4 V
n · · · · · ·			× · · · · · · · · · · · ·	halassictis incertus
24				aft,
				elh Alla
		* * * * * * * * * * * * *		eife
	teti syluxi mutabilis mutabilis			zw zw rbe
oi.	xi tab nut nut ssic	usi is is cancedus	sis sis	is list
s ari	ylu jor min	isi a a a lla ho ens stel	nasi ens as as as ens ich	tus sns Sei
icu icu don don ocy zat	Cay mir mir mir ilis meeni ilis meeni ilis meeni ilis deeliar	rva ust nuts nuts nuc ter ori ori and fus ust	eni eni nelide ide ggsi eim an. iyn iyn iyn iyn iyn	zerl ane ane (1)
ia	ctis Cayluxi minor modon mutabilis, modon mutabilis, modia julieni julieni pseudoplesictis gracilis intermedia aurelianensis brevidens	r sp. Gervaisi robusta minuta felina fecunda Waterhousi ⁴). sectoria lemanensis (Minstela) sp. angustifrons putoriodus	ardeus	in(in(em; onz
bia Jae s c; ta ta hy elv	itis icti	- a HAAAA SEU GU.	s J le	tis 5 16 Che
dul pa ctis	phi les pri gale ale	gal	a s a a s a s a s a s a s a s a s a s a	halassictis incertus
ra cra cra cra cra cra cra cra cra cra c	neglopo neoglog nogen	eog a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	oriu ailu " " " therefore a line a li	las pes ndc ndc
Lut fel ro	root of teas o	al al	Tiv To	Her Sh
Lutra dubia	Promephitis Larreti Stenoplesictis Cayluxi minor Palaeoprionodon mutabilis Haplogale media " pseudoplesictis Stenogale gracilis	Palaeogale Gervaisi robusta minuta felina felina fecunda Waterhousi Sectoria lemanensis lemanensis angustifrons	Protorius ardeus Proailurus Julieni Viverra simplicidens " hastingsiae " steinheimensis " minima " ? sansaniensis ²) " Peptorhyncha") " Peptorhyncha") " Ctittherium robustum Orbignyi " hipparionum	Thalassictis incertus

nde) n. Argenton (Indre). The control of the contr	Leithal Leit	× · ·		××	×		X				>	×	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
nde) n. Argenton (Indre). a. K. Paris). b. Chignite). c. Chignite).	Teithal Teigg u Sansan Sansan Mainz St. Géi Mainz Ronzoi Ronzo	× · ·									>	•	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51
n. (Berner Jura). (Berner Jura). d Käpfnasch. on Steiermack. (Gers). Indele Edy (Allier). Indele Puy (Allier). Indele Puy (Allier). Indele Puy (Allier). Indele (Quercy). Indemonty. And (England). Indele (Quercy). Od (Hordwell). Od (Hordwell). Ingen Ren (Gips. (Gips. (Gips. (Gips.).	Leithal Leit	× · ·)	•	3.7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50
n. (Berner Jura). (Berner Jura). d Käpfnach. d Käpfnach. Glers). slach, Eckingen. Ind-le-Puy (Allier). Ind-le-Puy (Allier). and-le-Puy (Allier). and-le-Puy (Allier). sad (England). and (Hendwell). sen. Gips. dips. (Gips. Gips. Gips.	Leithal Leit	× · ·									>	•	3.7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48
n. (Berner Jura). alk, d Käpfnach. alkere, Erkingen. con Steiermack. clack, Eckingen. alach, Eckingen. alach, Eckingen. alache-Puy (Allier). ala	Leithal Leit	× · ·									>	•	3.7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
n. (Berner Jura). (Berner Jura). d Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). md-le-Puy (Allier). and-le-Puy (Allier). sad (England). yon Ulm. and (England). and (England). sad (England). beloau. od (Hordwell). and (Pernont). den Ulm. And (Pernont). and (Pernont). den Ulm. den Ulm. and (Pernont). den Ulm. den Ulm. den Ulm. and (Pernont). den Ulm.	Leithal Leit	× · ·									>	•	3.7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
n. (Berner Jura). д Каргаер. д Каргаер. д Каргаер. оп Steiermack. (Gers). ядедь, Ескіпдеп). лас-де-Риу (Allier). за (Ерадава). за (Ерадава). за (Ерадава). за (Неполі). за (Неполі).	Leithal Leit	× · ·									,	•	3.7 38 39 40 41 42 43 44 45 46
n. (Berner Jura). al Käpfnach. d Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). nd-le-Puy (Allier).	Digg united Leithal	× · ·										•	37 38 39 40 41 42 43 44 45
n. (Berner Jura). alk, d Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). Ind-le-Puy de Dôme). and-le-Puy de Dôme). on Ulm. von Ulm. von Ulm. sad (England). sad (England). sad (England). sad (England).	Leithal Leit	× · ·)	•	37 38 39 4041 42 43 44
n. (Berner Jura). 11k. d Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). nd-le-Puy (Allier). nd-le-Puy de Dôme). (Haute Loire). sad (England). sad (England).	Leithal Leit	× · ·)	•	37 38 39 40 41 42 43
n. (Berner Jura). alk. d Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). nd-le-Puy (Allier). nd-le-Puy (Allier). nd-le-Puy (Allier). sad (England). on Ulm. on Ulm. on Ulm. on Ulm. on Ulm.	Teithal Phosphon	× · ·									>	•	3.7 38 39 40 41 42
n. (Berner Jura). alk. d Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). nd-le-Puy (Allier). nd-le-Puy (Allier). decretes (Puy de Dôme). nd-le-Puy (Allier). sad (England). on Ulm. on Ulm.	Teithal Teit	× · ·										•	3.37.38.39.40.41
n. (Berner Jura). alk. d Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). nd-le-Puy (Allier). nd-le-Puy (Allier). decretes (Puy de Dôme). nd-le-Puy (Allier). sad (England). on Ulm. on Ulm.	Peithal Peit	× · ·										•	337 38 39 40
n. (Berner Jura). al Käpfnasch. d Käpfnasch. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). slach, Eckingen). slach, Bekingen). slach, Bekingen). slach, Bekingen). slach, Bekingen). slach Bekingen). slach Bergland). on Ulm.	Hemps Hemps Hemps	× · ·			•		•					•	3.37.88.89
n. (Berner Jura). al Käpfnach. d Käpfnach. on Steiermäck. (Gers). slach, Eckingen). slach, Eckingen). nd-le-Puy (Allier). lacustres (Puy de Dôme). (Raute Loire).	Digg u Deithal Digg u	× · ·		• •			•	-					37.38
n. (Berner Jura). al Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). snach, Eckingen). nd-le-Puy (Allier). lacustres (Puy de Dôme).	Leithal Leit	× · ·											37.
n. (Berner Jura). alk. d Käpfnach. d Käpfnach. (Gers). slach, Eckingen). Weissenan). Meissenan). md-1e-Puy (Allier).	. Digg u . Tolihal . Tolin (H . Sansan X Mainz X Mainz X Mainz X Mainz	× · ·											60
n. (Berner Jura). 11k. d Käpfnach. on Steiermack. (Gers). slach, Eckingen). Weissenau).	Leithal Leithal Ligg u Kohle	× · ·	-		•								. 33
n. (Berner Jura). 11k. d Käpfnach. on Steiermack. slach, Eckingen).	Deithal Figg u Figu u	× · ·				_							. eg
n. Dernet Jura). 11k. d Käpfnach. on Stelermack. (Gers).	Figg u Sansan Kohle Sansan	•											$\times \times \cdot $
h'dlingen), n. (Berner Jura), al Käpfnach, on Stelermack,	Elgg u Kohle Sansan						•						× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
h'dlingen), n. (Berner Jura). alk, Käpfnach.	Elgg u Kohle Sansan				•								$\times \cdot \cdot \%$
hrdingen). n. (Berner Jura). alk. d Käpfnach.	· Flegu				$\cdot \times$			\times \sim \times	<			$\cdot \times \times \times$	(· · · ह
h'dlingen). n. (Berner Jura). alk.	reithal ·					•		$\times \times \times$	<			· ·×	
jrdlingen). n. (Berner Jura).		•											66
rdlingen). n.	· Vermes												&
inglingen).													
	gninsO .	,										· X · ·	96
	• Ries (1												
sgmünd.	· George												
·w	· Steinhe					X							
(Gers).	rromis .									-			6
. Alban (Isère).	Grive 5	·X				X		٠				· X ·	
'Orléanais,	Saldas				٠.								6
.3.	. Günzbı							• • •					6
inmeand (Bayern).	· Dinoth											· ·×	<u>«</u>
mboli (Toscana).	· Mte, B												
е (Рутевйев).	Cerdaig												<u>.</u>
(asiasq													<u> </u>
roix ronsse).	- Phou (4
eron. Cucuron (Vaucluse).	· Mt. Lul		X			$\cdot \times$							<u> </u>
	Pikerm	··XX	X						·XXX				<u>.</u> ç
•	· Baltava		X										
e Schotter.	. Belaede										-		9
,mis	. Ebbejaj	· · X ·				·×			·×××	<			
von Mösskirch etc.	тэплой .					• •							
Lignite).										•			
,19i	· Monthe		· X								X		
	HisnoH .									•	•		
Red Crag),	· Suffolk	· · × · ·	XX ·			· ·×					·×		4
etc. (Puy de Dôme).			- · · ×	× · ·		· ·×				·XXXX			
dus ou.			· · X	X .		· ·×				· · · ×			6
	Mortoli .												
			a):					lia)			angu-		
	:		(crocuta)	cen dsi	us) tus ns	ni tus ner		nec			I		
	:	S	cro :	Art var	mil ntar ide	dar nis ntk	nis	Ξ : :				Sis	· · ·
1	sn:	antiquus crassus iglicus . graeca .		arvernensis J lle, drei Art lurus Edwar	(Eusmilus) bidentatus palmidens	Jourdani aphanistus meganthereon	insignis. Iatidens ¹)	turnauensis (media)	attica attica ogygia	prista	ilu	Bredai ²)	Feignonxi Chalaniati dubius
	risc	antiquu crassus nglicus graeca chaeret	nia lae ata rier	dre dre s E			in Ia	uen	uon (un)	ens ens ostr	oli. des opb	dai	gnc lan ius
	<u> </u> <u> </u>	ang sang sang sang sang sang sang sang s	eximia . spelaea striata . Perrieri	iru	100	dus		ma.	aoc ca edil gia	di ii ii ii	ist	3rec	Feignon Feignon Chalania dubius
	tes	is i icti	9 00 00 14	gal telt	10d	Ĭ,		turnauens sp pygmaea.	attica antediluviar ogygia	pardinensis arvernensis brevirostris issiodorensi	Christoli pardoides	stidens iurus Bi	
	bes	" "" uru ieni yae	aena "	uro	pan "	hai "		- 03 1-4) Tosis	tide ırus "	2 2 2 2
	Herpestes priscus	antiquus crassus Aelurus anglicus . Hyaenictis graeca . Lycyaena chaeretis	Hyaena eximia " spelaes " striata " Perrier	Aclurogale, drei Arten Pseudaelurus Edwardsi	Drepanodon "	Machairodus "		Felis			" Christoli pardoides	Sciurus Bredai ²) sansanie	
			14	4 14 1	-			p-lang			14	U1	

	ist in Tit
	ütimeyeri identificirt, sseer. Nager Taf. VI, die Phosphorite und ehr wenig berechtigt
	enti Ta rite rite
	ide Pholopho " proping and pholopholopholopholopholopholopholophol
	osp osp nig
X	everi Nag Phos weni
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Rütimeyeri is losser, Nager die Phosph sehr wenig
·· X X X · XX · XX · XX · XX · XX · XX	Rätim hlosser r dic sehr "topa
<u> </u>	ciuvoides Rütime inus" Schlosser. sowie für die I gabe als sehr v iige Art "topar
	oia ie e
· · · × × · × · × · × · × × × · · × × × × · · × × × · · × × × × · · × × × · · × × × · · × × × · · × × × · · × × × · · × × × · · × × × · · × × × · · × × × · · · × × × · · · × × × · · · × × × · · · × × · · · × × × · · · · × × × · · · · × × × · · · · · × × × · · · · × × × · · · · × × × · · · · × × × ·	gerweise mit Sciuroi "Myoxus murinus" Cournon an, sowie muss diese Angabe eine selbständige
	nit Sc muril an, an, Ang
	mit ma al e a
	Alyoxus Cournon nuss dies eine sell
	veis vo.v urn s d
	Alf Co Co nus ein
The state of the s	iriig nd " für n, n
X	⁹ Früher irigerweise mit Sciuroides Rütimeveri identificirt Depéret und "Myoxus murimus" Schlosser. Nager Taf. VI Art auch für Cournon an, sowie für die Phosphorite un ader zeigen, muss diese Angabe als schr wenig berechtig n val d'Arno eine selbständige Art "topariensis", und did
······································	ëret u auch zeige al d'A
······································	Fri pér t a r z val
XXXX	- 9) Frühen es Depéret e Art auch nander zeig von val d'.
	tes se nat
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	thurs Depéret. — 9) Früher irtigerweise m Myoxus niteloides Depéret und "Myoxus » k.k.e.r. gibt diese Art auch für Cournon sigen sonst miteinander zeigen, muss diese Hyaen: Ferrieri von val d'Arno eine selbs
X	spermophilinus Deperet. — 4) Myoxus nifeld. 6, Lydekker gibt d. Ablagerungen sonst mi.
	Depér s nit gibt nist r
	S I S
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jyo. Jyo. dekke erungen
	hill J e k ung
· · · · · · · · · · · ×	mophilinus: 1) Myoxu Lydekker agerungen s e die Hyaen
	sperm 4 6, L Ablag wäre
· · · · · · · · · × · · · · · · · · · ·	S S A
**************************************	vaisianus Lart, und er kleiner als dieser. hkalk des Elsass. — nung, welche diese) Nach Weithofer
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dieser
× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lart, uals die Elsass, che di eithol
	us Lart ner als les Els: welche Weith
	uns gervatsiams leich, aber kleiner Melanienkalk des reinstimmung, wel nt. — *) Nach W
	sia kle dk dk
	er er nk: mu
(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ab ab imi imi
<u> </u>	ch, ch, nst
	iurus gleich Mel ereins
	Sci gim im im ebe
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$S_{\rm c} = S_{\rm c}$ ahnbau gen Ueb jor bena
<u> </u>	ahn nfal gen or
	Z. Z. Ille
× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	im in gen
)	Ker zszi uch er er
	n F 7.46 l a i d
	vol Pobli
1	en Sc. t. w.
	Shi Ar
si si	de de se ngl
	len och Die E
s si	PHE.
vaisi vaisi vaisi thicus thicus dius s s s s s s s s s s s s s s s s s s	1 20 ~ 0 d
illis reensis reensis reensis) In it jec - ⁶ , d vo
abilis	1) In den Höhlen von Kent. — ikeit jedoch dem Sc. Fraust im Z ibeit jedoch Art wohl auch alle ibed von England. Bei der gerin werden. — 7) Von Forsyth Ma
pectabilis	1) In lichkeit jec 28 5) donbed vo
ctomys Gervaisi. ctomys Gervaisi. don cadurcense. Guercyi. Siderolithicus sp.³) intermedius. murinus Wetzleri primaevus wetzleri parisiensis Wetzleri parisiensis wetzleri parisiensis wetzleri parisiensis intermedius. parisiensis intermedius parisiensis spectiosus comys facilis himys gracilis parvillardii comys Laurillardii pincidens sigmodus spp s	irklichkeit jec 27, 28. — ⁵) Ieadonbed vo
rus spectabilis isiarctomys Gervaisi rodon caducense	Wirklichkeit jec 5, 27, 28. — ⁵) Headonbed vo
us spece of paractomy odon c oldes F pa arctomy odon c oldes F pa arctomy parithemy parithemy parithemy parithemy prim parithemy parithemy prim parithemy parithemy parithemy prim parithemy parithemy parithemy prim parithemy parithemy parithemy prim parithemy parithemy parithemy prim prim parithemy prim parithemy prim prim prim parithemy prim prim prim prim prim prim prim prim	¹) In den Höhlen von Kent. — ²) = Sciurus gervatsia in Wirklichkeit jedoch den Sc. Frausi im Zahnbau gleich, aber kle Fig. 27, 28. — ⁵) Diese Art wohl auch allenfalls im Melanienkalk das Headonbeard. Bei der geringen Uebercinstimmung, hezeichnet werden. — ⁷) Von Forsyth Major benannt. — *) Nac

Reims.		152
Londonthon.		<u> </u>
Issel (Ande) n. Argenton (Indre).		
Grobkalk (Paris).		
Rembridge Insel Wight).		
Vaucluse (Lignite).		4
Pariser Gips.		46
Canton Waadt		45
Egerkingen Bohnerze.		4
Sigmaringen		43
Headonbed (Hordwell).		42
Phosphorite (Quercy).	X XXXX XXXX	41
.(Inomea (Piemont).		40
Pontainebleau.		39
Hempstead (England).		38
Bohnerz von Ulm.		37
Ronzon (Haute Loire).	××···	36
Marnes lacustres (Puy de Dôme).	·X · · · · · X · · · · · ·	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
St. Gérand-le-Puy (Allier).	X · · · · · X	33 34
Mainz (Weissenau).	X····· X	20
Ulm (Haslach, Eckingen).	X	32
Sansan (Gers).	· · · · · · · · × × × × × × × × × × × ×	95 96 97 98 99 30 31 32
Kohle von Steiermark.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30
Elgg und Käpfnach.	X XX	66
Leithakalk.		86
Vermes (Berner Jura).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
Oeningen.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	96
Ries (Nördlingen).	XXX X	75
Georgensamind,	X.	
Steinheim,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17 18 19 20 21 29 23 24
Simorre ((iers),		<u></u>
Grive St. Alban (Isère).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Sables d'Orléanais.		- 6
Günzburg,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 6
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- x
Dinotheriumsand (Bayern).		
Mte, Bamboli (Toscana).		
Cerdaigne (Pyrengen).		11 19 13 14 15 16
Alcoi (Spanien).		4
Lyon (Croix rousse).		
Mt. Luberon, Cucuron (Yauchuse).		-
Pikermi,		
Baltavar,		
Belvedère Schotter.		01
Eppelsheim,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Bohnerz von Mösskirch etc.	XXn	α
Casino (Lignite).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
Montpellier,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
Rousillon.	X X X	10
Suffolk (Red Crag).		⟨X 4
Perrier etc. (Puy de Dôme).		
Val d'Arno sup.	× · · · · × · · · · · · · · · · · · · × · · · · · · × · · · · · × · · · · · · × · · · · · · × · · · · · · · · × ·	< · «
Nortolk,	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(XX-
	. d	
	Hystrix Lamandini Issiodoromys pseudanoema Nesokerodon Quercyi. Sciuromys typicus Eomys Zitteli. Arvicola ap. 1) Henseli 3) Henseli 3) Henseli 3) Pilocaenicus minus " rhodanicum gergovianum " gergovianum " aniciense " spectabile " nucertum " nucertum " spectabile " sergovianum " sergovianum " sergovianum " aniciense " spectabile " aniciense " sergovianum " sergovianum " procertum " nusculum " anusculum " anusculum " anusculum " nusculum " procertum " sardus 6) " sardus 6) " sardus 7) Lagomys vienoviensis Myolagus Meyeri " sardus 9) " turicensis 10) " turicensis 10) " turicensis 10) " turicensis 10) " hongirostris " rivagatidens 11) " virgatidens 12) " arvernensis 13) Elenhas meridionalis 14)	- : :
	and the series of the series o	13
	Lamandini	antiquus primigenius
	mind mind mind mind mind mind mind mind	ige
	Lamandini mys pseucidon Queri mino s typicus s	antiquus primigen
	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	면접
	triix ddorcollectrix collaborcollectrix collaborcollectrollectrollectrix collaborcollectrix collaborcollectr	3
	Hystrix Lamandini Issiodoromys pseudanoer Nesokerodon Quercyi	4 2 2
	H DI KH PAKK C PKK KEH	i

52					
48 49 50 51 52	X			XX	
30	·×		XXX		
9				· · ×	
8					
7		$XX \times X \times X$			
4	• •	XX ⁿ XX X			
7		XXXXX X			
42/43/14/45/46/47		n. n. XXX X	· · X	XX···XX	
77		n. n. n. XX n.	$\times \cdot \times \rangle$	<u> </u>	
133		$\times \times \cdot \cdot \cdot \times \times$			
61		$\times \times \cdot \times \times \cdot \cdot$			
41	· · ×	$\times \times $	\times \cdot \cdot \cdot \cdot	$\times \times \cdot \cdot \cdot \times \cdot$	
10					
30					
38					
1					
3613		0	X · · ·		
55					
32/33/34/35/36/37/38/39/40/41	· · × · ·				
50	· · × · ·				
5.5					
133	X				×
5	·				
33					^_
66 86		* * * * * * *			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
6					X
07	i · · · · ·				
96					
619611					•
76					\times
93	· · · × ·				X
00			,		(% +
01:	· · · × ·				\times
Š					X
ē					X
Ø.	· × ·				X
Ē					
5					
-	3				· X
= =					- - -
911	0 .4				
-	N V	V			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	^			
56186161616118118118118118118118118118118					
- 1					
	. · · · · × ·				
-	· · · · × ·	X			
t					
	p · · · · ·				
1	 				• • •
	4	+ + + + + + + +			· X
	zz				
(24				
					* *
	17.00		as a	31	
	cocaenus 15) Oweni m Wagneri 10) Wetzleri 17) antiquum 15) modicum	cum crassum ¹⁹) medium ²⁰) curtum ²¹ , magnum ²² , annectans Fraasi Fraasi	Javali ovinum isselanus ²⁵) . argentonicus Prevosti ²⁶)	cervulus?) siderolithicus?s; um Labarpi?) (?) Duvali?o) um cuniculus?l) leporinum?s; Dumasi?s) adegundensis?l)	
	us icu	um um m f um scta	ali nun unu unu unu unu	arp list list cul	lia
	aenus 15) veni Wagneri Wetzleri antiquum	crassum 19) medium 20) curtum 21, magnum 21 annectans Fraasi minus 24)	Javali . ovinum sselanus ² rgentonic	rvi olit ab: ava uni por asi	ure ;30)
	we ve	cu mc m	jes iss arg	egu le c	a. cile
	m m	rae um	ıus	cervulus ²⁷) siderolithicus ²⁸ ; ium Labarpi ²⁹) (?) Duvali ²⁰) ium cuniculus ²¹) is Dumasi ²³) radegundensis ³¹)	m ;rac
	lon eri	eri eri	oph	n (cri)	riu) .
	Goryphodon cocaenus 15) Chalicotherium Wagneri 10) antiquum 17) antiquum 18)	Leptodon graecum	" Javali Pachynolophus isselanus ²⁵) Rachynolophus preventi ³⁶	". cervulus?") Lophiotherium Labarpi?") Lophiodon (?) Duvali") Hyracotherium cuniculus? Anchilophus Dumasi ²³) Anchilophus Dumasi ²³) Anchilophus Dumasi ²³)	Anchitherium aurelia- nense ⁸⁵)
	ypł lic	aeo aple	hyı	obic bic acc	shit ens par
	Sor	alc alc	aci	Joh Hyr Luc	And II.p
	0	HH H	러	HHH 4	Ψ. H

 12) Im ") Nach Depèret und Forsyth Major. — ") Zwischen diesen ") Sonst noch in Cerro di San Isidro und in der Meeresmolasse fedenfalls im Melanienkalk des Elsass (Andreae). — 21) Pieter's Original ist ein Pulephothevium, sein Plagiolophus sideralthiens dagegen = Palaeothevium eurtum 21) Hieher vielleicht Rütim eyer's Plagiolophus monutus, aber dann als Milchzähne. - "') Diese L. phiotherium elegans Rütim, (Fig. 49)? - . Plagiolophus miner 19) Im Soissonais und im Laonais (Aisne). - 17) Mit diesem "Colodus pachyzmathus" ist jedenfalls ballagariense Pethö identisch. Vermuthlich händelt es sich nur um das-Milchgebiss von Wagneri. - 17) Diese Art - Anisodon Schinzi H. v. Meyer - auch in dem Molassesandstein von Bollingen bei St. Gallen und in St. Gerand-18) Das aff. modicum Depéret's sicher nur ein Milchzahn dieser sederoolithus p. p. (Fig. 8) and Plagiolophus valdensis (Fig. 4), terner Plageolophus minor Pom. and Palacotherium vertum Pict. (pl. 1). Puloplotherium Fransi ist wohl 24) - Hyracotherium siderolithicum Pict, und 20) Pictet's Original ist wohl doch zu klein für diese Art. 29) Nach Lydekker auch in Hempstead, das doch sonst nut Arten der Ronzonfauna enthält. - 25) Hicher Pieter's Magiolophus 29) Nicht näher bestimmbar; vielleicht eine selbstständige Art von Palteotherunn, - 30) Wohl selbstständiges (ienus, weil un'en nur mit drei Pr verschen, sonst aber dem Pholophus rulpceps () w. Das Lophiotherium cerculum (lerv. wird von Kowalevsky hicher gestellt, von Lydekker aber zu Pachymalaphus gerechnet. Der einfache Bau der Pr spricht jedoch mehr für die Ansicht des Ersteren. — 30) Dieser Name ist der ältere, und stimmt auch Fillhol's Anchilophus Desmaresti ganz mit dem typischen Dumasi überein, ebenso Pictet's Anchilophus Gaudui (Fig. 7-12, 13?). Hieher allenfalls auch Lophiodon Prevosti Rütim. (non Gerv.) und Anchiliberium siderolithisum Rütim. — **) = Plagiolophus Valdensis Pict. XXIII. Fig. 1-3. 5 (non 4! = Palopholherium!) — **) Auch in Indhenhöven und in Cerro di Sau Isidro. — **) Auch in Concud, nach Depéret auch in Casino und Alcoi. doch zu gross, als dass es noch mit *annectans* vereinigt werden könnte. —²⁴) Hicher vielleicht Rütimeyer's Pagiolophus montus, aber dann als Milchzähne. —²⁷) Die und die folgende Art auch in Buchsweiler im Elsass (Andreac), der a*rgenfonie*us nach P. Gervais auch in Castres, Hicher vielleicht *Palaeotherum enrtum* Rütim. 11) Nach Deperet in den Tuffen der Auvergne und gleich antiquus auch XXIV Fig. 1, 2) and Hyracotherium Quercyt Fills, (letzlere als D.). St. Alban, Ob eine selbstständige Art: — ") Sonst noch in terro di san isano una ma sin in tradito in Videtto Loire, in terro di San Isidro.

11) Im Astien, den Congerienschichten und in Videtto Loire, and in traditori and sons antiones ") In sardinischen Höhlen. — ?) Nach Deperet und Forsyth Maj 2) In sardinischen Höhlen. - 3) Nach Lydekker. II. v. Meyer Manuser, -Species. 1 · Propala o herium farradum Rütim. (Fig. 51)? le-Puy, hier als modicum bestimmt, aber von dem rehten modicum der Phosphorite verschieden. -19) Is kommt wohl in Ronzon ein Pulzeotherium vor, ist aber sicher eine selbstständige 97) := Lophiotherium cercu'um Rütim.;, sowie Jupinadon Gresslyu Rhagatheriam Faldense Pict. p. p. (pl. 10) Auch in der Tourraine und in Cerro di San Isidro. ein stark abgekauter Criedodon. brezmostre P. Gerv. Macreus cocaemus Owen. -Lagomys come. beiden steht der Grösse nach D. levius Jourdan von Grive von Heggbach, Baltringen – 19 Auch in der Loutraine um Pliocin von Fulda, – 19 Nach Depéret in Suffolk, wohl Pachinolophus cereulus Gaudry (non Gervais) DUL Lagodus Fontanesi Dép. - ") Wohl Pachynolophus Kowalevsky (Fig. 8-10) Wohl doch Pachinolophus siderolitlicus sehr ähnlich. -1) Nach Lydekker. Pict. p. p. (Fig. 5, 6).

Reims																						
Londonthon																						
ban (əbnA) ləssI							X	X		$\overline{}$												
Grobkalk (Paris)	$\times \times$															
Bemlyridge (Inse								•)	×
Vaucluse (Ligni					X																	$\times \times \rangle$
Pariser Gips.									_													× ·>
Canton Waadt					•>	(X		X														٠.٠٠
Беегкіпдев									X													× ·
Rigmaringen																					Ś	\ \ \ \
Headonbed (Hor																						
Phosphorite (Q1	-	-		×	XX	<i>.</i>					X			X					/\/			//\
Cadibona (Pier											_	×										• •
												-/ `.			0- 0		0.0					
												<u>·</u>										
														<u> </u>								• •
								_				·										
														•			-					• •
									•				- 1	· ·								• • •
									•													
										•	٠	• }	XX	•	•	•			• •			
			>	< ·	٠.			•		•	٠	• >	$\times \times$. •					• •			
						•		٠	•					٠	X	•	$_{ extsf{X}}$					
			X			•		٠		-		٠			X	•	· >	ĺΧ				
IdaX ban RalA			• 0	٠. ٠					•	•				٠.	\times		• •	•				
Leithakalk.									•						X							• •
Vermes (Berner						•				•	•				X							
Oeningen.																						
Ries (Nördlinge										٠.		•										
Сеогдепадици										•					X			-				
Steinheim.															X		XX					
															۵, ۰	X						
		-		-												_						
								_				-										
				• •					-													
				-							_											
			•	•					•										-			
			•									•	• •	٠	• •	•	•	• •	•			
			•	•	• •					•	•	•		•			۰. ۰	• •	. 13.			
Pikermi.			٠							*	٠	•	• •	•			, u+ +		$\cdot \times$	(,	
Baltavar.					٠.					٠			• •	•			n	٠.	$\cdot \times$			
Belvedere Scho			•			٠.							٠.		٥		X					
Eppelsheim.			X												XX	(XX					
Вориста топ В			X						,						$\times \times$	· ·	·X				\rightarrow	< · ·
Casino (Lignite			X																			
Montpellier.	0-		X·																	X		
Rousillon,	X	X							-		•	•								X	-	
Suffolk (Red C	X	X															٥			X·		
	· × .	$\overrightarrow{\sim}$. ,						.										$\overline{\times}$.		
		\rightarrow										-								$\frac{2}{\lambda}$.		
		-/-																		$\stackrel{\frown}{\times}$	۵	
2[103#0]K		^ -									-			-	-					$\frac{\wedge \wedge}{\cdot}$		
								<u>.</u>	18			.11	. •	. 4	. 10	nze	17)		• 03		622	
					les	<u>.</u>	9	12 12	un:		uxi		112)	E,	SSI	he 7	. : #		th:	152	un.	S ²³
#		. 5			roc	les	, e	lan	SSic	· .	ayl: un	. 5	zet	.). ivu	- If	Corr	iac	-:	nat	inı	nus	ipe
	шт. 	ısi		115	эсе	oid	ens	vil	ra	tus	ټ ت	. 2	roi	(sp	old	got hle	str	13	, 20 1yg	scu	cor	latipes ²³) ndarium
	assı nis ns	ner aric	I. US ² firi	iscı	inc	pir	sel	1XO	SSE	nu	E C	- [(C) ,	۲. 'ä	. &	cin	an.	sp	spach	tru	ich m	Diplobune secundarium
	cr: aor ide	ver	ISC1	br	rh	ta Da	1.2	ನ ಸ	oe 1	Д·	un				. 8		e).		Ę,	le le	ti riu	Se
	on ster	p. hu	pri Pri	us.	on a					SD	the	(0)	1		ch)		rri¹ eriu		ro		heı	ne
1	aric s S p	ns		pir	iod					shin	rco oth	H.	=	: :	pisc	2 :	che	2 2	: "50	2 2	"lot	"Pu
	pp: uu:	pir "	2 2	ota i	phr phi	2 1		# £		rrac	np nuz	Ay			(tyl		ma		air		100	olq
ii.	H 2	Ed.		L'I	4 0					Ŧ,	2 %	, ,	4		0		7		2		A	<u></u>
	Behrerz von M. Behrerz von M. Behrerz von M. Behredere Schof Behrern. Peterni. Piterni. Jit. Luberon. C. Lyon (Croix ro. Mar. Bemboli. C. Grandigue Pyr. M. C. Croix ro. M. C. Mar. Bennoni. C. Grandigue Pyr. M. C. Grandigue Pyr. G. Grandigue Pyr. G. Grandigue Pyr. M. C. Grandigue Pyr. G. Grandigue	X Yal d'Arno su Rousillon, Aunorpellier, Casho (Spelsbeim, Bohnerz von A Bohnerz von B Bo	X X Sunion King State Control	Variety of Charles	Active St. Directors (Gers) And Control of St. Con	Morfolk. Morfolk.	X X Yourseller. X X Yourseller. X X Yourseller. X You d'Arno su Subpelserim. X X Bebriere etc. (Pressering the etc.) X X Yourseller. X Yourseller. You (Crois ref.) Beltreter Scholler. Beltreter Scholler. Allor (Spanison Cookies) Cookiese Scholler. Allor (Spanison Cookies) Beltreter Scholler. Allor (Spanison Cookies) Beltreter Scholler. Allor (Spanison Cookies) Cookiese Scholler. Allor (Gers) Beltreter Scholler. Allor (Gers) Beltreter Scholler. Allor (Gers) Beltreter Chies. Allor (Gers) Beltreter (Lignisch) Canton Wandt Allor (Gers) Beltreter (Gips. Beltreter (Gips. Allor (Gers) Beltreter (Gips. Beltre	X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	X X Yorfolk. X X And d'Arno su Yorfolk. Yorfol	Samma	Seignand State of the contribution of the cont	Nortobic Nortobic	Second Control Contr	Signature of the control of the cont	Secretary Secr	Sample Control	Action of the control	Solution Solution	Section Sect	Antonio Care Care Care Care Care Care Care Care	Action of the property of the	

55				
50 51				r Grösse ci Arten altringen. (Elsas). Exemplar Beren M. achtyhus. 10) Nicht IN ey er's cht doch was auch vollerium vollerium vollerium, viherium, Cayluxi. c' Morphol. vi elgans. Norphol. vilerium, Cayluxi. c' Morphol. vilerium, c' Cayluxi.
0				HARBER SALANDER SERVER
70				TOTA A STORY TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL THE
48 49				i. v. Me yer stimmt in der Grösse sind nach Teller allerlei Arten der Meeresmolasse von Baltringen. 7) Auch in Buchsweiler (Elsass) und sicher in Cadibona (Exemplane "Crochet" auf dem oberen M. na Baltringen. — 16) = brachypus, deiner als der vorige. — 19) Nichten, abgebildet in H. v. Me yer's 8—10, soferne dieser nicht doch Hyracodontherium Filh, was auch Hyracodontherium Filh, was auch "XXIV, Fig. 4, \$5). Caenotherium, 71 hol's Plesidacrytherium elegans, adder e. Abgebildet im Morphol., 11—13. Pr ähnlich Dacrytherium Cayluxi, 67). — 32) Hicher Piete t's Anotherium cayluxi, 67). — 32) Hicher Piete t's Caenotherium collotorrum and allenfalls auch Pietet's Caenotheri der distale Theil der Fibula
90		×		Ajnacskő (Ungarn). — 2) Der hungaricus H. v. M. eyer stimmt in der Grüsse nisis überein. Unter dem Namen arvernensis sind nach Teller allerlei Arten teskő). — 3) Auch am bohen Rohnen und in der Meeresmolasse von Baltringen. — 4) Auch in Kressenberg (Parision). — 7) Auch in Buchsweiler (Elsass) tide vermuthlich auch in Lobsann im Elsass und sicher in Cadibona (Exemplan Lydekleer auch Croizeti genannt, aber ohne "Crochet" auf dem oberen M. naux des Fonds und in der Meeresmolasse von Baltringen. — 19) = brachyphus p. p., sicher in Eppelsheim. — 18) Schr viel kleiner als der vorige. — 19) Nichts Weimar. — 29) Diese Art auch in Egerkingen, abgebildet in H. v. M. eyer's s. Hyopotamus crispus p. p. Di. XXIV, Fig. 8—10, soferne dieser nicht doch modicum Filh. — 29) Der Gesichtsschädel = Hyacodoniherium Filh, was auch wohl Ragzahrerium Valdense Piet. p. p. (Pl. XXIV, Fig. 4, 5), Caenotherium elegans. H. VIII, Fig. 44, non Fig. 45), iedenfalls auch Filh ol's Pesidacrytherium elegans. A dem Pietevischen echten Rhagatherium valden. A hypotamus crispus Piet. p. pl. XXIV, Fig. 7, 11—13, Pr ähnlich Dacrytherium, orpotamus crispus Piet. p. pl. XXIV, Fig. 7, 11—13, Pr ähnlich Dacrytherium, orpotamus v. Mey. Sp. 0, 10, 12 und pl. XXIVI, Fig. 11, 14. — 31) Hieher wohl der ohere M des den Innenrändern. — 35) = Amphimoerix P. Gerv. — Carnotherium collobrium ovale vsky's Hyopotamus (Paläont, Fig. 46) und allenfalls auch Pietet's Gaeno-12. — 39) Hier linden sich Tibien, mit welchen der distale Theil der Fibula.
				timmt in continuation of the state of the s
-		\times \times		v. Meyer stimmt in and nach Teller allurar Meeresmolasse von Auch in Buchsweil and sicher in Cadibona in Crochet" auf dem Baltringen. — 1 ⁶) = iner als der vorige. — 4. abgebildet in II. v procodomherium Filh XXIV, Fig. 4, S), C ⁶ , Hol's Pesidacytherii den e. Abgebildet in II. v i.— 13. Pr ähnlich Da ebiss des Dacrytherii den e. Abgebildet ii. v. — 23. Hicher Pic.). — 33. Hicher Pic.). — 33. Hicher Pic.). — 34. Hicher Pic.). — 35. Hicher Pic.). — 37. Hicher Pic.). — 37. Hicher Pic.). — 38. Hicher Pic.). — 38. Hicher Pic.). — 38. Hicher Pic. on der distale auch Pic. t en der distale Theil
42 43 44 45 46 47		X Y		er stimmt in Teller samolasse vom Euchswer in Buchswer in Buchswer in Cadibo tet" auf de rorige. Gen vorige. Fig. 4, 5), Fig. 4, 5), Fig. 4, 5), Abgedacrythe in II. Apgedacrythe in II. Fig. 5), Fig. 6, 5), Fig. 7, 5), Fig. 6, 5), Fig. 7, 5), Fig. 1, 5), Fig. 1, 5), Fig. 1, 5), Fig. 2, 5), Fig. 3, 5), Fig. 4, 5), Fig. 4, 5), Fig. 4, 5), Fig. 4, 5), Fig. 5, 1, 5), Fig. 6, 5), Fig. 6, 5), Fig. 6, 5), Fig. 7, 7, 7, 8), Fig. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
<u> </u>		^		stimmt stimmt Teller nolasse nolasse au Gadili mar M
45	XX	n. X · X	$\times \times \times \times$	Leyer stimunach Telle feeresmolass uch in Buck sicher in Cacincher in Soferne do So
~				yer sti ch Te. ch Te. resmola 1 in B 1 eer in Cehet" gen.— gen.— gen.— gen.— gen.— hildet soferne soferne pontherii , Fig. d Pessida Pessida Pessida Pessida Pessida Pessida Pessida Pessida pontherii on Pessida pontherii on Pessida on Pessid
4		O-1 O-1 X		— 2) Der hungaricus H. v. Meyer stem Namen arvernensis sind nach Telebohen Rohnen und in der Meeresmolssenberg (Parisien). — 7 Auch in Fin Lobsann im Elsass und sicher in rizett genannt, aber ohne "Crochet" ader Meeresmolasse von Baltringen.— heim. — 19 Sehr viel kleiner als der Art auch in Egerkingen, abgebildet p. p. pl. XXIV, Fig. 8—10, soferne Der Gesichtsschädel = Hyracodomher/ zaldense Pict. p. p. (pl. XXIV, Fig. 2dlense Pict. p. p. (pl. XXIV, Fig. 3dlense Pict. p. p. (pl. XXIV, Fig. 44–57). Hill pressum Filh, das Milchgebiss des Da pressum Filh, das Milchgebiss des Da jver, Taf. V, Fig. 64–67). — 32). Hill XVII, Fig. 11, 14 — 34). Hilcher wol Must (Paläont. Fig. 46) und allenfalls and sich Tibien, mit welchen der dista
ത			· · · × · ×	yye character in the solution of the solution
₹				yer stimn the Telle resmolasse h in Buel her in Cad her in Cad cohet ^a auf nogen. — I sofer vo telildet in soferne di tentrium r, Fig. 4, r, F
<u> </u>	· · ×		· · · · · × × · · · × × ·	Meye nach inches nach i sicher Sicher Crocke tringer in als Sicher Crocke i als Sicher Sicher i als Sicher i als Sicher i als Sicher i als Propertie Properties Prope
	//// // //	V VV V		icus H. v. Meyer neursis sind nach and in der Meeresm nd in der Meeresm nh. — 7) Auch in Elsass und sicher i Elsass und sicher i Sec von Baltringen viel kleiner als de erkingen, abgebild f. Fig. 8—10, sofer lel = Hyracodonth p. (pl. XXIV, Fig. 40—67). — 3) Fig. 7, 11—13. Pr. S. Milchgebiss des J. Gerv. — 3) Hieber v. 2 Gerv. — 3) Hieber v. 2 Gerv. — 3) Hieber v. 2 Gerv. — 60, und allenfalls it welchen der dis
$\exists XXX$	$\langle XX \cdot X \cdot X \rangle$	$X \cdot XX X$	<u> </u>	s H. v. I in der I in
♀				H. v. its since in der in der in der in der in der ohne i, siss und ohne i, vom Bis B. its B.
39 <u>+0</u>				ws II. "us III. "us III. "is and din dd "is and dd "is an
				v H. v. Mey sind nac in der Meer — 7 Auch saxs und sichs axs und siche obne "Croc von Baltringen, abgel ig 8—10. s — 10. XXIV, ch Filh ol's — 3. Milchgebiss d 54—67. — 3. Milchgebiss d 54—67. — 3. Milchgebiss d 60 und allenfe welchen der en state of the sind of the side
ρ				ws. — Sas in it in the interview of the
3				- 1.2 % [1.4] (2.5) (2.5) (2.5) (3.6) (3.6) (4.4) (4
$5 \times \cdot$				garicus garicus sernicus sien). m Else, aber in ales in ales in ales Egerk IIV, E hädel das N. Fig. 6 frig. 6 frig. 6 frig. 6 frig. 6 frig. 46 fri
5				tungaricus H. v. Meyarveenensis sind nachbuen und in der Meere Paristen). — 7 Auch un im Elsass und siche unt, aber ohne "Croch escendasse von Baltrings") Schr viel kleiner als in Egerkingen, abgeb XXIV, Fig. 8—10, so ttsschädel — Hyracodovict, p. p. (pl. XXIV, rict, p. p. qquadherium valdenve. XXIV, Fig. 64–67). — 32 V. Fig. 64–67). — 34 V. Fig. 64–67). — 35 V. Fig. 64–67). — 36 V. Fig. 64–67). — 36 V. Fig. 64–67). — 37 Viliebe himoerix P. Gerv. — 6 Ont. Fig. 46) und allenfalien, mit welchen der vien.
o				T SPETHS NEW STATEMENT OF THE
9				von Ajnácskő (Ungarn), — 2) Der hungaricus H. **Rensis überein, Unter dem Namen arvernensis stjnácskő), — 3) Auch am bohen Rohnen und in d. **Levelide vermuthlich auch in Lobsann im Elsass von Lydekker auch **Croizet genannt, aber ohn con Lydekker auch **Croizet genannt, aber ohn in Weimar. — 2) Diese Art auch in Egerkinge in Weimar. — 2) Diese Art auch in Egerkinge ett's **Lyopotamus crispus p. p. pl. XXIV, Fig. **R. **modicum Filh. — 29) Der Gesichtsschädel — I am odderum Filh. — 29) Der Gesichtsschädel — I am odderum Filh. — 29) Der Gesichtsschädel — I al. VIII, Fig. 44, non Fig. 45), jedenfalls auch Fillich dem Pietet'schen echten **Khageatherium von Hypopotamus crispus Piet, p. pl. XXIV, Fig. 7, 45). Dazu **Atotherium depressum Filh., das Milch L. v. Mey s. R. (Rü tim eyer, Taf. V. Fig. 64—6 Higopotamus crispus Piet, p. pl. XXIV, Fig. 11, 14. — 3 ann den Innenränden. — 35) — Amphimoerix P. G. Ko wale vs ky's **Hypopotamus (Paläont, Fig. 46) un oden 12. — 39) Hier inden sich Tibien, mit welel.
+) Der h. Namen en Roherg (H. Lobsan, i. genan p. pl. 2. Gesicht
Ö			· · × · · · · · · · ·	Der Nameren Roberg Lobsameren Roberg Lobsameren Roberg Robe
5				- Dr. Hat Loger a Processo
ۍ				been Nambeen Nambeen Nambeen Nambeen Nambeen Nambeen Lo on der Marcia Art a Art a Art a Art a P. Cechten Lt. P. P. Cechten Nambeen Nambee
21				lem Ni hoher Ni hoher Ni hoher Sessenbo Care
J				- I have been been been been been been been be
0				dem ham hohe ham
2				11) — 3) Der gr dem Name am hohen R Kressenberg auch in Lobs and in der Me ppelsheim. — 40) Der Gesium P. Der Gesium P. Der Gesium Fig. 5) Der Gesium Fig. 5) Der Gesium Fig. 5) Der Gesium Fig. 6) Der Fig. 7) Der Fig. 6)
n				ndeskő (Ungarn). — ²) I überein. Unter dem Na.). — ³ Auch am bohen ⁹ Auch in Kressenbe vernuthlich auch in Lodekker auch Croizeti dekker auch Croizeti des Fonds und in der I., sieher in Eppelsheim. mar. — ²) Diese Art i popotamus crispus p. p. vum Filh. — ²) Die Gart i popotamus crispus p. p. vum Filh. — ²) Der Gg. II. Rhagadherium crispus p. p. vum Filh. — ²) Der Gr. Filh. Filh. — ²) Der Gr. Film. Pict. p. p. vu Advolterium depressu ey. sp. (Rütim eyer, "). Tu and pl. XxVII. Innerränden. — ³⁰) — ² i evsky's Hyopotumus (F. — ³⁰) Liler inden sich
3				deskő (Ungari überein. Unter), — °) Auch °) Auch in vermuthlich a Jekker auch des Fonds un , sicher in Ep nar. — °) D popotamus cris nar. — °) D popotamus cris nar. — °) D popotamus cris nar. Filh. — "" Fils, 44, no m Pictet'sch mp orispus I
5 .				(Unga Auchan Auc
4				n Ajnácskő (Ung nsis überein. Un ácskő). — ⁹ Aud 1. — ⁹ Auch i oride vermuthlich haux des Fends p. p., sicher in Weimar. — ²⁹ 's Hyopotamus, wohl Kagagath, Ar VIII, Fig. 44, ch dem Pieter' wohl Kagagath, ch dem Pieter' vohodamus erizpu v. Mey. sp. (R.
				nnacskő (U überein.)). — ¬) Auc. vermuthl des Fon mar. yopotami Yaga tem Fill Ritag tem Pict man czi cm Pict nama czi za Adrot ey, sp. 1 Ino. 12 p.
1				Kő – A – E.
1				von Ajndeskő (mensis überein jnáeskő). – ⁹ yss). – ⁹ Au sss). – ⁹ Au srotide vermutl on Lydekkel on Lydekkel m. p., sichet in Weimar. – et's Hyopotam f. modicum Fi f. modicum Fi f. modicum Fi f. wodicum Fi f. wodic
				Ajnacsł Ajnacsł sis über ceskő). – " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1				Afjinde Afjinde Afjinde Afjinde Afjinde Affinde Affinde Afjinde Afjind
f				Ajná Ajná Ajná cskő). — c titác ve Lyde Lyde Lyde Lyde Lyde Lyde Lyde Lyd
6				(von Ajnà expensis ü Ajnáeskő). Sass). — Sass). — Serotide v Von Lyd A Chaux d A Chaux d In In Weim It et's Lfy It
				in voi d Ajin d Ajin Elsassi inocero inocer
4				ocen von Aj arvernensis and Ajnácske Elsass. — Rinocerotide 13, Von Ly in la Chaux innutum p. 1 Pictet's In pictet
3				uch noch im Pliocän von Ajadeskő (Ungapsabgüssen des arvernensis überein. Un arn (Schönstein und Ajadeskő). — 3) Auc Buchsweiler (im Elsass). — 9) Auch in — 19) Dieser Rhinoceroide vermuthlich Heuroversos. — 13) Von Lydelker auc in Hobenhöven, in la Chaux des Fonds uiense. — 17) = minutum p. p., sieher in Inanense. — 2) Auch in Weimar. — 2), und M.) von Pieter's Hyopotamus e. n Bainern; = Anophoth, modicum Filh. — die vorige Art. Hieher wohl Rhagadher, L. Pr sehr einfach, ähnlich dem Pieter's Hyopotamus Graspus ännt. Taf. VIII, Fig. 44, 29-phetriiden. — 28) = Hyopotamus crispus ännt. Taf. VIII, Fig. 44, 29-phetriiden. — 28) = Hyopotamus crispus ännt. Taf. VIII, Fig. 45). Dazu Adrolleri photamus Grassbyi II. v. Mey. sp. (Ri Prioùdez, pl. XXXVII, Fig. 9, 10, 12 und zu starke Vorsprünge an den Innenfänder um Cuv. Blainv. = Kowalevsky's Hy
1				m Plic des tein u Plic des tein u x r (im x r (im x r (im x r (im x r)
5				described by the second of th
0				HE STONE CONTRACTOR
- · · ·				th it is seen in the property of M_1 . In $t = -\frac{1}{2}$, M_2 , M_3 , M_4 , $M_$
				och i issen choch i issen chon i issen chons sweil issen chon properties of the chon chon chon chon chon chon chon chon
)				noch im P (Schönstein Psweiler (i Schönstein h)sweiler (i q) Dieser vocatos. 1. (Schönstein i q) Dieser vocatos. 2. -1^{7}) = -1^{7} and M_{1}) vor and M_{2}) vor and M_{1}) vor M_{2} and M_{2}) vor M_{3} and M_{2}) vor M_{3} and M_{3} vor M_{2} and M_{3} vor M_{3} and M_{3} vor M_{2} and M_{3} vor M_{3} and M_{3} vor M_{3} and M_{4} vor M_{2} vor M_{3} and M_{4} vor M_{2} vor M_{3} vor M_{3} vor M_{4} vor M_{2} vor M_{3} vor M_{4} vor
				uch noch im Plio psabgüssen des ern (Schönstein un Buchsweiler (im Plio Dieser Rohlerseros. — 10) Dieser Rohlerseros. — 17) — m. Hohenhöven, itense. — 17) — m. anense. — 21) A. an Baiern; — An an Baiern; — An die vorige Art. Tyopotamus (Palä Cheritaen. — 28 to sehr einfach photheritaen. — 28 to
				uch Pisab Pisab Pica Pica Pica I un II I
				auch an auch an auch an Bu. plen an
, , ,				
1				h Tellor iegenden in von Ur ") Auch De'p. Tarn De'p. Tarn De'p. Tarn ") = ssicher abe sicher abe sans Achnlich (alsdam appenheim appenheim appenheim kleiner a alevsky't sicher A Siche
				h Tellc iegenden in von U obp. Tar Deb. Tar Deb. Tar Deb. Tar Sicher ab (alsdam Achnlich (alsdam Appenhein Appenhein Appenhein Sicher a Sicher a Sicher a Sicher a Sicher a Sicher a Sicher a Anopha
				h Tell h Tell it gende in von $^{(1)}$ Auc Dép. Tell Dép. $^{(2)}$ Auch $^{(3)}$ Sicher $^{(3)}$ = $^{(3)}$ Achnlic (alsda appenhe appenhe appenhe $^{(3)}$ Esicher evsk y evsk y evsk y vielleic $^{(3)}$ S Ano, $^{(3)}$
		* * * * * .		h h Te iegen in voor in voor in voor in voor in voor in voor of in voor in voo
				auch in Casino, nac: mit den mir vorli mgaricus im Plioci n Heidenbeim. Nur in Braconac. Nur in Braconac. 11) = gramatense. 3elvedère Schotter, v. Mey. Man.). in Canton Waadt im Canton Waadt im Bohnerz von P. hat. — 20, Noch hat. — 20, Noch ig. 12), sowie Kow iel grösser als Kipl bune* und Fig. 13, fyopotamus Kowal c. — 3) = Plieber nteren M haben für Blainv. = Dickoo, VI, Fig. 6) und ?
				asino, nac mir vorli mir vorli mir plioci heim. Anachae. Schotter, Man.). $\therefore -2\eta$ Mileber over als $Xipi$ d Fig. 13. $\therefore Fover als Xipi$ Higher $\therefore Fover als Xipi$ of Fig. 13. $\therefore Four als Xipi$ $\therefore Four als X$
				- S. H. HASS. ROSK MOSSECUL
1				n Casin den mi casin den mi casin mi c
				- 8- 485 N X 2 2 2 8 8 2 2 8 1 1 1 2 3
				SS SS I BE do les con
				Fasia . Good La Company
				CHEST SELEBBLI SELES
				- all sale all all all all all all all all all
				L Taging H J KactiE P SA N Sa x N。
				SKE O SH TE SEE HE LESSE
				- rada 9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
				Service Transfer and the service of
				Tage Tage Note to be a second to the second
	H		arvulum 3 sp. 36) egans ense 30) tettense im	Service State Service
			obs.	President of the state of the s
: : :	H 33		ttt	P. KOKE PAPER KIESE C. H. HE BE
: : :	 [29] 130] tum³			TO SECTION OF THE LOSS OF THE
: : :	6)	wa-	er m. teege 3r	
yi	s ²⁶) luxi ²⁹). num ³⁰).		par	Ser a de
: : :	ayluxi ²⁹) ayluxi ²⁹) vinum ³⁰) . spidatum ³	(e ³⁴)	m par m par l eleg alden hnste latum um	N. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
: : :	gans ²⁶) Cayluxi ²⁹) . ovinum ³⁰) . E cuspidatum	cile ³⁴)	um par par par par par par par par	1) Ni Ueb Ueb Pom. Pom. Dep Uraci Uraci P. P. P. P. P. P
: : :	sp. 27) capluxi ²⁶) covinum ³⁰) covinum ³⁰)	racile ³⁴)	rium secunda- rium parvulum ? sp.³0, rium elegans m valdense³3) frohnstettense spidatum rvinum ohnstettense	1) Nach Depéret auch in Casino, nacm Uebrigen recht gut mit den mir vorlifasst. Der typische hungarieus im Piloci Pom. — 4) Auch in Heidenheim. — m Dép. Hérault. — 9) Nur in Braconac. Ginchener Museum. — 11) — grannatense. Depéret auch im Belvedère Schotter, Chaux des Fonds (H. v. Mey. Man.). — 3 Hyacodon nebrascensis Leidy. — 29, Vielleicht auch im Canton Waadt andige Art ist. — 24) Im Bohnerz von P. andige Art ist. — 24) Im Bohnerz von P. i. p. (pl. XXVI, Fig. 12), sowie K. ow Ikleine Arten, nicht viel grösser als Xipl. Taf. V, Fig. 3, "Dichobune" und Fig. 13, Dichobune Sovints Owen. — 31) Hieher cervinus Owen. Die unteren M haben für Enzichobune obliguum Blainv. — Dichobune ist vie for P. (pl. XXVI, Fig. 13. — 3) — Pietet cervinus Owen. Die unteren M haben für erzeiter p. (pl. XXVI, Fig. 6) und ?
	elegans ²⁶) ² sp. ²⁷)) capturis ²⁶ ovinum ³⁰). m cayluxi ²⁶) capturis ²⁶ capturis ²⁶ .	gracile ³⁴) magnum herium prin	herium section per herium section per herium per herium elegium valden lum valden lum valden per herium servinum servinum servinum servinutum s	in Ueb gefasst. J Ni in Deb in Dep in Dep in Dep in Dep in Dep in Dep in C. L — 29 istandige in neuer ict. P. P in Ikleine 6. Taf. V Dichobu D
	elegans ²⁶) 2 sp. ²⁷) rium Cayluxi ²⁹) ovinum ³⁰).	(182) n gracile ³⁴) magnum otherium prin	ntherium secundantherium parvulum ? sp.30, 38, 38, therium elegans rium valdense30, 40, touspidatum cervinum . sp. frohnstettense . sp.	h im Ueb ningelasst. Jerri Pom. vieri Pom. a Minchen ach Dept la Chaux als Hyrach lytt.—23 yistfändige ker neuerr Pict. p. p. wei kleine 886. Taf. V wei kleine = Dichobuu ides, pl. 2 nus cervim ides, pl. 2 nus cervim ides, pl. 3
	elegans ²⁶) 2 Sp. ²⁷) 2n. ²⁸) terium Cayluxi ²⁹) ovinum ³⁹)	yji ⁸³) lon gracile ⁸⁴) magnum lontherium prin ⁵)	in the section of the	1) Nach Dep'eret auch in Casino, nach im Uebrigen recht gut mit den mir vorlinnengefasst. Der typische hungarieus im Piloci Frieri Pom. — ⁴) Auch in Heidenheim. — Nur im Dép. Hérault. — ⁹) Nur in Braconac. — ¹⁰) ach Dep'eret auch im Belvedère Schotter, in la Chaux des Fonds (H. v. Mey. Man.). — ¹⁰ as Hyracodon nebrascensis Leidy. — ²⁰ , Vielleicht auch im Canton Waadt eript. — ²⁹) Vielleicht auch im Canton Waadt sibstständige Art ist. — ²⁹) Im Bohnerz von Pikker neuerdings constatirt hat. — ²⁰) Noch if Piet. p. p. (pl. XXVI, Fig. 12), sowie Kow Zwei kleine Arten, nicht viel grösser als Kipl in Dichobune. — ²⁰) = Hyopotanuer Kowallich Dichobune. — ²⁰) = Hyopotanuer Kowalle — ²⁰ = Hyopotanuer Myopotanuer Kowalle — ²⁰ = Hyopotanuer Myopotanuer Myopotanuer Myopotanuer Myop
Quercyibavaricum ²⁴)	gen. 2 sp. ²⁷) gen. 2 sp. ²⁷) gen. ²⁸) therium Cayluxi ²⁹) ovinum ³⁹) therium cuspidatum ³	skyi ⁸³) 10. ³³) odon gracile ⁸⁴) magnum odontherium prin	msecondonuerium secondontherium paragen.37 secondon secondo secon	auch im Ueb nmengefasst. Jeirrieri Pom. Nur im Dép. Nur im Dép. n im München n im München n in Jeinstein Pop. n in la Chaux ser als Hyrac, n in la Chaux n in la Chaux n in la Chaux ser als Hyrac, ser is selbstständige e kk er neuer eri Pict. p. p. 7 Zwei kleine
" Quercyi	elegans ²⁶) gen. 2 sp. ²⁷) gen. ²⁸) rytherium Cayluxi ²⁹) totherium cuspidatum ³	evskyl ³²) sp. ³³) hodon gracile ³⁴) magnum hodontherium prin	ium	1) Na amench im Ueb) ammengelasst. Poirrieri Pom. 9) Nur im Deb. 9) Nur im Deb. 14) Nach De pë (ch in la Chaux sisser als Hyrace riser als Hyrace also e selbstständige de ker neuerilleri Pict. p. p. 27) Zwei kleine vib. 1886. Taf. V ähnlich Diplobut 360, am Son am Liberioides, pl. 3 Achobums cervim Gerv. — Dichobut Rhérioides, pl. 3 Achobums cervim Reneveries serving
	ele gen. 2 sj gen. ²⁸) . therium "therium	levsky! ³²) levsky! ³²) 2 pp. ³³) Xiphodon gracile ³⁴) Xiphodontherium primae- vum ³⁵)	a dont gen.3 gen.3 gen.3 gen.4 gen.4	ch im tengefi rrieri rrieri rrieri im Min Min Mach n la C als als als als als als als als als als

		Caenotheriu "	Brav. ³) .	: :		Plesiomeryx	2 2	s 1	Dichobune	: :	Spaniotherium	Cebochoeru	nov. gen. **) Gelocus con	sp. Phaneromer	Pseudogelocus suevic		"Lophiomeryx	Currentomorne	crypromery "	Prodremother Palaeomervx	"			" "	Palaeomery	dius p. p.)
		Caenotherium laticurvatum ¹) metopias ²)	Brav. ³)	elongatum Filholi ⁴)	sp	Courtoisi ⁵)	sp. 6)	gracilis')	Dichobune leporinum ⁹)	Campichi ¹¹)	m.")	()	nov. gen.**)	" sp	cus suevicus ¹⁷).	medium		minor ¹⁸)	major	Prodremotherium elongatum	Bojani ²⁰)	Kaupi^{21}).	lemanensis ²³)	Boulangeri ²⁴).	Palaeomeryx Pomeli (= me-	
	Norfolk,				•							•						•			•					
	Val d'Arno sup.																									• (
	Perrier etc, (Puy do													•								. ,				- 0
	Suffolk (Red Crag),			• •		-														•						
	Rousillon, Montpellier,		• •						-			-									•		- :			• 0
	Casino (Lignite).				• •	•	• •					•	• •	•				• •	•		•					·t
irch ete.	Bohnerz von Mössk																									• 5
	Eppelsheim.																									
	Belvedère Schotter.							• •				·														
	Baltavar,																									. 7
(Joniono IV) do	Pikermi.					•						•		•		÷										. (
	Mt. Luberon. Cucur		• •			•			-			· ·		<u>. </u>		•		• •	•							. ;
-1.	Alcoi (Spanien).				• •	٠				•		*	• •	•		•	• •	٠.	*		•					• •
-(na	Cerdaigne (Pyrenä					•	• •							•		•			•		-			•		. ;
(vavo	Mte, Bamboli (Tos									•									٠							1.
Bayorn).	Dinotheriumsandonid											_													-	. 0
	Günzburg.													_								<u> </u>				0.00 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 0
	Sables d'Orléanais,			• •											_		_									. 0
40170	Grive St. Alban (I Simorre (Gers).	* •				•																				Ğ
	Steinheim.		• •	• •																						. 6
	Georgensgmünd,																					_				. 6
	Ries (Nördlingen).	• •								•									•		•					٠,٣
	Оеліпеел.																-			-						.00
ıra).	Vermes (Berner Ju																								-	1.
- 4	Leithakalk.	• (1.												•						·×						.00
	Elgg und Käpfnac Koble von Steierm	• • •																	•	· X.				٠.		.0
137 ****	Sansan (Gers).			• •			•		• •			*, *									$\stackrel{\sim}{\times}_{\times}$			•		.0
ingen).	Ulm (Haslach, Eck	_XX	X ·					• •				• •	•	•	• •								$\times \times$	X		X8
	naassisW) zaiald	XX												•								X	X ·	(h.)	>	X
(Allier).	St. Gerand-le-Puy	XX	X·				•>	< ·						• ,								X,	XX	X	>	Χõ
	Marnes lacustres (X :				•	<u> </u>																		- 20
	Ronzon (Haute Lo						·>	<u>X</u>							<u>`</u>										-	5
	Hembetesd (Engls				•		•										•			•						-6
	Fontainebleau.		0												•		•						n.,			20
,(3	Cadibona (Piemon														•											7
	Phosphorite (Quere		X	××>	× .	XX	X		XX	XX	(X)		$\times \rangle$	<	X	XX	×ς	. X	$\times \rangle$	<						41 4
.(II)	Headonbed (Hordy																									19
Bohnerze,	Sigmaringen Egerkingen					•			<u> </u>	•																25 36 27 38 30 40 41 49 43 44 45 46 47 48 49 50 51
	Canton Waadt					•			·	<u> </u>																4.5
	Pariser Gips.					٠			Χ			• •														146
•	Vancluse (Lignite)				,	X			X		>	<Χ														47
.(idgiVi	Bembridge (Insel																									48
	Grobkalk (Paris).																									495
	To II (obit b) foss!																									
genton (Indre)	Londonthon.																									75.

101 112 13 114 115 116 117 118 119 120 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 115 113 114 115 114 115 114 115 113 114 115 114 114	Jgg). Jggibt, old am er als er als ende mant, rium. coleti (fan.). ciner einer einer einer einer einer des dass eicher odes einer
200	erwechslung der Lecalität (etwa hoher Rohnen statt Elgg). "" (frösser als cadurennen, als Filhol angibt, "") (frösser als cadurennen, "") Grösser als cadurennen, "") Grösser als cadurennen Müller Rütim eyer. — "") Grösser als urinum Blainn. 3. Figur) — "") Diese und die folgende fer von P. Gerva is algebildet. — "") en Müllerimm, ist schon von Leidy für einen Tylopoden vergeben, stese), Nach H. v. Meyer Mannser, offenbar — Nicoleti sansis. — "") Auch am hohen Rohnen (ff. v. Mey. Man.). 1 und im Canton Waadt (hier natürlich ebenfalls in einer schon viel zu lange Ps, und ist das Vorkommen einer pygmaeus aus dem Obermiocän, dem *pygmaeus* des hie von Leiding. Ist wohl = *Cervus Partschi* K aup. — Angabe P. Gervaris' (Zool. et Pal. gen. p. 161), dass rund als *rigonocerus K aup. auch im Dep. Ister. Sichen und im Obermiocän von Schlesien. Ist identisch mit ro. — "") = *Dremotherium* Deperet. — "") Nach Deperet einer "") — "") = *Cauvieri, algestellte Art wohl doch zu klein. — "") Nach Deperet
6	traft of the control
La mH	en s ilh (d)
4	ohm na na uch poocenb poocenb refer. re
<u>G</u>	rrR Solling Tyle off cm cm cm cm (1. g
1	ohenmee (1) Dobe ohen na e y o
<u>0</u>	va h. kom h. kom h. kom h. kom h. kom h. kom dilde dass cina dass cina dilde dass cina dil is occin con h. et c. e
T T	(etvo
	ität rten oree oree oree oree oree oree oree or
SS	ocal Min A M
	er L melals als als als als als als als als als
98	gg de de lijch kerr kebn kebn kebn kebn kebn kebn kebn kebn
ਲੋਂ ਸ ∨	slum virks Dic Dic Dic Dic Nac Im C Nac Nac Nac Nac Nac Nac Nac Nac Nac Nac
88 × 88 × 88 ×	cch v cy v vo sic
& X	Terw "more of the control of the co
8 · · · · ××××	im (ol. ol. ol. ol. ol. ol. ol. ol. ol. ol.
8 · · · ××××	Chaptuzat, also den Mergeln von Cournon. — ⁹) H. v. M. Wohl eine Verwechslung der Localität (etwa hoher Rohnen statt Elgg). — ⁴) Gleich dem folgenden von Lyde keer ausgeschieden. Bass im Quercy wirklich mehr Arten vorkommen, als Fithkol anglau. **Andrewium Courtoist P.** Gerv. **Pestonerry granquatebutatus Fithkol. — ⁶) Grösser als cadurents. — ⁷ Soll nach Fithkol anglaublich ist. — ⁸) Grösse des cadurents; aber auffallend langer P ₂ . — ⁹) = Dietsbure Mülleri Rütim eyer. — ¹⁰) Grösser als line. — ¹¹) = robertinaum P. i. erv. run Milegelis; .**Diebolure murinum Blain v. 3. Figur) — ¹⁷ Diese und die folgende and en zienlich problematisch. — ¹⁸) = Kühodon gelgens P. i. Gerv. Alter nicht sicher. — D c.p. Herault, daselbst auch Zuleoflerium. **Set. Morph, Jahrb. 1836. Tal. V. Fig. 20. Der Name Pootomery, ist schon von Leidy für einen Tylopoden vergeben. **Jahch in Baltringen (Meeresnolasse) und nach P. Gervais im Orlémais. — ⁸) Auch in Baltringen (Meeresnolasse) und nach P. Gervais im Orlémais. — ⁸) Auch in Baltringen (Meeresnolasse) und nach P. Gervais im Orlémais. — ⁸) Auch an hohen Rohnen (H. v. Mey. Man.) **Jahch in Baltringen (Luchofitz). — ²⁹) Mach Lyde ke er auch in Ronzon und im Cauton Waadt (hier natürlich ebenfalls in en an und für sich überaus unwahrscheinlich. — ²⁹) Auch an aber schon viel zu lange P*, und ist das Vorkommen einer nan und in der Kohle von Steiernark. Die dertige Form hat aber schon viel zu lange P*, und ist das Vorkommen einer ann und in der Meeresnolasse von Hobenlöven und in der Braunkohle von Leiding. Ist wohl en Gervais Formeren. **Jahs dieraneeros K aup, nach Deper et auch im Belvedère-Schotter und als **rigonocents K aup, auch in Grissen und in der Meeresmolasse von Baltringen, in Glinbach bei Giessen und in Obermiocäin von Schlesien. Ist identisch mit Gervais, Bull. soc. geol. T. X, p. 159, pl. VI, auch in Cerro di Gasa Isideo. — ³¹) = Dremotherium Deperet. — ³²) Nach Lydekker's Angaben. Dies gilt auch von den folgenden. — ³¹) — ³¹ — ³²
89 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Vohologia Pologia Polo
920	MI. A den. A den. A su de
61	M. J. Shiping and J. S.
2. · · · × · · × ·	.v
81 · · · · · ××··	aus
2 · · · · ××× · · · · · · · · · · · · ·	ker ker Tra Amarian Nation On a Supplemental The Distribution The Community of the Communit
<u> </u>	also den Mergeln von Cournon.— ich dem folgenden von Lydekker Courtoist P. Gerv. Plesionerits 1, — ** "b" Grösse des cadureerits, "b" ist.— ** "b" Grösse des cadureerits, "b" iemlich problematisch.— ** "b" » " " " " " " " " " " " " " " " " "
<u><u>+</u> · ×× · · · ×× · · · · ×× · · · · · · ·</u>	urre urre urre V.Y.
	n C cad cad cad C c cad c c c c c c c c c c c c c c c c c
	n vo. r. v. r. v. T. T. T. T. T. T. T. T. T.
<u>41</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o den Mergeln dem folgenden virleist P. Ger
≅ · · · · · · · · · · × ₹ · · · · · · · · ×	Merological Property of the pr
<u>a</u> · · · · · · · · · · · ×	also den Meisich dem folge Courtoist P. Courtoist P. Sist. — 8) Grö ist. — 70bertia iemlich prob Nouteit Fill h, Jahch. 1 in la Chaux in Baltringer Böhmen (Tuu in la Chaux in Reconstruction of the Kol für sich über Kol für sich
<u> </u>	lso our de
e · X · · · · X X · · · · X	ut, a Clark in it in in it in
∞ · · · · · · × × × × · · · · · · · · ·	otuzzenia (h. 1970) (h. 19
<u>ω · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>	Chaptuzat, 1. — 4) Gle motherium glaublich line.) — 4 d daher z reatherium ser. Morp ser. Morp 11) Auch 12) Auch 130 Auch 131 Auch 132 Auch 132 Auch 134 Auch 135 Auch 136 Palaber 137 Auch 138 Auch 1
10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in (den den m gand und Dor ooss ooss vie richl III. III.
4 · · · · X	lgen kau kau Lam nnt mnt mnt HC ki, J HC in in in in in in in in in in in in in
61 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	an fo 1-5) bei bei 1-5) bei 1-5) s S s S s S s S s S s No nou- n
H	kkke den, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	1) Nach Lyde kker auch in Chaptuzat, also den Mergeln von Cournon. — 2) H. v. M. M. Wohl eine Verwechshung der Localität (etwa hoher Rohmen, als Filhol angibt, schert ziemlich sieher av sein. — 5) Generotevium Courtoist P. Gerv. Presonners and general sein. — 5) General Scalar Course. — 19 Gleich dem folgenden von Lyde kker ausgeschieden. Dass im Query wirklich mehr Arten vorkommen, als Filhol an beiden Localitäte vorkommen, was kaum glaublich ist. — 19 Grüsser als general sein. — 5) Grüsser als die vorge Att. (In Bose negre bei Lamandlae.) — 11, — robertianum P. Gerv als algeblater Rittim eyer. — 19 Grüsser als die vorge Att. (In Bose negre bei Lamandlae.) — 11, — robertianum P. Gerv als algeblater and alla in v. 3. Fright) — 17 Diece und die Gattung sind sehr mangelhaft bekennt und daher ziemlich problematisch. — 19 Naticibel kein Suide. Oberkiefer von P. Gerv als algeblater. — 19 J Rumandlae.) — 19 Gattung sind sehr mangelhaft bekennt und daher ziemlich problematisch. — 19 Naticibel kein Suide. Oberkiefer von P. Gerv als algeblater. — 19 J Rumandlae.) — 19 J. Auch in Bartingen (Medoritz) — 19 Naticibel kein Suide. Oberkiefer von 1. K. Naticibel kein Suide. — 18 J. Lyde kker. Sehr unsicher! — 19 J. Auch in al. Chaux de Fonds und Ingeghane. Problemery. School Rich Raman schon an und in der Kohle von Steiermark. Die dortige Form hat aber schon von Leid ying Raman schon an und fin sek Naticiber Raman also den Volkere Suider Ramandlae. — 27) Auf dieses Thirte bezielt Ramandlae. Der viel Rohere Zahrkrone. — 27) Auf dieses Thirte bezielt Ramandlae. Schoolemme. — 27) Auf dieses Thirte bezielt Ramandlae. Schoolemme. — 27) Auf dieses Thirte bezielt Ramandlae. Schoolemme. — 27) Auf dieses Ritter bezielt Ramandlae. Schoolemme. — 27) Auf dieses Ritter bezielt Ramandlae. Schoolemme. — 27) Auf dieses Ritte
sis sis	den r zuurko den r zuurko den r zuurko des den
pracilis (= Partschi us p. p. p. Pop.26) Pop.26) Pop.26 Po	Nach chie chie chie chie no wach in I I I I I I I I I I I I I I I I I I
meryx gracilis (== p. p.) meryx Partschi pygmaeus p. p. minimus sp. sp. sh minimus da sp.) minimus selgans sh furcatus sp.) furcatus sp.) furcatus sh furcatus sp.) furcatus sh furcatus sp.) furcatus sp.) sp.	1) Nach sicher verschie t ziemlich siche (Localitäten v. rige Art. (In l g sind sehr m. rv. pl. XXXX = Protomer Lydekker. ch Lydekker. ch Lydekker. ch Lydekker. miocän-Bildung miocän-Bildung miocän-Bildung auch Localitäten st auch Leman miocän-Bildung st auch Leman miocän allerd perso gross wi penso gro
meryx grace; p. p.) meryx Parl meryx Parl meryx sp. min ila sp.) meryx floure erus elegan furcat furcat lunatus ³⁰) sp. ³¹) sp. ³¹) lus nesche Cusanu bulade Mathen Pentel is Perrieri etueriaru cylindro cylindro cylindro cylindro cylindro cuttocer daus ardeu ramos dicran oorbonicus sardinensisstralis ³⁴). tenoides latifrons ³³) Savini	ler emli ocali ocali ocali ocali ocali ocali ocali oli oli oli oli oli oli oli oli oli o
lacomeryx gracilis (- dius p. p.)	Sici. Int zi, Int z
Palaeomeryx gracilis (==me- dius p. p.)	heint heint e den e e e e
Al Bi Co Din Pa Pr	

	anana so amelopsi Iyaemos in felladott rottagoceri ralaeory n alaeotra	Palae°rea Antidorca Gazella d Bo Antilope	Bos elatus . Leptobos St Haplomeryx Listriodon s Sus Strozzii arverne antiquu	", eryman Depéret) ius provinc palaeocr Iyotherium ", ", ", ", ",
	Dama somonensis Camelopardalis attica Hyaemoschus crassus ¹ guntianus ² Jourdani Frotragocerus Chantrei Protragocerus Chantrei Tragocerus Analtheus ³ Valenciennesi brevidens brevidens " bradedaphus Skoueni	s L s R s R s R s eper orbc orbc rect hast ard Cor	Bos elatus Leptobos Strozzii Haplomeryx Zitteli Listriodon splendens ⁷ Sus Strozzii " arvernensis " antiquus	a - a
	ulis attica s crassus. ¹). guntianus. ²) Jourdani um Duverno, us Chantrei amaltheus. ³) allasii revidens s Roueni s Roueni s Roueni s Roueni	ermayer nii a^4)	ii eli dens ⁷)	thius (nach alis hoerus ⁸) Sömeringi ⁹) medium ¹⁰) choeroides Waterhousi Weissneri ¹¹) sp. ¹² st typus ¹⁸)
	(oyi			
Norfolk,				
Val d'Arno sup.		× · · · × · · · · · · · · · · · · · · ·	$\stackrel{\wedge}{\times} \times \times \times \times \times$	
Perrier etc. (Puy de Dôme).	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· × · · · ·	
Suffolk (Red Crag).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · × ·	· · × · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Montpellier.		· · · · × ×		· X · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Casino (Lignite).		· · · · ×>		X
Bohnerz von Mösskirch etc,	·× · · · · · · · · · · ·		·× ·	· ·XX · · · · · ∞
Eppelsheim.	·X · · · · · · · · · · · ·	· · · · X	· · ×	· XXX · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Belvedère Schotter.	· · · · · · × · · · · · · ·			· X · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Baltavar,	· · · · × · × · · · · · ·	· ·×	•	× · · · · · · : : : : : : : : : : : : :
Pikermi,	$\times \cdot \cdot \cdot \times \cdot \times	XXX · ·		
Mt. Luberon. Cucuron (Vaucluse).	· · · · × · ×	\times \times ···		X · · · · · · · × X 12113
Lyon (Croix rousse).	··× ·× ·			X · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Alcoi (Spanien).	· · · ×			X · · · · · · X
Cerdaigne (Pyrengen).			• •	
Mte. Bamboli (Toscans).	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	×·	• • •	
Dinotheriumsand (Bayern).	×···	•	·×	·× · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Günzburg.	XX	X	·×	××× · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sables d'Orléanais.	XX	•	·×	×. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Grive St. Alban (Isère).	X	•	X	X · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Simorre (Gers).	X X	•	·×	X
Steinheim.	· · ·	•		X · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Georgensgmünd. Ries (Nördlingen).	•	•	• •	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ochingen,	•			<u> </u>
Vermes (Berner Jura).	•	•		22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Leithakalk.	×	X	·×	X · · · · · × ×
Elgg und Käpfnach.	•	X	·×	* XX · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kohle von Steiermark.	X	X	0-4	X
Sansan (Gers).	X	X	•	X
Ulm (Haslach, Eckingen).			•	
Mainz (Weissenau).			•	~ X · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
St. Gerand-le-Puy (Allier).			•	X- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Marnes lacustres (Puy de Dôme).			•	35
Ronzon (Hante Loire).				
Bohnerz von Ulm.			•	
Hempstead (England).			•	88
Fontainebleau.			•	68
Cadibona (Piemont).			•	X · 4
Phosphorite (Quercy).			X	X 1
Headonbeil (Hordwell).				124
Sigmaringen Sigmaringen				$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Egerkingen Bohnerze.				4
Canton Waadt 1 Pariser Gips.				2 46
Vaucluse (Lignite).				347
Bembridge (Insel Wight).				7 48
Grobkalk (Paris).				345
Issel (Aude) u. Argenton (Indre).				20
Londonthon,				21

		Describerium Naui and Vindobonense. — 2) Wohl - Hyaemuschus minor P. Gerv. Guntianus ist eine sehr wohlbegründete Art. Als Rütimeyer
		m m
		in the
XX		· 43
× ×		- × +
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		<
~ X · ·		- tj.,
	XXXXX	. 4
		ete
	X	. Pu
$\times \times $	· ×× × · · · · ×	rrii.
	· ×× · · · · · ·	peg
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140
	·xx xxx ·x ·····	× 0
		fr.
	·××× · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sc]
		10
		eii.
		- 1 56
		· · ·
		1111
XX · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tia
		un.
		. 6
		-
		CI
		ت
		_ =
		, <u>,</u>
		ino
· · X · · · · · · · ·		
		5117
$\cdot \times \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$		· yae
·× · · · · · · · · ·		H
		_
		10/
		- =
		7 2
		_ !
		- 3
		.11)
		0116
	· · · · · X · · · · · · · · · ·	· op
• • • • • • • • • • •		ind
	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 2
		. pq
×		
		×
		. %
		
		the
S		200
us rr ¹⁷) 19) 19) ini	ninor ²³)	000
illy illy illy illy illy illy illy illy	minor ²³) ipponensii ardi elaunus ²⁶) torhynchu mardi cinus m magnun alsatucun valdense minus ³⁰) esslyi Lyd euro- euro-) n	7
su s	minor² ardi .	
Juercyt ¹⁹). fullatus ¹⁶). f) suillatus ¹⁶). (?) suillatus ¹⁷). facustris ²⁹). crassus helveticus ²⁰ saturniuum Lamandini us patrsiens. agnum ²¹ s amphibiu ² .	minor ²³). hipponensis ²⁴ , tymardi. s velaunus ²⁶). leptorhynchus ²⁰ , Aymardi. porcinus. alsaticum ²⁷ , reium magnum ²⁷ , reium magnum ²⁷ , reium magnum ²⁷ , (Gresslyi Lyd. ³¹), (Gr	. =
S (S	minor ²³) hipponensis ²⁴) kymardi leptorhynchus ²⁶). Aymardi porcinus alsaticum ²⁷ erium magnum ²⁷ valdense ²⁹) minus ³⁰). Gresslyi Lyd. ³¹); (?) (?) (?) ?	•
nar nar oru lur eru ytar n	other party of the state of the	,
Dolichoerus Quercyt ¹²)	minor ²³ "hipponensis ²⁴ Hyppotamus Aymardi "hypotamus velaunus ²⁵ "hypotamus velaunus ²⁵ "hypotimus velaunus ²⁶ "hypotimus Aymardi "hypotimus Aymardi "hypotimus Aymardi "hypotimus	niense
(c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	plopui ropota nthrac nthrac ntenaco paeus otogoi eniscoel icolach acroth acroth	nieı
	a a second	H

minor Filh. non Gerv. — ¹⁸) Achalich dem helvelicus Pict, und Kowalevsky's , zweitem Suiden" — ¹⁹) Aus Gard, zusammen mit Palaeotherium. — ²⁹) Vielleicht identisch mit dem Cebochoerus sp. aus Quercy. Hat aber doch zu complicite. M. — ²¹) Auch im Headonbed der Insel Wight nach Lyde kker. — ²⁹) Auch in Lobsann im Elsass. — ²⁹) Im Pleistocän von Malta. — ²⁴) Wohl ein Problematieum? — ²⁵) Auch in Lobsann im Elsass. — ²⁹) — oninus Owen (nach Lyde kker). — ²⁷) Auch in den Meeressanden von Uffhofen bei Worms, in der Braunkohle des Westerwaldes, in Rochette bei Lausanne und in den Braunkohlen von Micsbach (Oberbayern) und St. Gaudens. — ") = Sus antedurvianus Kaup. Choevapolamus Steinheimentis Fraas. — ") Cote polamus Legant Naup. Choevapolamus Steinheimentis Fraas. — ") Auch am hohen Rohnen und der Braumkohle des Westerwaldes. Kleiner in der Meeresmolasse von Baltringen; in la Chaux de Fonds und im Calcuire de Beauce. — ") Auch am hohen Rohnen und air der Braumkohle des Westerwaldes. Kleiner als Waterhousi. — ") Sohr ähnlich Hroherium Sömerungi. — ") Viellecit identisch mit Meissneri, doch sind die Backzühne fast etwas zu einfach. — ") George – ") Gerv. — ") George – ") Gerv. — ") George onorus simplex P. Gerv. — ") George onorus simplex P. Gerv. — ") George onorus simplex P. Gerv. — ") Cobochoerus von dem Tupinodon Gresslyi H. v. Mey. — "2", Von diesen dürsten Phenacodus, Meniscodon und Miochaenus wohl doch eher als Artiodactylen angesprochen Werden; sieher aber gehört "Prologonia" zu den Paarhusern; der Pelycodus dagegen könnte wohl in der That sich als Angehöriger dieser Gattung erweisen. Jedenfalls halte ich ihn für einen Pseudolemuriden. — "3") Kommen eigentlieb in Wegfall, d. Chalicotherium und die als Ancybeherium etc. beschriebenen Knochen zu den nämlichen Thieren 19) . . Choersholamus Ziegleri Kaup, und = Sus Wylensis II. v. Mey. Auch Art mit sehr einsachen Zähnen. — 15) Grösse des Pularochorrus typus, der letzte obere Maber noch sehr kurz. — 16) = Choeromorus simplex P. G erv. — 17) Cebochoerus 30) = Sandbergeri H. v. Mey. Auch in der Braunkohle von Gusternheim und Lausanne. - 31) Jedenfalls verschieden von dem echten Hyopotamus Gresslyi, wenigstens Monteviale (Vicentin). — 27) Auch in den Cyrenenmergeln des Mainzer Beckens, in der Braunkohle von Schlüchtern und in Lobsann im Elsass. - * 1 - belsiacus. Auch in Cerro di San Isidro und nach Depèret in Alcoi und im Belvedere Choeropotamus Steinheimensis Fraas. . gehören. Macrotherium sansaniense auch in St. Gaudens. Gaudens, - ") = Sus antediluvianus Kaup. de Fonds, selten in St. Gaudens.

	Londonthon. Reims.		XX	
(91bal) notasgaA .			- •	
	Сторкајк (Раг			
	Bembridge (In		• •	
	Vaucluse (Ligi	XXX		die als <i>Ancylotherium</i> etc. beschriebenen Knochen zu den nämlichen Thieren gebören. <i>Macrotherium</i> – ³) = Oxygomphius leptognathus. die tertiären Land-Säugethiere Italiens. — Tahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1880. p. 55. und Fillh ol's
	Pariser Gips.	···××		en. <i>Macrotherium</i>
(therW notar')			cotherium und die als Ancylotherium etc. beschriebenen Knochen zu den nämlichen Thieren gehöre ius frequens. — 3) = Oxygomphius leptognathus. Arbeit: Ueber die tertiären Land-Säugethiere Italiens. — Tahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1880. p. s.
Вористие.	пэзнімчэрд			ageh
-	Rigmaringen			g
ordwell).	Headonbed (H	××		ere
.(yoron)	Phosphorite (Q	· · · · · ××××× · ·	×× · ·	Thi
·(juotu	oid) nnodibe!)			II I
	Pontainellean			che
(៦ជនខ្មែរ	Hempstead (E)			ij
Jun.	Вориста гоп			näi
.(Sire).	Hanzen (Hante	· · · · · · · · · · · · · · ×××	× · · · ·	¤
res (Puy de Dôme)	blarnes lacusti			v
Phy (Allier).	St. Gerand-le-			zn
	Mainz (Weisse		· · · · · × · × · · · ·	- ien -
	Ulm (Has'ach,			—— och
	Sansan (ters).			q.
iermark,	Mohle von Ste			[
	Elgg und Egl			—— ene
	Leithakalk.			eb
er Jura).	Vermes (Berne			
	Oeningen.			etc. beschriel [leptognathus.
уеп).	Ries (Nördling			
	Georgensgmin			etc
	Steinheim.			- 27
.(Simorre (Gers		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dncylotherium Oxygomphius
	Grive St. Alba			
	Sables d'Orléa			
	Günzburg.			0 x 0
and (Bayern).	Dinotheriumss			
	Mte. Bamboli			a
	Cardaigne (Py			die
	Alcoi (Spanier			pg . a
	Lyon (Croix r			m m
neuron (Vaueluse).				- I min
	Pikermi,	× · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		fre fre
	Baltavar.			oth s
offer,	Belvedère Sch			1, da <i>Chalicotherium</i> un Oxygomphius frequens.
	Eppelsheim.	X		Cha
Mösskirch etc.	Войпета топ			a ()
	Casino (Lignit			5, t
	Montpellier.			gfall S
	Rousillon.			Weg 2) = (2
Orag).	Suffolk (Red (—
	Perrier etc. (P			ii j
	Val d'Arno su			ich ich
	Norfolk,			ntl nde
		T	" Blainvillei	The many eigentlich in Wegfall, da Chalicotherium und auch in St. Gaudens. $-$ 2) = 0 xygomphius frequens. In dieser Tabelle konnte Weithofer's Arbeit: Ueber
	i	lici Ilici Insis	Ss ²) ss	nm r S
	!	nntel unn unn unn unn insi insi insi insi ins	rense · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The sansaniense, auch in St. Gaudens. $ -$
		Ancylotherium Pentelici ¹) Peratherium parvum	" Amphiperatherium Ronz " sp	1) Kommt sansaniense, auch in St. Anmerkune: In dieser
		m Pe parvu affine antiq Cuvi Laur cadu Cayh graci Aym 6 sp sp	any Sp.	# # H
		um mu	ath	156,
		the srit	per " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	rier rku
		otylo ithe	"" pbij	sa,
		, critical control of the crit	Veo Veo	Anı
	1	L A H	4 4	, ,

Aus der vorliegenden Tabelle ersehen wir, dass der Formenreichthum der europäischen Säugethierwelt während der Tertiärzeit keineswegs gering war. Die Zahl der Genera können wir auf etwa 220, die Zahl der Arten auf 600—650 veranschlagen. 1) Die noch in der Gegenwart lebenden Gattungen machen hievon einen winzigen Bruchtheil aus, recente Arten sind in wirklich tertiären Ablagerungen anscheinend überhaupt noch nicht zu finden. — Die Forestbeds von Suffolk und Norfolk, wo solche Arten neben tertiären vorkommen, dürften wohl überhaupt schwerlich die Fauna je eines einheitlichen Zeitraumes enthalten, sondern eher zufällig zusammengeschwemmte Thierreste aus verschiedenen Perioden. Von einem wirklich tertiären Alter dieser Schichten kann überdies kaum ernstlich gesprochen werden.

Was die verschiedenen, aufeinanderfolgenden Faunen anlangt, so ist ein gewisser genetischer Zusammenhang zwischen ihnen zwar keineswegs in Abrede zu stellen, aber nichtsdestoweniger bemerken wir oft bei zwei scheinbar unmittelbar aufeinander folgenden Horizonten so grosse faunistische Differenzen, dass wir uns veranlasst sehen, hier einen neuen Zeitabschnitt beginnen zu lassen.

Solche Hauptwendepunkte treten uns entgegen in der Fauna von Reims, weiter im Londonien, den Sanden des Soissonais, von Argenton und den älteren Schweizer Bohnerzen ein Theil der Formen von Mauremont (Waadt) und einige aus Egerkingen etc. — ferner in der Thierwelt des Pariser Gips, der Lignite und Gipsmergel der Vaucluse, der schwäbischen Bohnerze, dem Rest der Formen aus den Schweizer Bohnerzen, in den Formen des Bembridgebed der Insel Wight und des Headonbed von Hordwell. Hierauf folgt die Fauna des Kalkes von Ronzon (Haute-Loire), der Ulmer Bohnerze und der Ablagerungen von Hempstead; eine weitere finden wir in den Süsswasserkalken von Ulm, Mainz und St. Gérand-le-Puy (Allier). Auf diese folgt, allerdings zeitlich durch eine marine Bildung getrennt, die obermiocäne Fauna von Sansan (Gers), Grive-St. Alban (Isère), die Sande von Orléans, die Braunkohlen von Steiermark, der Dinotheriumsand der bayrisch-schwäbischen Hochebene — hier besonders reich in Günzburg —, die Südwasserkalke von Steinheim und Georgensgmünd und die Kohlen von Elgg und Köpfnach.

Ein weiterer Zeitabschnitt beginnt mit der Fauna von Eppelsheim, Pikermi, Baltavar, Cucuron, Mont Lébéron, sowie Concud und Alcoi (Spanien), dann folgt die Fauna von Perrier (Auvergne) und Val' d'Arno, womit die Tertiärfaunen anscheinend zum Abschluss gelangt sind.

Durch einen ganz erstaunlichen Formenreichthum an ausgestorbenen Säugethieren zeichnen sich die Phosphorite des Quercy aus. Allein gleichwie in den Bohnerzen des Canton Waadt sind auch hier Reste aus verschiedenen Horizonten zusammengeschwemmt, doch stammen dieselben der überwiegenden Mehrzahl nach aus der Zeit der Ablagerung des Pariser Gips. Ein kleiner Theil gehört schon der vorausgehenden Periode an, ein weiterer entspricht der Periode der Ronzonfauna; ausserdem finden wir Formen aus den Marnes lacustres, die im Alter etwa zwischen Ronzon und St. Gérand-le-Puy stehen dürften, und schliesslich scheinen sogar Rhinocerotiden aus dem Obermiocän in Quercy vorzukommen. Höchst merkwürdigerweise fehlen echte Untermiocän-Arten ²) gänzlich. Ein sehr beträchtlicher Procentsatz der Phosphorit-Fauna ist jedoch bis jetzt anscheinend auf diese Ablagerung beschränkt, und zwar sind dies theils Formen, die sich

¹) Eine genaue Zählung der Arten und Gattungen erscheint mir deshalb bedenklich, weil doch manche derselben noch recht dürftig begründet und daher strittig sind. Ich bemerke eigens, dass ich nach Möglichkeit bestrebt war, Identificirungen und somit Verminderung der Zahl der Gattungen und Arten vorzunehmen. Eine wesentliche Bereicherung des bis jetzt bekannten Säugethiermaterials — soweit es das europäische Tertiär betrifft — wäre nur durch Entdeckungen neuer Fundstätten und wo möglich neuer, bis jetzt übersehener Horizonte möglich, nicht aber durch eine wiederholte Revision der beschriebenen Formen. Freilich dürfte auch eine solche kaum eine wesentliche Reduction obiger Zahlen ergeben.

²⁾ Aus der Fauna von St. Gérand-le-Puy.

der älteren Säugethierwelt enger anschliessen, theils solche, die ein mehr modernes Gepräge zur Schau tragen. 1)

Auch in dem — jüngeren — Dinotheriumsand von Eppelsheim sind die Reste zweier ehemals getrennter Faunen vereinigt. Die ältere entspricht im Alter der Ablagerung von Sansan, Steinheim etc., die jüngere den Ablagerungen von Pikermi und Lébéron. Die älteren Reste sind hiebei in schon fossilisirtem Zustand aus ihrem ursprünglichen Lager ausgewaschen und dann zusammen mit den jüngeren neuerdings begraben worden.

Dass zwischen all diesen Säugethierfaunen des europäischen Tertiärs ein gewisser directer Zusammenhang besteht, ist nicht zu leugnen. Es äussert sich derselbe am deutlichsten in Bezug auf die Artiodactylen und gewisse Raubthiertypen. Ebenso sicher sind aber doch auch einige ziemlich scharfe Grenzen zu bemerken, so zwischen der Fauna des Pariser Gips und der Fauna von Ronzon. Diese letztere hebt sich dann ihrerseits wieder sehr scharf ab von der Fauna von St. Gérand-le-Puy und des Ulmer und Mainzer Beckens. An den eben genannten Localitäten finden wir die letzten Reste der älteren Tertiärformen, die Caenotherien, Peratherien und Theridomys; und unterscheidet sich diese Thierwelt von der folgenden ausserdem auch durch das Fehlen von affen- und pferdeähnlichen Formen — Anchitherium — und der Proboscidier, welch letztere im Obermiocän überhaupt zum ersten Male erscheinen.

Die überwiegende Mehrzahl der Gattungen schliesst sich indess schon sehr enge an die lebende Fauna der alten Welt an, die ihrerseits auch wieder sehr vielfache Anklänge an die Thierwelt des nördlichen Amerika aufweist, indem die dortigen Formen entschieden aus Europa oder noch richtiger Asien eingewandert sind. Die auf das Untermiocän folgenden Säugethierfaunen von Sansan, Steinheim etc., von Pikermi und schliesslich jene von Val' d'Arno sind nichts weiters als Etappen auf dem Wege zur gegenwärtigen Fauna von Europa, Asien, Afrika und Nordamerika.

Die dem Ronzonkalk vorausgehenden Ablagerungen enthalten dagegen sehr wenige Typen, deren Beziehungen zu den jüngeren Thiergesellschaften so ohne Weiteres in die Augen springen, meist sind es Formen, die ohne Hinterlassung von Nachkommen gänzlich erloschen sind. Wenn auch wirklich zwischen ihnen und gewissen lebenden Typen verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, so sind dieselben doch nur indirecte, und zwar werden dieselben dann vermittelt durch Glieder der älteren Säugethierfaunen Nordamerikas. Die dortigen Repräsentanten haben sich, freilich unter wesentlichen Aenderungen, in die Gegenwart fortgepflanzt, ihre Verwandten im europäischen Tertiär hingegen sind nur als bald erlöschende Seitenlinien zu betrachten. Es gilt dies insbesondere für die Perissodactylen, die Cameliden, gewisse Creodonten sowie die Pseudolemuriden. Nur die Hunde, viverren- und marderähnlichen Carnivoren, die Insectivoren, Chiropteren und manche Nager und Paarhufer des älteren europäischen Tertiärs haben phylogenetische Bedeutung erlangt.

Bevor ich jedoch auf diese Verhältnisse näher eingehe, dürfte es sich empfehlen, die wichtigsten aussereuropäischen Tertiärfaunen in Kürze zu charakterisiren.

Die Faunen des nordamerikanischen Tertiärs sind durch folgende Formen gekennzeichnet:

I. Puercobed: Condylarthren — Phenacodontiden, Vorläufer der Unpaarhufer, Periptychiden, Vorläufer der Paarhufer, Pantolambda, Vorläufer der Amblypoden, viele Creodonten — Micclaenus — Triisodon — Deltatherium, Lemuren — Mixodectes, Pseudolemuriden — Pely-

¹⁾ Immerhin verhalten sich die einzelnen Localitäten durchaus nicht alle gleich, die einen, z. B. Lalbenque, liefern mehr ältere, die anderen — Mouillac — mehr jüngere Formen.

codus, Tillodontier — Psittacotherium, Monotremen (?) — die Neoplagiaulax-ähnlichen Ptilodus und Catopsalis, hieher wohl auch Polymastodon und Carnivoren — Didymictis.

- II. Wasatchbed (Coryphodonbed): Nager Plesiarctomys, Tillodontier Esthonyx, Pseudolemuriden Hyopsodus Pelycodus, Insectivoren Ictops, Artiodactylen Pantolestes, Perissodactylen Hyracotherium (Eohippus) Ectocion Systemodon, Condylarthren Phenacodus Meniscotherium, Amblypoden Coryphodon, Creodonta Didelphodus Oxyaena, Carnivoren Didymictis Miacis. Die höheren Schichten des Wasatchbed enthalten eine etwas abweichende Fauna und stellen wohl einen selbstständigen Schichten-Complex dar (Windriverbed). Wegen des Vorkommens von Coryphodon und der Aehnlichkeit der Perissodactylen wird das Wasatchbed mit den Soissonien und Londonien verglichen, während das Puercobed mit dem ältesten europäischen Tertiär Reims bärenartige Creodonten und die Neoplagiaulax-ähnlichen Ptilodus und Catopsalis gemein hat.
- III. Bridgerbed (Dinocerasbed): Nager Plesiarctomys, Creodonten Mesonyx Stypolophus, Lemuren Anaptomorphus, Pseudolemuriden Tomitherium Hyopsodus, Tillodontier Tillotherium, viele Perissodactylen Hyracotherium und Piiolophus (Orohippus), Chalicotheriiden, nämlich Palaeosyops und Limnohyus, Rhinocerotiden (Hyrachyus, Colonoceras, Orthocynodon) und Tapiriden (Systemodon), Amblypoden Dinocerata, Paarhufer Achaenodon (ein Bunodont) und Ithygrammodon, ein Kameel. Es erinnern diese beiden letzteren Faunen etwas an jene aus Débruge, dem Pariser Gips und den Bohnerzen; so hat Tomitherium einen nahen Verwandten in Adapis, Hyopsodus in Cryptopithecus, Stypolophus in Proviverra, Mesonyx in Pterodon, Orohippus und Eohippus in Ilyracotherium und Anchilophus, Systemodon in Tapirulus; Plesiarctomys ist sogar in beiden Continenten anzutreffen.
- IV. Uintabed (Diplacodonbed). Dieses bildet den directen Uebergang vom Bridger zum White-Riverbed. Es enthält einen Chalicotheriiden Diplacodon, Rhinocerotiden Amynodon, einen Tapiriden Isectolophus einen Equiden Epihippus Artiodactylen Oromeryx Eomeryx Leptotragulus, den Vorläufer der Oreodontiden Protorcodon, Carnivoren Miacis, Creodonten Mesonyx, ferner Hyopsodus und Plesiarctomys. Mit Europa hat diese Fauna wenig gemein, doch scheinen wenigstens die genannten Perissodactylen als Ahnen von Formen des europäischen Miocäns eine wichtige Rolle zu spielen.
- V. White-Riverbed (Brontotheriumbed): Nager Gymnoptychus, Ischyromys, Heliscomys — Panolax — Palaeolagus, Carnivoren — Amphicyon (?) Drepanodon — Dinictis — Bunailurus - Hoplophoneus, Creodonten - Hyaenodon, Insectivoren - Leptictis, Mesodectes, Perissodactylen: Menodus, und andere riesige Chalicotheriiden - Rhinocerotiden mit C und J, nämlich Metamynodon, dann Accrotherium und Hyracodon, Pferde, Anchitherium, Artiodactylen, und zwar Oreodontiden mit Orcodon, Eucrotaphus, und Agriochoerus, Cameliden mit Poëbrotherium, Leptauchenia, eine hirschähnliche Form, Leptomeryx, und endlich Elotherium und Hyopotamus. Dazu kommen noch sehr zweifelhafte Peratherien und der letzte Hyopsodide, Menotherium, wohl der Marsh'sche Laopithecus. Von manchen Autoren wird ein eigenes Oreodonbed unterschieden, da die Gattung Oreodon erst in etwas höheren Lagen auftritt während Menodus (= Brontotherium etc.) für die unteren charakteristisch ist. Marsh nennt ausserdem noch ein Miohippusbed mit Diccratherium und Miohippus. Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Fauna viele Anklänge aufweist an jene der Phosphorite und des Ronzon-Kalkes; so entspricht Ischyromys dem Sciuromys, Eumys dem Cricetodon, Dinictis der Aelurogale, Oreodon und Agriochoerus dem Haplomeryx; Hyaenodon, Drepanodon, Hyopotamus, Elotherium und Acerotherium finden sich in beiden Continenten. Auch besteht ausserdem grosse Aehnlichkeit

zwischen den europäischen Cephalogalen und *Pseudamphicyon* und dem amerikanischen "Amphicyon". Dagegen ist die Identität der europäischen und amerikanischen Peratherien überaus zweifelhaft.

VI. John Day-Bed. Diese Ablagerung enthält Nager — Sciurus — Meniscomys — Castor — Paciculus, — Entoptychus — Pleurolicus — Lepus, Carnivoren — Amphicyon — Temnocyon — Galecynus — Enhydrocyon — Oligobunis — Hyaenocyon — Nimravus — Dinictis — Pogonodon — Hoplophoneus, Paarhufer, und zwar Cameliden — Poëbrotherium — Gomphotherium — Eucrotaphus, Oreodontiden — Coloreodon — Merycochoerus — Agriochoerus, Dicotyliden — Bothrolabis und Chaenohyus — und die hirschähnlichen Hypertragalus und Blastomeryx. Hiezu gesellen sich Mastodon und viele Equiden.

Die Unpaarhufer sind noch nicht näher bekannt; Cope hat bis jetzt, und zwar aus dem etwas höheren Ticholeptusbed, nur namhaft gemacht Anchitherium, drei Hippotherium und einen Protohippus. Dazu kommen in Oregon noch vor Dicotyles und ein Protolabis, in Montana ein Mastodon, Cyclopidius, Pithecistes, Merycochoerus, Merychyus — die letzten vier sind Oreodontiden — und je eine Art von Leptauchenia, Procamelus und Protolabis Cameliden. Die Carnivoren sprechen allerdings einigermassen für die Gleichaltrigkeit mit St. Gérand-le-Puy, dagegen deuten die Equiden sowie Mastodon schon auf ein obermiocänes oder gar schon pliocänes Alter.

VII. Loup-Forrbed. (Niobrara-Schichten, Pliohippusbed): Carnivoren — Canis, zum Theil Amphicyon — Pseudaclurus — Aclurodon, Artiodactylen — Cervus — Cosoryx — Dicrocerus — Megalomeryx und Blastomeryx — Merycochoerus — Merychyus — Merycodus — Protolabis — Procamelus — Homocamelus — Pliauchenia, Perissodactylen, und zwar Rhinocerotiden — Peraceras und Aphelops und viele Equiden — Protohippus — Hipparion — Merychippus — Hyohippus, Parahippus — von Nagern Castor, von Proboscidiern Mastodon. Nach Marsh sind ausserdem noch Bos, Tapiravus und Morotherium — das letztere ähnlich Megatherium — zum Vorschein gekommen. Diese Fauna erinnert hinsichtlich des Hipparion an das europäische Pliocän; auch die Amerika eigenen Cameliden und Aphelops erscheinen schon als ganz moderne Typen, dagegen ist das amerikanische Mastodon noch sehr primitiv; es schliesst sich innig an das europäische angustidens an.

VIII. Das **Equusbed** 1) enthält Mastodon, Equus, Tapirus, Auchenia, Mylodon, das Diluvium, Bos, Equus, Tapirus, Megatherium, Mylodon, Megalonyx, Hesperomys, Arvicola, Neotoma, Castor, Ercthizon, Lepus, Praotherium, Scalops, Amblyrhiza, Felis, Ursus, Galera, Mixophagus — Anomalurus (dieser wohl ein Insectivor und keineswegs der lebende A. Waterhousi, der ein Nager ist!) und Mastodon nebst Elephas.

Eine sehr reiche, jedoch vielleicht auf mehrere Zeitabschnitte zu vertheilende Fauna treffen wir in den indischen Siwalik-Hills. Abgesehen jedoch von Anthracotherium, Hyopotamus und dessen Abkömmling — dem Merycopotamus — schliesst sich dieselbe so innig an Pikermiformen an, dass eine besondere Aufzählung der einzelnen Typen vollkommen überflüssig erscheint. Ob dieselben als Nachkommen von jenen zu betrachten sind, oder nur mit ihnen den Ursprung gemein haben, ist hier völlig gleichgiltig, sicher wurzeln sie der Mehrzahl nach ebenfalls in der Fauna des europäischen Miocän. Es hat diese Siwalik-Fauna grosse Bedeutung als Ausgangspunkt für viele in der Gegenwart in Asien und Afrika einheimische Typen.

¹⁾ Diese beiden letzten Glieder des Tertiärs sowie das Diluvium sind von Cope bis jetzt nur ganz oberflächlich berührt worden. Solange daher nicht sein grosses Werk — "Tertiary Vertebrata" — vollendet sein wird, wofür freilich wenig Aussicht besteht, sind wir theils auf die veralteten Arbeiten Leidy's, theils auf die völlig uncontrolirbaren Publicationen Marsh's, theils auf eine Menge kleinerer, weitzerstreuter Mittheilungen Cope's angewiesen. Von einem erspriesslichen Studium der jüngeren merikanischen Fauna kann somit keine Rede sein.

Eine Menge fossiler Säugethierreste hat endlich auch Südamerika geliefert, so namentlich riesige Nager und Edentaten. Die letzteren haben sich aller Wahrscheinlichkeit nach aus den Tillodontiern oder ähnlichen Formen des nordamerikanischen Tertiärs herausgebildet. Besonderes Interesse verdienen die Gattungen Toxodon und Macrauchenia, vermuthlich eigenartig differenzirte Typen der in Nordamerika zur Eocänzeit so formenreichen Condylarthren. Ueberhaupt stammt diese ganze fossile Thierwelt Südamerikas zweifellos von nordamerikanischen Tertiärformen ab; für die lebende Fauna der übrigen Continente ist sie ohne alle Bedeutung.

Sehen wir nun zu, welche Verbreitung die wichtigeren Säugethiergruppen während der Tertiärzeit aufzuweisen hatten.

Die Monotremen sind in der Gegenwart auf Australien und Neu-Guinea beschränkt. Im ältesten Tertiär hatten sie jedoch noch Repräsentanten in Europa und Nordamerika aufzuweisen, wenigstens gehören die dortigen Multituberculaten — Plagiaulaciden — nach den neuesten Untersuchungen 1) wahrscheinlich diesem Formenkreise an. Sehr zahlreich waren dieselben in jenen Continenten während der Jurazeit, in Nordamerika nach den jüngsten Mittheilungen von Marsh 2) auch zur Kreidezeit.

Unter den Marsupialiern ist nur die Familie der Didelphiden, wie noch jetzt, so auch in der Tertiärperiode ausserhalb Neuholland anzutreffen. In Europa verschwindet sie im Untermiocän. Ob die lebenden amerikanischen Beutelratten von diesem "Peratherium" abgeleitet werden dürfen, erscheint überaus fraglich. Eher könnte dies für Phascologale der Fall sein. Die übrigen Marsupialier sind wohl schon seit Anfang der Tertiärzeit in Neuholland eingewandert, wenigstens bedingt ihre ausserordentliche Formenmannigfaltigkeit einen sehr langen Zeitraum, denn nur während einer solchen längeren Periode konnten so verschiedenartige Differenzirungen eines und desselben Formenkreises platzgreifen.

Die Nager treten schon im älteren Tertiär in Europa und Nordamerika auf. Auf dem letzteren Continente spielen jedoch anfangs nur die Sciuromorphen eine wichtigere Rolle, die übrigens auch so ziemlich gleichzeitig in Europa erscheinen und wohl von Anfang an sich als Kosmopoliten erweisen. Bei uns besteht der grösste Theil der älteren Nagerfauna aus den Theridomyiden, aus welchen sich möglicherweise die vom Miocän an in beiden Hemisphären verbreiteten Biber und Hystriciden einerseits und die in der Gegenwart auf Südamerika beschränkten Caviaden und Stachelratten andererseits entwickelt haben. Dazu kommen noch die Cricetodon, wohl die Ahnen der Myomorphen. Lagomyiden finden sich zuerst im europäischen Untermiocän, Hasen zuerst im Miocän von Nordamerika. Erst im Diluvium gelangten die letzteren nach Europa, und zwar wohl über Asien her. Die übrigen Nager des nordamerikanischen Tertiärs schliessen sich wohl am besten an solche Typen an, welche noch jetzt jene Gegenden bewohnen.

Chiropteren sind nur aus dem älteren europäischen Tertiär in nennenswerther Zahl bekannt. Es bilden jene Typen wahrscheinlich den Ausgangspunkt für die lebenden Vespertilioniden, Rhinolophiden — und Vampyriden — und wären somit Kosmopoliten geworden, was bei der Lebensweise dieser Thiere auch nicht allzu schwer gewesen sein dürfte. Die Frugivoren dagegen haben wohl schon seit langer Zeit ihre jetzigen Wohnsitze inne; jedenfalls gehen auch sie auf insectivore Fledermäuse zurück, bei welchen freilich der Flugapparat noch nicht so vollkommen entwickelt war wie bei den tertiären und lebenden Repräsentanten.

Die Edentaten dürfen wohl zum grossen Theil von den Tillodontiern des nordamerikanischen Tertiärs oder doch diesen ähnlichen Thieren abgeleitet werden, wenigstens gilt dies für

¹⁾ Poulton E. B. Proceedings of the Royal Society 1888, p. 353, und Oldfield Thomas ibidem 1889, p. 126, pl. II

²⁾ The American Journal of Science 1889, Juli und August.

die riesigen Megatheriiden und Glyptodonten und wahrscheinlich auch für die noch lebenden Bradypodiden; sehr unsicher ist die Herkunft der gleichfalls südamerikanischen Dasypodiden sowie von Myrmecophaga, sowie die Abstammung des altweltlichen Maniden und des Orycteropus vom Cap. Die letzteren mögen wohl schon seit geraumer Zeit ihre gegenwärtige Heimat bewohnen, ursprünglich aber wohl auch aus Nordamerika gekommen sein und auf überaus primitive Creodonten hinauslaufen.

Sämmtliche Hufthiere - von dem noch zu besprechenden Hyrax und den Proboscidiern abgesehen - gehen aller Wahrscheinlichkeit nach auf Condylarthren zurück, jene fünfzehigen bunodonten Ungulaten, welche im Eocan von Nordamerika eine so wichtige Rolle spielen und ihrerseits wieder von Creodonten, also Fleischfressern, abzuleiten sind. Als die drei Haupttypen der Condylarthren sind zu nennen: die Periptychiden, die Ahnen der Paarhuferdie Phenacodontiden, die Ahnen der Unpaarhufer, und Pantolambda, der Ausgangspunkt der Coryphodontiden und Dinoceraten. Die beiden letzteren erlöschen noch im Eocän, und hat auch da nur die Gattung Coryphodon Reste in Europa hinterlassen; alle übrigen Amblypoden sind auf Nordamerika beschränkt. Die Perissodactylen oder Unpaarhufer erreichen schon im Eocän und Oligocän eine grosse Formenmannigfaltigkeit, namentlich gilt dies vom Pferdestamm. Derselbe hat schon frühzeitig Repräsentanten in Europa sowohl als auch in Nordamerika, doch sind nur die neuweltlichen Glieder dieses Stammes von wesentlicher Bedeutung, indem die altweltlichen sämmtlich früher oder später ohne Hinterlassung von Nachkommen wieder ausgestorben sind. Die europäische Reihe ergänzte sich immer wieder durch Einwanderung amerikanischer Typen. Erst vom Pliocän an scheint der Pferdestamm in der alten Welt weiter entwicklungsfähig geworden zu sein. In Europa sowohl als auch in Nordamerika finden wir bereits zur Eocänzeit Tapiriden, doch starben die altweltlichen Formen - Lophiodon - sehr bald wieder vollständig aus. Erst vom Oberoligocan und Untermiocan an erhält sich der Tapirstamm ununterbrochen in Europa, und geht auf diese altweltliche Linie wohl auch der lebende indische Tapir zurück. In Amerika erscheinen echte Tapire erst vom Loupfork an, erhalten sich dann aber ebenfalls wenigstens in Südamerika bis in die Gegenwart. Die ältesten Rhinocerotiden finden wir in Nordamerika im Bridgerbed, in Europa dagegen erst im Oberoligocan - Ronzon. - Im erstgenannten Continente sterben sie im Pliocän schon gänzlich aus; die Hauptentfaltung erlangte dieser Stamm offenbar in der alten Welt, in Amerika brachte es nur der schlanke Typus der Hyrachyus, Triplopus und Hyracodon und ausserdem die Aphelops zu einiger Blüthe. Die vierte Gruppe der Perissodactylen endlich, die Chalicotheriiden erscheinen in Europa im Oligocan oder Untermiocän und setzen dann bis in's Unterpliocän, in Asien vielleicht sogar bis zum Pleistocän fort, in Amerika dagegen sind solche Chalicotheriiden schon vom Bridgerbed an zu verfolgen, sterben aber freilich auch schon im Untermiocän wieder aus, nachdem sie einen grossen Formenreichthum und riesige Dimensionen erzielt — Menodus, Brontotherium — im Bau der Extremitäten sich jedoch sehr conservativ verhalten hatten.

Die Paarhufer erscheinen in Amerika zuerst im Wasatchbed, doch findet sich hier nur die Gattung Pantolestes, der älteste Vertreter der Tylopoden. Diese lassen sich dort alsdann durch das ganze Tertiär hindurch verfolgen, und zwar vom Untermiocän an sowohl als Cameliden als auch als Aucheniiden; die ersteren siedeln erst im Pliocän in die alte Welt über — Siwalik. Der zweitälteste nordamerikanische Paarhufer ist Achaenodon, wohl ein bald erlöschender Ausläufer jenes Primitivtypus, aus welchem sich die Suiden, Anthracotherien und Hyopotomiden sowie die Entelodon entwickelt haben. Alle diese sind entschieden Bürger der alten Welt, nur ein Theil der Suiden, die Dicotylinen, zeigt sich vom Miocän an bis in die Gegenwart

auf die westliche Hemisphäre beschränkt, und ausserdem hat auch Entelodon daselbst im White-Riverbed einen Repräsentanten aufzuweisen. Spuren von Wiederkäuern finden sich zwar in Nordamerika im Uintabed, doch sind dieselben wohl kaum von besonderer stammesgeschichtlicher Bedeutung. Die Hauptentwicklung der Hirsche, Antilopen, Rinder und Schafe hat sich vielmehr ganz sicher in der alten Welt abgespielt. Hirsche - freilich geweihlos - gibt es daselbst zum mindesten vom Oligocan an, Antilopen seit dem Obermiocan, Rinder seit dem Oberpliocan. In Amerika erscheinen Hirsche erst im Obermiocan, ebendaselbst auch ein angeblicher Dicrocerus, der Stammvater der Gabelantilope - Antilocapra -, Rinder dagegen wohl erst im Diluvium. In Europa gibt es ausserdem vom Obereocän an Formen, welche der eigentlichen Wiederkäuerreihe in mancher Hinsicht ziemlich nahe stehen, sie erlöschen jedoch im Oberoligocan und Untermiocan schon wieder vollkommen. Es sind dies die Caenotheriiden und Dichodontiden. Sie sind wahrscheinlich von Anfang an auf die alte Welt beschränkt gewesen; einzig und allein der ebenfalls gänzlich ausgestorbene Hypertragulus (?) des nordamerikanischen White-Riverbed könnte in die letztere Familie gehören. Dagegen ist ein anderer eigenthümlicher Formenkreis — die Oreodontiden — wohl niemals über Nordamerika hinausgekommen. Sie beginnen im Uintabed mit dem fünfzehigen Protorcodon und dauern bis zum Mittel- oder Obermiocän — Loupforkbed. An die Paarhufer reiht sich allenfalls auch der Stamm der Anoplotheriiden an, die freilich nur eine ziemlich kurze zeitliche Verbreitung aufzuweisen haben, hinsichtlich ihrer Organisation - namentlich Extremitätenbau - jedoch als die fremdartigsten Typen des europäischen Tertiärs erscheinen.

Die ersten *Proboscidier* treten urplötzlich in Europa im Obermiocän auf, und zwar in zwei Genera — *Dinotherium* und *Mastodon*; in Amerika zeigt sich nur die letztere Gattung und auch wahrscheinlich erst etwas später, erhält sich daselbst aber freilich noch bis in's Pleistocän. Wir haben es hier wohl mit einem altweltlichen, und zwar vermuthlich asiatischen Stamm zu thun; wenigstens entfaltet derselbe auf der östlichen Halbkugel seinen grössten Formenreichthum.

Hier wäre auch allenfalls die merkwürdige recente Gattung Hyrax zu besprechen, ausschliesslich auf Ostafrika und Syrien beschränkt. Ihre Herkunft ist überaus dunkel; wir können nur annehmen, dass dieselbe von einer noch überaus primitiven Creodonten-Form sich abgezweigt und in vielen Stücken im Sinne der Hufthiere, und zwar zumeist der Perissodactylen, differenzirt haben. Möglicherweise sind sie schon zur älteren Tertiärzeit an ihre dermaligen Wohnsitze gelangt oder sie haben sich lange etwa in Asien aufgehalten.

Von den Fleischfressern haben die Creodonten ihren grössten Formenreichthum in Nordamerika entfaltet und dies schon im Eocän. Nach Europa sind nur ziemlich wenige, überwiegend eigenartig differenzirte Typen gekommen, von denen dann einer — Hyaenodon — später auch in Amerika auftritt, nachdem dort der Creodontenstamm scheinbar bereits erloschen war. Die gewissermassen in der Mitte zwischen den eigentlichen Creodonten und den Carnivoren stehenden Gattungen Miacis und Didymictis sind mit Ausnahme einer etwas zweifelhaften Art nicht über jenen Continent vorgedrungen, wohl aber die ihnen sehr nahe verwandten Vorfahren der Hunde, Bären, Marder und Zibethkatzen. Mit Ausnahme der eigentlichen Bären, die anfangs durch wiederaussterbende Amphicyon-ähnliche Formen ersetzt sind, finden sich diese Familien schon im europäischen Oligocän, die Hunde als Cynodon und Cynodictis, noch dazu in grosser Arten- und Individuenzahl. Spärlicher sind anfangs die Viverren und Musteliden. Neben ihnen bemerken wir einen zwischen beiden gewissermassen in der Mitte stehenden Formenkreis — Palaeoprionodon, Stenoplesictis etc., als dessen letzte Ausläufer höchstens der lebende Prionodon und vielleicht auch die Gattung Cryptoprocta betrachtet werden dürfen. Im Untermiocän

verschwinden die Hunde vollständig, sind dann im Obermiocän und Pliocän nur durch einige wenige Reste angedeutet und erreichen eine grössere Entfaltung erst wieder im Pleistocän. Um so häufiger sind sie im Miocan von Nordamerika, während daselbst Marder die ganze Tertiärzeit hindurch zu den grössten Seltenheiten gehören, Zibethkatzen aber anscheinend gänzlich fehlen. In Europa lässt sich dagegen die allmälige Entwicklung der Lutren, Martes und Putorius recht gut verfolgen. Die Bären beginnen im Untermiocän mit der Gattung Amphicyon, die sich dann in Hyaenarctos umwandelt, aus welchem sich endlich im Oberpliocän die Gattung Ursus selbst entwickelt. Nach Amerika scheinen Bären erst im Pleistocän gekommen zu sein. Von den Amphicyon- ähnlichen Pseudamphicyon und Cephalogale erhalten sich die ersteren nur bis zum Ende des Oligocans, die letzteren aber als solche sicher bis zum Anfang des Obermiocans; der ganze Formenkreis endet dann definitiv im Pliocän - Simocyon; auch Nordamerika hat einen Vertreter desselben - Oligobunis - aufzuweisen. Ganz räthselhaft ist der Ursprung der Katzen. Die ersten Feliden-ähnlichen Formen erscheinen nahezu gleichzeitig in beiden Continenten, doch sind gerade diese wohl kaum von besonderer phylogenetischer Bedeutung, oder doch höchstens für die bis in's Pleistocan reichenden Smilodon und Machairodus, welche in beiden Hemisphären - und selbst in Südamerika - Repräsentanten hinterlassen haben. Die echten Katzen beginnen erst im Obermiocän, und zwar in Europa und Asien, und gelangten wohl erst im Pleistocän nach Amerika. Die Subursen endlich behaupten möglicherweise schon seit geraumer Zeit ihre gegenwärtigen, über die ganze warme Zone verbreiteten Wohnsitze; ihr Ursprung ist jedenfalls von sehr generalisirten Creodonten abzuleiten.

Die Insectivoren waren während der Tertiärzeit in Europa durch eine relativ nicht geringe Formenzahl vertreten, während in Nordamerika von solchen Resten bis jetzt noch überaus wenig zum Vorschein gekommen ist. Ein Theil der ausgestorbenen europäischen Typen schliesst sich den Macroscelididen Afrikas und den Cladobates der Sundainseln an — Parasorex — ein anderer den Erinaceiden. Jedenfalls haben die Insectivoren des europäischen Tertiärs grosse Bedeutung als Stammeltern der recenten Formen. Auch die lebenden nordamerikanischen Insectivoren dürften grösstentheils von altweltlichen Typen abstammen.

Die in der Gegenwart auf das südliche Asien und das tropische Afrika sowie auf Madagascar beschränkten Halbaffen waren während der älteren Tertiärzeit sowohl in Europa als auch in Nordamerika anzutreffen, doch kann wohl keiner von diesen fossilen Repräsentanten als wirklicher Ahne von noch lebenden Typen angesprochen werden. Nichtsdestoweniger glaube ich kaum fehlzugreifen, wenn ich Nordamerika für die ursprüngliche Heimat dieses Formenkreises halte und denselben auf verallgemeinerte Creodonten zurückführe.

Eine solche Urabstammung haben wir auch für die Quadrumanen anzunehmen, nur haben dieselben dann noch ein Prosimier-Stadium durchlaufen. Aus diesem sind weiter die Pseudolemuriden hervorgegangen, die sich im älteren Tertiär beider Continente finden. Unter den letzteren sind jedoch wohl nur die amerikanischen Formen von phylogenetischer Bedeutung. Als ihre Nachkommen erscheinen die Cynopithecinen, die bis jetzt ausschliesslich in der alten Welt — lebend und fossil vom Pliocän an — nachgewiesen worden sind. Die Anthropomorphen stehen dagegen in näherer Beziehung zu den Platyrhinen Südamerikas. Sie erscheinen zuerst im Obermiocän von Europa. Die letztgenannten sind bis jetzt noch nicht in eigentlich fossilen Typen bekannt. Beide Gruppen haben sich etwa im Oligocän von einem gemeinsamen Stammvater abgezweigt, der seinerseits wieder auf einen generalisirten Prosimier — mit $\frac{3}{3} \mathcal{F} \frac{1}{1} C \frac{4}{4} Pr \frac{3}{3} M$ — hinausläuft.

Aus den obigen Auseinandersetzungen ergibt sich, dass zwischen Europa und Nordamerika zum mindesten seit Anfang der Tertiärzeit - wohl aber auch schon in der Juraperiode - ein lebhafter Formenaustausch stattgefunden haben muss, und zwar verschiedene Male. Die ersten Einwanderungen in Europa erfolgten während des Eocän. Dann aber fand im Oligocän und Miocän in Nordamerika eine Invasion von europäischen Formen - z. B. Hyaenodon, Cynodictis, Cynodon, Hyopotamus — statt. Bald darauf müssen aber auch wieder amerikanische Typen — Anchitherium - nach Europa gelangt sein; später finden wir daselbst auch wieder Hunde, nachdem solche im Miocan von Nordamerika eine bedeutende Rolle gespielt hatten, in unserem Continente aber wohl gar nicht vorhanden waren, während dort die bis dahin auf die alte Welt beschränkten Wiederkäuer zum ersten Male auftreten. Auf die Beziehungen, welche die heutige Säugethierwelt Nordamerikas zur Säugethierfauna Europas und des nördlichen Asiens aufweist, brauche ich hier nicht weiter einzugehen. Sie setzt sich bekanntlich vorzugsweise aus Formen zusammen, für welche sich auch in der alten Welt sehr ähnliche Vertreter finden, und wird daher ebenfalls als arctisch bezeichnet. Beide Faunen, die nearctische sowohl wie die paläarctische, wurzeln zum grössten Theil in den Säugethiertypen des europäischen und asiatischen Miocän und Pliocän, wenigstens sind bis jetzt nur aus solchen Ablagerungen Hirsche, Cavicornier - Antilopen und Rinder -Schweine, Marder, Bären und gewisse Nager - Murinen, Lagomyiden - und Insectivoren - Sorex, Erinaceus und Talpa bekannt.

Die heutige asiatische Säugethierwelt erscheint zum Theil als Fortsetzung der europäischen Miocän- und Pliocänfauna — wenigstens gilt dies für die indische Region — gewisse Hirsche, Schweine, Affen, Viverren, Marder, Katzen, Nager und Insectivoren. Zum Theil stammt sie von Formen der indischen Siwalikfauna, und von solchen ist dann wieder ein Theil der jetzigen palaearctischen Fauna abzuleiten. Gewisse andere Typen jedoch, wie die Prosimier, und wohl auch Galeopithecus und die frugivoren Fledermäuse mögen auf Formen des nordamerikanischen Eocän zurückgehen. Daneben ist es immerhin nicht ganz unwahrscheinlich, dass Asien eine Zeit lang — zu Ende der älteren Tertiärzeit — die Ahnen der Proboscidier und aller Affen beherbergt hat. Möglicherweise gilt dies sogar für die Feliden und Subursen.

Was die afrikanische Säugethierfauna betrifft, so setzt sie sich zum grössten Theil aus Abkömmlingen der indischen Siwalikfauna zusammen, daneben gibt es jedoch eine Anzahl Formen, die einen ganz anderen Ursprung zu haben scheinen. So stammt der Hyaemoschus aus dem europäischen Miocän, der Galago, sowie die meisten Säugethiere Madagascars von Typen des nordamerikanischen Eocän oder doch diesen sehr ähnlichen Formen. Die Cryptoprocta geht vielleicht auf einen der europäischen Palaeoprionodon zurück; der so ungemein specialisirte Otocyon, der Orycteropus, sowie die Hyrax scheinen schon seit sehr langer Zeit in Afrika einheimisch zu sein, sind aber vermuthlich ebenfalls auf Formen des nordamerikanischen Eocän zurückzuführen. Dagegen könnte Proteles doch erst mit den übrigen Hyaeniden nach Afrika gekommen sein; die eigenartige Reduction seines Gebisses muss jedoch schon ziemlich lange vorher begonnen haben. Die Macroscelididen und Rhynchocyoniden erweisen sich vermuthlich als Abkömmlinge jener Stammform, aus welcher auch die lebenden Cladobates sowie der Parasorex des europäischen Miocän hervorgegangen sind; dieselbe haben wir wohl vielleicht im älteren europäischen Tertiär zu suchen.

Südamerika scheint wohl erst verhältnissmässig spät von Repräsentanten des nordamerikanischen Tertiärs oder doch deren Abkömmlingen bevölkert worden zu sein. Ich habe hier vornehmlich die *Macrauchenia, Toxodon, Typotherium*, sowie die grossen Nager und Edentaten im Auge. Von den letzteren ist dann im Pliocän ein Theil wieder etwas nach Norden vor-

gedrungen. Die Mastodon, Dicotyles, Hirsche, Llama, Pferde und Katzen sind dagegen etwa zur gleichen Zeit vom Norden her in Südamerika eingewandert, ebenso vielleicht auch die eigenartigen Caniden, doch können diese wie etwa auch die Subursen — Procyon, Nasua — und Platyrhinen während der mittleren Tertiärzeit in Asien gelebt haben und auf einem uns unbekannten Wege an ihren dermaligen Wohnsitz gelangt sein. Ebenso räthselhaft ist die Einwanderung der Stachelratten, Chinchilla, der Caviaden und Dasyproctas. Ihre nächsten Verwandten finden sich im älteren europäischen Tertiär. Dagegen stammen die Hesperomys sicher von Formen des nordamerikanischen Miocän. Die Didelphiden haben wohl den gleichen Ursprung wie ihre in Nordamerika lebenden Verwandten.

Australien hat, abgesehen von den Monotremen und Marsupialiern, von denen die letzteren hier eine ganz erstaunliche Mannigfaltigkeit der Differenzirung erreicht haben, nur den Canis Dingo, sowie Nager und Fledermäuse — aufzuweisen. Alle diese scheinen erst sehr spät von Asien her eingewandert zu sein, dagegen dürften die Eplacentalier jenen Continent schon seit langer Zeit in Besitz genommen haben.

Ich habe hier die wechselseitigen Beziehungen, welche sich zwischen den verschiedenen Tertiär-Faunen Europas und Nordamerikas herausgestellt haben, und die gegenwärtige Vertheilung der einzelnen Gruppen der Landsäugethiere besprochen, ohne bisher auf die Frage einzugehen: Wie sind die einzelnen Formen aus dem einen in den anderen Erdtheil gelangt?

Für viele Forscher gilt es für eine ziemlich feststehende Thatsache, dass Europa mit dem nördlichen Amerika während der Tertiärzeit direct durch eine, noch dazu sehr breite Landbrücke, die fabelhafte "Atlantis", verbunden war, als deren Reste wir die Azoren, Canaren, und Bermuda zu betrachten haben. Marsh, der zuerst wirklich auf Grund des paläontologischen Materials die Beziehungen der alt- und neuweltlichen Formen besprochen hat, 1) behilft sich indess auch ohne eine solche directe Verbindung. Für ihn genügt eine Ueberbrückung der heutigen Beringstrasse, wodurch ein Hinüber- und Herüberwandern von altweltlichen und neuweltlichen Formen ermöglicht war. Ich bin ihm hierin gefolgt, ohne es eigens hervorzuheben, denn die Zusammensetzung der einzelnen europäischen, asiatischen und amerikanischen Tertiärformen bietet uns durchaus keinen Anhaltspunkt für das Vorhandensein einer solchen "Atlantis"; man könnte höchstens zu Gunsten dieses fabelhaften Festlandes anführen, dass die Wanderungen in dieser directen Richtung von Amerika nach Europa durch die geringere Entfernung begünstigt gewesen wären. 2) Die Entfernungen bilden indess kaum einen nennenswerthen Factor bei den Wanderungen der Landthiere, es setzen diese vielmehr wahrscheinlich ihren Weg fort, bis sie an unübersteigliche Schranken, wie Gebirge oder Meere, kommen oder ganz gefährliche Concurrenten antreffen; jede Thierspecies hat von Natur aus wohl das Bestreben, sich von dem Orte ihrer Entstehung aus concentrisch zu verbreiten. Dieses Moment, die geringere Entfernung, wird jedoch reichlich aufgewogen durch die unbestreitbare Thatsache, dass namentlich in der jüngeren Tertiärzeit Asien eine ganz hervorragende Rolle als Heimat vieler nearctischer und paläarctischer Formen spielt und vermuthlich auch das Entstehungscentrum der Proboscidier, Hippopotamen, der Anthropomorphen und Cynopithecinen darstellt.

Sodann ist die Existenz dieser jetzt versunkenen Atlantis auch geologisch keineswegs bewiesen. Im Gegentheil hat es vielmehr den Anschein, als ob die Grenzen der Continente schon

¹⁾ Introduction and Succession of Vertebrate Life in America. Nashville, Tenn. American Association for the Advancement of Science 30 August 1887.

²) Von den Rocky Mountains nach Mitteleuropa in der Richtung von West nach Ost 120, in der Richtung von Ost nach West, also über Asien, 240 Längengrade — die doppelte Entfernung.

zur Tertiärzeit, wenn nicht schon früher, im Ganzen und Grossen die nämlichen gewesen seien wie heutzutage, wenn auch freilich die Existenz eines von Südwesteuropa bis weit nach Mittelasien hineinreichenden Meeres nicht geleugnet werden kann. Wir sind eben gewohnt, in allererster Linie die geologischen Verhältnisse Mitteleuropas zu berücksichtigen, ein Gebiet, das jedoch verschwindend klein ist gegenüber den übrigen Theilen der Erde. Wenn wir aber auch diese in Betracht ziehen, so finden wir, dass nicht nur das ganze nördliche Europa, der grösste Theil von Süd- und Ostasien, nahezu ganz Afrika und Australien, sowie fast ganz Südamerika und die nördliche Hälfte von Nordamerika bereits seit der paläozoischen Zeit Festland gewesen sind und dass daher der Satz: "Die Grenzen der Continente haben sich im Laufe der verschiedenen Erdperioden nur wenig geändert", sehr viele Berechtigung hat.

Ist es nun auch wenig wahrscheinlich, dass Europa und Nordamerika direct mit einander verbunden waren, so haben wir doch sehr gewichtige Gründe für das Vorhandensein einer Landbrücke zwischen Nordamerika und Nordasien, und zwar in der Gegend der heutigen Beringstrasse. Von topographischen Verhältnissen sprechen hiefür unter Anderem die geringe Entfernung der dortigen Landmassen und die geringe Tiefe des heutzutage dort befindlichen Meeresarms, vom zoogeographischen Gesichtspunkte ist die Annahme einer Landbrücke in jener Gegend, wenigstens soweit die diluviale und recente Fauna in Betracht kommt, geradezu eine Nothwendigkeit.

Wir werden daher besser thun, wenn wir auf die Frage, welchen Weg die aus Amerika nach Europa — und umgekehrt — wandernden Säuger eingeschlagen haben, vorläufig gar nicht näher eingehen. Daran aber müssen wir um so entschiedener festhalten, dass sowohl der Westen von Nordamerika als auch das westliche Mitteleuropa für die Entstehung und die Geschichte der allermeisten Säugethierstämme von der grössten Bedeutung sind. In beiden Bezirken können wir durch lange geologische Zeiträume hindurch alle Veränderungen, welche der eine oder andere Stamm durchgemacht hat, mit grösster Leichtigkeit verfolgen, so z. B. in Amerika hinsichtlich der Pferde, Rhinocerotiden und namentlich der Oreodontiden und Kameele; in Europa gilt dies für die Schweine, Hirsche, Bären etc.

Hieran ändert auch die von Haacke 1) näher ausgeführte Hypothese, wonach der Nordpol die eigentliche Heimat der Landfauna sein soll, nicht das Geringste, denn wenn auch die Thatsache ganz richtig ist, dass die Südspitzen der heutigen Landmassen das letzte Refugium der Beutelthiere, Monotremen, Edentaten, Lemuren und Strausse darstellen, die zum Theil früher auch in Nordamerika und Europa verbreitet waren, so müssen wir doch die Giltigkeit dieser Hypothese auf die mesozoische Zeit und das allerälteste Tertiär beschränken, wo wirklich wenigstens Beutelthiere und wohl auch Monotremen in beiden Theilen der nördlichen Hemisphäre gelebt haben. Die tertiären Beutler dagegen sind nicht mehr die Ahnen der jetzt noch in Südamerika lebenden Didelphiden und der neuholländischen Phascologalen, sondern nur nahe Verwandte derselben, ebenso ist keiner der bis jetzt aus Europa oder Nordamerika bekannten fossilen Lemuren ein directer Vorläufer der noch jetzt lebenden Halbaffen; das Gleiche gilt auch von den Edentaten. Immerhin weisen diese Verhältnisse doch darauf hin, dass wirklich eine Verdrängung der älteren Formen durch besser organisirte neue Typen stattgefunden hat, und zwar in der Richtung von Nord nach Süd. Auch verdient diese Hypothese unbedingt den Vorzug vor der Annahme versunkener Continente. Sie setzt nur ganz geringe Abweichungen von der jetzt gegebenen Vertheilung von Wasser und Land voraus; Haacke beansprucht blos eine Verbindung Nordeuropas und Nordasiens mit den Polarländern, eine bessere Verbindung zwischen Nord- und Südamerika

¹⁾ Biologisches Centralblatt Bd. VI, p. 363.

einerseits und Ostasien und Australien andererseits und ausserdem noch Landbrücken zwischen Afrika und Madagaskar und zwischen Australien und Neuholland.

Einen Punkt möchte ich endlich noch kurz berühren. Während nämlich in der Geologie sonst das Auftreten gleicher Formen an verschiedenen Localitäten als ein Beweis für die Gleichaltrigkeit der betreffenden Ablagerungen angesehen wird, habe ich in allen Fällen, wo ein sonst der alten Welt angehöriger Stamm auf einmal auch in der neuen Welt erscheint - und umgekehrt — die betreffenden Ablagerungen nicht etwa als gleichaltrig, sondern aufeinander folgend betrachtet. Es 'ist eben doch ein Unterschied, ob zwei weit entfernte Fundplätze die gleiche Art oder nur die gleiche Gattung enthalten. Bis jetzt war es aber erst möglich, auch nur eine einzige beiden Continenten gemeinsame Art nachzuweisen, nämlich das Mammuth — daneben kommen freilich noch einige Formen in Betracht - wie Cervus canadensis, Rangifer americanus, Ursus ferox, die wohl auch in Europa gelebt haben - aber immer sind dies nur diluviale Arten. Bei der Langlebigkeit mancher Gattungen - z. B. Hyaenodon - ist jedoch der Schluss, dass alle Ablagerungen, welche Reste derselben enthalten, auch im Alter einander sehr nahestehen müssten, ein sehr voreiliger. Ausserdem ist auch zu bedenken, dass, ehe eine in Amerika einheimische Gattung in Europa erscheinen konnte - und umgekehrt - doch immerhin ein sehr ansehnlicher Zeitraum verstreichen musste. Die diluvialen beiden Continenten gemeinsamen Typen kommen hier gar nicht in Betracht, indem dieselben aller Wahrscheinlichkeit nach aus Asien stammen und daher so ziemlich gleichzeitig in Europa und Nordamerika auftreten konnten.

Wenn wir also das Vorkommen gemeinsamer Gattungen an räumlich weit entfernten Localitäten für die geologische Altersbestimmung benutzen wollen, so wird es sich empfehlen, von einer directen zeitlichen Identificirung der betreffenden Ablagerungen abzusehen; wir werden vielmehr fast besser thun, wenn wir z. B. eine amerikanische Ablagerung, welche Formen enthält, die bis dahin immer in Europa gelebt haben, der Zeit nach in der geologischen Schichtenfolge nach jener europäischen Ablagerung einstellen, welche die betreffende Form zum letzten Male enthält. Freilich wird ein solches Verfahren auch nicht ganz glatt verlaufen, es kann vielmehr recht wohl vorkommen, dass eine Form, die in Europa schon lange ausgestorben ist oder sich zur Unkenntlichkeit umgestaltet hat, nach langem Zwischenraum in Amerika auftritt, während andere Formen, die in Europa erst später gelebt haben, gleichwohl noch vor oder mit jenen auch in Amerika erscheinen. So verhalten sich z. B. der altoligocäne Cynodictis und Temnocyon einerseits, und der oberoligocäne Cynodon und der sogenannte Galecynus andrerseits. Der erste verschwindet in Europa schon nach dem Unteroligocän, sein Vertreter, der Temnocyon, erscheint in Amerika erst im Miocän — Loupfork, zugleich mit Galecynus, dem Repräsentanten des in Europa nur im jüngeren Oligocän beobachteten Cynodon.

Jedenfalls ist sonach das Auftreten gemeinsamer Gattungen sehr wenig geeignet zur directen Altersbestimmung von Ablagerungen in geographisch weit auseinander liegenden Bezirken.

Anderweitige Hilfsmittel stehen uns jedoch wenigstens vorläufig nicht zu Gebote, und kann daher die Schichtenfolge in Amerika höchstens annähernd mit jener, welche wir in Europa beobachten, in Parallele gebracht werden.

Es wäre nicht ganz ausgeschlossen, dass dereinst Asien, d. h. die etwa dort vorkommenden Tertiärablagerungen, unseren zoogeographischen Kenntnissen zu einem wesentlich höheren Grad von Vollständigkeit verhelfen könnte, insoferne hier wohl der Ursprung der Proboscidier, der Subursen, Feliden zu suchen ist und auch die Affen während der mittleren Tertiärzeit möglicherweise daselbst gelebt haben.

INHALT.

	8	eite		8	cite
Aelurogale intermedia	41	(427)	Machairodus cultridens	5 I	(437)
Aelurus anglicus	23	(409)	" insignis	53	(439)
Didymictis	61	(447)	"Jourdani	49	(435)
Drepanodon bidentatus	48	(434)	" latidens	53	(436)
" palmidens	49	(435)	" leoninus	50	(436)
" ? sp	48	(434)	maritimus	53	(439)
Felidae	34	(420)	" meganthereon	51	(437)
Felis antediluviana	54	(440)	" parvulus	52	(438)
" attica	57	(443)	" Schlosseri	52	(438)
"leiodon	55	(441)	,	53	(439)
" ogygia	55	(441)	Palhyaena hipparionum	33	(410)
" prisca	56	(442)	Prohyaena	25	(411)
" sp	57	(443)	Pseudaelurus Edwardsi	40	(426)
"turnauensis	57	(443)	Subursi	21	(407)
Herpestes crassus	21	(407)	Thalassictis incerta	14	(400)
, lemanensis	17	(403)	Viverra ambigua	ΙI	(397)
" minimus	17	(403)	angustidens	7	(393)
" priscus	18	(404)	" antiqua	11	(397)
sp	21	(407)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	19	(405)
Herpestidae	15	(401)	" exilis	II	(397)
Hyaena arvernensis	31	(417)	" Hastingsiae	7	(393)
" eximia	30	(416)	"leptorhyncha	9	(395)
" Perrieri	3 E	(417)	"minima	8	(394)
" spelaea	31	(417)	miocaenica	10	(396)
Hyaenidae	24	(410)	_ Pepratxi	10	(396)
Hyaenietis germanica	32	(418)	" sansaniensis,	IO	(396)
" graeca	32	(418)	simplicidens	5	(391)
Ictitherium hipparionum	13	(399)	" sp	ΙI	(397)
"Orbignyi	14	(400)	" steinh eimensis	8	(394)
" robustum	1.4	(400)	" Zibethoides	11	(397)
Lycyaena	32	(418)	Viverridae	I	(387)

Die mit Cursivschrift gedruckten Namen wären als Synonyma zu bezeichnen,



DIE FOSSILEN PROBOSCIDIER DES ARNOTHALES IN TOSKANA.

VON

DR. K. ANT. WEITHOFER.

VORWORT.

Einer freundlichen Aufforderung des Herrn Professors C. de Stefani, Directors des paläontologischen Museums des R. Istituto di Studj superiori in Florenz, folgend, hatte ich mich über Frühjahr, Sommer und Herbst 1888 in diese Stadt begeben, um das daselbst in reicher Menge angehäufte Säugethiermaterial zu studiren. Vorzüglich die Reste aus den vielgenannten Ablagerungen des Arnothales waren es, denen hier in besonderem Masse mein Interesse galt, zumal ja bekanntermassen die Fauna gerade dieser, den reichsten Fundstätten fossiler Säugethiere sich wohl ebenbürtig an die Seite stellenden Localität bis nun nur höchst fragmentär und dürftig bekannt war, obzwar die genannte Sammlung gewiss eine der grössten und schönsten, sowie andererseits auch eine der ältesten ist. Zu diesen günstigen Umständen kommt aber weiter noch hinzu, dass auch andere Städte der Nachbarschaft, wie Montevarchi und Arezzo, mit regstem Interesse in der Anlage gleicher Collectionen dieser urweltlichen Bewohner ihrer Heimat wetteifern, so dass in den Museen derselben ein Material vorhanden ist, aus dem man bezüglich Vollständigkeit, wie nur an wenigen anderen Orten, ein Bild jener Fauna sich zu fertigen im Stande ist.

Was bisher in dieser Hinsicht geleistet wurde, hat C. J. Forsyth Major in seinen "Considerazioni sulla Fauna dei Mammiferi pliocenici e post-pliocenici della Toscana" 1) zusammengestellt. Wurde hiedurch zwar eine allgemeine Uebersicht geschaffen, so fehlte es doch an ausführlicheren Monographien, an detaillirterer Behandlung der einzelnen Gruppen, wie sie z. B. von demselben Forscher den Pferden und Caniden gewidmet wurde. Man war dabei auf die zwar vielfach grundlegenden, aber doch nicht immer und in jeder Hinsicht ausreichenden Aufzeichnungen durchreisender Paläontologen — hauptsächlich H. Falconer's und L. Rütimeyer's — angewiesen, die der Natur der Sache gemäss auch nur das Allerwenigste zur Abbildung bringen konnten.

Zweck meines Aufenthaltes sollte es daher sein, nebst einer allgemeinen Sichtung des Materiales, so weit es die drängende Zeit erlaubte, eine detaillirtere Bearbeitung einzelner Gebiete in Angriff zu nehmen.²)

¹⁾ Atti della Soc. Toscana Sc. nat. Pisa. Vol. I, fasc. I und 3, 1876; Vol. III, fasc. 2, 1878.

²⁾ So überdie Hyänen: "Die fossilen Hyänen des Arnothales in Toscana". Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss., math.-nat. Cl., Bd. 55 Wien 1889. — Ferner an kleineren Arbeiten: "Einige Bemerkungen über den Carpus der Proboscidier." Morph. Jahrb. Bd. XIV, 1888, S. 507—516. — "Alcune Osservazioni sulla Fauna delle Ligniti di Casteani e di Montebamboli (Toscana)." Boll. R., Comit. geol., 1888, Nr. 11—12. — "Ueber die tertiären Landsäugethiere Italiens." Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1889, Bd. 39, S. 55—82.

In diesem Sinne nun soll die vorliegende Arbeit die fossilen Mastodonten und Elephanten des Arnothales behandeln. Als Grundlage diente mir nicht nur das überaus reiche Material des R. Istituto di Studj superiori in Florenz, sondern auch die mehr oder minder umfangreichen Sammlungen der geologisch-paläontologischen Institute der Universitäten Pisa, Bologna, Rom und Neapel, des Museums der Accademia Valdarnese del Poggio zu Montevarchi und des Museums zu Arezzo.

Die Proboscidier stellten in der pliocänen sowohl, wie diluvialen Zeit ein sehr bedeutendes Contingent zu der Fauna Italiens. Ueberreste dieser Thiere finden sich z. B. in der Gegend zwischen Florenz und Arezzo so häufig, dass nach Cocchi 1) die Landleute dieselben dort, wo Steine mangeln, als willkommenes Material zum Eindecken ihrer Weinbergabzugsgräben benützten.

Dass ein so reichliches Vorkommen dieser gewaltigen Knochen die Aufmerksamkeit schon lange auf sich gelenkt haben musste, ist wohl erklärlich. So schreibt, um eines Beispieles zu gedenken, Lorenzo Legati in einer "Descrizione del Museo Cospiano" (nach Targioni): "Due insigni frammenti di gamba d'Elefante impietrito, i quali col rimanente dell' ossatura pietrificata di si gran corpo, furono ritrovati nel Territorio d'Arezzo presso il Fiume Chiana, e poscia donati al Sig. Marchese Cospi dal Sereniss. Ferdinando II., Granduca di Toscana, di cui ordine si maraviglioso Scheletro era con particolar diligenza stato disseppellito l'Anno 1663." Auch der in Florenz lebende Däne Nikolaus Steno erwähnt in seiner Schrift "De solido intra solidum²) prægrandia illa ossa, quae ex agris Aretinorum eruuntur", von denen er weiter auch nachzuweisen sucht, dass sie von den von Hannibal nach Italien geführten Elephanten herstammen. Diese Ansicht theilen die meisten Autoren damaliger Zeit und auch noch des XVIII. Jahrhunderts (so z. B. P. Boccone, Andrea Cesalpino, Coltellini, Paolo Giovi, D. M. Manni, B. Mesny).

Erst Giov. Targioni Tozetti³) machte auf das völlig Irrthümliche und Widersprechende dieser Ansicht aufmerksam und suchte in einer längeren Auseinandersetzung eine richtigere einzuführen. Erstens hätte man Elephantenreste unter so starken Tuffschichten gefunden, dass unmöglich seit Hannibals Zeiten so viel Tuff abgelagert worden sein könnte, dann hätte nach Polybius der Carthager bis in das Arnothal überhaupt nur einen einzigen Elephanten gebracht. Man hätte daher nur Knochen eines einzigen Individuums finden können. Weiter strebt er nun bei einer Vergleichung der Fossilfunde mit den lebenden Elephanten darzuthun, dass erstere überhaupt unmöglich von den afrikanischen Elephanten, wie sie ja die Carthager doch besessen hatten, herrühren könnten, sondern vielmehr dem indischen gleichen. Nach Erfahrungen an anderen Orten dürfe es auch nicht viel Wunder nehmen, wenn man in Toskana Knochen von Thieren findet, die entweder heute ganz erloschen sind oder in ganz verschiedenen Gegenden und Klimaten leben. ⁴) "E come mai possono esser venuti tanti Elefanti Indiani nel Valdarno di sopra, e quivi morti? Io non lo so, e non spero di poterlo mai sapere. Certo che strane alternazioni sono seguite, nella superficie del Globo che noi abitiamo, e gli Elefanti,

¹⁾ J. Cocchi: L'Uomo fossile nell' Italia centrale. Mem. Soc. Ital. Sc. nat. Vol. II., Milano 1867, S. 15.

²⁾ N. Steno: De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus. Florentiae 1669, S. 64: "Eadem historiae autoritas dubitare vetat, quo minus praegrandia illa ossa, quae ex agris Aretinorum eruuntur, mille nongentorum annorum saevitiei restiterint; certum enim est, 1. Crania iumentorum, quae ibi reperiuntur, non esse ex huius Coeli animalibus, sicut neque femora illa iugentia, et praelongae scapulae, quae ibidem reperiuntur. 2. Certum est, transiisse illac Annibalem, antequam ad lacum Trasimenum cum Romanis confligeret. 3. Certum est, extitisse in ipsius exercitu iumenta Africana, et immensae magnitudinis Elephantes turrigeros. 4. Certum est, dum a montibus Fesulanis descenderet, nimia aquarum alluvie periisse in locis paludosis magnam partem animalium oneribus vehendis destinatorum. Certum est locum, unde eruuntur dicta ossa, ex variis stratis congestum esse, quae plena sunt saxis a circumsitis montibus torrentium impetu devolutis; ut adeoque cuilibet loci, et ossium naturam cum historia conferenti evidens in omnibus consensus latere amplius non possit."

³⁾ Giov. Targioni Tozetti: Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa. Ediz. 2., Firenze 1775. Tomo VIII, p. 391 u. ff.

^{4) 1.} c. Tomo VIII, S. 391 und T. X, S. 392.

animali i quali oggidi non vivono spontaneamente fuori della Zona torrida, anticamente hanno abitato anche in quelle parti di esso Globo, che presentemente Zone temperate o Zone frigide si addimandano." 1)

So bemerkenswerth aber diese Ausführungen Targioni's, insbesondere der darin geäusserten Ansichten über Verbreitung der Thiere einst und jetzt auch sind, so beginnt doch eine wissenschaftliche Behandlung dieses Materiales erst mit F. Nesti's Arbeiten über die Fauna des Arnothales, von denen 1808 die erste erschien. Sie handelt bereits über unseren Gegenstand und wird daher an anderer Stelle zur Sprache kommen. —

Die in dem zu besprechenden Areale vorkommenden Proboscidier, deren Verbreitung sich dann aber in jedem Falle auch über nahezu ganz Italien erstreckt, sind die folgenden:

- a) Mastodon.
- I. M. (Tetralophodon) Arvernensis Croiz. et Job.
 - b) Elephas.
- 2. E. (Loxodon) meridionalis Nesti.
- 3. E. (Loxodon) lyrodon Weithofer.
- 4. E. (Euelephas) antiquus Falconer.
- 5. E. (Euclephas) primigenius Blumenbach.

Mastodon Borsoni Hays wurde bis nun im Arnothal noch nicht sicher nachgewiesen, kommt aber in anderen Gebieten Nord- und Mittelitaliens vor. Die Angaben über das Vorkommen von Elephas Africanus L. auf der Halbinsel selbst sind wahrscheinlich alle irrig, ebenso die der Entdeckung eines der Zwergelephanten Maltas, Siciliens und Sardiniens auf dem Festland. Von der Berechtigung der Bestimmung einzelner Zähne als angeblicher El. Armeniacus konnte ich mich nirgends überzeugen; stets gehörten die so bezeichneten Reste entweder El. meridionalis oder antiquus oder primigenius an. Es konnten daher nur obige fünf Arten ausgeschieden werden. Die übrigen finden sich als Synonyma oder als Gegenstand gelegentlicher Besprechung bei denselben behandelt. —

Zum Schlusse fühle ich es als eine angenehme Pflicht, allen den Herren, die in irgend einer Weise meine Arbeiten in Italien gefördert haben, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Dieser gebührt vor Allem Herrn Professor C. de Stefani, der mir als Assistenten an seinem Institute in Florenz in jeder Hinsicht volle Freiheit gewährte und mir in Beschaffung der nöthigen Literatur stets jegliche Unterstützung angedeihen liess, der es auch mit aller Fürsorge auf sich nahm, eine italienische Ausgabe der vorliegenden Abhandlung zu veranstalten, welche gleichzeitig mit dieser in den Schriften des R. Comitato geologico in Rom erscheinen wird.

Er gebührt ferner in besonderem Masse meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. M. Neumayr, für seine Bemühungen um das Zustandekommen meiner Reise, und Herrn Professor C. d'Ancona vom R. Istituto di Studj sup. in Florenz für die zuvorkommende Liberalität, mit der er mir seine eigene Bibliothek zur Verfügung stellte.

Ferner bin ich wegen ihres freundlichen Entgegenkommens und der zahlreichen Unterstützungen bei Besichtigung und Benützung der verschiedenen Sammlungen folgenden Herren tief verpflichtet worden: Professor G. Capellini in Bologna, Professor G. Meneghini und Professor M. Canavari in Pisa, Dr. C. J. Forsyth Major und Professor H. Giglioli, Vorstand der zoologischen Sammlung, in Florenz, Avv. T. Cini, Vice-Präsident der Accademia Valdarnese, und Professor R. Berlingozzi in Montevarchi, Professor R. Meli in Rom und Professor Fr. Bassani in Neapel.

Wien, im December 1888.

¹⁾ l. c. T. VII, S. 411-412.

I. Paläontologischer Theil.

1. Mastodon Arvernensis Croizet und Jobert.

1828. Mastodon Arvernensis, Croizet et Jobert, Recherches sur les ossements fossiles du département du Puy-de-Dôme. Paris. S. 133.

1836. Mastodon angustidens, Cuvier (p. p.), Recherches sur les ossements fossiles. T. II. S. 327.

1842. Elephas (Mastodon) angustidens, Cuvier, Blainville: Ostéographie, G. Elephas (p. p.)

1846. Anancus macroplus, Aymard, Bull. Soc. géol. Fr., Sér. II., T. IV, S. 414.

1859. Mastodon brevirostris, Gervais, Zoologie et Paléontologie française, 2. Éd., S. 67.

1879. Mastodon dissimilis, Jourdan, Lortet et Chantre: Recherches sur les Mastodons et le Faunes mammologiques qui les accompagnent. Arch. Mus. hist. nat. Lyon. T. II. S. 297.

Historisches.

Diese Species wurde im Jahre 1828 von Croizet und Jobert in ihrem Werke über die Fauna von Puy-de-Dôme auf ein Oberkieferfragment mit den drei Milchzähnen hin aufgestellt.

Cuvier vereinigte sie wieder mit seinem M. angustidens, Blainville glaubte sogar auch das Genus cassiren zu sollen.

Gervais gründete die neue Art *M. brevirostris* (von Montpellier), identificirte sie selbst mit Sismonda's "Mastodonte angustidente" aus dem unteren Arnothal und fügt schliesslich hinzu: "Plusieurs auteurs ont admis l'identité du *Mastodon Arvernensis*, dont il vient d'être question avec le *Mastodon brevirostris*; cette identité n'est pas impossible, mais elle ne nous paraît pas encore démontrée; si elle venait à l'être, l'espèce devrait reprendre son nom le plus ancien et être appelée *Mastodon Arvernensis*."1)

Nichtsdestoweniger versuchten Lortet und Chantre im Jahre 1879 diesen Namen durch einen in der Literatur noch nie gebrauchten zu verdrängen, der aber wohl absolut abzuweisen ist. Einmal ist der Namen Mastodon Arvernensis um ein volles halbes Jahrhundert früher gegeben worden, als der Name M. dissimilis Jourdan publicirt wurde. Dass Jourdan ihn mündlich schon 1840 gebraucht haben soll, änderte nach steter Gepflogenheit selbst dann nichts, wenn Croizet und Jobert ihren Namen auch erst nach diesem Jahre gegeben hätten. Dann ist auch der Vorwand Lortet's, dass Croizet's Reste ungenügend wären, nicht stichhältig. Zur Zeit, als Letzterer mit seinem Arbeitsgenossen Jobert ihre Art aufstellten, war nur Cuvier's M. angustidens bekannt, und von dem unterschied sie sich — auch in den Milchzähnen 2) — ganz ausserordentlich stark und lässt daher das Vorgehen der beiden Gelehrten vollkommen berechtigt erscheinen. Wenn späterhin auf die etwa sehr abweichenden echten Molaren eine neue Species begründet wird, so hat diese nach dem Usus nur so lange Giltigkeit, als der Zusammenhang nicht nachgewiesen werden kann. Sowie dies geschieht, müssen sie natürlich vereinigt, der ältere Name aber aufrecht erhalten bleiben.

Uebrigens — selbst wenn man Lortet's Gründen nachgeben könnte — ist der Name M. Arvernensis so sehr eingebürgert, dass auch hier — nach dem Beispiele anderer Fälle — jeder Versuch, ihn zu beseitigen, wohl an der "Verjährung" scheitern würde. Doch scheint, wie gesagt, Croizet's Namen vollkommen berechtigt; auch Depéret behält ihn in seinem jüngsten Werke bei. 3)

¹⁾ Gervais, Zool. et Pal. fr. S. 67.

²⁾ Wie Croizet und Jobert selbst ganz ausdrücklichst bemerken; es ist unrichtig, dass sie sich bloss auf die verschiedene Grösse gestützt hätten.

³⁾ Ch. Depéret, Description géologique du Bassin tertiaire du Rousillon. Ann. Sc. géol. T. XVII; Paris, 1885. St. 1—272.

— Vergl. auch Lydekker, Siw. and Narb. Probosc. Pal. Ind. X, I, V, 1880, S. 113 (294).

Das Museum zu Florenz besitzt von diesem Proboscidier einen fast vollständigen Schädel mit erhaltenen Stosszähnen, jenes Schädelfragment sammt Unterkiefer, das schon von Nesti abgebildet wurde, einen weiteren jungen Schädel sammt Unterkiefer von Montopoli, jedoch in arg zerdrücktem Zustand, ferner vier einzelne Unterkiefer mit mehr oder weniger gut erhaltenen beiden Horizontalästen, drei Unterkieferhälften, eine Gaumenpartie, sowie zahlreiche lose Zähne; von Skeletttheilen sind mehrere, zum Theil sehr vollständige Extremitäten, endlich eine bedeutende Zahl anderer isolirter, wie zusammengehöriger Knochen vorhanden.

Schädel.

(Taf. IV, Fig. I; Taf. V, Fig 2; Taf. XV, Fig. 4.)

Der zuerst erwähnte Schädel wurde im Jahre 1883 auf dem Territorium der Villa Fenzi bei Percussina in der Nähe von Florenz gefunden. Er besitzt das ganze Hinterhaupt, die Gaumenregion und die Prämaxillaria sammt Zähnen, sowie die Jochbögen in sehr gutem Erhaltungszustande. Die ganze Scheitel- und Stirnregion, die Umgebung der Nasenöffnung, die jedoch ungemein hoch gelegen sein muss, sammt den höheren Theilen der Prämaxillaria fehlen, ebenso wie auch von den Orbiten das rechte ganz, das linke zum grossen Theil. Doch ist eine Augenhöhle an dem Nesti'schen Exemplar vorhanden.

Die Hinterhauptwand, nur in ihrem unteren Theil in einer Höhe von 1—2 dm erhalten, ist gegen die Seiten leicht abgewölbt und mit ihrem etwas wulstförmig nach abwärts vorspringenden Unterrand nur durch eine schmale, etwa 3—4 cm breite Querfläche von der Gelenkfläche für den Unterkiefer getrennt. Sehr ähnlich zeigt diese Verhältnisse Mastodon Sivalensis wieder.¹) Bei den vorhandenen Schädeln von Elephanten ist die Furche stets viel breiter; die Glenoidfläche selbst transversal viel weniger concav als bei Mastodon. Die Condylen springen bei letzterem viel weniger nach hinten vor, sondern legen sich mehr an die Hinterwand an, was auch gegenüber den in ihren Schädeln bekannten indischen Mastodonten — M. Sivalensis und Perimensis — ein sehr augenfälliger Unterschied ist, wo sie, wie auch vielfach bei Elephanten, fast gestielt erscheinen.²) Sie sind auch bedeutend weniger convex und schmäler als bei letzteren.

Das Foramen magnum ist flach gerundet und relativ gross.

Ober ihm geht die Hinterhauptwand steil empor. Die Grube für das Ligamentum nuchae ist zwar vorhanden, jedoch, so weit sichtbar, sehr seicht, ähnlich wie bei *Mastodon Sivalensis*, während sie in dieser Entfernung vom Hinterhauptsloch bei Elephanten schon sehr tief ist, da hier die Knochenwand unmittelbar über dem Foramen sogleich sich fast horizontal gegen vorne einbiegt.

Ebenso wie der Unterrand ist auch der Seitenrand — Crista lambdoidea — zugeschärft und fällt vorne in den Schläfengruben scharf gegen innen zu ab. Er bildet mit dem horizontalen Unterrand, der nur in der Mitte durch die denselben fast zur Hälfte nach abwärts überragenden Condylen unterbrochen wird, einen Winkel von etwa 105 Grad. Nach etwa 8—10 cm betragendem Verlaufe zweigt sich von ihm nach vorne eine ziemlich scharfe Crista ab, die dann auf den Jochbogen übergeht und zwischen sich und der Occipitalcrista die äussere Gehöröffnung einschliesst.

Der Jochbogen ist in seiner rückwärtigen Partie sehr stark und springt mit dem Hinterende des Jugale nach hinten spitzwinkelig sehr scharf hervor, wie es auf der linken Schädelseite, wo der


¹⁾ Falconer and Cautley: Fauna antiqua Sivalensis. Pt. I-VI; Proboscidea. Taf. 33, Fig 3, und Taf. 39, Fig. 5.

²) Doch scheint dies einer gewissen Variation zu unterliegen, wie wenigstens die drei Abbildungen von Schädeln von *Mast. Sivalensis* (F. A. S. Taf. 33, Fig. 1 und 4, und Taf. 39, Fig. 6) dies darzuthun scheinen. Der letztere gleicht schon fast vollkommen unserem *Mast. Arvernensis*.

Bogen sehr gut erhalten ist, gut zu sehen ist. Nach vorne zu verschmälert er sich stark, verbreitert sich aber gegen die Orbiten zu wieder zu einer rautenförmigen Figur, deren obere Ecke etwas weiter nach vorne vorgeschoben ist als die untere. Er liegt parallel mit der Alveolarlinie der Molaren.

Von der Schläfenregion ist leider nichts erhalten. Dagegen hat der Bruch die Gehirnhöhle und den Verlauf der Nasenhöhle von vorne freigelegt.

Der Boden der Gehirnhöhle ist gegen die Alveolarebene nach vorne zu aufsteigend (etwa 30 Grad) und ganz flach. Die Sella turcica breit und nur sehr wenig ausgewölbt. Processi clinoidei sind nicht deutlich zu sehen, wie sie auch bei den lebenden Elephanten nur sehr schwach entwickelt sind. Das Tentorium cerebelli ist verhältnissmässig ziemlich gross und wird nur zum sehr geringen Theil von den Hemisphären des Grosshirnes bedeckt. Das Perioticum tritt stark hervor und ist von unteninnen-vorn nach oben-aussen-hinten sehr steil gestellt. Es begrenzt von hinten beiderseits eine etwa bohnenförmige, etwas nach hinten und mit dem convexen Rande nach aussen geneigte tiefe Nische. Ihr unteres Ende liegt bedeutend unter dem Niveau des Türkensattels. Auffallend für diesen Theil des Grosshirnlagers ist seine ausserordentlich geringe Ausdehnung in sagittaler Richtung, die, etwa 6·5 cm betragend, von der des Kleinhirnes (ungefähr 8 cm) übertroffen wird. Die transversale Breite der Sella beträgt etwa 8 cm, die Entfernung der oberen Enden jener bezeichnend bohnenförmigen Nischen das Doppelte. Die Höhe der Gehirnkapsel misst ober dem Türkensattel 12 cm.



Mastodon Arvernensis; Skizze des Schädelbaues; die auspunktirten Flächen bezeichnen vom sagittalen Medianschnitt getroffene Knochenpartien.

Das Dach ist innen flach gewölbt, nach vorn zu verhältnissmässig steil aufsteigend und besitzt in der Mittellinie einen flachen, jedoch ziemlich bedeutenden Längsrücken (gegen den Gehirnraum zu). Der vor den Orbitosphenoidalcristen gelegene Raum für den Olfactorius war bedeutend, seine Längsdimension betrug etwa 4 cm, doch ist er durch den Bruch fast vollständig zerstört. Nur auf der rechten Seite sieht man die Seiten- und noch ein Stück der Vorderwand. Ebenso fehlt seine untere, obere und linksseitige Begrenzung.

Die hintere Nasenössnung steht nahezu senkrecht, nur wenig nach hinten geneigt, die Nasenhöhle steigt zuerst nach vorne zu auf, wendet sich aber bereits nach sehr kurzem Verlauf senkrecht empor. Ihre natürliche obere Oeffnung ist nicht vorhanden. Der von ihr nach vorne zu begrenzte Keilbeinkörper ist unten etwa 7 cm dick (sagittal), erweitert sich aber in seiner oberen Hälfte durch Ausladung nach vorne und besonders hinten rasch zu einer Dicke von 12 cm. Seine Höhe beträgt dabei etwa 14 cm. (Siehe Textfigur.)

Diese Gestaltung der Umgebung der Gehirnkapsel ist beträchtlich abweichend von dem Befund bei den Elephanten. Vor Allem zeichnet sich die Gehirnkapsel selbst durch ihre ausserordentliche Kürze aus, von der dann natürlich auch wieder die Längsdimension des Keilbeincomplexes abhängig ist. Während bei dem indischen sowohl, als dem afrikanischen Elephanten die Länge desselben nach den Abbildungen bei Cuvier, Blainville, Flower die Höhe überwiegt, ist das Umgekehrte hier der Fall. Dann erscheint die Gehirnhöhle höher, mehr zugerundet. Während sie aber sonst überall ziemlich weit von den Stosszähnen entfernt ist, liegen diese ihrer Vorderwand hier ganz unmittelbar an, ja steigen selbst bis zur Höhe ihres Daches empor und sind in dem vorliegenden verletzten Zustand nur etwa 11 cm von der Hinterhauptswand entfernt. Dabei ist die Beschaffenheit ihrer Umgebung und ihres Lagerraumes, der Alveole, eine derartige, dass dies unzweifelhaft auch der natürliche Befund gewesen sein dürfte.

Dieses weite Vordringen der Stosszähne nach rückwärts ist hier unter sämmtlichen Proboscidiern, soweit bekannt, einzig dastehend.

Die vordere Nasenöffnung, obzwar sie sehr hoch droben, beinahe schon am Scheitel, gemündet haben muss, muss hier in ganz exceptioneller Weise zwischen den Stosszähnen hindurch den Weg nach aussen gefunden haben. Bezüglich der hohen Lage kann man allerdings annehmen, dass die grosse Prämaxillargrube, welche sogleich Erwähnung finden wird, unmittelbar ober dem jetzigen Bruchrand durch eine horizontale Wand abgeschlossen war und hier bereits die äusseren Choanen gemündet hatten. Doch wäre dies nur eine Verschiebung von geringer Bedeutung, die nur zur Consequenz haben müsste, dass die Incisiven die Nasenöffnung dann nach oben noch weiter überragt hätten

Ob man bei dieser bedeutenden Ausdehnung der Stosszähne nach hinten auch annehmen müsste, dass auch die Prämaxillaria bis nahe an das Supraoccipitale herangereicht habe, kann natürlich hier weder mit Ja noch mit Nein beantwortet werden. A priori dürfte es nicht nothwendig sein, da ja auch bei den Nagern z. B. die Wurzeln der Schneidezähne im völlig erwachsenen Zustande bis in die Maxillaria hinein sich erstrecken. Der senkrecht aufsteigende Nasencanal trifft in seiner totalen Sagittalerstreckung auf die Stosszähne. Um in normaler Weise über denselben zu münden, so dass der Alveolargrund die Vorderwand der Nasenöffnung bildet, wie dies gewöhnlich der Fall ist, müsste dieser Canal oben stark nach rückwärts ablenken.

Von ganz besonderer Charakteristik sind ferner die Prämaxillaria. Sie zeigen von vorne im Allgemeinen den Umriss eines gleichschenkligen Dreieckes, dessen Spitze gegen die Nasenöffnung zu gekehrt ist. Die Stosszahnalveolen divergiren ausserordentlich stark. Sie treten in der Plastik, besonders in ihren tieferen Partien, fast ringsum scharf hervor, was insbesondere dadurch bewirkt wird, dass die Prämaxillaria eigentlich nur aus den beiden Alveolen bestehen, die vorne durch einen fast ebenso starken wie sie selbst, nach hinten concaven Wulst und unten durch eine nach abwärts etwas convexe Knochenplatte verbunden werden. Es entsteht dadurch eine tiefe dreieckige Grube, deren Boden concav, deren seitliche Begrenzung jedoch medianwärts (in horizontalem und verticalem Sinne) convex ist, während der Vorderrand sich zu dem erwähnten dicken, nach vorn convexen Wulst aufwölbt. Es ist diese löffelförmige Gestalt der Prämaxillaria ausserordentlich bezeichnend für unser Fossil. (Siehe Textfigur.) Der Winkel, den sie mit der Alveolarlinie einschliessen, ist sehr flach und beträgt etwa 155 Grad.

Die Orbita liegen zum grössten Theil ober den Stosszähnen und sind von ungemein dicken, wulstigen Rändern umgeben. Die Augenhöhlung selbst ist ziemlich klein; mit ihren Rändern treten sie jedoch auffallend stark hervor. In ähnlicher Weise scheint dieser Befund nur bei Mastodon Sivalensis¹) vorzukommen.

¹⁾ F. A. S. Tafel 32-33.

An der Aussenseite der Incisivalveolen, zum Theil ober ihrer Axe, liegen die ovalen *Foramina infraorbitalia*, deren Canal sich nach hinten zu senkrecht sehr rasch erweitert, übrigens aber sehr kurz ist. Seine Medianwand zeigt deutlich die Plastik der Stosszähne.

Die Maxillaria sind nicht besonders hoch, der Gaumen breit, die Alveolen der Molaren parallel. Bei der Untenansicht eines Schädels von *Mast. Sivalensis* ist der Gaumen relativ schmäler, gegenüber der Breite der Zähne, diese selbst jedoch auch wieder parallel.

Das hintere Ende der Oberkieferknochen wird, etwa vorhangförmig, von einem senkrecht stehenden Knochengebilde bedeckt, das von ersterem selbst seitlich durch eine tiefe Falte getrennt, als Homologon der halb calottenförmigen Pterygoidfortsätze der Alisphenoidea bei den Elephanten angesprochen werden muss. Es steht nach unten zu ziemlich frei. Nach oben setzt sich bei den Elephanten der vordere Rand dieser Pterygoidfortsätze der Alisphenoidea gegen die Orbita zu abknickend als eine nach vorn überworfene, starke Crista gegen die Postorbitalfortsätze der Frontalia fort; am Grunde der dadurch entstehenden Falte befinden sich dann zu Beginn der Abknickung mehrere Foramina und Fissuren. Am vorliegenden Schädel verliert sich jedoch dieser Kamm, kurz nachdem er die letztgenannte Stelle passirt hat, wo allerdings nur ein breiterer Spalt die zerstörten Oeffnungen andeutet. Nahe dem Grunde der erwähnten Alisphenoidcalotte befindet sich, ähnlich wie bei den Elephanten, ein weites Foramen, die hintere Mündung des Alisphenoidcanals.

Die Bulla ist, wie beim Elephanten, dem Alter des Thieres entsprechend fast völlig ausgeflacht. Ihr gegenwärtiger Befund gleicht oberflächlich einer dreieckigen, mit breiterer Basis in ungefähr sagittaler Richtung der Schädelbasis aufsitzenden, nach hinten zu divergirenden ziemlich dicken Knochenplatte, deren dritter Zipfel stark nach aussen neigt und an das mediane Ende der Glenoidfläche sich anschliesst. In der Verlängerung der letzteren erscheint dieses Gebilde mit der Basis quer verwachsen. Beiderseits dieser Verbindungsstelle sind offenbar Foramina vorhanden, welche den vor und hinter der Bulla gelegenen Fissuren entsprechen werden. Ein medianwärts, dem Keilbein zu gelegenes, allerdings etwas undeutliches Loch muss zum Eintritt der inneren Carotis gedient haben.

Masse dieses Schädels sind:

Vorhandene Länge längs der Mittellinie	m
Grösste Breite an den Jochbögen	,,
Breite des Foramen magnum	,,
Höhe des ", ",	,,
Gesammtbreite beider Condylen	,,
Grösste Länge der einzelnen Condylen	,,
Länge des Unterrandes der Schädelhinterwand	,
Transversale Breite der Glenoidflächen	,
Entfernung der beiden Glenoidflächen voneinander	,
Entfernung des Oberrandes der hinteren Nasenöffnung vom Unterrand des Foramen magnum. 17.5,	,
Gesammtbreite der beiden Pterygoidfortsätze der Alisphenoidea	,
Ihre Höhe bis zum Unterrand des Foramen für den Alisphenoidcanal	,
Breite der hinteren Nasenöffnung	,,
Länge des Maxillare sammt Alisphenoid	,
Länge der Alveolen der M_2 und M_3	"
Entfernung des vorderen Alveolarrandes des M_3 vom Unterrand der hinteren Oeffnung des	
Infraorbitalcanales	,
Länge des Jochbogens bis zum tiefsten Punkte der Orbita	,
Grösste Höhe desselben am hinteren Ende	

Senkrechte Diagonale der vorderen Raute desselben (von der Spina postorbitalis nach abwärts) 15	cni
Schmalste Stelle zwischen beiden Punkten	**
Gesammtbreite der Prämaxillaria zwischen den Foram infraorb 50	21
" " " am vorderen Ende	77
Senkrechter Durchmesser der Stosszahn-Alveole am ersteren Orte	**
" " " " letzteren Orte	**
Grösste Breite der Prämaxillargrube	**
Kleinste (vorhandene) Breite derselben	**
Erhaltene Länge der Prämaxillaria bis zum aufsteigenden Nasencanal 64	.,
Von da bis zur Schädelhinterwand (in der Depression f. d. Ligam. nuchae)	**
Gaumenbreite	*9
Gesammtbreite des Schädels am Vorderrande der Orbiten (die doppelte linke Hälfte ge-	
nommen)	

Das von Nesti¹) schon beschriebene und abgebildete Schädelfragment von Monte Carlo im oberen Arnothal besteht aus dem mittleren Theil der linken Stosszahn-Alveole sammt Augenhöhle, der anstossenden Partie der Prämaxillargrube, einem Stück der rechten Alveole sammt dem Gaumen und drei Molaren (rechter M_3 und linke $M_2 - M_3$). Das Individuum war also von ungefähr ganz demselben Alter, wie das, dem der soeben beschriebene Schädel angehört hatte. Doch war es von etwas bedeutenderer Grösse, denn die Alveolen, die z. B. bei dem Schädel von Percussina nur 14 cm im transversalen Durchmesser (vor dem Foramen infraorbitale) besitzen, zeigen hier einen solchen von 17.5 cm. Allerdings ist dabei auch Quetschung von oben im Spiele gewesen, von der es auch herrührt, dass medianwärts die Alveole sich viel bedeutender über die grosse Grube der Prämaxillaria hinüberlegt, so dass ihr Boden breiter ist als die obere Oeffnung. Zum Theil ist dies jedoch, wie bereits erwähnt, auch bei dem früheren Schädel zu constatiren gewesen.

Worin dieses Fragment dem prächtigen Schädel ergänzend zur Seite tritt, ist die zwar bloss auf einer Seite, doch besser erhaltene Orbita. Sie zeigt sich hier von ganz ausserordentlich dicken, wulstigen Rändern umgeben und ragt insbesondere nach oben-vorn sehr beträchtlich über die Stosszahn-Alveolen hervor.

Der Gaumen ist vorn unmittelbar über dem Vorderrand des M_2 quer abgebrochen und zeigt hier eine in der Mitte kaum 1 cm dicke, seitlich etwas stärkere (bis 2.5 cm) solide Knochenplatte, di in ihrem jetzigen Zustand keinerlei Zusammensetzung aus etwa zwei Lamellen (Prämaxillaria und Maxillaria) erkennen lässt. Auch von Canälen sind keine Foramina zu sehen. An der transversal concaven Oberseite begrenzen zur Seite der Mediane zwei annähernd parallele, schwache Kämme eine geringe Depression, die eine Breite von etwa 5 cm besitzt. Sie endigt noch vor dem hinteren Bruch.

Dieser ist wieder ober dem Hinterrande des M_3 erfolgt. Der Gaumen hat daselbst in der Mitte eine Dicke von bereits 8 cm erreicht. Der Bruch zeigt kleinzellig-spongiöse Knochenmasse. Der Gaumen selbst hat eine Breite von etwa 9 cm und zeigt in der Mitte eine mehr als 2 cm tiefe Furche mit senkrecht abfallenden Rändern und einer Breite von ungefähr 5^*5 cm. Die Dicke des Gaumens beträgt daher an der Seite 11 cm.

Dieser Befund des Gaumens ist sehr abweichend von dem am Schädel, indem hier eine Dicke seines Knochens von 8 cm etwa schon ober dem Vorderrand des M_3 erreicht wird, ober dessen Mitte jedoch die senkrecht aufsteigende Vorderwand des Nasenraumes sich befindet, daher sein Hinter-

¹⁾ F. Nesti: Lettera secondadell' Osteologia del Mastodonte a denti stretti al Sig. Prof. L. Canali di Perugia. Pisa, 1826.

rand schon unter den letzteren zu liegen kommt. Es ist dies umso bemerkenswerther, als beide Thiere ungefähr in demselben Alter standen, ja es der Schädel mit seiner gleichsam weniger weit vorgeschobenen Zahnreihe ist, der durch stärkere Usur, insbesondere des M_2 , ein höheres Alter seines Eigenthümers bekundet.

Zu diesem Schädelfragment gehört auch ein Unterkiefer, dem jedoch der grösste Theil beider aufsteigenden Aeste fehlt.

Auf Tafel XV, Fig. 4, gelangte in einem Drittel der natürlichen Grösse ein jugendlicher Schädel sammt Unterkiefer von Mastodon Arvernensis zur Abbildung, der bei der im Jahre 1880 von Forsyth Major unternommenen Ausgrabung bei Montopoli im unteren Arnothal zu Tage gefördert wurde. Er ist jedoch leider vollkommen zertrümmert und verquetscht, so dass nicht mehr als die allerrohesten Umrisse zu sehen sind. Was er jedoch zeigen kann, ist, dass der Schädel dieses Proboscidiers im Jugendzustande lange nicht so abnorm gebaut war, als im erwachsenen und sich hierin ganz den Verhältnissen unserer Elephanten anfügte.

Der Gehirnantheil war weitaus überwiegend, die sonst so enormen Prämaxillaria klein. Doch ist bezüglich der letzteren der jetzige Zustand nicht der natürliche, indem der vorragende Theil der Stosszahn-Alveolen bei der Präparation abbröckelte und so nur die freigelegten Incisiven sichtbar sind. Es sind die gegen 1 dm langen Milchincisiven, die nach dem Befund ihrer Lage im Gestein auf die gleichfalls schon sichtbaren und gegen 4 cm weit hervorragenden bleibenden Stosszähne aufgeklebt sind. Die Prämaxillaria mussten natürlich auch die ersteren umschlossen haben. Auch die Nasenöffnung liegt sehr tief, zwischen den Orbiten. Unter derselben ist die tiefe Prämaxillargrube schon ziemlich stark zu sehen. Die Stosszahn-Alveolen und die Stosszähne selbst laufen zwar parallel, dass dies aber auch der natürliche Zustand gewesen sei, ist sehr unwahrscheinlich.

Von Backenzähnen standen der vorderste und mittlere Milchmolar in Usur. Gerade — und zwar jugendlichen Elephantenschädeln gegenüber sehr hoch — über dem letzteren liegen die grossen Orbita. Während der dieselben bei Elephanten nach hinten begrenzende, vom Processus postorbitalis zum Vorderrand der Alisphenoidcalotte ziehende Kamm bei dem erwachsenen Mastodonschädel sich gegen aufwärts zu verlieren schien, ist er hier in seinem ganzen Verlaufe deutlich sichtbar. Dass nach hinten steil aufsteigend auch D_1 und sogar in seinen Anfängen M_1 zu sehen ist, ist offenbar nur dem Umstande zuzuschreiben, dass die erwähnte, die Maxillaria von hinten überdeckende Alisphenoidcalotte, wie die Prämaxillaria, abbröckelte und sorgfältigst wegpräparirt wurde. Im natürlichen Zustande war wahrscheinlich nur der letzte Milchzahn im Begriffe, mit seinem vordersten Joche durchzubrechen.

Totale Länge des Schädels vom Vorderrand des D_3 bis zum entferntesten Punkte des

Hinterrandes	 33.2 cm
Länge des Jochbogens	 15 ,,
Höhe der Orbiten über der Zahnbasis	 7 ;;
Höhe der Augenhöhle selbst	 7 ,,
Breite derselben (senkrecht darauf)	 6.5 ,,
Entfernung des Vorderrandes des D_3 vom Hinterrand des D_1	 14 ,,

Ausser diesen Schädeln und Schädelfragmenten besitzt das Florentiner Museum endlich noch ein Gaumenfragment, das zusammen mit vielen Knochen des Skeletts, die gleichfalls hier aufbewahrt werden, vor vielen Jahren schon, gleichfalls bei Montopoli, gefunden wurde. Doch ist diese Gaumenpartie zu schlecht erhalten, als dass sie etwas Neues lehren könnte. Der Gaumen selbst ist vorne ist cm breit und in der Mitte, wie schon an den früheren Schädeln bemerkt, mit einer Längsfurche versehen, die hier nur etwas breiter (etwa 7 cm) und durch einen Längskamm getheilt ist.

Was die Verwandtschaftsverhältnisse betrifft, so steht dem Mastodon Arvernensis sonder Frage das indische Mastodon Sivalensis weitaus am nächsten. Ausser den Backenzähnen, nach denen beide Formen seinerzeit von Cautley sogar identificirt wurden, zeigt auch der Schädelbau viele gemeinsame Züge, wenn auch natürlich beide noch immer sehr gut und scharf voneinander geschieden sind. Das Hinterhaupt ist bei beiden fast gleichgeformt, die ganz sonderbar gestalteten Orbita finden sich am ähnlichsten nur bei dieser sivalischen Art wieder und auch die so überaus charakteristischen Prämaxillaria verbreitern sich bei letzterer nach abwärts beträchtlich, sowie nach Falconer's Abbildung¹) auch die tiefe Grube zwischen den scharf markirten Stosszahn-Alveolen hier, wenn auch nur angedeutet und sehr seicht, so doch in ihrer Anlage und Form deutlich in ähnlicher Weise vorhanden ist.

Es bildet also diese Form wieder ein Glied mehr in der Reihe derjenigen Thiere, die zwischen den pliocänen Faunen Indiens und Europas so enge Beziehungen erkennen lassen und weiterhin noch unter den Raubthieren, Elephanten, Paar- und Unpaarhufern ihre Vertreter finden.

Unterkiefer: Zuerst sei hier jenes Unterkieferfragmentes Erwähnung gethan, auf das hin schon Nesti im Jahre 1808²) die Gegenwart eines zweiten Elephanten (nebst *El. primigenius*) vermuthete, dem er jedoch damals keinen Namen gab. Cuvier wies jedoch im Jahre 1821³) nach, dass dieser Mandibel, der leider die Zähne fehlten, alle Eigenthümlichkeiten seines "Mastodonte à dents étroites" zukommen, die ihn daher "engagent à la rapporter à l'espèce dont je trait à présent".

Wodurch diese hauptsächlich ihr charakteristisches Gepräge bekommt, ist die Bildung und der Ansatz des Schnabels. Von der Innenseite der Molaren geht beiderseits eine hohe, scharfe, mit der anderen annähernd parallel laufende Crista aus, die einen wohlgerundeten, transversal concaven, sagittal convexen Symphysencanal einschliesst. Derselbe besitzt hinten eine Breite von etwa 7.5 cm, vorne von 6 cm, verengt sich aber hierauf rasch auf etwa 2 cm, indem er auf den eigentlichen Schnabel übertritt. Die Mittellinie desselben ist in der Fortsetzung der erwähnten Convexität des Canales nach vorn-abwärts gerichtet. Gegen seine Spitze verbreitert er sich wieder ein wenig und bildet so einen von der übrigen Symphyse sehr scharf abgesetzten, schmalen und langen Vorsprung. Ist dieses Verhalten schon bezeichnend, so liegt sein Hauptcharakteristikon in der Profilansicht. Im Allgemeinen zeigt er da die Symphysenform eines jugendlichen Elephanten, repräsentirt daher durch dieses Beibehalten der Jugendform eines entwickelteren Typus bis in's Alter seine alterthümlichere Organisation. Die ganze Symphyse und insbesondere der Schnabel ragt weit vor und dacht an seiner Oberseite flach nach vorne ab. Einen bezeichnenden Unterschied weist jedoch der Unterrand auf, indem er nicht gleichfalls nach abwärts gebogen ist, wie selbst bei dem sehr jungen Kiefer von El. meridionalis, Tafel VII, Fig. 2, sondern, wie dies Nesti's, Cuvier's und unsere Figur (Taf. XIV, Fig. 7) zeigt, ziemlich stark sich nach aufwärts biegt, um den Schnabel zu erreichen. Dieser erscheint daher auch im Profil scharf abgesetzt, ungefähr in der Mitte zwischen Ober- und Unterrand gelegen und nicht in der directen Verlängerung des letzteren oder sich vielleicht sogar mit diesem unter die ganze Basis des Kiefers abbeugend, wie dies bei den Elephanten der Fall ist.

Ausser diesem liegen mir noch vier andere Kiefer, sowie der Gypsabguss eines fünften vor, die sämmtliche diese Charakteristika — natürlich mit einigen Variationen geringerer Bedeutung — aufweisen. Der Unterrand ist stets durchgehends convex und steigt vorne zum Schnabel empor, wenn dieser auch in keinem Falle mehr erhalten ist. Der horizontale Ast ist — wie an Fig. 6, Tafel XIV,

¹⁾ F. A. S. Taf. 43, Fig. VIII.

²⁾ F. Nesti: Di alcune ossa fossili di Mammiferi, che s'incontrano nel Valdarno. 1808, S. 12, und Taf. I, Fig. 1 und 2.

³⁾ G. Cuvier: Ossem. foss. T. I, S. 161, und eine Copie der Nesti'schen Abbildung, Taf. IX nach Seite 204.

gut zu sehen — gegenüber den Elephanten sehr schlank, mit parallelem Ober- und Unterrand, ähnlich wie dies auch bei den von Falconer¹) abgebildeten Kiefern von Mastodon Ohioticus und Andium der Fall ist. Der ebendaselbst dargestellte Kiefer von Mastodon Sivalensis schliesst sich jedoch mit seinem nach vorn sich erhebenden Oberrand mehr den Elephanten an.

Von allen anderen Mastodonten unterscheidet sich unsere Form wieder in der Aufsicht. Hier divergiren, nach Elephantenart, die horizontalen Aeste sehr bedeutend, während sie bei Mastodon angustidens, longirostris, Ohioticus, Andium, Humboldtii und auch bei Mast. Sivalensis einander mehr genähert erscheinen. Es hat dies offenbar hier seinen Grund in der sehr bedeutenden Breite des Gaumens. Es tritt dies besonders deutlich an zwei (nicht zur Abbildung gelangten) Unterkiefern des Mast. Arvernensis im Florentiner Museum zu Tage.

Die vordere Kante des verticalen Astes steigt, wie wohl stets bei Mastodonten, senkrecht zur Alveolarlinie empor, während sie bei Elephanten immer mehr oder weniger nach vorn übergeneigt ist. Auch der Hinterrand ist weniger ausgeschweift, der ganze aufsteigende Ast überhaupt schlanker als bei den Elephanten, während Mast. Sivalensis auch hierin sich diesen mehr nähert.

Der Unterkiefer der Mastodonten ohne untere Incisiven zeigt daher gegen die Elephanten einige sehr charakteristische Merkmale, die sich jedoch fast alle als Kennzeichen deuten lassen, dass Mastodon einen jugendlicheren Typus in der Entwicklung der Proboscidier vorstellt als Elephas, bei dem sie zumeist im unerwachsenen Zustand mehr oder weniger deutlich auch vorhanden sind. Dahin gehören: das flache Vorspringen der Symphyse mit dem Schnabel, die breite und seichte Höhlung des Symphysencanales, die schlanken Horizontaläste, die relativ schmalen Verticaläste und sogar auch der Winkel, den die Vorderkante des letzteren mit der Alveolarlinie bildet.

Am Schädel liessen sich constant zwei Merkmale derselben Bedeutung anführen: die Prämaxillaria bilden gegen die Alveolarlinie der Molaren einen sehr stumpfen Winkel, der, bei Elephanten anfangs gleichfalls vorhanden, später immer kleiner wird, und die Orbiten liegen bei den Mastodonten relativ weiter zurück als bei den erwachsenen Elephanten und befinden sich zumeist ganz über der Molarenreihe, wie auch bei jungen Elephanten, bei denen sie jedoch im Laufe des Wachsthums mehr oder weniger weit über dieselbe nach vorn hinausrücken.

Bezahnung.

1. Incisiven.

a) Milchincisiven:

Wie an früherer Stelle schon bemerkt, sind an dem jugendlichen Schädel von Montopoli (Forsyth Major's Ausgrabung im Jahre 1880) beide Milchincisiven sammt den Spitzen der nachrückenden bleibenden Zähne erhalten. Erstere sind gerade, gegen die Spitze schwach abnehmend, letztere selbst zugerundet. Ihre Länge ist etwa 85 mm; sie sind wie der ganze Schädel seitlich comprimirt, jedenfalls aber erst durch spätere Entstellung. Dabei beträgt der senkrechte Durchmesser 6 cm, hinter der Spitze 21 mm, der transversale 15 mm. Hinter diesen 6 cm erleidet der Zahn eine leichte Einschnürung zu 19 mm grössten Durchmessers, welcher Abschnitt daher vielleicht als Wurzel gedeutet werden kann, die des nachrückenden definitiven Zahnes wegen schon zum grössten Theil resorbirt wurde. Nur wäre dann bei den lebenden Elephanten die Krone sehr viel kürzer. Lartet gibt an, dass dieselbe nach Corse auch mit Email bedeckt sei. Hier fehlt es jedoch fast vollständig; nur unmittelbar an der

¹⁾ F. A. S. Taf. 35, Fig. 5 und 3a.

Spitze und an der Aussenseite jedes Zahnes ist je ein Stückchen Email vorhanden, von einer Länge und Breite etwa von 8 mm. Es ist dies jedenfalls der Rest einer ehemaligen Schmelzkappe, welche die Spitze umkleidet und sich an der Aussenseite weiter hinauf erstreckt hatte, wie etwas ganz Gleiches auch Vacek von einem, nach ihm allerdings definitiven Stosszahn des Unterkiefers von Mastodon longirostris aus dem Belvedèresande des Laaerberges bei Wien angibt. Nach diesen Verhältnissen und dem von Lartet beschriebenen und abgebildeten Milchincisiven von Mastodon angustidens möchte ich mich jedoch schliesslich mehr der Ansicht zuneigen, dass fast die gesammte erhaltene Zahnpartie als Wurzel anzusprechen sei und von der eigentlichen, kurzen, schmelzbedeckten Krone nur die letzten Reste vorne noch erhalten seien.

Als Consequenz müsste man dabei aber dann wohl auch annehmen, dass die zerstörten Prämaxillaria bis nahe zur Spitze des Zahnes in seiner jetzigen Gestalt gereicht, sie daher auch schon in der Jugend eine sehr bedeutende Ausdehnung besessen hätten.

b) Bleibende Incisiven:

An demselben Schädel sind auch die Spitzen der nachrückenden bleibenden Incisiven sichtbar. Sie sind ebenfalls seitlich comprimirt und endigen, ähnlich wie die einzelnen Joche der Molaren von Elephas, beiderseits in drei fingerförmige, doch bis zur Spitze verwachsene Papillen. Diese treten besonders an der Innenseite in Folge zweier tiefen Furchen sehr stark hervor; undeutlich an der Aussenseite. Der grössere, senkrechte Durchmesser beträgt etwa 2 cm, der kleinere 1.5 cm. Der rechte Zahn ist an der Aussenseite über eine Länge von ungefähr 6.5 cm freigelegt. Er ist überall mit einer etwa 1.5 mm dicken Schmelzschicht, deren faseriges Gefüge an einigen Bruchstellen sehr deutlich sichtbar ist, bedeckt.

In ähnlicher Weise findet sich eine solche Schmelzkappe an den von Vacek beschriebenen unteren Incisiven von Mastodon longirostris, dessen oberen Incisiven jedoch nach demselben Autor jegliches Email fehlt.³) Dasselbe findet statt an den unteren Incisiven von Mastodon angustidens, während die oberen ein breites Schmelzband an der concaven Seite besitzen. An der convexen kommt hingegen nach Lartet ein solches bei Mastodon tapiroides vor. Der von demselben seinem Mastodon Pyrenaicus zugeschriebene Stosszahn von Saint-Gaudins (Haute-Garonne) zeichnet sich durch Mangel von Email aus.

Uebrigens sollen nach Pohlig⁴) auch noch beim jugendlichen bleibenden Stosszahn von *Elephas* primigenius Spuren einer Schmelzbedeckung wahrzunehmen sein.

Von Stosszähnen des Mastodon Arvernensis im erwachsenen Zustand liegen vor: die beiden Exemplare in dem Schädel von Percussina, ein solcher gefunden mit Resten desselben Individuums bei Montopoli im unteren Arnothal, ein isolirter von Sammezzano im oberen Arnothal und ein gleichfalls isolirter von Ceprano in der Provinz Neapel.

Ueber die Beschaffenheit und Lage der Alveole dieser Zähne wurde schon an früherer Stelle Erwähnung gethan. Die Form des Zahnes innerhalb derselben ist leicht concav nach aussen, bald nach dem Austritt wendet er sich nach oben und ein wenig nach innen. Von der Abwärtskrümmung, wie sie Sismonda an seinem Exemplar von Villafranca beschreibt und abbildet,⁵) ist hier im obersten Theile des Zahnes nichts zu sehen; im Gegentheil, in der Profilansicht erscheint der Zahn hier selbst an dieser Stelle concav nach aufwärts und nicht nach abwärts. Ueberhaupt nehmen auch sämmtliche

¹⁾ M. Vacek: Ueber österr. Mastodonten etc. Abhandl. d. k. k. geol. Reichs-Anst. Bd. VII, Wien 1877, St. 28.

²⁾ Lartet: Sur la dentition des proboscidiens fossiles, etc. Bull. Soc. géol. Fr. 1858-59, S. 490, Taf. XIV, Fig. 1.

³⁾ M. Vacek: Ueber österr. Mastodonten, S. 31.

⁴⁾ H. Pohlig: Ueber die Spitze eines sehr jugendlichen permanenten Stosszahnes von El. primigenius. Sitzber. nieder rhein. Ges. Bonn, 1887, S. 254.

⁵⁾ E. Sismonda: Osteografia d'un Mastodonte angustidente. Turin, 1851, S. 21, Taf. I, Fig 4-5.

mir vorliegenden Zähne ausserordentlich viel langsamer an Stärke ab, als dies nach Sismonda's Figuren für die von ihm behandelten Reste erhellt. Weiter erwähnt derselbe Autor auch eine "striscia di smalto a struttura evidentemente fibrosa e limitata alla superficie superior-interna", wie sie, nur an der entgegengesetzten Seite, nach Biedermann und Vacek¹) bei Mastodon angustidens zwar vorkommt, nach letzterem Autor jedoch dem Mastodon longirostris fehlt. Im Gegensatz zu Sismonda kann ich jedoch an meinem Material, in Uebereinstimmung mit der Angabe Lartet's, nichts von diesem Schmelzstreif entdecken. Sowohl im Durchschnitt zeigt sich längs der Peripherie stets die gleiche Structur, als auch an der Oberfläche des Zahnes stets dieselbe Beschaffenheit, insbesondere dieselbe Härte ringsum zu beobachten ist.

Die beiden Zähne des Schädels von Percussina divergiren ausserordentlich stark und constant von der Wurzel bis zur Spitze. Der linke ist jedoch in etwa der Hälfte seines freien Verlaufes abgebrochen. Diese Verletzung muss aber noch bei Lebzeiten des Thieres erfolgt sein, da die Bruchränder durch den Gebrauch vollkommen gerundet, der Zahn selbst zugeschärft erscheint.

Gleich nach dem Austritte aus der Alveole zeigen die Zähne eine sehr grobe, doch flache Cannelirung — nach Art etwa einer korinthischen Säule, doch nur sehr seicht — deren einzelnen Furchen 2·5—4 cm breit sind.

```
Gesammtlänge des rechten Zahnes (aussen, längs der Krümmung) . . . 220
                                                                      cm.
Durchmesser des annähernd kreisrunden Querschnittes an der Basis . .
                                                                 12.5 "
Grösserer (senkrechter) Durchmesser 35 cm vor der Alveole . . . . .
                                                                 12'5 "
Kleinerer (querer)
                                                                 11.2 "
                               27 29
Grösserer (senkrechter) Durchmesser 50 cm hinter der Spitze . . . .
                                                                 11'3 ,
Kleinerer (transversaler)
                               22 27
                                      "
                                             19
                                           27
Ungefähre Entfernung beider Spitzen im unverletzten Zustand
                                                                155
Entfernung der Zähne beim Verlassen der Alveole
                                                                 47
Länge der Sehne (Spitze-Wurzel)
                                                                205
Ihre grösste Entfernung vom Zahn
                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

Der Zahn von Sammezzano zeigt genau dieselbe Krümmung, wie der soeben besprochene. Er nimmt auch gegen die Spitze sehr langsam an Stärke ab, die Spitze selbst ist zu einer transversalen Schneide abgenützt. Der vollständige Zahn des Schädels weist hingegen nur eine kleine elliptische Nutzfläche mit einem sagittalen Durchmesser von 6 cm und einem queren von 3 cm auf, die die Spitze von hinten-unten nach oben-vorne schräg abstutzt. Emailband ist hier ebenfalls keines zu sehen; die Zahnsubstanz zeigt dieselben breiten, flachen Cannelirungen. Der Zahn ist in seiner ganzen Erstreckung nach oben concav gekrümmt.

¹⁾ Auch Lartet gibt das Vorhandensein derselben bei Mast. angustidens an der concaven, also unteren Seite an (l. c. S. 491).

Dieselben Verhältnisse finden sich auch wieder an dem bei Montopoli zugleich mit einem Gaumenfragment, dem Unterkiefer, Becken, einem Theile je einer Vorder- und Hinterextremität, einer Scapula, sowie Atlas und Epistropheus ausgegrabenen linken Stosszahn, der jedoch, wie alle die Knochen, weniger gut erhalten, zum Theil zerdrückt und angewittert ist. Er ist jedoch etwas schlanker, die Krümmung aber genau wieder dieselbe, nur stärker. Von einer Convexität nach oben in seiner Wurzelpartie ist gleichfalls nichts zu sehen; sie ist, wie im Profil der ganze Zahn, nach aufwärts concav. Ebenso fehlt jegliche Spur von Email. Das vordere Ende ist viel schärfer zugespitzt als früher.

Gesammtlänge des Zahnes, aussen, l	längs der	Krümmung							258	cm
Ungefähr 50 cm vor dem (zer- f	Grösserer	(senkrechter)	Durchmesser						13.2	**
quetschten) Wurzelende										
115 cm vor dem Wurzelende	Grösserer	Durchmesser							11.7	12
115 cm vor dem wurzelende	Kleinerer	22							10	
Ungefähr 50 cm hinter der Spitze	Grösserer	Durchmesser	(etwas nach i	nnen	ge	dreht)			9	77
Ongerant 50 cm militer der Spitze	Kleinerer	22	(senkrecht dan	rauf)					7.5	39
Länge der Sehne (Spitze — Wurzel))						٠	٠	225	
Ihre grösste Entfernung vom Zahn									40	**

Der Zahn endlich von Ceprano ist viel schwächer gekrümmt. Im Profil zeigt er eine flache Concavität nach oben, in der Aufsicht ist die S-förmige Curve nur sehr leicht angedeutet. Er nimmt auch mehr gleichmässig von der Basis zur Spitze ab. Schmelzband ist keines vorhanden. Der Querschnitt ist überall kreisrund.

Depéret 1) führt an, dass ein von Companyo 2) abgebildeter und beschriebener, fast vollständiger Stosszahn von Perpignan eine Länge von 2.68 m und kein Schmelzband besitze. Letzteres findet auch an einem anderen im Museum dieser Stadt befindlichen Stosszahnfragmente statt. An einem von ihm selbst gefundenen Fragment von 47 cm Länge beschreibt er jedoch "sur la face interne une surface plane, creusée en gouttière et limitée par deux lèvres rectilignes", welche nach ihm ganz zweifellos einem Emailband zum Lager gedient hat.

Auch Gervais 3) erwähnt ein Fragment eines dem Mast, brevirostris zugeschriebenen Stosszahnes, das ein Emailband besitzen soll, Depéret citirt jedoch wieder in einer Fussnote in seinem oben genannten Werke 4) ein "dans les galeries du Muséum sous le nom de Mastodon brevirostris de Montpellier" befindliches Vorderende eines solchen Zahnes von 70 cm Länge, das keine Spur eines solchen Bandes trägt. Nichtsdestoweniger spricht er sich jedoch bei der Zusammenfassung der Merkmale des Mastodon Arvernensis 5) dahin aus, dass er "im Gegensatz zu der Ansicht Lartet's und

¹⁾ Ch. Depéret: Vertébrés foss. du Roussillon, S. 153.

²⁾ Companyo: Histoire naturelle des Pyrénées-Orientales, 1861, Vol., I, Taf. I, Fig. 3.

³⁾ Gervais, Zool. et. Pal. fr., S. 66, Taf. III, Fig. 8.

^{4) 1,} c. S. 155.

⁵) 1. c. S. 159.

Gervai's (?) glaubt, dass die Stosszähne desselben, wie bei M. angustidens, an ihrer Innenseite ein Emailband getragen hätten, à servir de surface de frottement".

Ob nun diese Verhältnisse wirklich variabel seien, oder ob die Angaben des Vorhandenseins von Email über die ganze Länge des erwachsenen Zahnes auf unrichtiger Beobachtung oder falscher Bestimmung beruhen, kann natürlich nicht entschieden werden. Das muss jedoch betont werden, dass sämmtliche vier fast vollständigen Zähne des Florentiner Museums, die gewiss auch vier verschiedenen Individuen angehört hatten, keine Spur eines solchen Schmelzbandes besitzen, wohl aber der einzige vorhandene jugendliche Stosszahn an seiner ursprünglichen Spitze eine Schmelzkappe trägt, die unbestimmt weit — gewiss jedoch über 6.5 cm an der Aussenseite — nach hinten gereicht hat.

Allen vorhandenen Unterkiefern (fünf) fehlt jedes Anzeichen eines etwaigen unteren Incisiven Auch an dem jugendlichen Unterkiefer, der zu dem Schädel von Montopoli gehört, sowie an einem zweiten ungefähr desselben Alters und von derselben Localität ist nichts zu bemerken, was auf das Vorhandensein von Incisiven schliessen liesse.

2. Backenzähne.

a) Prämolaren?

Falconer spricht in seiner Schrift über die britischen und europäischen Mastodonten 1) die Ansicht aus, dass das von Croizet und Jobert im Zusammenhang mit dem typischen Oberkiefer des Mastodon Arvernensis abgebildete Zahnfragment ein Prämolar sei und dass er an dem Original sehr deutlich (distinctly) "the remains of part of the alveolus of a vertical premolar above the penultimate milk molar" gesehen habe; "and M. Laurillard," sagt er weiter, "informed me that he had seen the germ of this premolar, the tooth "A" above referred to being the one in question, i. e. the penultimate premolar." Der Ersatzzahn des letzten Milchmolars sei jedoch noch nicht gefunden worden.

Im Jahre 1879 wurde dasselbe Exemplar (nur vervollständigt, wie auch schon Croizet und Jobert angeben) von Lortet und Chantre²) wieder abgebildet; diese Autoren bemerken jedoch — nach einer Aufzählung und kurzen Charakterisirung der Milchzähne des Oberkiefers im Allgemeinen — darüber nur:³) "La figure 1 de la planche VII représente la pièce qui a servi de type à Croizet et Jobert pour créer cette espèce. Ce *Mastodon Arvernensis* montre cette première dentition complète." Sie sehen also diesen letzten Zahn als dritten Milchzahn an.

Mir liegt der schon vielfach genannte Schädel von Montopoli sammt dazugehörigem Unterkiefer, sowie ein isolirtes Exemplar des letzteren vor, die sämmtliche D_3 und D_2 in Usur, D_1 aber im Begriffe nachzurücken enthalten. Wenn ein Prämolar entwickelt würde, müsste er daher hier wohl zu sehen sein. Obzwar ich nun aber im Oberkiefer ziemlich tief nachgrub, den Unterkiefer aber quer durchbrach und hier nachsuchte, konnte ich keine Spur eines etwaigen zum verticalen Ersatz bestimmten Zahnes entdecken. Dasselbe gilt auch von dem zweiten Unterkiefer, dessen Knochen stark verletzt ist, aber durch nichts die Anwesenheit oder auch nur ehemalige Anwesenheit eines Prämolaren andeutet.

Ein solcher muss daher bei *Mastodon Arvernensis* als bis jetzt noch nicht nachgewiesen betrachtet werden; wohl aber vereinigen sich alle Fälle dahin, dass überhaupt keine vorhanden waren. Es fällt daher dieser Grund weg, der diesen europäischen Mastodonten von seinem ihm zunächst stehenden indischen Verwandten *Mastodon Sivalensis* trennen könnte.⁴)

¹⁾ H. Falconer, Palzont. Memoirs and Notes. Comp. and edit. by Ch. Murchison; London, 1868; Vol. II, S. 34.

²⁾ Lortet et Chantre: Recherches sur les Mastodontes, etc., Taf. VII, Fig. 1 und 1 a.

³) l. c. S. 299.

⁴⁾ Vergl. R. Lydekker: Siv. and Narb. Probascidea, S. 251 (70) und 255 (74).

b) Milchmolaren (Taf. XIII, Fig. 1 und 1a; Taf. XIV, Fig. 1-4a; Taf. XV, Fig. 4):

Das vorliegende Material besteht aus dem vollständigen Milchgebiss des Ober- und Unterkiefers zweier Individuen, gefunden 1880 bei der Ausgrabung bei Montopoli von Forsyth Major. Vom zweiten Individuum (B) ist jedoch nur der Unterkiefer im Zusammenhang; die Zähne des Oberkiefers sind isolirt. Dieselbe Gelegenheit lieferte auch noch einen vereinzelten oberen D_2 eines dritten (C), jedoch bedeutend jüngeren Individuums. Ausser diesen besitzt das Museum noch den Gypsabguss eines Unterkieferfragmentes mit D_2 und stark verletzt D_3 , das bei Asti gefunden wurde (D).

Der obere vorderste Milchzahn ist von abgestutzt dreieckiger (B) oder abgerundet rechteckiger (A) Form und besitzt im Allgemeinen zwei Höckerreihen sammt kleinem vorderen und
hinteren Talon. Die Joche und ihre Theile sind jedoch sehr ungleich entwickelt. Das vordere besteht
aus einem hohen, die übrigen weit überragenden, grossen Aussentuberkel (Taf. XIV, Fig. 3), dem nach
innen und etwas nach vorn ein bedeutend kleinerer angelagert ist. Am zweiten Joche ist wieder der
innere Höcker stärker ausgebildet. Die einzelnen Tuberkel sind durch einen Basalkragen miteinander verbunden.

	A	B
Länge	. 23 mm	25 mm
Grössere Breite	. 18 "	22 ,,

Der untere D_3 ist bedeutend kleiner (Taf. XIII, Fig. 1 und 1a), insbesondere schmäler. Er besteht bei B aus zwei gleich grossen, hohen, eng aneinander gelagerten Tuberkeln, vorn einem kleinen Talon und hinten aus einem zweihöckerigen, niedrigen Joch, das auch nicht viel anders als ein Talon aussieht. Bei A, dem zum Schädel gehörigen Unterkiefer, zeigen die Haupthöcker die gleiche Beschaffenheit, das hintere Tuberkelpaar ist aber vollends zu einem kleinen, einhöckerigen, gegen aussen zu gelegenen hinteren Talon reducirt. Von den beiden hochkonischen Haupthöckern ist hier wieder der äussere etwas vorgerückt. Beidemal ist ein kleiner eingipfliger, vorderer Talon vorhanden.

													A		B	
Länge			٠		٠	•	٠	٠			٠	٠	17.5 mm	2 I	mı	m
Grösste	Br	eite							٠				11.5 %	15	11	

Der obere D_2 besteht aus drei Höckerpaaren, die durch die Verschiebung der inneren Tuberkel etwas alterniren. Bei manchen Zähnen, besonders wahrscheinlich jüngeren (= C= Taf. XIV, Fig. 4), ist diese Alternation kaum angedeutet, bei älteren tritt sie deutlicher hervor. Vom vorderen inneren Tuberkel zieht sich ein höckeriger, an Höhe stets abnehmender Rücken vor die Vorderseite des vorderen äussern, desgleichen senden letzterer und der mittlere innere einander Vorsprünge entgegen, die manchmal auch die Gestalt eines selbstständigen Zwischentuberkels, annehmen und das vordere Thal sperren. Etwas Aehnliches geschieht auch von Seiten des mittleren äusseren und des hinteren innern, und da der letztgenannte, ähnlich wie der Vorderinnertuberkel, einen mehrgipfligen Kamm an der Hinterseite des Zahnes gegen aussen sendet, so wird dadurch der stets etwas kleinere Hinteraussentuberkel von dem inneren mehr oder weniger umfasst (Taf. XIV, Fig. 2).

						A	B	C
Länge	•					46 mm	47 mm	44 mm
Breite { vordere hintere	•			٠		33 "	35 "	29 ,,
hintere						33 ,,	37 ,,	32 ,,

Der untere D_2 (Taf. XIII, Fig. 1 und 1a) ist gegen den oberen bedeutend mehr in die Länge gestreckt, auch nach vorne zu mehr verschmälert. Wieder ist es die innere Höckerreihe, die gegen vorne verschoben ist. In der Mittellinie liegt am Vorderrand ein elliptischer Höcker, der auch

bei starker Abkauung nicht das Bestreben zeigt, mit einem der nachfolgenden zu verschmelzen; er legt sich an beide gleichmässig an. Das erste Tuberkelpaar liegt annähernd in einer Linie, und auch hier ist es von diesem der äussere Tuberkel, der dem mediointernen zu einen Vorsprung bildet, während von diesem ein ähnliches Gebilde dem ersteren entgegengesendet wird. Am zweiten Höckerpaar ist das innere beträchtlich vorgerückt. Auch das zweite Thal wird hier durch eine ähnliche Bildung gesperrt wie das erste. Vom hinteren Höckerpaar ist wieder das äussere etwas zurück und greift mit einem kurzen Vorsprung an die Hinterseite des inneren.

						\mathcal{A}	B	D
Länge				•		50 mm	49 mm	56 mm
$Breite \left\{ egin{array}{l} vordere \\ hintere \end{array} ight.$		•			•	25 ,,	26 ,,	28 ,,
hintere						29 ,,	31 ,,	36 ,,

Von oberen D_1 (Taf. XIV, Fig. 1 und 1a) sind nur die des Exemplars B an ihrem vordersten Joche angekaut. Deren Gestaltung lässt sich kurz dahin charakterisiren, dass die äusseren Tuberkel, besonders in der vorderen Hälfte, die inneren an transversaler Ausdehnung übertreffen, dass hingegen letztere in das vor ihnen gelegene Thal (respective an die Vorderseite des Zahnes) gegen die Aussenseite zu einen mehr- bis vielgipfligen Kamm aussenden, welche Kämme nach hinten zu immer kürzer werden und die Thäler sperren. Vom letzten inneren Tuberkel geht ein ähnlicher Rücken auch an die Hinterseite des Zahnes ab. Dabei sind diese Innentuberkel meist blos eingipflig oder es setzen sich ein, höchstens zwei kleine Secundärhöcker gegen aussen zu an, wo dann dieses Gebilde entfernt an die halbselenodonten Zähne gewisser älterer Paarhufer erinnert, während die Aussenhöcker meist einen drei- bis vierhöckrigen First zeigen. Beiderseits ist aber stets der äussere Gipfel der höchste.

Von den erwähnten Kämmen geht der vorderste an der Vorderseite des Zahnes bis zu dessen Aussenwand und trägt dabei 5-6 Spitzen. Der zweite, ebenfalls von der Spitze des zweiten Innentuberkels ausgehend, lenkt alsbald vollständig in die Richtung des vordersten Querthales ein und läuft etwa bis zu dessen äusserem Viertel. In der Mitte des Thales stösst ein von der Innenseite des Aussentuberkels nach hinten zu ausgehender, ganz kurzer Längskamm zu ihm, über den hinaus sich ersterer jedoch noch weiter fortsetzt. Der dritte Querkamm ist wieder kürzer und erstreckt sich nur bis zu einem solchen vom zweiten Aussentuberkel ausgehenden Längsvorsprung, ebenso der vierte. Ein anscheinend vom letzten Innentuberkel auslaufender hinterer Kamm bildet eine Art Talon.

	A	B
Länge	 76 mm	80 mm
Breite am ersten Tuberkelpaar	 43 ,,	. 42 ,,
Grösste Breite (am dritten Tuberkelpaar)	 47 ,,	.47 ,,

Am unteren D_1 des Exemplars B (Taf. XIII, Fig. 1 und 1a) ist gemäss der allgemeinen Regel, dass stets die unteren Molaren in der Usur etwas weiter vorgeschritten sind als die oberen, auch das zweite Joch schon erheblich angegriffen. Waren es im Oberkiefer die äusseren Tuberkel, die sich durch eine grössere transversale Breite auszeichneten, so sind es hier im Unterkiefer die inneren. Das vorderste Tuberkelpaar liegt wieder in gleicher Linie und hat gleichmässig einen Talon vorgelagert. Am zweiten bis vierten Paare greift der innere Tuberkel beträchtlich vor seinem seitlichen Nachbar ein und erzeugt dadurch eine vollkommen ausgesprochene Alternation der Jochhälften. Das Hinterende des Zahnes ist bei A verhüllt, bei B beiderseits abgebrochen. Es sind wieder stets der vordere äussere und hintere innere Höcker, die sich Vorsprünge entgegensenden und so das ursprüngliche Thal sperren. Auch besitzen diese Zähne, wie die übrigen Unterkieferzähne, eine bedeutend langgestrecktere Gestalt.

				\mathcal{A}	B
Länge		٠		85 mm	79 mm ¹)
Pusite ∫ am	ersten Tuberkelpaar dritten ", "			36 "	36 ,
breite \ am	dritten ,, ,,			?	43 "

Alle diese Milchzähne sind dadurch ausgezeichnet, dass sie alle eine sehr ausgeprägte "Wulststreifigkeit", das Aussehen von mit "Regenfurchen bedeckten Bergabhängen" besitzen.

Die Grössenverhältnisse dieser Zähne mit denen des nächstverwandten Mastodon Sivalensis zusammengestellt, gibt nach Lydekker's und Falconer's Angaben folgende Tabelle:

				Mast. A	rvernensis	Mast. Si	valensis
				Länge	Breite	Länge	Breite
Unterer D_3				17.5 mm	11.2 mm	15°6 mm	10.4 mm
Oberer D_2			٠	46 "	33 "	67.6 "	46.8 "
Unterer $D_{\scriptscriptstyle 2}$				50 "	29 "	49*4 "	31'2 "
Oberer D_1				76 "	47	83°2 ,	52 ,
Unterer $D_{\scriptscriptstyle 1}$				85 ".	43 "	88.4 "	46.8

Die Jochformel der Milchzähne lautet für das siwalische Mastodon nach Lydekker's Richtigstellung der Falconer'schen Angabe $\frac{2+3+4}{2+3+4}$, zeigt also genau denselben tetralophodonten Charakter wie das *Mastodon Arvernensis*.

Aus der Betrachtung der obigen vergleichenden Zahlenangaben ergibt sich weiter, dass in der Grösse der Unterkieferzähne beide Formen ziemlich genau übereinstimmen, wenn auch bezüglich des D_3 und D_2 die europäische, bezüglich des D_1 aber die indische Art grössere Zahlen aufweist. Die Zähne gehören ja jedenfalls verschiedenen Individuen an.

Viel beträchtlicher ist jedoch die Abweichung in den Oberkieferzähnen, zumal diese zusammen einem Oberkieferstücke angehören. Die Länge des $D_1=100$, ergeben sich für beide Arten folgende Verhältnisse der Länge zur Breite:

Mastodon Arvernensis: 100:60. Mastodon Sivalensis: 100:80.

Der obere D_1 des ersteren ist im Allgemeinen nach Lydekker's Abbildung 2) etwas schmäler als der des zweiten, wenn dieser Unterschied auch an Falconer's Abbildung 3) weniger hervortritt. Bei beiden Figuren alterniren die Jochhälften jedoch entschieden mehr, als dies bei Mastodon Arvernensis der Fall ist. Bei Falconer erscheint auch das letzte (4.) Joch sehr unentwickelt, was gegen die bei Mastodon Sivalensis stark ausgeprägte Tendenz der Vermehrung der Joche auffallend absticht. Noch mehr tritt dieser sonderbare Umstand an dem von Falconer 4) abgebildeten oberen D_2 hervor. Dieser Zahn zeigt trotz seiner ganz auffallenden Grösse ein höchst unentwickeltes drittes Joch; ein hinterer Talon scheint vollständig zu fehlen; er trägt überhaupt ein ganz eigenthümliches, reducirtes Gepräge zur Schau, gegenüber dem gleichen Zahn von Mastodon Arvernensis.

Die zwei von Lydekker abgebildeten D_1^{-5}) sind beide auch von Wulststreifen bedeckt; nicht so jene Falconer's.

¹⁾ Beide Angaben der Länge sind - besonders die des Exemplars B - unvollständig.

²⁾ l. c. Taf. XLI, Fig. 2.

³⁾ F. A. S. Taf. XXXVI, Fig. 2 und 2a.

⁴⁾ F. A. S. Taf. XXXVI, Fig. 1 und 2.

⁵⁾ Ein oberer l. c. und ein unterer ibid. Taf. XLIV, Fig. 2.

δ) Wahre Molaren (Taf. III, Fig. 3; Taf. IV, Fig. 4; Taf. V, Fig. 3; Taf. XIV, Fig. 5; Taf. XV, Fig. 5):

Auf Tafel XV, Fig. 5, ist in ³/₅ natürlicher Grösse die Abbildung eines Molaren gegeben, der nach der Gestaltung der Usurfläche und seiner Kürze wohl zweifellos — und zwar als erster wahrer Molar — dem Oberkiefer zugeschrieben werden muss. Im Unterkiefer wird nämlich bekanntlich mehr die äussere Höckerreihe abgekaut, im Oberkiefer die innere (Vacek's prä- und posttrite Jochhälften). Der vordere Talon wird an letzterem von einem vom inneren, also dem stärker abgenützten Tuberkel absteigenden Kamm gebildet, der dann bei vorgeschrittener Usur eine zungenförmige Verlängerung der Marke desselben nach aussen zu bildet. Am Unterkiefermolaren tritt der vordere Talon auch bald mit dem inneren Tuberkel in innigere Verbindung und führt daher ähnliche Verhältnisse herbei wie am oberen. Da aber hier der äussere Höcker der prätrite ist, so geht diese Zunge hier vom schwächer abgekauten Tuberkel aus. Im Ober- wie im Unterkiefer ist es eben die innere Höckerreihe, die stets gegen die äussere vorgeschoben ist.

Unser in Rede stehender Zahn zeigt ersteres Bild, ist daher jedenfalls als oberer M_1 anzusprechen. Die Höcker alterniren sehr deutlich — zum Unterschied vom oberen D_1 — und die inneren derselben senden gegen die äusseren des unmittelbar zuvorstehenden Paares Vorsprünge aus. Dasselbe geschieht von letzteren in entgegengesetzter Richtung. Das letzte Joch ist etwas kleiner als die vorhergehenden; alle sind mit sehr gut ausgeprägter Wulststreifigkeit versehen.

Der Zahn stammt von Fojano (Provinz Arezzo), im Thal der Chiana, aus dem dortigen lacustren Pliocän.

Von unteren M_1 befinden sich hier nur zwei Gypsabgüsse. Der eine ist ein isolirter, nur wenig abgekauter, rechter Molar, gefunden bei Asti, dessen Original sich in Turin befindet. Die Wechselstellung der Jochhälften ist hier eine fast vollkommene. Der vordere Talon dehnt sich hauptsächlich vor dem prätriten Tuberkel aus. Diese setzen an ihrer Hinterinnenseite einen Secundärhöcker an, der dem posttriten Tuberkel des hinteren Paares zustrebt. Dieser zeigt das Bestreben, dem ersteren entgegenzukommen, ganz ähnlich und in gleicher Richtung, wie es bei dem Oberkieferzahn geschildert wurde. Der Zahn ist im Allgemeinen mit letzterem gleich breit, jedoch bedeutend länger und ohne Andeutung von Schmelzwülsten. Die inneren Höcker sind, wie im Oberkiefer, etwas grösser als die äusseren.

Das zweite Exemplar befindet sich an dem Abguss einer fast vollständigen linken Unterkieferhälfte und ist äusserst stark abgekaut, so dass sämmtliche Höcker bereits breit miteinander verbunden sind. Dieser Unterkiefer stammt gleichfalls aus Piemont, aus dem lacustren Pliocän von S. Paolo bei Villafranca, und enthält nebst dem M_1 auch noch den M_2 und, vom Knochen zwar ganz bedeckt, jedoch von innen frei präparirt den M_2 .

Von oberen M_2 befinden sich hier drei schöne, isolirte Exemplare, wie auch der grosse Schädel, sowie Nesti's Cranialfragment je einen stark abgekauten M_1 tragen.

Von ersteren sei zunächst der Tafel XIV, Fig. 5, abgebildete, nur wenig abgenützte Zahn erwähnt. Er zeigt in ausgezeichneter Entwicklung jene beim oberen D_1 beobachteten, in die Thäler vorspringenden Pfeiler, von denen der vorderste als Talon sich bis an die Aussenseite des Zahnes hinzieht, während die anderen nach hinten immer schwächer werden. Die Alternation ist sehr schwach ausgeprägt, wie stets an intacten Zähnen des Oberkiefers. Die äusseren Tuberkel haben eine bedeutend grössere transversale Erstreckung als die inneren. Wie der früher erwähnte obere M_1 , besitzt auch dieser Molar eine ausgezeichnet wulststreifige Schmelzoberfläche. Bemerkenswerth ist er auch durch seine geringe Grösse. Wenn man jedoch den früheren Zahn als M_1 bezeichnet, so steht dieser entschieden den M_2 viel näher.

Länge			٠					•					٠			100	mm.
Breite	am	I.	Jo	che			٠				٠					55	12
Grösst	e B	reit	:e (am	3.	Jo	ch	e)								64	"
Vertica	ale I	löl	ie o	les	3.	prä	itri	ter	ı (ir	nne	rer	n) (Γul	oer	kels	49	23

Einem bedeutend grösseren Zahne gehörte das Tafel V, Fig. 3, abgebildete Fragment an, das aus den drei hinteren Jochen, sowie einem Theile des ersten besteht. Sämmtliche drei Thäler werden wieder durch vorspringende Pfeiler gesperrt, überhaupt ist dieser Zahn genau so wie ersterer gebaut, nur sind die Joche etwas schlanker emporstrebend und oben mit schneidigerem Grat. Wulststreifigkeit ist gleichfalls in ganz vorzüglicher Art entwickelt. Der Zahn stammt aus Bisticci bei Rignano im oberen Arnothal (Provinz Florenz).

Vom Monte Carlo, im oberen Arnothal, stammt ein oberer, linker M_2 , an dem auch die Wurzel erhalten ist. Sie besteht, abweichend von den Angaben Vacek's für einen gleichen Zahn, 1) aus jedenfalls fünf Aesten, von denen zwei das erste, zwei das zweite und einer die beiden letzten Joche trägt. Vom vorderen Paar ist der äussere weitaus stärker entwickelt als der etwas nach hinten gedrängte innere. Desgleichen steht der innere Ast des zweiten Paares eigentlich zwischen dem zweiten und dritten prätriten Höcker. Anordnung und Form der Marken ist genau dieselbe wie an dem Tafel XV, Fig. 5, abgebildeten oberen M_1 . Bemerkenswerth ist jedoch, dass dieser Zahn vollständig glatt ist.

Gleichfalls durch völlig glatten Schmelzbelag zeichnen sich die M_2 der erwähnten Schädelreste aus. Sie sind beide stark abgekaut und zum Theil vorne abgebrochen.

				-		1	M_2	des	Schädels	111	v. Nes	ti's Fragm.
Länge						•		122	mm		120	mm
Hintere	Bı	eit	e				•	72	27		. 68	22

¹⁾ Vacek: 1, c. S. 37.

Der untere M_2 ist nebst in dem erwähnten Gypsabguss von Villafranca in einer zweiten, schönen, linken Unterkieferhälfte aus dem oberen Arnothale (Taf. III, Fig. 3), sowie auch als ein isolirtes Exemplar der rechten Seite vorhanden.

Der am besten erhaltene Zahn der Unterkieferhälfte aus dem Arnothal zeigt 4 Höckerpaare mit nahezu vollkommen alternirenden Tuberkeln. Die Art der Wechsellagerung der letzteren, ihre Form und gegenseitigen Beziehungen sind genau wie früher. Der Zahn ist nach vorne zu bedeutend verschmälert, überhaupt langgestreckter als der entsprechende obere.

Der isolirte M_2 , gleichfalls aus dem oberen Arnothal, ist sehr stark abgekaut und vorne abgebrochen. Er dürfte eine Länge von 140, bei einer vorderen Breite von ungefähr 58 und einer hinteren von 67 mm besessen haben.

Etwa ebensolang und schmal ist der M_2 des Turiner Gypsabgusses. Die Verhältnisse unter den Höckern sind genau wie am ersteren Unterkiefer.

Unter den oberen M_3 lassen sich recht gut zweierlei Typen unterscheiden. Der eine, wie er durch die M_3 des grossen Schädels repräsentirt wird, gleicht etwas mehr den Unterkiefermolaren; d. h. er wird nach rückwärts zu schmäler, das letzte Joch ist meist nur aus zwei schlanken Kegeln zusammengesetzt, der Talon sehr klein, das Hinterende des Zahnes etwas zugerundet spitzwinkelig. Noch immer ist er jedoch natürlich breiter und kürzer als der M_3 des Unterkiefers.

Stärker ist letztere Eigenthümlichkeit bei dem zweiten Typus ausgeprägt. Er nimmt nach rückwärts zu wenig oder gar nicht an Breite ab, das letzte Joch und der Talon bestehen aus mehreren Höckern, die oft auch undeutlich voneinander geschieden sind. Am deutlichsten zeigt diesen Typus ein Zahn der Sammlung des Marchese C. Strozzi, von dem sich hier auch ein Gypsabguss befindet. Der M_3 des Nesti'schen Schädelfragmentes bietet nebst mehreren anderen ein Uebergangsglied zwischen beiden.

Ausserdem sind ganz ausserordentliche Variationen in der Grösse zu constatiren.

Der letzte Molar des Schädels ist ferner noch dadurch ausgezeichnet, dass er eine Vermehrung der Jochzahl auf sechs sammt kleinem hinteren Talon anzeigt. Es ist dies also eine Ueberschreitung des tetralophodonten Charakters in derselben Weise, wie dies bereits Vacek an einem Zahn des rundhügeligen Mastodonten von Pikermi nachgewiesen hat. Auch an den Zähnen, die Lortet und Chantre aus dem Rhonebecken abbildet, lässt sich dieser Charakter öfter constatiren; so bezüglich der Oberkieferzähne: Tafel III, Fig. 4 und 4α . So ziemlich genau dieselben Gestaltungsverhältnisse wie hier sind dann auch bei dem M_3 an Nesti's Schädelfragment vorhanden.

Sonst steht mir jedoch leider von oberen M_3 kein ganzes Exemplar mehr zur Verfügung.

												Schäde	el ·	Nesti's Schädelfragm					gm.
Länge des ob.	M_3			•			٠	٠	٠			184	шm				182 1	nm	
Breite (grösste)	am	Ι.	Joch							٠		77	77				80	77	
> 7	,,	4.	,,				, •	. •	, •	. •	. •	. 76	22			4	77	27	
,,	17	6.	"			٠			٠		٠	56	>>				6.3	22	

¹⁾ Vacek: l. c. S. 32, Tafel VII, Fig I—Ia.

Auch von dem zweiten Typus liegt mir als vollständiges Exemplar nur der Gypsabguss aus der Strozzi'schen Sammlung vor. Seine ersten 4 Joche sind vollkommen normal, hinter diesen befindet sich ein weiteres, aus vier etwas bogenförmig nach hinten convex angeordneten Hügeln bestehendes Joch, von vollkommen derselben Breite wie die vorhergehenden, und ganz dicht an dasselbe angedrängt ein transversal zwar sehr breiter, sagittal jedoch sehr schmaler Talon, so dass der Zahn wie abgestutzt erscheint. Die Form und gegenseitige Lagerung der Tuberkel ist hier, wie bei dem ersteren Typus, dieselbe, wie sie bei den vorhergehenden Molaren erwähnt wurde.

Von dem bei Villafranca gefundenen Mastodon sagt Sismonda, 1) dass es im Oberkiefer einen Molaren mit 4, im Unterkiefer einen solchen mit 5 Jochen habe. Er bezeichnet daher ersteren als M_2 , letzteren als M_3 ; dies ist aber natürlich nicht gut möglich. Es sind entweder beide M_3 oder beide M_3 . Die Grösse (17 und 19 cm), sowie der Umstand, dass Sismonda von nachrückenden Zähnen, die in diesem Zustand schon vorhanden, sogar auch schon sichtbar gewesen sein müssten, nichts erwähnt, lassen sie jedoch zweifelsohne als letzte Molaren erscheinen. Es wäre dann freilich der abnorme Fall zu constatiren, dass hier der obere M_3 nur 4 Joche besessen hätte. Doch liegt offenbar nur ein Beobachtungsfehler vor. Wenn man das im Früheren bezüglich der gegenseitigen Anordnung der Höcker Gesagte in Erinnerung bringt, so wird man ebenfalls 5 Joche an der — übrigens offenbar nicht ganz correcten Zeichnung, Taf. I, Fig. 2 — ersehen können. Der Zahn reiht sich dem zweiten Typus an.

Hier, im Museum zu Florenz, befindet sich noch eine Zahl von Fragmenten von oberen M_3 , die wegen ihrer stark verschiedenen Dimensionen bemerkenswerth sind.

Ein solches, aus den Ligniten von Spoleto stammend, ist ganz nach dem ersten Typus gebaut. Es enthält die vier letzten Joche und einen einfachen Talon; seine Länge ist 145 mm, die Breite am 2. vorhandenen Joche 92 mm, am letzten 71 mm. Die Höhe des vordersten prätriten Hügels ist, senkrecht gemessen, etwa 70 mm.

Ein anderes Exemplar, von Montopoli mit den drei letzten Jochen, zeigt die Grössenabnahme der Joche wie am ersten Typus, auch das letzte enthält jedoch noch 4 Höcker, und ebenso gleicht der Talon mehr dem zweiten Typus. Es sind die Zähne beider Seiten in gleichen Fragmenten vorhanden. Länge des rechten: 130 mm, Breite des vordersten Joches: 99 mm, des letzten (dritten): 80 mm; senkrechte Höhe des posttriten vordersten Hügels: 68 mm.

Sehr deutlich zeigt den ersten Typus wieder ein bedeutend schmäleres Fragment vom Monte Carlo mit den letzten drei Jochen und einem kleinen Talon. Jedes der Joche, auch das letzte, besteht blos aus zwei Tuberkeln. Die Länge des ganzen Fragmentes ist 108 mm, die Breite der drei aufeinander folgenden Joche: 75, 70 und 62 mm.

Zwei andere Fragmente, bestehend aus den letzten Jochen, sind zwar ganz typisch nach dem Zahn in der Strozzi'schen Sammlung gebaut, besitzen jedoch gegen diesen sehr geringe Breitendimensionen. Das eine stammt von Vacchereccia im Thal der Magra, Provinz Massa, und zeigt die beiden letzten Joche. Das letzte besteht aus 4 kräftigen Tuberkeln, ebenso auch der Talon; dieser ist nur wenig schmäler als das Joch und eng an dieses angeschlossen. Die Länge dieses Fragmentes beträgt etwa 8.5 cm, die Breite des vorderen Joches 84 mm, des hinteren 76 mm, des Talons 64 mm.

²⁾ Sismonda; Osteografia etc., S. 23, Taf. I.

Das zweite Fragment enthält die letzten drei Joche mit derselben Gestaltung. Es ist noch etwas schlanker gebaut. Länge desselben ist 10 cm, Breite des vordersten Joches 69 mm, des letzten 61 mm.

Zu diesem letzteren Exemplar muss jedoch bemerkt werden, dass seine Bestimmung als oberer Molar auf Widersprüche stösst. Die Form der Joche ist entschieden die eines oberen Zahnes, ebenso die sehr wenig ausgeprägte Alternation der Hügel, auch der Mangel einer basalen Verbreiterung, wie sie am unteren M_3 stets zu treffen ist, spricht für die genannte Bestimmung, sowie auch die wurzelwärts concave Krümmung der Basis. Bisher haben wir es aber stets getroffen, dass jener strebepfeilerähnliche bis kammförmige Vorsprung nach vorn, der die Querthäler sperrt, oben wie unten von der inneren Jochhälfte ausgehe, für den Oberkiefer daher von der prätriten, und von da gegen aussenvorn verlaufe. Hier kann man jedoch das entgegengesetzte Verhalten, also wie sonst nur an Unterkiefermolaren, bemerken; auch ist eher die posttrite Jochhälfte etwas weniger vorgeschoben, was gleichfalls für letztere bezeichnend ist.

Als sehr bemerkenswerther Umstand muss ferner besonders betont werden, dass dieses Fragment im vorletzten, besonders aber im letzten Querthale eine sehr erhebliche Menge von Cement besitzt, mit dem, jedoch blos bis zur Krone, auch die Wurzeln bedeckt sind.

Einem Zahn von ähnlich ganz ausserordentlichen Dimensionen, wie jene zwei soeben genannten Exemplare von Montopoli, gehörte ein sehr schlecht erhaltenes Fragment aus dem oberen Arnothal an. Es ist ein Mittelstück, enthaltend zwei Joche und den "Strebepfeiler" des nächst hinteren; auch die ganze Aussenseite fehlt. Es ist ferner dadurch bemerkenswerth, dass die Schmelzoberfläche das Aussehen "mit Regenfurchen bedeckter Bergabhänge" zeigt, wenn es vielleicht auch nicht so ganz ausgeschlossen ist, dass diese Rauhigkeiten wirklich blos der Einwirkung der Atmosphärilien zugeschrieben werden müssen. Die Länge dieses Fragmentes ist etwa 10 cm, die Breite (unvollständig) am vorderen Joche 94 mm.

In ähnlicher Weise wie an den Zähnen des Arnothales kann man auch an den von Lortet und Chantre abgebildeten oberen M_3 des Rhonebeckens die zwei beschriebenen Zahntypen unterscheiden. Für den nach hinten zu verschmälerten, mit schwächeren und einfacheren Jochen versehenen — sowie anscheinend selteneren — Typus kann Tafel IV, Fig. 7 und 7a, als Beispiel gelten, für den breiten, hinten abgestutzten und mit complicirten hinteren Jochen ausgestatteten Typus, dem fast alle anderen Abbildungen des oberen M_3 in dem Werke der genannten Autoren zufallen, am besten etwa Tafel III, Fig. 1, 1a, 3, 3a, Tafel VI, Fig. 2, 2a.

Nun ist es weiter gewiss sehr erwähnenswerth, dass anscheinend auch bei Mastodon Sivalensis beide Typen sich in ähnlicher Ausbildung vorfinden. Ein von Lydekker¹) abgebildeter oberer M_3 nähert sich wenigstens entschieden unserer abgestutzt-breitkronigen Form, während ein anderer von Falconer abgebildeter fast vollkommen dem Zahne des grossen Schädels, also dem ersten Typus, entspricht²) und ein dritter, bei demselben Autor, ein Mittelding, mehr jedoch schon nach Art der breitkronigen Form gebildet, darstellt.³)

Untere M_3 liegen mir, beiderseitig erhalten, in zwei Unterkiefern vor, ferner ein isolirter vollständiger, sowie mehrere grössere und kleinere Fragmente. In zwei anderen Kiefern sind sie noch ganz vom Knochen bedeckt.

Ihre Unterschiede gegen die Oberkieferzähne bestehen darin, dass sie eine etwas stärkere Krümmung im horizontalen Sinne besitzen, die jedoch im entgegengesetzten Sinne verläuft wie bei

¹⁾ R. Lydekker: Siw. and Narb. Probosc., Taf. XLIV, Fig. 1.

²⁾ F. A. S. Taf. XXXIV, Fig. 1. — Auch Fig. 2 ist ein Ma, der den gleichen Typus sehr gut repräsentirt.

³⁾ F. A. S.: l. c. Taf. XXXVI, Fig. 6 und 6a, und derselbe Zahn: Pal. Mem. I, Taf. IX, Fig. 1 und 1a.

den ersteren. Diese sind nämlich convex nach aussen, während die Molaren des Unterkiefers concav nach aussen sind. Die stärker abgekaute (prätrite) Jochhälfte liegt oben und unten stets an der concaven Seite. Da es aber stets die innere Hälfte ist, die vorgeschoben erscheint, und von der nach aussenvorn jener Vorsprung ausgeht, so ist dies an den oberen Molaren die stärker abgekaute (prätrite), an den unteren die schwächer abgekaute (posttrite) Jochhälfte. An den Unterkiefermolaren ist ferner, wie schon Depéret beobachtet hat, die Oberseite des Zahnes nach Elephantenart leicht concav, an den Oberkieferzähnen jedoch entsprechend convex.

Der Unterkiefer, der zu Nesti's Cranialfragment gehört, enthält beiderseits den M_3 , sowie ein Stück der Alveole des M_2 . Der M_3 hat fünf Joche sammt einem hinteren Talon. Der vordere wird von jenem schon öfter genannten transversalen Kamm gebildet. Er ist demzufolge, wie schon von Anderen betont wurde, ein wesentlich anderes Gebilde als der hintere, der ein unentwickeltes Joch und einem solchen daher im Wesen homolog ist. Drei Joche sind erst angekaut, während das vierte und fünfte nur aus je zwei einfachen, aneinandergelehnten Kegeln besteht, der Talon aber nur von einem einzigen grossen Conus gebildet wird. Die Joche werden nach hinten zu immer schmäler, da sich jedoch die Basis hier stark ausdehnt, ist die Breite derselben hinten und vorn nicht viel verschieden.

Länge	des	li	nken	Zahne	ès.									2 I 2	mm
Breite	am	I.	Joch				٠				٠			72	29
22	27	3.	22	•	٠				٠					77	**
77	27	5.	27			٠		٠				٠		76	22

An einem weiteren Unterkiefer aus dem oberen Arnothal sind wieder beide M_3 (Taf. IV) Fig. 4), jedoch auch noch die M_2 erhalten. Erstere zeig^en wieder fünf Joche von derselben Beschaffenheit wie früher, nebst einem hinteren Talon. Dieser ist aber schon entschieden breiter und ganz deutlich im Begriffe, sich in zwei Kegel zu zerlegen, ähnlich wie eine solche Spaltung auch schon an ersterem Exemplar angedeutet war. Während an diesem aber der Zahn mit diesem Talon schliesst, setzt sich hier noch ein weiteres Gebilde an, das nach der üblichen Terminologie erst als der eigentliche Talon bezeichnet werden muss. Es ist also hier in deutlichster Weise der Uebergang zu einem höheren Jochtypus vorhanden, wie wir dies schon bei dem M_3 des Schädels constatiren konnten.

Der erwähnte isolirte linke Zahn stammt von Poggio bei S. Maria Montespertoli, Provinz Florenz, und ist vollständig bis auf ein kleines Stück am Hinterende. Der Talon hinter den fünf Höckerpaaren ist bereits vollständig in zwei Kegel, ganz nach Art der letzten Joche, getrennt, und das abgebrochene Stück hat den eigentlichen Talon erst getragen. Bei diesem Zahn muss daher bereits von sechs entwickelten Jochen gesprochen werden. Eine weitere sehr bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit dieses Zahnes ist, dass in den letzten Thälern eine ziemlich beträchtliche Menge von Cement eingelagert ist.

¹⁾ Depéret: Vertébrés foss. du Roussillon, S. 153.

Zusammen mit diesem Zahne wurde an derselben Localität das Fragment eines zweiten, jedoch rechten gefunden, das ganz ohne jeden Zweifel nach Form und Erhaltung der anderen Kieferhälfte desselben Individuums angehört hatte. Es ist nur das letzte der früheren drei angekauten Joche vorhanden; zwei fehlen also. In seinem jetzigen Zustand zeigt der Zahn aber vier Joche und einen sehr ausgebildeten, grossen, zweihöckerigen Talon, der am ersteren Zahne abgebrochen war. Das letzte dieser vier Joche stimmt in seiner Gestalt vollkommen mit dem letztvorhandenen des linken Zahnes und besteht aus zwei grossen, aneinandergelagerten Tuberkeln. Wir haben also hier zweifellos einen ganz typisch sechsjochigen letzten Molaren vor uns, wie er einem pentalophodonten Mastodonten entsprechen würde. Wie der frühere, besitzt auch dieser Zahn eine reichliche Menge von Cement in sämmtlichen vier vorhandenen Querthälern. Er gelangte Tafel V, Fig. 4, zur Abbildung.

Ein zweites ähnliches Fragment, von Cerreto Guidi im unteren Arnothal, zeigt fünf Höckerpaare, ist aber sowohl vorn abgebrochen, als auch hinten eine Bruchfläche das ehemalige Vorhandensein eines etwa 3 cm breiten und ungefähr ebenso hohen, deutlich aus zwei Tuberkeln zusammengesetzten Talons andeutet. Die vorhandenen fünf Höckerpaare müssen also als wahre Joche angesprochen werden, von denen das letzte aus zwei einfachen, zusammen 50 mm breiten und gegen 40 mm hohen Kegeln besteht. Da aber das ganze Fragment kaum 15 cm lang ist, so muss vorne offenbar noch ein ganzes Joch vorhanden gewesen sein, das dann im Verein mit dem Talon die Länge auf ungefähr 20 cm ergänzt hat. Es liegt also auch hier wieder ein ganz unanfechtbar sechsjochiger M_3 vor. Im ganzen letzten Thale, sowie in den tieferen und geschützteren Partien der vorhergehenden ist wieder Cement eingelagert.

Aus dem vorliegenden Materiale erhellt demnach, dass der M_3 des Mastodon Arvernensis den normalen fünfjochigen Bau sehr häufig verlässt und in weiterschreitender Complication den rein sechsjochigen Typus sehr oft erreicht. An Zähnen des Unterkiefers trat dieses Streben etwas entschiedener hervor als an denen des Oberkiefers. Das Gleiche findet nun auch bei Mastodon Sivalensis statt, von dem Lydekker sagt¹), dass die oberen Molaren fünf oder sechs, die unteren nur sechs Joche und einen hinteren Talon tragen. Während jedoch bei der indischen Species die mittleren Molaren auch zuweilen die normale Zahl des tetralophodonten Jochtypus überschreiten²), konnte dies bei keinem einzigen unserer Exemplare auch nur andeutungsweise constatirt werden.

Bezüglich des im Vorhergehenden erwähnten Vorhandenseins von Cement an den Zähnen des Mastodon Arvernensis muss fernerhin erwähnt werden, dass ein solches nach Falconer bei Mastodon Sivalensis höchstens "in the bottom of the clefts" vorkomme. Lydekker kommt auf dasselbe bei Beschreibung dieser Species nicht zu sprechen, sagt aber an einer früheren Stelle, bei Besprechung der Beziehungen des Mastodon Pandionis zu den übrigen Mastodonten 3), dass Mastodon Sivalensis "keine Spur" von Cement zeigt, während es bei Mastodon Pandionis auftritt. Da aber letzteres sehr bemerkenswerthe genetische Beziehungen zu ersterem zeigt, so dürfte der Mangel von Cement bei diesem — wenn man noch dazu jetzt das Verhalten seines europäischen Verwandten in

^{1) 1.} c. S. 254 (73).

 $^{^{2}}$) Oberer M_{1} wird von ihm nur einer erwähnt, mit vier Jochen; ein unterer Zahn, der durch seine Grösse sich den M_{1} anreiht, enthält sogar sechs Joche, während sonst kein Exemplar dieses Zahnes mehr bekannt ist; von oberen M_{2} beschreibt er vier Exemplare, deren eines fünf, drei aber blos vier Joche besitzen; ebenso zeigen von zwei Exemplaren unterer M_{2} eines vier, das andere fünf Joche.

^{3) 1.} c. S. 227 (46).

Betracht zieht, der andererseits nach den Molaren sogar etwas weniger weit vorgeschritten ist — vielleicht doch hauptsächlichst auf nachträgliche Auswitterung zurückzuführen sein, ähnlich wie vielleicht auch bei jenen Zähnen von Mastodon Arvernensis, wo dieses Verstärkungselement fehlt. Denn wo es in den obgenannten Fällen vorhanden ist, ist es weich und ziemlich leicht zerstörbar.

Bezüglich der Zahnfolge muss endlich noch bemerkt werden, dass die Angabe Vacek's1), dass bei Mastodon Arvernensis, "ganz so wie bei Elephas, mit Ausnahme des ersten Jugendstadiums der Kiefer nur einen einzigen entwickelten Backenzahn und etwa die Reste seines Vorgängers enthält", nicht so vollkommen richtig sich erweist. Dass die Milchzähne eine Zeit lang alle drei in Usur stehen, ist nach dem Vorliegenden constatirt. Eine Combination von Michzähnen und echten Molaren war mir nicht zu Gesichte gekommen; dagegen zeigt der früher beschriebene Gypsabguss aus Turin den ersten und zweiten Molar in voller Usur und das Gleiche findet auch an dem von Lortet und Chantre abgebildeten Ober- und Unterkieferfragment²) statt. Bis jetzt sind also jedenfalls immer zum Mindesten zwei Zähne im Gebrauch gestanden. Beim weiteren Wachsthum tritt aber jetzt allerdings ein Stadium ein, wo der M_1 ausgestossen wird, während der M_3 noch nicht völlig an seinen Platz getreten ist. Diesen Moment, wo thatsächlich nur ein, und zwar der zweite Molar allein das Kaugeschäft besorgt, repräsentirt hier eine prächtige Kieferhälfte, die im Profil auch Taf. XIV, Fig. 6, abgebildet ist. Demselben Stadium gehört auch der von Vacek l. c. erwähnte Unterkiefer in Pisa an. Bald ist jedoch M_3 nachgerückt, und wir finden wieder zwei Molaren in Usur. Dieses Stadium repräsentiren der Schädel von Percussina, das Schädelfragment von Monte Carlo (Nesti),3) der Unterkiefer, zu dem der M_3 auf Tafel IV (Fig. 4) gehört, an welchem M_2 zwar nicht vollständig ist, aber offenbar erst nachträglich zerbrochen wurde. Im weiteren Verlaufe wird nun auch M_2 ausgestossen, so dass nun das zweite Mal blos einem Molar, dem letzten, die Function des Nahrungzerkleinerns obliegt.

Nach dem ganzen bisher Gesagten ergibt sich demnach, dass die dem Mastodon Arvernensis weitaus am nächsten stehende Form in dem indischen Mastodon Sivalensis gesucht werden muss. Beides sind Arten, die den fünfjochigen Bau der letzten Backenzähne bereits verlassen haben oder zu verlassen im Begriffe sind und dadurch den Uebergang zu den Stegodonten vermitteln. Auch das sehr häufig sich einstellende Cement in den Querthälern weist auf's Deutlichste auf dieses Moment hin. Auch sonst, in ihrer Zusammensetzung zeigen die Zähne beider Formen viele Beziehungen zu einander, so dass sie, wie bereits erwähnt, von Cautley gar nicht unterschieden wurden. Inwieweit auch die Schädelcharaktere dieser Verwandtschaft das Wort reden, wurde schon an früherer Stelle ausführlich besprochen.

2. Elephas meridionalis Nesti.

^{1775 (?),} Elefante Indiano, Giov. Targoni Tozetti: Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa. Edizione seconda. Tomo VIII. Firenze, 1775.

^{1808,} Elephas primigenius, Blumenbach (Elefante primitivo), Nesti: Di alcune ossa fossili di mammiferi che s'incontrano nel Valdarno. 1808.

^{1821,} Elephas primigenius Blumenbach, G. Cuvier: Recherches sur les Ossements fossiles, etc. Paris, 1821. Tome I*r
1825, Elephas meridionalis Nesti, Lettera sopra alcune ossa fossili del Valdarno non per anco descritte. Sulla nova
specie di Elefante fossile del Valdarno. Pisa, 1825.

¹⁾ l. c. S. 40.

²⁾ l. c. Taf. I und II.

 $^{^{8}}$) Am Unterkiefer ist hier allerdings M_{2} gemäss einer schon öfter constatirten Regel ausgestossen, und es findet sich nur noch ein Theil seiner Alveole vor.

1828, Éléphant a larges lames, Croizet et Jobert: Recherches sur les ossements fossiles du Departement du Puyde-Dôme. Paris, 1828.

1841, Elephas primigenius Blumenbach, Blainville: Ostéographie ou Description iconographique comparée du Squelette et du Systeme dentaire des cinq classes d'Animaux Vertébrés récents et fossiles. Paris, Genus Elephas.

1846, Elephas primigenius, Blumenbach, R. Owen: A History of British fossil Mammals and Birds. London, 1846. 1846, Elephas minimus (non Nesti) Falconer: On the fossil Species of Elephant and Mastodon found in the Sewalik

Hills (1846). Palæontologial Memoirs and Notes of the late H. Falconer, etc.; comp. and ed. by Ch. Murchison. London 1868, Vol. I, S. 53.

1857, Elephas meridionalis Nesti, H. Falconer: On the Species of Mastodon and Elephant occurring in the fossil state in Great Britain. Part II. Elephant. Pal. Mem. London, 1868. Vol. II, S. 76.

1857, Elephas minutus (non Nesti) Falconer: On the Species, etc. Pal. Mem. II, S. 105.

1859, Elephas proboletes? Fischer; Lartet, Sur la dentition des proboscidiens fossiles (Dinotherium, Mastodontes et Elephants) et sur la distribution géogr. et stratigr. de leurs débris en Europe. Bull. Soc. géol. Fr., 2. Sér., T. 16, Paris 1858—59; Seite 500.

1867, Elephas meridionalis, Nesti, Ig. Cocchi: L'Uomo fossile nell' Italia Centrale. Memorie della Società Italiana di Scienze naturali. Vol. II Milano, 1867.

1877—81, Elephas meridionalis Nesti, A. Leith Adams: Monograph on the British fossil Elephants. Palæontographical Society. London 1877—1881, pag. 181.

Historisches.

Bei weitem der grösste Theil aller der im oberen Arnothal aufgefundenen Proboscidierreste gehört dieser Species an, von der im Museum zu Florenz ein ausserordentlich reiches Material aufgespeichert liegt. Aber auch im unteren Arnothal kommt er ziemlich häufig vor.

Im Vorworte bereits wurde erwähnt, dass F. Nesti der Erste war, der sich eingehender mit den Fossilresten dieser Gegenden beschäftigte und diese seine Studien in mehreren Arbeiten hinterlegte. Gleich seine erste, im Jahre 1808 publicirte, behandelte die Elephanten. Er unterscheidet darin unter den Proboscidiern des Arnothales drei Arten: Elephas primigenius Blumenbach, zu welchem die meisten Reste gehören sollten (l. s. c. S. 8: " quelle della Toscana appartengono per la massima parte ad una specie, che il Sig. Blumenbach ha chiamata Elefante primitivo."), nach einem zahnlosen Unterkiefer eine zweite, die aber von Cuvier als zu Mastodon angustidens¹) gehörig bezeichnet wird, und "molto piu singolare di questa" nach einem Unterkieferast mit zwei Zähnen eine dritte, "che annunzia un individuo della grandezza di uno dei nostri bovi".²) Von Cuvier wurde diese zu El. primigenius gewiesen.

Zu bemerken ist an dieser Stelle noch, dass Falconer³) irrthümlich angibt, dass Nesti in dieser Abhandlung schon seine Species *El. meridionalis* nebst einem *El. minutus* aufgestellt habe. Thatsächlich ist erstere erst 1825 gegründet worden, und letzterer Name findet sich bei Nesti überhaupt nicht, da er im Jahre 1808, wie erwähnt, keine Namen gegeben und er später auf diesen Kiefer nie mehr zurückkommt.⁴)

Cuvier's Ansichten über die italienischen Elephanten, die er in den "Recherches sur les Ossements fossiles" äussert, sind schon angeführt worden. Er anerkennt, wie er ja auch Tertiär und Diluvium als angeschwemmtes Land zusammenfasst, nur eine einzige fossile Elephantenart: Elephas primigenius Blumenbach, zu der er auch sämmtliche italienische Elephanten zieht.

¹⁾ Natürlich in Cuvi er's (weiter) Fassung; thatsächlich M. arvernensis.

²) 1. c. S. 13.

³⁾ Falconer, Pal. Mem. II, S. 104.

⁴⁾ S. 53, Vol. I. der Pal. Mem., nennt Falconer diesen kleinen Kiefer wieder *El. minimus*; doch ist von Nesti natürlich auch dieser Name nie gebraucht worden.

Dem gegenüber sucht jedoch Nesti in einer neuerlichen, 1825 erschienenen Abhandlung¹) nachzuweisen, dass sich der Elephant des Arnothales wesentlich von dem sibirischen unterscheide, und schlägt für ersteren den Namen *Elephas meridionalis* vor. Auch Croizet und Jobert erklären sich für eine zweite fossile Elephantenart²): "Ces dernières observations tendent à prouver que, de même qu'il y a deux espèces d'éléphans vivans, il y a aussi deux espèces d'éléphans fossiles; l'éléphant à lames étroites qu'on a rencontré très-souvent, et l'éléphant à larges lames dont on a déjà trouvé plusieurs mâchelières, celles de Porentrui, de Romagnano, de Monteverde, de Laufen, et la mâchoire dérite par M. Nesti, dans les Annales du musée de Florence, se rapportent evidemment à cette dernière qui habitait aussi l'Auvergne".

Trotz der zahlreichen Argumente Nesti's kehrt jedoch Blainville in seiner "Ostéographie" wieder zur alten Ansicht Cuvier's zurück und glaubt, obzwar er sich die ziemlich bedeutenden Differenzen nicht verhehlt, wahrscheinlich mehr von Cuvier's Autorität beeinflusst, doch nicht annehmen zu können, dass "un peu plus ou moins d'épaisseur dans les collines dentaires et dans leurs intervalles, puissent former une différence spécifique. Je pense donc avec M. G. Cuvier que l'El. meridionalis et l'El. primigenius ne sout qu'un."3) Er geht sogar noch weiter und verwirft auch das Genus Mastodon, das er mit Elephas vereinigt.

Der Cuvier'schen Ansicht der specifischen Einheit aller fossilen Elephanten schliesst sich auch Owen⁴) auf's Entschiedenste an, sowie dass der Name *El. meridionalis* nur einer Variation der Zähne seinen Ursprung verdanke, einer Variation, die ganz ebenso auch bei den sibirischen Elephanten vorkommen solle.

Bereits zwei Jahre früher hatte jedoch Falconer seine umfassenden Studien der fossilen indischen Elephanten begonnen und dabei auch die europäischen — zunächst britischen — Formen mit eingeschlossen. Er fand in den britischen Lagern Zähne, die ganz seinem El. planifrons entsprachen, andere wieder, die denen des jüngeren El. namadicus ausserordentlich glichen. Erstere waren aus dem Norwich-Crag, letztere von der Norfolk-Küste und den fluviatilen Ablagerungen des Thames-Thales. Diese identificirte er jedoch wegen ungenügenden Vergleichsmateriales mit Nesti's El. meridionalis und nannte die des Crag als die älteren El. antiquus. In dieser Weise findet sich auch die Namengebung in der "Fauna antiqua Sivalensis". Später sah er jedoch diesen seinen Irrthum ein⁵) und corrigirte ihn auch in der blos im Manuscript gebliebenen Tafelerklärung zu dem genannten Werke. Derzufolge ist es die Art aus dem Crag, welche mit El. meridionalis übereinstimmt, den er nun in scharfer Weise vor den übrigen Elephanten charakterisirt.

Lartet⁷) schliesst sich Falconer's Ansicht an, zählt jedoch zu seinem *El. meridionalis* auch offenbare Reste von *El. primigenius* aus Russland (*El. proboletes*? Fischer) und Sibirien.

Für Cocchi ist *El. meridionalis* das bezeichnende Thier des unteren Pliocän, zu dem sich dann im oberen Pliocän *El. antiquus* gesellt.⁸)

Auch in Leith Adams grosser Monographie der britischen Elephanten finden natürlich diejenigen Italiens eingehendere Besprechung.

¹⁾ Nesti: Lettera sopra alcune ossa foss. etc. Pisa 1825.

²⁾ Croizet et Jobert: Rech. Oss. foss. Puy-de-Dôme. Paris 1828. S. 131 und 132.

³⁾ Blainville, Ostéographie, Genus Elephas, S. 220.

⁴⁾ Owen, British foss. Mam. and Birds. London 1846. S. 238.

⁵⁾ Falconer: Pal. Mem. II, S. 108-109.

⁶⁾ Falconer: Description of the Plates in the Fauna antiqua Sivalensis. Compiled by the Editor, from Notes and Memoranda. Pal. Mem. I. S. 443.

⁷⁾ Lartet, l. s. c.

⁸⁾ Cocchi, L'Uomo fossile nell' Italia centrale. Milano, 1867. S. 16-17.

In neuester Zeit hat Pohlig versucht, mit *El. meridionalis* den *El. Hysudricus* der Siwalikhügel zu identificiren, was aber wohl, wie später gezeigt werden wird, aus verschiedenen Gründen gänzlich unstatthaft ist.¹)

Schädel.

Falconer thut in seiner öfter schon citirten Abhandlung über "British and European fossil Elephants" neun Schädel oder Schädelfragmente Erwähnung, die er zu El. meridionalis zählt und die sämmtliche dem Florentiner Museum angehören. Aus England selbst ist noch kein Schädel bekannt. Zu diesen Exemplaren sind seither noch einige weitere, allerdings in minder vollständigem Erhaltungszustande hinzugekommen, andererseits gehören aber auch nicht alle von ihm angeführten Stücke zu dieser Species. So ist dies besonders mit dem unter 5 bezeichneten Schädel der Fall, der auch von Nesti schon erwähnt wird. Er figurirt in dessen Arbeit vom Jahre 1825 als Schädel B. Er ist aber offenbar ein El. antiquus Falconer. Der Grund, warum ich andere von Falconer angeführte Exemplare (6, 8 und 9) nicht zu El. meridionalis zähle, wird später erörtert werden.

Leider ist jedoch kein einziger dieser Schädel in vollkommenem Erhaltungszustande, so dass die Gesammtheit der Charakteristik nach mehreren Exemplaren combinirt werden muss. — Dem besterhaltenen derselben (Taf. I), Nesti's Schädel A oder Falconer's Cranium 4, fehlt hauptsächlich die Gegend um das Occipitale superius; jedoch sind auch die Incisivalveolen abgebrochen worden, und wenn sie auch isolirt noch vorhanden sind, so ist doch diese Stelle stark beschädigt und die Richtung der Incisiven nicht mehr genau festzuhalten. Falconer thut auch zweier "enormous tusks, which are spread out horizontally in the Theristocaulodon-manner" Erwähnung; von diesen existiren jedoch nur die beiden äussersten Spitzen, da alles Uebrige täuschend aus Gyps hinzugemacht ist. Diese horizontal ausgebreiteten Zähne sind daher nur eine Ausgeburt der Phantasie des betreffenden Restaurators.

Für das Folgende mag noch bemerkt werden, dass sich sämmtliche relativen Richtungsangaben als horizontal, vertical etc., stets auf die horizontal gestellten Molaren beziehen.

Was nun die Gestaltung des Schädels betrifft, so unterscheidet sich El. meridionalis hierin sehr prägnant nicht nur von El. primigenius, wie Nesti und Falconer hauptsächlich darzuthun suchten, sondern überhaupt von sämmtlichen bekannten Elephantenarten. Bei El. primigenius liegt die grösste Breite des Schädels ungefähr in der Gegend der Orbiten, während das eigentliche Cranium ziemlich bedeutend verengt ist; bei El. meridionalis hingegen überragt das Hinterhaupt seitlich die Orbita. Hiedurch erscheint der Schädel natürlich in der Temporalgegend viel mehr eingeschnürt. Thatsächlich ist die Breite der Fronto-Parietalregion wohl nicht viel geringer als bei El. primigenius. Der Vorderrand der Fossa temporalis geht ferner in einer viel mehr der transversalen genäherten Richtung in den Processus postorbitalis über, wie es in solchem Grade bei keinem der fossilen Elephanten mehr der Fall ist. Am meisten nähert sich diesen Verhältnissen noch El. planifrons oder noch mehr El. bombifrons. Die Leith Adams'sche Abbildung eines Schädels von El. premigenius²) zeigt in

¹) Diese und mehrere andere Ansichten Pohlig's über fossile Elephanten kenne ich nur nach vorläufigen Ankündigungen einer grossen Elephantenmonographie. Solche finden sich: Sitzungsber. d. Niederrhein. Gesellsch. zu Bonn, Sitzg. v. 4. Febr. 1884; Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. Berlin, 1885, S. 1022—1027; — Quart. Journ. Geol. Soc. London, 42. Bd. 1886, S. 177; — Bollettino della Società Geologica Italiana. Vol. V., fasc. 3, Roma 1887, S. 413.

Anmerkung während der Correctur: Mittlerweile ist ein erster Abschnitt von H. Pohlig's Monographie erschienen (Nov. Act. k. Leop.-Carol. Akad. Nat. Bd. 53, Nr. 1). Die Umstände erlauben mir es jedoch nicht, hier oder im Späteren auf dieselbe einzugehen.

²⁾ l. c. Taf. VI und VII.

gewissem Masse auch diesen Charakter — im Gegensatz zu der Cuvier's oder Falconer's in der "Fauna antiqua Sivalensis" — doch ist aber hier die Erstreckung des Bogens in sagittaler Richtung eine sehr viel bedeutendere.

Die Nasalia sind an der Spitze nicht ausgerandet. Die Nasenöffnung ist flach halbmondförmig und besitzt wohl die bedeutendste transversale Ausdehnung unter allen Elephanten. Senkrecht auf diese Richtung ist die Breite relativ nirgends bedeutend. Die Postorbital-Fortsätze springen seitlich und nach abwärts sehr weit vor und liegen etwas hinter bis etwas vor den Enden der Hörner der Nasenöffnung. Es scheint dies bei allen Formen mehr oder weniger zu variiren. Bei drei Schädeln von El. meridionalis liegt es bei einem (A Nesti, IV Falconer) hinter, bei einem zweiten ungefähr in der Richtung, bei einem dritten (C Nesti, III Falconer) sogar vor denselben. Hier ist er auch sehr stumpf. Ebenso dürfte auch die Gestalt des Lacrymalhöckers mannigfachen Abänderungen unterworfen sein. Falconer nennt ihn "pointed" zum Unterschiede von El. primigenius, wo er "thick and prominent" ist.") Hier ist er nur an einem Exemplar (Schädel C) und auch hier nur auf einer Seite erhalten.

Ueber die genauere Lage der Nasenöffnung in der Längserstreckung des Schädels lässt sich nichts Bestimmtes sagen, da eben stets entweder eine vordere oder hintere Partie desselben fehlt. Doch liegt sie jedenfalls relativ sehr weit zurück, weiter jedenfalls als bei El. indicus, primigenius oder Hysudricus, und nähert sich hierin anderen, mehr brachykephalen Elephanten, wie El. Africanus oder Namadicus (abgesehen von den Stegodonten).

Die Alveolen der Incisiven besitzen eine beträchtliche Länge, sind jedoch nur an dem hier hauptsächlich in Berücksichtigung gezogenen Schädel A (Nesti) und an einem Oberkieferfragment in ihrer Gesammtlänge erhalten. Diese übertrifft gewiss 55 cm. Auch ihre Breite beträgt über 50 cm. Die Plastik des Zahnes ist auch äusserlich stark ausgeprägt. Die beiden Alveolen bilden zwei wohlgerundete, nahezu parallele - weil etwas x-förmig gekrümmte - Cylinder, die durch einen tiefen, von oben her eindringenden Spalt von einander getrennt sind. Er ist vorn am seichtesten und beginnt gleich unterhalb der Mitte der Nasenöffnung mit einer etwas verbreiteteren Partie. Er gleicht hierin noch am allermeisten El. Hysudricus. Die Verbindung der beiden Praemaxillaria ist jedoch einigen Verschiedenheiten unterworfen. Am Schädel A_{\bullet}^{2}) sowie an den Fragmenten E und G sind die beiden Alveolen durch eine schmale, in der Mitte ungefähr 8 cm breite horizontale Platte getrennt. Sie stösst in ihrer oberen Hälfte unter einem rechten bis ziemlich spitzen Winkel (Schädel G) von den Alveolarwänden ab. Dieselbe liegt ferner oben (hinten) am Grunde des hier am tiefsten Spaltes und ist daselbst 10-13 cm. dick, steigt nach vorne zu nach aufwärts, ist in der Mitte ungefähr am schwächsten (3-6 cm) und nimmt nach vorne an Stärke wieder zu. Bei den beiden Schädeln C und D - besonders aber an ersterem - sind die beiden, übrigens ganz gleich gestalteten Alveolen einander so sehr genähert, dass sie sich in einem sehr breiten Streifen berühren. Die Zähne sind dann nur durch die zwei Alveolarwände getrennt. Der schmale Spalt - natürlich nur etwas seichter ist aber dabei trotzdem sichtbar. Für diesen zweiten Fall kenne ich unter allen Elephanten kein Analogon.

Das einzige vollständige Prämaxillare sah ich an einem Schädelfragment in der Sammlung der Accademia Valdarnese zu Montevarchi, das aber bezüglich seiner Gestaltung dieselben Eigenthümlichkeiten zeigte, die soeben erwähnt wurden. Es ist nach oben zu, gegen die Nasenöffnung, nicht

¹⁾ Pal. Mem. II, 123.

²) Der Bequemlichkeit halber sei im Weiteren diese Bezeichnungsart Nesti's beibehalten. Sein Schädel B gehört, wie erwähnt, einem E. antiquus an; um Irrungen vorzubeugen, soll daher dieser Buchstabe ausgelassen werden. Schädel C ist der von Nesti [1825, Taf. I, Fig. 1—2] und Falconer [F. A. S., Taf. 42, Fig. XIX und Pal. Mem. Vol. II, Taf. I, Fig. 11] abgebildete, D sei der von Letzterem unter 7 angeführte, E, F und G drei weitere Fragmente in der hiesigen Collection.

vollständig erhalten, daher seine Ausdehnung in dieser Richtung unsicher bleibt. Sie beträgt ungefähr 83 cm, die Länge vom Foramen infraorbitale bis zur Spitze der Alveolen ist 50 cm, die grösste Breite am Vorderende derselben 62 cm, ihre schmalste Stelle überhaupt — ungefähr 33 cm von der Spitze — 52 cm. Die Stockzähne sind bei ihrem Austritt aus der Alveole abgebrochen und zeigen hier querelliptischen Durchschnitt. Der grössere Durchmesser (transversal) beträgt 22 cm, der kleinere 20 cm.

Bezüglich der Richtung der Incisivalveolen macht Falconer in seinen "British and European fossil Elephants" folgende Bemerkung:¹) "In El. meridionalis the incisive alveoli are also much elongated (i. e. wie bei El. primigenius); but instead of being parallel, in all the large crania they diverge from the sub-orbitary foramina on to their extremity, where the divergence becomes sudden and as marked as in the African Elephant." Ich kann, wie bereits oben erwähnt, diese Beobachtung an meinem Material nicht machen. Die Divergenz ist nur unbedeutend und ist in fast demselben Grade von der Mitte aus gegen oben zu beobachten. Uebrigens ist andererseits der Parallelismus der Alveolen des Mammuth kein constantes Merkmal, wie Leith Adams angibt.²) Dass das von ersterem hierbei auch angeführte Cranium Nr. 5 = Nesti's B, mit 39½ Inch. Spannweite zwischen den Enden der Alveolen, gar nicht zu dieser Species gehört, wurde schon des Oefteren angegeben. El. meridionalis zeichnet sich also gerade so wie El. primigenius durch "an interposed fossa" zwischen den beiden Alveolen aus.

Die "einzige Ausnahme zu diesen angegebenen Charakteren",3) welche das Cranium Nr. 9 bilden soll, wird später besprochen werden.

In der Pofilansicht tritt bei El. meridionalis als besonders charakteristisches Merkmal die tief ausgewölbte Frontoparietalregion hervor. Sie lässt sich bei diesem Elephanten nur mit der des El. Hysudricus, wie schon Falconer bemerkt, vergleichen. Allerdings scheint sie bei diesem — wenn nämlich dieser Schädeltheil natürlich erhalten und nicht durch spätere Einflüsse deformirt ist, wie Leith Adams vermuthet⁴) — noch stärker ausgehöhlt zu sein. Das jugendliche Exemplar, abgebildet in der "Fauna antiqua Sivalensis", Tafel 6, Fig. 1—3, zeigt wenigstens noch nichts von diesem Charakter. Ein halberwachsenes Exemplar, ibid., Tafel 12, B, und wie Falconer vermuthet, ein Weibchen, ist wieder "very slightly concave on the forehead".⁵) El. planifrons hingegen, mit dem El. meridionalis in den Zähnen so ausserordentliche Aehnlichkeit besitzt, ist in diesem wie in den meisten Schädelmerkmalen weit abweichend. Eine allerdings nur sehr schwache Impression der Frontoparietalgegend besitzt wohl nur noch El. Indicus und El. primigenius.

Die Nasalia springen horizontal über die Nasenöffnung vor.

Besonders charakteristisch für die Seitenansicht des Schädels ist ferner bei El. meridionalis die schiefe Lage des Jochbogens, wie schon Nesti bemerkt. Der Winkel, den er mit der Kaufläche oder Alveolarlinie einschliesst, beträgt jedoch nur ungefähr 25 Grad. Ueberall sind sonst Jochbogen und Kaufläche parallel oder wenigstens nahezu parallel. Nur an der Abbildung des El. planifrons, "Fauna antiqua Sivalensis," Tafel 44, Fig. 16 (nicht so aber auf der Haupttafel, Tafel 6, Fig. 1), und an der von Elephas Africanus in Blainville's "Ostéographie"6) erscheinen sie gegen einander etwas geneigt. Der von Falconer") in seiner "Fauna antiqua Sivalensis" abgebildete Schädel des afrikanischen Elephanten reiht sich jedoch in dieser Beziehung wieder dem gewöhnlichen Typus der Elephanten an.

¹⁾ Pal. Mem. II, S. 124.

²⁾ L. Adams, British fossil Elephants. S. 130.

³⁾ Pal. Mem. II, S. 124.

^{4) 1,} c, S. 128 und 129.

⁵) Pal. Mem. I. S. 437.

⁶⁾ Fasc. Eléphants, Taf. III.

⁷⁾ l. c. Taf. 44, Fig. 17.

Entweder ist dieses Merkmal wirklich variabel oder, was vielleicht wahrscheinlicher ist, sind die Zeichnungen nicht richtig. Was das fossile Material betrifft, so zeigen sämmtliche drei Schädel, an denen man diesen Theil wahrnehmen kann, dasselbe Verhalten. Der Grund muss wohl darin gesucht werden, dass einerseits die hintere Insertionsstelle des Temporalbogens etwas höher und die vordere relativ etwas tiefer gelegen ist, als sonst bei den Elephanten. Besonders letzteres ist bemerkenswerth, da eine von den Hinterhauptscondylen zur Kaufläche der Zähne oder vielleicht besser zur Alveolarlinie gezogene Parallele bei El. meridionalis die Orbita fast ganz unterhalb lässt, während diese Linie z. B. bei El. primigenius beinahe den Unterrand derselben trifft, bei anderen wieder dieselben in höherem oder tieferem Niveau durchschneidet; dann springt auch der Fortsatz des Squammosum nicht erst nach abwärts vor, sondern verläuft gleich nach vorn zu, sich dem Jugale überlagernd.

Das Jugale ist ein flacher, rechts-links abgeplatteter Knochen, der an seiner Vereinigungsstelle mit dem Squammosum und gegenüber dem *Processus postorbitalis* eine beträchtliche Verdickung (in verticaler Richtung) erfährt.

Die Orbitale sind ziemlich gross und liegen natürlich etwas tiefer als die unten vom Jochbogen begrenzte Fossa temporalis. Letztere selbst ist von mittlerer Grösse und besitzt eine von hinten-oben nach vorn-unten gestreckte Gestalt. Dieses hat hauptsächlich darin seinen Grund, dass der Occipital-condylus der Stirnregion mehr genähert ist. Jedenfalls ist diese Entfernung geringer als die des dem Condylus zunächst gelegenen Theiles der Frontalgegend von der Kaufläche des Zahnes oder selbst dem Alveolarrande. Nicht so gross oder selbst Null ist diese Differenz z. B. bei El. Indicus, primigenius, namadicus, Africanus, planifrons u. a.

In demselben Umstande ist wohl auch die Ursache zu suchen, dass vom Hinterrande des Molaren der Knochen fast senkrecht aufsteigt und der Condylus daher nicht sehr weit hinter dem Zahne sich befindet. Aehnliches findet man bei El. ganesa, doch liegen hier die Condylen nicht so hoch, wahrscheinlich weil die ursprünglichere Gestalt der Molaren dieses Stegodonten keine so mächtigen Maxillaria brauchte. Doch scheint letzteres nicht im unmittelbaren Causalnexus zu stehen, insoferne z. B. El. bombifrons sehr hohe Oberkiefer besitzt.²)

Was nun die Stellung der Incisivalveolen zum übrigen Schädel betrifft, so lässt sich darüber der Unvollständigkeit des Erhaltungszustandes halber wenig Sicheres sagen. An dem einzigen Schädel, an dem sie ganz vorhanden sind (A), sind sie am Grunde abgebrochen und ihre genauere Lage nicht leicht zu ermitteln. Am montirten Schädel liegen sie ganz in einer Richtung mit der Frontalregion, was aber vielleicht nicht richtig sein dürfte. An den beiden übrigen Schädeln (C und D), sowie an zwei grösseren Fragmenten (E und G) ist nur ein Mehr oder Weniger ihres proximalen Theiles erhalten. Soweit es sich hier erkennen lässt, beträgt der Winkel, welchen die Unterseite der Alveolen mit der Kaufläche des Molaren einschliesst, ungefähr 110 Grad.

Wenn man den Winkel, den die Verbindungslinie der Mitte der Hinterhauptscondylen und des Oberrands der Orbita mit der Verlängerung der Achse der Incisivalveolen bildet, in's Auge fasst, so schliesst sich hierin El. meridionalis am nächsten El. Africanus, sowie auch El. Hysudricus Namadicus, bombifrons an. Bei El. Indicus ist er kleiner, noch geringer bei El. primigenius und ganesa, den beiden stärkstbezahnten Formen. Soweit man nach den Abbildungen bei Blainville, Falconer, Cuvier urtheilen kann, scheint jedoch die Neigung der Prämaxillaria bei der Mukna genannten Varietät des El. Indicus, obzwar sie schwächer ausgebildete Incisiven besitzt, stärker zu

¹⁾ Ueberhaupt wird man bei einer Vergleichung der Umrissabbildungen auf Taf. 42—45 der "Fauna antiqua Sivalensis" mit den Hauptabbildungen auf den vorhergehenden Tafeln, denen doch jedenfalls dieselben Originale zu Grunde liegen, finden, dass erstere zum Theil ziemlich unverlässlich sind.

²⁾ Fauna ant. Sival., Taf. 28.

sein als bei der mit grösseren Zähnen versehenen Spielart Dauntela. Bei jungen Individuen ist dieser Winkel stets grösser als bei erwachsenen, und zwar annähernd derselbe wie bei El. meridionalis. Dieser repräsentirt daher, wie auch der in Afrika heute noch lebende Loxodonte, einen jugendlicheren Zustand des auch in seinen Molaren philogenetisch viel weiter vorgeschrittenen indischen Elephanten.

Das Supraoccipitale ist mächtig entwickelt, am Cranium C beiderseits der medianen Vertiefung fast ballonförmig aufgetrieben, am Cranium D mehr abgeflacht 1) und relativ hoch. Die seitliche Begrenzung wird von einem sowohl hinten als vorn gegen die Schläfengrube sehr steil abfallenden und daher seitlich stark vorspringend erscheinenden, wulstigen Kamm gebildet. Gleich oberhalb des Foramen magnum, mit seiner Basis gegen vorne zu schief ansteigend, befindet sich eine grosse Vertiefung für das Ligamentum nuchae, welche, nach oben sich erheblich verbreiternd, eine weite Ausrandung des Scheitels nach vorne zu bewirkt. Dass sie, wie Falconer angibt, überwölbt wäre "by a produced lamina of the vertex", kann ich an meinem Materiale nicht beobachten. Doch sind die Schädel hier überall mehr oder weniger verletzt; sie kann daher auch gewaltsam verloren gegangen sein.

Im Profil erscheint das Hinterhaupt fast senkrecht aufragend mit nur geringer Neigung nach vorne — wendet sich hierauf unter einem Winkel von ungefähr 130° gegen vorne, erreicht im Scheitel seinen höchsten Punkt und steigt dann unter einem 85—90° betragenden Winkel wieder zur Frontoparietal-Region herab. Am ähnlichsten scheint es noch bei El. Hysudricus gebaut zu sein. Ganz verschieden ist es bei El. planifrons; bei El. namadicus gleicht ihm die Ansicht von hinten.

Die Alisphenoidea steigen, wie bereits erwähnt, sehr steil empor, die Temporalbögen inseriren ein beträchtliches Stück vor den Molaren, der "horizontale Theil" der Maxillaria dehnt sich bis zur Spitze der Incisivalveolen aus, zwischen sich und den letzteren den langen Incisivcanal freilassend.

Provisorisch stelle ich hier zu dem typischen El. meridionalis zwei Fossilreste junger Thiere, von denen das eine aus einem Schädel — an dem allerdings ein grosser Theil der linken Seite, sowie des Hinterhauptes fehlt — mit dem dazugehörigen rechten Unterkieferast, das zweite aus einem Stück der beiden Maxillaria mit d_3 — d_2 , sowie dem ganzen Unterkiefer, jedoch ohne aufsteigenden Ast, besteht. Sie sind beide auch von Falconer in seinen "British and European fossil Elephants" erwähnt. ²) Das zuerst genannte gehört einem neugeborenen, wenn nicht fötalen Individuum an, da d_3 noch vollkommen intact eben erst den Kieferknochen zu durchbrechen beginnt. Die Schädelknochen sind deshalb auch arg verdrückt und zerbrochen, lassen jedoch im Allgemeinen die Form des Schädels noch gut erkennen. Der postorbitale Theil ist sehr ausgedehnt und flach gerundet, wie das jugendliche Cranium in Blainville's "Ostéographie". ³) Von der bedeutenden Erhebung der Frontoparietalpartie am erwachsenen Individuum ist noch nichts zu sehen, höchstens kann ein leichter Kamm hier so gedeutet werden. Nichtsdestoweniger erscheint die fossa temporalis im Verhältniss zu den Orbiten sehr kurz, was aber wohl nur zum kleinsten Theil auf eine nachträgliche Verunstaltung zurückgeführt werden kann. Beweis dessen ist, dass der Unterkiefer, der intact ist, fast vollkommen der Entfernung der fossa glenoidalis von dem vordersten Milchzahn entspricht.

Die Orbita sind sehr gross, von der Schläfengrube durch eine beinahe senkrecht herabsteigende Crista spheno-frontalis getrennt und liegen noch hinter dem Vorderrand des im Keime befindlichen d_2 . Sowohl bei Blainville's Abbildung⁴) als bei einer solchen Cuvier's⁵) eines jungen El. indicus ist die Schläfe sehr viel grösser, die erwähnte Crista sehr schief nach rückwärts absteigend, und die

¹⁾ Am Cranium A leider zerstört.

²⁾ Pal. Mem. II. Seite 110.

³⁾ Blainville, Ostéographie, Genre Elephas, Tafel II.

⁴⁾ L. c.

⁵⁾ Cuvier, Ossemens fossiles, Vol. I, Éléphans, Pl. XII, fig. 2.

Orbiten selbst liegen bei ersterem, wo auch ein d_3 vorhanden ist, mit ihrem Vorderrand noch vor diesem, bei letzterem, das einem schon älteren Thiere angehört, noch etwas weiter vorgerückt. Die Nasenöffnung befindet sich bedeutend mehr nach vorn verlegt, als bei erwachsenen Schädeln, wenn anscheinend wohl auch nicht so weit wie bei El. indicus, wo sie in der Schädelaufsicht ungefähr im vorderen Drittel liegt. Hier ist sie etwas vor der Mitte.

Die Prämaxillaria liegen sehr flach — ungefähr 150—160° gegen die Backenzähne — und zeigen schmale Alveolen für Milchincisiven. Erhalten ist von solchen nichts. Der Durchmesser der Alveolenöffnung ist 12—13 mm. Zwischen den beiden Alveolen ist eine längliche Mulde, ungefähr 35—40 mm breit und bei 18 mm tief.

Von den Zähnen durchbricht d_3 soeben die Knochen, d_2 ist fertig angelegt, die einzelnen Platten des d_1 sind jedoch gegen einander verschoben und noch wenig ausgebildet. Von der Hinteröffnung der Choanen steigt dann die Schädelbasis sehr langsam und allmälig zum Hinterhaupte empor.

Masse dieses sehr jugendlichen Schädels sind:

Erhaltene Gesammtlänge)
Länge vom Occipitale superius bis zur Mitte der Nasenoffnung	
Von hier bis zur Spitze der Prämaxillaria	
Breite der Nasenöffnung (transversal)	
Länge " " (sagittal)	
Grössste Breite der Orbita (Vorderrand — Proc. postorbitalis)	
Länge der Prämaxillaria	
Gesammtbreite derselben unmittelbar vor den Orbiten	
Dicke derselben am frei vorragenden Theile	
Entfernung der Spitze derselben von dem vorderen Insertionsrande des Temporalbogens	
am Squammosum	

Das erwähnte zweite Exemplar gehört einem etwas älteren Individuum an, da bereits auch schon die dritte Platte des d_2 in Usur getreten ist (Taf. XIII, Fig. 2-2 a). Es besteht jedoch nur aus einem Stück des vorderen Gaumens mit den beiderseitigen d_3 und d_2 . Doch ist dafür der Gaumen nicht zerdrückt, wie bei dem soeben beschriebenen Schädel. Er ist ungefähr 32-35 mm breit und ziemlich tief ausgehöhlt. Vor dem d_3 knickt er fast plötzlich nach abwärts ab. Die Breite des d_2 selbst ist, an derselben Stelle gemessen wie früher der Gaumen, 38 mm breit. Die Innenseite der Zähne und daher auch des Gaumens ist vollständig parallel. Von vorne ist wieder jene Grube zwischen den beiden Incisivalveolen zu sehen, hier jedoch bereits mit steileren seitlichen Rändern und ungefähr 35 mm breit.

Die Verwandtschaftsbeziehungen des *El. meridionalis* zu den anderen fossilen und lebenden Elephanten sollen weiter unten besprochen werden. Vorläufig sei nur bezüglich des Schädels erwähnt, dass ich "molta somiglianza del cranio dell' *El. meridionalis* con quello dell' *El. indicus* e specialmente con quello dell' *El. primigenius*", wie Pohlig in einer Ankündigung einer grossen Elephanten-Monographie im "Bolletino della Società Geologica Italiana" ²) besonders hervorhebt, nicht finden kann. Ebenso ist wohl seine Vereinigung des *El. meridionalis* mit *El. Hysudricus* ³) entschieden unrichtig. Gerade diese beiden dürften wahrscheinlich in keinen directen genetischen Beziehungen zu einander stehen.

¹⁾ Die wirkliche Länge dürfte etwa 33 cm betragen haben.

²) Pohlig: Sopra una monographia degli Elefanti fossili della Germania e dell' Italia. Boll. Soc. Geol. Italiana. Vol. V. 1886; Roma 1887, Seite 413.

³⁾ L. c. Seite 414 und Sitzungsber. der Niederrheinischen Gesellschaft zu Bonn. Sitzg. vom 4. Febr. 1884, Seite 1 und 2 (des Separatabdruckes).

Schädelmasse.

Schädel A.

Breite der Nasenöffnung	51 cm
Halbe Breite der Frontalzone	
Halbe Breite zwischen den Postorbitalfortsätzen	
Distanz von der Spitze der Nasalia bis zum Scheitel 1)	40 ,,
schmalste Stelle	23 ,,
Halbe Breite der Prämaxillaria schmalste Stelle	31 ,,
Länge der rechten Prämaxillaralveole (Oberseite)	51 ,,
Dicke derselben in der Mitte	
Entfernung der Spitze des Postorbitalfortsatzes vom Vorderrand der Orbita	
Entfernung des Unterrandes des Foramen magnum von der Basis der hinteren Nasen-	
öffnung	32 "
Entfernung der beiden hintersten Punkte der M von einander	
Entfernung der Vorder-Innenecke der M von einander	
Höhe des Scheitels über der Alveolarlinie (senkrecht)	
Dicke des Jochbogens am unteren Postorbitalhöcker	10 ,,
Kleinste Entfernung der beiden Stosszahnalveolen	
Schädel C.	
Halbe Breite der Basis des Hinterhauptes	42 cm
Höhe desselben über der Basis des Foramen magnum	
Breite der schmalsten Stelle der Stirn	
Halbe Breite der Nasenöffnung	
Höhe des Scheitels über der Alveolarlinie 2)	
	90 ,,
Schädel D.	
Breite der Frontalzone (schmalste Stelle)	34 cm
Halbe Breite der Nasenöffnung	
Höhe des Scheitels über der Alveolarlinie 3)	

Unterkiefer.

Von Unterkiefern liegen mir an zehn Exemplare mit mehr oder minder gut erhaltenen beiden Hälften und ungefähr ebensoviele Fragmente vor. Sie repräsentiren fast jedes Altersstadium: von solchen, bei denen nicht einmal noch der vorderste Milchzahn zum Durchbruche gekommen ist,⁴) bis zu solchen, deren letzter Molar schon bis zu einem hohen Grade niedergekaut erscheint.

¹⁾ Letzterer ist jedoch zum Theil abgebrochen, so dass diese Dimension zu klein ist.

²⁾ Derselbe liegt aber an diesem Schädel 14 cm hinter derselben.

³⁾ Liegt hier über dem Hinterrand des Zahnes.

⁴⁾ Diese Unterkieferhälfte gehört zu dem soeben beschriebenen jugendlichen Schädel; abgebildet Taf. VII., Fig. I.

Da Ueberreste von Unterkiefern natürlich viel häufiger erhalten bleiben, als grössere Partien des Schädels, und besonders, da erstere auch in England mehrfach gefunden worden sind, so wurden sie schon von Falconer¹) und besonders Leith Adams²) einer sehr eingehenden Besprechung unterzogen. Ich glaube daher von einer solchen absehen zu können, zumal da mir ausser den Kiefern von El. meridionalis fast keine anderen zur Verfügung stehen. Jedem Versuch eines genaueren Vergleichs könnte daher nur höchst problematischer Werth zukommen. Nur der Veränderungen während des Wachsthums sei hier gedacht.

In der frühesten Jugend besitzt der Kiefer sozusagen noch die normale Kieferform der Säugethiere, indem ein horizontaler Ast mit mehr oder minder parallelem Ober-Unterrand, vorn schief abgestutzt, die von hinten — unten nach oben — vorne ausgedehnte Symphyse trägt.³) Bei Elephas in seiner ausgebildeten Form ist jedoch der Kiefer von den Zähnen gleichsam scharf nach abwärts geknickt und dann das dadurch unten vorspringende untere Eck des Kinnes durch eine zur oberen Ecke des Kinnes gezogene Gerade abgestutzt⁴). Der daher anfangs als Fortsetzung des zahnlosen Kieferoberrandes erscheinende, spornartige Vorsprung der Symphyse wird später anscheinend zu einer Fortsetzung des Unterrandes. Bei Mastodon arvernensis herrscht noch mehr oder weniger jener erste Zustand vor, und daraushin hat ja auch Cuvier den Unterkiefer, den Nesti 1808 abbildete, zu Mastodon gestellt. Der jugendliche Kiefer des El. meridionalis ist ferner ausserordentlich schlank, vor den Zähnen noch beträchtlich ausgedehnt und in seiner Gesammtheit etwas nach abwärts gedreht, so dass er mit dem hinteren Alveolarrande einen Winkel von etwa 150° einschliesst. Unterhalb der Zähne so ziemlich überall gleich hoch, verschmälert er sich vorne etwas. Das Kinn springt unten etwas nach abwärts vor. Die Symphyse hat eine eiförmige Gestalt, mit nach auswärts gerichteter Spitze. Die obere Fläche des spornartigen Schnabels hat gleichfalls nur eine ganz geringe Neigung.

Der Winkel, unter dem sich die beiden Kieferhälften treffen, beträgt ungefähr 70°. Nichtsdestoweniger erscheint — von oben aus — innen die Symphyse sehr ausgewölbt und breit, indem sich der Kieferknochen vor den Zähnen transversal sehr verschmälert und daher Raum zu einem weiteren, wohlgerundeten Bogen gibt. Der Kiefer gleicht in dieser Beziehung sehr der von Leith Adams gegebenen Abbildung eines nur ganz wenig älteren Kiefers von El. primigenius⁵), wenn auch bei diesem die Symphyse noch breitgestreckter ist. In der Seitenansicht ist er jedoch, da er sich in der Bildung des Kinnes schon vollkommen den erwachsenen Elephanten anreiht, vollständig verschieden.

Nach hinten zu verbreitert sich der zahntragende Ast ausserordentlich rasch, so dass er von einer Breite von 22 mm hinter der Symphyse nach 6 cm langem Verlaufe zu 56 mm angewachsen ist.

Unmittelbar hinter dem d_2 erhebt sich an vorliegendem Exemplar (zu dem vorhin an zweiter Stelle erwähnten jugendlichen Cranialfragment gehörig; Taf. VII, Fig. 2) in senkrechter Richtung der Ramus ascendens mit dem Kronfortsatz. Diese gesammte hintere Partie ist jedoch fast vollständig an einer zu dem ersterwähnten jungen Schädel gehörigen Unterkieferhälfte erhalten, an der nebst dem Symphysentheile nur das allerhinterste Stück fehlt (Fig. 1). Hier ist der Ramus ascendens vor dem Condylus sehr breit, viel breiter, als es bei Blainville's Abbildung (Blainville, Ostéogr., Genus Elephas, Tafel II) der Fall ist, nähert sich aber ausserordentlich der Figur Cuvier's (Cuvier, Oss. foss., Eléphans, Tafel XII). In der Aufsicht ist der horizontale Kieferast, dem bedeutend geringeren Entwicklungsgrad der Zähne

¹⁾ Pal. Mem. II, Seite 126-128, 140-141.

²⁾ L. c. Seite 134, 199.

³⁾ Siehe Taf. VII, Fig. 2.

⁴⁾ Siehe Taf. VIII, Fig. 2.

⁵⁾ L. c. Taf. X, Fig. 1 und 1a

entsprechend, viel schmächtiger und seine Unterseite, im Gegensatze zum ersteren, wo sie vollkommen und breit gerundet ist, natürlich schmäler, mit der Flanke aber einen Winkel von etwas weniger als go^o einschliessend.

Masse des ersterwähnten Kiefers sind:

Länge	von	n Beginn o	des Ram	us asce.	ndens	bis	zur	Spi	tze							180	mm
Höhe	des	horizontale	en Astes	vor Be	ginn d	es a	ufst	eige	end	en	•					52	12
,,	7.7	,,	17	unter d	d_{3}											53	2.7
,,	7.7	77	,,	an sein	er schi	nals	sten	Ste	elle	(vo	rc	lem	K	linn	1)	40	,,
Höhe	des	Kinnes .										•				45	2?
Grösst	er D	urchmesse	r des Sy	mphyse	enovale	s.										50	"
Entfer	nung	des d_3 ve	on der S	Spitze .												94	2.2

Ein weiteres Altersstadium repräsentiren Kieferhälften mit d_2 und d_1 (Taf. VIII, Fig. 3). Leider sind sie jedoch schlecht erhalten. Es fehlt der aufsteigende Ast, und auch das Kinn ist stark verletzt. Es ist das umsomehr zu beklagen, als mir hier zum Vergleiche ein prachtvoll erhaltener, ungefähr gleichalteriger, fast vollständiger Kiefer eines *El. primigenius* aus Kurgan, im westlichen Sibirien, vorliegt.

Aus dem jedoch, was vorhanden ist, lässt sich schon ersehen, dass der Kieferoberrand vor den Zähnen in diesem Alter bei El. meridionalis schon bedeutend mehr gesenkt ist, sowie auch, dass die erwähnte kahnförmige Bildung des Kinnes offenbar schon fast ganz zurückgetreten ist, wenn auch die obere Fläche des Schnabels noch immer sich viel mehr der Horizontalen als der Verticalen nähert. Bei dem Kiefer des Mammuth fällt der Kieferknochen unmittelbar vor den Zähnen sofort unter einem Winkel von etwa 1100 geradlinig ab; bei El. meridionalis ist die Neigung immerhin noch 120—1300. Bei ersterem sind ferner Kiefer-Ober- und Unterrand nahezu parallel, während bei letzterem die Alveolarlinie sich vorne bedeutend aufwärts krümmt und der Knochen hier daher viel höher erscheint. Ueberdies ist letzterer auch etwas gestreckter.

Der genannte Mammuth-Unterkiefer repräsentirt daher ein Wachsthumsstadium, das *El. meridionalis* erst viel später erreicht.

Masse eines solchen hieher gehörigen Unterkiefers (Taf. VIII, Fig. 3) sind (d_2 befindet sich in voller Usur, d_1 ist in seinen ersten zwei Jochen davon ergriffen):

Länge	VO:	m Beginn des au	ufstei	igenden	Aste	es bis zum	Vorderra	nd	des	d_2			•		•		130 r	nm
Höhe	des	Kieferknochens	unte	r dem	Vord	lerrande des	$s d_2$.										105	77
,,	"	7,7	bei	Beginn	des	aufsteigend	en Astes										83	,,
Dicke	22	22	,,	ż.,	,,	"	"	٠				•	•	•		•	84	; ;

Die gleichen Masse an dem Unterkiefer des El. primigenius:

Länge vom Beginn des aufsteigenden Astes bis zum Beginn des abschüssigen Diastems . . 150 mm , , , , , , , zur (abgebrochenen) Symphysenspitze (hori-

Weiter befinden sich nun hier Kiefer mit $d_1 - M_1$, mit M_1 , mit M_2 , mit $M_2 - M_3$ und mehrere mit M_3 . Das Diastem wird immer abschüssiger, die frühere obere Fläche des Schnabels steht endlich schon beinahe senkrecht. An einem Kiefer mit $d_1 - M_1$ beträgt der Winkel zwischen Alveolarlinie und dem scharfen Kamm des Diastems noch 130°, an einem anderen mit derselben Bezahnung nur

noch 120; an einem dritten mit M_2 110, an einem weiteren mit M_2 — M_1 (Tafel VIII, Fig. 2) sogar nur 100°. 100—110° ist er in der Regel bei erwachsenen Exemplaren. Der Schnabel und das gesammte Kinn ziehen sich dabei oft bedeutend nach abwärts vor, die Seitenwände der Symphyseneinsattlung werden steiler oder wölben sich medianwärts sogar etwas über. Dass übrigens das Detail auch hier überaus variabel sei, kann man schon nach dem, was Leith Adams über die Kieferform des *El. primigenius* sagt¹) und abbildet, vermuthen.

Der Bogen, unter dem sich die beiden Hälften vorne treffen, ist allerdings im Allgemeinen mehr hyperbelartig; doch liegen mir auch Exemplare vor, wo er fast ganz so breit gerundet ist, wie bei El. primigenius. Cuvier sah als einen der wichtigsten Unterschiede zwischen seinem fossilen Elephanten (El. primigenius Blumenbach) und den lebenden den an, dass bei ersterem, zu denen er ja alle Fossilreste dieses Genus stellte, die Molaren parallel wären, während sie bei letzteren nach vorne convergiren²). Falconer³) und schon Nesti¹) machten jedoch die Bemerkung, dass bei dem italienischen Elephanten (El. meridionalis) "the teeth of the opposite sides converge in front. instead of being nearly parallel, or but little inclined, as in El. primigenius". Ja selbst für den typischen El. primigenius zeigte Ersterer, dass die Zähne nach vorne zu convergiren können³). Was nun El. meridionalis betrifft, so ist letzterer Befund allerdings hier der normale; doch kommen andererseits auch wieder Fälle vor, wie zwei der vorliegenden Kiefer beweisen, dass die Zähne nahezu parallel laufen.

Angesichts dieser grossen Variabilität könnte einer Vergleichung, basirt auf geringes Material oder gar nur auf einzelne Abbildungen, wie bereits erwähnt, a priori nur ein sehr geringes Vertrauen entgegengebracht werden. Nur eine auf Grund genauen Studiums möglichst zahlreicher Reste verschiedener Species gewonnene Anschauung kann da massgebend sein, wo oft die Grenzen der individuellen Variation grösser zu sein scheinen als die normale Distanz zwischen den beiden Species.

Bezahnung.

Incisiven: Ueber die Stosszähne der älteren europäischen Elephanten (El. meridionalis und antiquus) ist man in der Literatur bis jetzt noch ziemlich im Unklaren. Es kommt dies daher, dass man noch keinen derselben mit dem Schädel im Zusammenhange angetroffen hat, daher bei isolirten Funden stets die Unsicherheit der Zutheilung. Leith Adams erwähnt aus England zwei Zähne. Von dem ersten, gefunden im Elephant Bed zu Runton bei Cromer, sagt er jedoch schliesslich: "Seeing that the tusks of El. antiquus presents the same configurations, and that individuals of the latter attained to nearly the same colossal dimensions, it is impossible to assign the above with certainty to either species; the probability is, however, that is belonged to El. meridionalis." O Von dem anderen sagt er jedoch geradezu, dass es "just possible" wäre, dass der Zahn mit anderen in der Nachbarschaft im Forest-bed gefundenen Molaren von El. antiquus zu demselben Individuum gehörte.

Der italienischen Vorkommnisse thut Nesti⁷) in seinem Briefe an Ottav. Targioni Tozetti Erwähnung. Die grosse Variabilität in der Stärke ist er weniger geneigt dem Alter, als vielmehr dem Geschlechte zuzuschreiben.

¹⁾ L. c. S. 134-145.

²⁾ Cuvier, Oss. foss. S. 184.

³⁾ Falconer, Pal. Mem. II, S. 127.

⁴⁾ Nesti, Lettera sopra alcune ossa etc., 1825, S. 206.

⁵⁾ L. c. und "Fauna antiqua Sivalensis", Taf. 131, Fig. 1-3.

^{6) 1.} c. S. 186.

⁷⁾ Nesti: Lettera sopra alcune ossa etc., Pisa 1825, S. 203

Falconer führt aus dem Florentiner Museum mehrere Schädel an, an welchen die Zähne vollständig erhalten sind; "and the specimens are sufficiently abundant to furnish a correct idea of their form and direction."¹) Doch gehören die von ihm zuerst genannten Schädel mit lyraförmigen Stosszähnen wahrscheinlich nicht hieher, und was das Cranium mit den "sichelförmigen, nach Theristocaulodon-Art gekrümmten" Incisiven betrifft, so wurde schon an früherer Stelle gesagt, dass es sich hier um künstlich dem Cranium A Nesti's in sehr täuschender Weise aus Gyps angefügte Zähne handelt. Nur die äussersten Spitzen sind echt, die ja möglicherweise zu demselben Individuum gehört haben konnten. Doch waren diese wieder offenbar rechts und links, vertauscht, so dass auf diese Weise jenes sonderbare Zahngebilde zu Stande kommen konnte. Der "enormous skull" mit dem einzigen Zahn auf der rechten Seite und den ausserordentlich breiten Prämaxillaria gehört nach dem Backenzahn einem El. antiquus an. Von Incisiven ist jedoch an ihm ausser jenem in der Alveole steckenden Theile nichts zu sehen.

Von dem typischen El. meridionalis besitzt also auch das hiesige Museum keinen Schädel mit erhaltenen Stosszähnen. Doch sind dafür von letzteren mehrere sehr gut erhaltene Exemplare da, an denen auch noch ein allerdings geringer Theil der Alveole in natürlichem Zustande haftet, so dass daraus ihre Stellung zum Schädel so ziemlich genau bestimmt werden kann. Darnach war der Zahn nach dem Verlassen der Alveole zuerst nach abwärts und auswärts gerichtet, krümmte sich dann in leichter Schraubenwindung nach aufwärts und endlich ein wenig nach einwärts. Stets ist jedoch die Richtung dabei gegen vorne und keine Tendenz zur spiralen Rückwärtsbeugung vorhanden wie bei El. primigenius. Der Durchschnitt des Zahnes ist oval oder etwas eiförmig. Dabei ist der längere Durchmesser am Grunde der Alveole von unten innen nach aussen-oben gerichtet; die obere Spitze des Ovals dreht sich jedoch noch innerhalb der Alveole nach innen und behält diese Drehungsrichtung bis zur Spitze des Zahnes bei, so dass sie ein Stück vor der Alveole an das mediane Ende des nun horizontal liegenden grossen Durchmessers zu liegen kommt, hierauf, ein Stück weiter, nach unten und endlich sogar auch noch etwas nach aussen. Die an der concaven Seite der Krümmung des Zahnes gelegene Fläche des Ovales ist in der Regel etwas bis beträchtlich flacher als die an der convexen Seite gelegene. Das Mass und die Schnelligkeit der Schraubenwindung variirt dabei innerhalb gewisser, jedoch nicht allzuweiter Grenzen. Die Zähne selbst sind sehr stark und massig und nehmen anfangs langsamer, gegen die Spitze aber relativ rasch an Stärke ab.

So ist bei einem Zahne der grössere Durchmesser unmittelbar vor der Alveole 20 cm, der kleinere 18 cm; von der Stelle dieser Messung bis zur Spitze ist die Totallänge 180 cm; ein Meter vor der Spitze der grosse Durchmesser noch 16.5 cm, der kleinere 14 cm.

Ein zweiter rechter Zahn, an dem von einer Alveole nichts zu sehen ist, hat an seinem hinteren Ende einen grossen Durchmesser von 21 cm und einer kleinen von 18.5; die Länge beträgt jedoch nur 164 cm; grosser und kleiner Durchmesser 1 m vor der Spitze: 18.5 und 15.5 cm.

Ein dritter, der linken Seite, zeigt eine ausserordentliche Länge. Dies rührt jedoch jedenfalls nur daher, dass die Alveolarwände weggebrochen sind und wir daher auch noch die Erstreckung des Zahnes in der Alveole vor uns haben. Sie beträgt 266 cm. Dabei sind die Durchmesser am hintersten Ende 16 und 14'5 cm, ungefähr 60 cm weiter vorn ist der grössere jedoch auf 19 cm angewachsen und nimmt dann gegen die Spitze sehr langsam ab. 1 Meter vor derselben ist der grosse Durchmesser noch 16 cm, der kleine 13'5.

¹⁾ Pal. Mem. II, S. 119.

Von Chiusi, Provinz Siena, stammen zwei wahrscheinlich demselben Individuum angehörige Zähne von besonderer Grösse mit anhaftenden Theilen der Alveole, von denen der rechte jedoch vorne ein Stück eingebüsst hat. Der linke misst ungefähr vom Alveolarrand bis zur Spitze 203 cm; mehr als ein halber Meter Zahnlänge steckt jedoch noch in der Alveole. Unmittelbar vor dieser beträgt der grosse Durchmesser 21.5 cm, der kleine 18 cm, dieselben 1 m vor der Spitze 17.5 und 15 cm.

Ein linker Stosszahn, bei Terranuova gefunden und in der Sammlung der Accademia Valdarnese zu Montevarchi aufbewahrt, besitzt eine ausserordentlich starke Schraubenkrümmung und eine beträchtliche Abplattung an der concaven Seite. In der Mitte ist sein grösserer Durchmesser 20 cm, der kleinere 18 cm.

Prof. Fr. Bassani führt einen im Museo Civico von Mailand befindlichen Stosszahn von El. meridionalis an, der nach ihm fast 3.5 m lang gewesen sein muss. Er stammt aus der Nähe von Salsomaggiore in der Provinz Parma und hat einen grössten Umfang von 72 cm, dabei einen grösseren Durchmesser von 24 und einen kleineren von 19 cm. Der erhaltene Theil des Zahnes hat eine Länge von 2.57 m.1)

Ein Fund neueren Datums ist ein grosser Stosszahn, der zusammen mit einem Unterkiefer, zerbrochenen Molaren und dem Incisiv der anderen Seite bei San Martinello in der Nähe von Perugia gefunden wurde und sich gegenwärtig im Besitze der Marchesa Spinola ebendaselbst befindet. Er hat längs-der concaven Seite gemessen eine Länge von 290 cm und zeigt sehr gut jene charakteristische schraubenähnliche Krümmung. Der grösste Umfang, ungefähr zwei Meter von der Spitze, beträgt 58 cm, der Umfang 1 m vor der Spitze 55 cm. An letzterer Stelle ist der grössere Durchmesser 20 cm, der kleinere 15.5 cm.

Jüngere Individuen zeigen natürlich eine geringere Dicke, doch erweisen sie sich immerhin durch ihr relativ rasches Anwachsen zu beträchtlicher Stärke als hieher gehörig. Ein solches Fragment hat z. B. eine Länge von 1 m und hier einen Durchmesser von 11 cm. Da es noch keine centrale Höhlung besitzt, muss es noch beträchtlich länger gewesen sein.

Ein anderes von ziemlich starker Krümmung ist vorn und hinten abgebrochen. Es ist ungefähr 92 cm lang, die beiden Durchmesser nicht sehr viel verschieden. Der grössere beträgt am hinteren Ende 12, am vorderen 7.5 cm, der kleinere hinten 11.5, vorne 7 cm. Es besitzt ebenfalls noch keine centrale Höhlung.

Diese jüngeren Zähne charakterisiren sich daher durch ein langsameres Anwachsen, wahrscheinlich durch einen weniger ovalen Durchschnitt, und dann durch eine etwas raschere Krümmung des Zahnes.

Milchincisiven liegen mir keine vor. Doch sind in zwei sehr jugendlichen Kiefern Alveolen für solche vorhanden. Sie haben hier etwa 10—12 mm im Durchmesser. —

Ein ganzer Schädel mit beiden wohlerhaltenen Incisiven — sammt dem ganzen Skelette — scheint nur im naturhistorischen Museum von Paris vorhanden zu sein. Es ist schon von Paul Gervais aufgestellt worden und stammt nach Gaudry aus dem Pliocän von Durfort (Gard). Nach der Abbildung stimmen die Zwischenkieferknochen und die Stosszähne in ihrer Form und Richtung, soweit man es nach der Zeichnung beurtheilen kann, vollkommen mit den Resten des Florentiner Museums überein. Die Stirnregion ist allerdings viel zu breit, doch

¹⁾ Fr. Bassani: Sopra una Zanna di *Elephas meridionalis* scoperta nelle sabbie gialle di Salsomaggiore (provincia di Parma). Dal Museo Civico di Milano, 6 Aprile 1884.

ist dies, wie noch andere Abweichungen, vielleicht nur auf Rechnung einer ungenügenden Abbildung zu setzen.¹)

Die Stosszähne wenden sich auch leicht nach innen, wie bei den italienischen Vorkommnissen, von denen Falconer irrigerweise sagt: "In the majority of cases they diverge, and are produced forwards and upwards in a easy curve, with points directed outwards, very much as in the African Elephant, or in the sceleton of *Mastodon Ohioticus* in the British Museum."²) Die Gestalt sowohl als Richtung der Zähne bei letzterem³) ist jedoch ganz verschieden von der bei *El. meridionalis*. Die Zähne verjüngen sich viel rascher von der Alveole zur Spitze und besitzen anscheinend jene leichte schraubenförmige Krümmung nicht. Auch sind ihre Spitzen nach auswärts gewendet.

Eine ganz auffallende Aehnlichkeit mit manchen unserer hiesigen Zähne bietet jedoch ein von Falconer in seiner "Fauna Antiqua Sivalensis"4) abgebildeter, jedoch nicht näher bestimmter Stosszahn eines Elephanten. Er zeigt dieselbe Krümmung und sogar auch dieselbe Abplattung an der concaven Seite desselben, so dass man sich fast versucht fühlen könnte, ihn dem El. Hysudricus zuzutheilen, der im Schädelbau so viele Aehnlichkeiten mit El. meridionalis besitzt, wenn er sich allerdings auch in der Structur seiner Molaren ebenso entschieden von diesem entfernt.

Backenzähne.

A. Milchzähne: 1. Unterer D_3 : Die Sammlung besitzt vier solche Zähne, von denen zwei zu dem Unterkiefer des bereits erwähnten jugendlichen Schädels, einer (linksseitig) zu dem gleichfalls schon genannten Unterkiefer (mit Oberkiefer) gehören.⁵)

Die beiden ersten (Tafel VII, Fig. 3—3a) sind noch nicht angekaut und besitzen je drei Joche und vorne und hinten einen Talon. Die Joche erscheinen stark "gefingert" und mit verticalen Runzeln bedeckt. Der Umfang ist oval, sehr wenig nach hinten verbreitert. Länge 23 mm; grösste Breite 15 mm:

Der dritte, von Falconer schon beschriebene Zahn ist etwas kürzer. Er besitzt auch nur drei Joche und einen vorderen Talon. Er ist zu hinterst am breitesten. Obzwar die Usur schon ziemlich weit vorgeschritten ist, ist die Fingerung noch immer ersichtlich. Falconer⁶) nennt ihn irrthümlich einen rechten und schreibt ihm drei Joche und beide Talone zu.

Länge: 19 cm; grösste Breite 15 cm.

Die Wurzel besitzt überall zwei vollkommen getrennte, nach unten divergirende Aeste, von denen der hintere der stärkere ist. Leith Adams erwähnt denselben Befund bei El. Indicus, der von ihm als El. antiquus abgebildete Antepenultimus hat hingegen eine einheitliche Wurzel. Auch El. primigenius scheint eine — wenigstens in ihrem oberen Theile — verwachsene Wurzel besessen zu haben. Die Krone erscheint von der bedeutend schmäleren Wurzel stark abgeschnürt. Der Cementbelag ist an dem an zweiter Stelle erwähnten Exemplar stark entwickelt, schwach an den übrigen; hier jedoch jedenfalls nur noch nicht angelegt.

¹⁾ Gaudry, Les Ancêtres de nos animaux dans les temps géologiques. Paris, 1888, Seite 279 und Titelbild (Publicirt in der Bibliothéque scientifique contemporaine.)

²⁾ Pal. Men., II. Seite 119.

³) R. Owen, British fossil Mammals and Birds. London, 1846. Seite 298; sowie: J. D. Dana: Manual of Geology. 2. Ed. New-York, 1876.

⁴⁾ F. A. S., Tafel 41, Fig. 1 und 1a.

⁵⁾ Dieses letztere Exemplar ist ausführlicher beschrieben in Falconer, British and European fossil Elephants. Pal. Mem., II., Seite 110.

⁶) Pal. Mem., II. Seite 110.

1a) Oberer D_3 : An denselben beiden Exemplaren sind auch je beide obere D_3 vorhanden, der überdies auch in einem isolirten Stück vorliegt.

An dem fast vollständigen Schädel noch nicht in Usur getreten, zeigt er wieder jene Auflösung der Kämme in Papillen, die schon früher erwähnt wurde. Der Zahn ist bedeutend breiter und zählt drei Joche nebst vorderem und hinterem Talon. Die Zahl der Papillen steigt bis sechs an einem Joche, beim unteren D_3 bis vier.

Länge: 21 mm; Breite: 18 mm.

An dem Oberkieferfragmente ist der Zahn beträchtlich angekaut, das letzte Joch zum Theil mit dem Nachjoch schon verschmolzen. Vorhanden sind drei Joche und vorderer und hinterer Talon. Cementbelag ist reichlich, Email dick, Marken¹) nicht mehr in Inseln aufgelöst und (vorn — hinten) sehr breit (Taf. XIII, Fig. 2).

Länge: 23 mm; Breite: 20 mm.

Endlich liegt noch ein isolirter, linker, oberer D_3 vor. Er ist auch ziemlich stark — doch schief nach aussen — oben — abgekaut, die Schmelzinseln der Marken jedoch noch getrennt. Er hat dieselbe Jochformel wie vorhergehender. Das Cement ist abgerieben.

Bei diesen wie auch den übrigen oberen D_3 ist die Wurzel, wie auch schon bei unteren D_3 , vollkommen zweitheilig, nach oben divergirend und bei einer Breite von 9 mm scharf von der Krone abgesetzt. Die Länge des hinteren Astes beträgt 14 mm. Die grösste Breite der Krone liegt stets zu hinterst.

Länge: 21 mm; Breite: 17 mm.

Falconer bildet in der "Fauna Antiqua Sivalensis") einen oberen D_3 von El. planifrons ab, der, obzwar 25 mm lang, nur vier Joche im Ganzen besitzt. Ausserdem nimmt eigenthümlicherweise die Höhe derselben vom vorletzten gegen vorn sehr rasch ab, was aber wohl nur eine Abnormität ist. Er gleicht dem unsrigen jedoch durch die Dicke seiner Joche.

Leith Adams bringt einen sehr breiten oberen D_3 von El. antiquus von Grays Thurrock, Essex, zur Abbildung (Leith Adams, 1. c. Tafel 1, Fig. 1—1a, Seite 13), der aber im Ganzen nur vier Joche zeigt. Bei El. meridionalis sind jedoch die Details des Zahnes viel plumper, massiver, gerundeter als bei diesem D_3 . Er erwähnt ferner einen solchen auch als in der "Fauna Antiqua Sivalensis" abgebildet.³) Dieser ist jedoch nach Falconer (Pal. Mem., I., Seite 442) ein zweiter oberer Milchmolar, was nach der Stärke seiner fünf Joche und seiner Höhe auch wahrscheinlich sein dürfte.

2. Oberer D_2 : Ist an dem genannten Oberkieferfragment sehr gut zu sehen und auch schon von Falconer⁴) beschrieben. Er zählt nach diesem sechs Joche nebst vorderem und hinterem Talon; doch ist hier der vordere Talon ganz ausserordentlich klein⁵) und das erste Joch eigentlich morphologisch dem sonstigen Talon gleich. Von der Usur sind an diesem Zahne noch der Talon und die hinteren drei Joche verschont geblieben. Die einzelnen Schmelzbüchsen sind

¹⁾ So mögen hier und im Folgenden die durch die Abkauung entstandenen Durchschnitte der einzelnen Joche — in ihrer Gesammterstreckung in transversaler Richtung — genannt werden. (= Discs of wear).

²⁾ L. c. Tafel 12, Fig. 1-1b.

³⁾ L. c. Tafel XIV A, Fig. 1 und 1a.

⁴⁾ l. c.

⁵⁾ Die Zählung der Joche und Talone ist überhaupt eine höchst unsichere und vielfach vollkommen willkürliche. Manchmal ist der Talon so stark entwickelt wie ein Joch, manchmal wieder sehr schwach; manchmal drängen sich die einzelnen ihn zusammensetzenden Papillen transversal stark zusammen, und es entstehen dann Constellationen, bei denen es stets zweifelhaft

ungemein dick und — doch nur an ihren Spitzen — reichlich mit Cement überlagert. An der Kaufläche selbst ist die erste Marke schon einheitlich, die zweite jedoch aus drei, die dritte aus fünf Inseln zusammengesetzt. Das Email ist relativ dick und mässig, jedoch ganz unregelmässig gewellt. Die Höhe der Krone beträgt ungefähr 35 mm. Das Email ist stark gerunzelt.

Länge: 62 mm; Breite: 40 mm.

An dem jungen Schädel ist D_2 erst im Keim. Er zählt fünf Joche nebst den beiden Talonen. Höhe der Krone annähernd dieselbe wie früher. Die Zahl der Papillen in jedem Joche ist 5-8; das Email ist gerunzelt.

Länge: 60 mm; Breite: unsicher.

Ein fast vollständig erhaltener, isolirter D_2 zeigt auch die Jochformel $x \circ x$.

Länge: 67 mm; Breite: 38 mm (ohne Schmelzbelag).

Mehrere isolirte Fragmente zeigen, soweit erkennbar, dieselben Verhältnisse.

Ein schönes Exemplar eines oberen D_2 von El. meridionalis befindet sich im Museum von Montevarchi. Es besitzt x 6 x Joche und eine Länge von 6_4 mm. Die Breite beträgt zwischen dem ersten und zweiten Joche 28 mm, am fünften Joche 40 mm.

2a) Unterer D_2 : Dem zuerst erwähnten zweiten Oberkiefer-Milchmolaren entsprechend, sind bei demselben Exemplar auch die unteren D_2 sehr gut entwickelt. Sie charakterisiren sich durch dieselben Eigenschaften. Bezüglich der Jochformel $x \circ x$ gilt dasselbe wie oben.

Länge: 62 mm; Breite: 35 mm.

Der Unterkiefer des jungen Schädels zeigt D_2 im Keim. Jochformel ist $x \, 5 \, x$; Länge: ungefähr 65 mm; Breite: unsicher.

Ein isolirter linker Unterkieferast zeigt D_1 und, stark abgekaut, D_2 . (Tafel VII, Fig. 4, Tafel VIII, Fig. 3.) Letzterer zeigt fünf Joche nebst vorderem und hinterem Talon. Bei letzterem sind annähernd dieselben Verhältnisse zu constatiren, wie früher bei dem vorderen Talon. Er bildet eine bedeutend kleinere, halbkreisförmig nach vorne gebogene Marke, in deren Mittelpunkt sich ein weiteres, im Falconer'schen Sinne erst als hinterer Talon zu bezeichnendes Zahnelement befindet. Die Marken sind breit und in Folge der weit vorgeschrittenen Usur einander sehr genähert, vorne sogar theilweise schon verschmolzen. Das Email ist dick, wenn auch, wie bei allen Deciduis, nicht so dick wie bei den echten Molaren, äusserlich stark gerunzelt, unregelmässig gewellt und von glänzend schwarzer Färbung. Am breitesten ist der Zahn ungefähr am vorletzten Joche. Nach vorn schmälert er sich beträchtlich. Er erscheint jedoch trotzdem viel breiter gebaut als ein — allerdings in der Usur etwas weiter vorgeschrittener — gleicher Zahn von El. antiquus von Maspino, bei Arezzo, am Ausgange des Val di Chiana (aus quarternären Ablagerungen).

Länge: 67 mm; grösste Breite: 41 mm.

Tafel XIV B der "Fauna antiqua Sivalensis" bringt die leider etwas zu kleinen Abbildungen von zwei oberen und einem unteren D_2 von El. meridionalis von der Norfolk- und Suffolkküste. Die einzelnen Marken sind hier zwar weit, wie Falconer bemerkt, doch unterscheiden sie sich von den vorliegenden italienischen Vorkommnissen doch durch ihre etwas gedrängtere Stellung und regelmässigere Form. Es gilt dies hauptsächlich von Fig. 3, auch 2, so dass ihre Bestimmung,

ist, ob sie einen oder zwei Quercomplexe bilden. Es entstehen dadurch Zahn- (besser Joch-) Formeln, die einander nicht vollkommen äquivalent sind, indem die gezählten Elemente keine ganz gleichwerthigen Einheiten sind. So finde ich bei *El. meridionalis*, wo ganz vollständige Zähne erhalten sind, allerdings auch die Jochformel x6x, dabei ist aber stets der Vordertalon — er ist neben dem oben in Rede stehenden Milchzahn überhaupt nur noch einmal angedeutet, da er sehr viel früher als sonst durch die Pression der Zähne verloren geht — so ausserordentlich klein, dass man ihn fast nur als Anhängsel des ersten Joches betrachten kann und dieses, das wieder viel geringere Dimensionen als die übrigen besitzt und oft nicht einmal dem hinteren Talon an Grösse gleichkommt, als vorderen Talon. Die Jochformel des D_2 sollte daher richtiger x5x lauten.

wie auch Leith Adams theilweise vermuthet 1), nicht ganz richtig sein dürfte. Der von Letzterem abgebildete Unterkieferast mit D_{2} 2) kann wohl sicher *El. meridionalis* zugeschrieben werden. Bezüglich der Jochformel wird wahrscheinlich auch hier dasselbe gelten können, was schon oben erwähnt wurde.

El. antiquus unterscheidet sich von El. meridionalis hauptsächlich durch sein dünneres, regelmässiger gewelltes Schmelz der Marken, die, selbst etwas gepresster, auch näher aneinandergerückt im Zahne stehen. Auch besitzen sie fast regelmässig eine mediane Erweiterung in sagittaler Richtung. Der Zahn selbst ist bei El. meridionalis stets breiter und plumper gebaut.

Von dem so nahestehenden *El. planifrons* der Sivalikfauna findet sich bei Falconer nur ein Durchschnitt eines solchen Zahnes gezeichnet. 3)

Den gleichzeitigen *El. Hysudricus* unterscheidet von *El. meridionalis* sein euelephantoider Typus im Zahnbau auch hier in entschiedenster Weise. 4)

3. Oberer D_1 : Vom oberen D_1 sind nur drei Exemplare vorhanden. Zwei in — zusammengehörigen — Oberkieferfragmenten, und ein isolirter. Letzterer ist offenbar der von Falconer in "British and European fossil Elephants" 5) beschriebene Milchzahn.

Von den ersteren zeigt der rechte — besser erhaltene — 7 dicke Joche und einen vorderen und hinteren Talon Von den Jochen sind drei und ein wenig auch noch das vierte von der Usur ergriffen. Sie zeigen im Uébrigen dieselben charakteristischen Eigenschaften wie die früher erwähnten Zähne. Die Breite am ersten Joche, das bereits eine einheitliche Marke bildet, ist 48 mm, dieselbe am sechsten 54 mm. Die Gesammtlänge beträgt 115 mm, die Höhe des letzten Joches (jedoch am entsprechenden linken Zahn gemessen) 63 mm; doch ist dieses Joch noch vollständig von Cement bedeckt.

Der isolirte Zahn ist, wie erwähnt, der von Falconer beschriebene. (Abgebildet Tafel VIII, Fig. 1.) Die Krone hat jedoch nicht 8 Joche und die beiden Talone, wie genannter Autor sagt, sondern nur 7, indem der zuhinterst aufsitzende Cementwulst keinen Talon mehr enthält, daher das letzte, ohnedies kleinere Joch consequentermassen als solcher angesprochen werden muss. Die Charakteristik dieses Zahnes fasst er schliesslich in den Worten zusammen: "A broad crown with low rigdes, wide discs and thick enamel". Er zeigt folgende Dimensionen:

Länge	:				٠						4	110	mm.
Breite	am	I.	Jo	che:						,		50	
,,	,,	7.		,,								62	,,
Höhe	21	7.		22			,		,			45	27

Die bedeutende Verschiedenheit in der Höhe beruht wohl nur auf dem Grad der Abnützung. Im Allgemeinen kann man den Zahn zweimal so lang als hoch nennen.

Ein weiterer oberer D_1 von *El. meridionalis* befindet sich im Museum zu Montevarchi. Seine Jochzahl beträgt ebenfalls $x ext{ 7 } x$ Joche. Seine Länge ist 110 mm, die Breite am 4. Joche 60 mm, die Höhe ebendaselbst gleichfalls 60 mm.

¹⁾ Leith Adams, l. c. S. 188.

²⁾ L. c. Tafel XXII, Fig. 3 und 3a.

³⁾ F. A. S. Tafel XII, Fig. 2.

⁴⁾ F. A. S. Tafel VII, Fig. 5-7.

⁵⁾ Pal. Mem., II., S. 110-111.

Sämmtliche von Leith Adams aus englischen Lagerstätten beschriebenen oberen D_1 besitzen auch die Jochformel x 7 x, während die des El. antiquus x 9 x-x 10 x Joche aufweisen. Ein gleicher Zahn von El. Namadicus ist nach Leith Adams von solchen des El. antiquus nicht unterscheidbar.

3 a) Unterer D_1 : Vorhanden sind: Ein Kiefer mit D_2 und D_1 , ein Kiefer mit D_1 und der Alveole des M_1 (Gypsabguss), zwei isolirte Zähne und mehrere Fragmente.

Am erstgenannten Kiefer sind die einzelnen Platten des D_1 ausserordentlich dick und in der Zahl von 8, sammt Vorder- und Hintertalon. Doch ist letzterer sehr klein und dem gleichfalls kleinen, eine nach hinten geöffnete Rinne bildenden letzten Joch eingelagert. Angekaut sind erst die ersten zwei Joche, an denen, wie schon bei D_2 erwähnt, glänzend schwarzes Email zu Tage tritt.

Länge: 130 mm; grösste Breite: ungefähr 60 mm; Höhe wohl nur wenig grösser.

Der Milchmolar des Gypsabgusses, dessen Original sich in der Sammlung des Marchese C. Strozzi befindet, erweist sich in seinen Proportionen als echter El. meridionalis, doch erinnern die Joche durch ihre eigenthümliche Wellung, sowie die mediane Ausweitung in sagittaler Richtung etwas an El. antiquus. Doch ist das Schmelz sehr stark, wie bei El. meridionalis, der Zahn sehr breit und in unversehrtem Zustande jedenfalls nicht sehr hoch gewesen. Die Jochformel ist $x \otimes x$, wenn ein undeutlicher Vorsprung als vorderer Talon angesprochen werden kann.

Von den beiden isolirten Zähnen zählt der eine 7 Joche und beide Talone (Taf. VII, Fig 6). Die Usur hat soeben das letzte Joch ergriffen. Er bietet denselben lang-eiförmigen Umriss und folgende Dimensionen:

Doch ist das 6. Joch bereits ein wenig abgetragen.

Zum Unterschiede von allen diesen angeführten Zähnen zeigt ein zweiter isolirter unterer Molar, mit fehlendem Cement, eine ziemlich langgestreckte Gestalt mit ebenso etwas bedeutenderer Höhe. Er zählt 8 Joche mit einem vorderen und einem sehr kleinen hinteren Talon. Die Joche nehmen bis zum fünften an Breite sehr wenig zu und erweitern sich dann rascher bis zum letzten, das fast das breiteste ist. Sie sind sehr ausgesprochen gefingert. Die Masse sind:

```
Länge: 122 mm; Breite am 1. Joche: 37 mm;
..., 4., 42, Höhe am 7. Joch: 60 mm.
..., 7., 50, ,
```

Die geringe Breite muss jedoch zum Theil dem Mangel an Cement zugeschrieben werden. Uebrigens sind die Joche stark, weit abstehend, das Email unregelmässig gewellt und relativ dick. An eine Verwechslung mit *El. antiquus* kann wohl nicht leicht gedacht werden. Von diesem liegt mir ein gleicher Zahn aus dem Valdarno vor, der sich durch seine langgezogene schlanke Gestalt und die bedeutende Höhe, durch das feiner gewellte Schmelzblech mit der medianen Erweiterung der enger stehenden Joche als solcher documentirt und eben dadurch sich auch von dem entsprechenden Zahn des *El. meridionalis* wesentlich unterscheidet.

Ein ähnlicher Zahn von El. meridionalis, wie dieser zuletzt beschriebene, befindet sich auch in der Sammlung von Montevarchi. Er ist gleichfalls beträchtlich schmal und von etwas bedeutenderer Höhe, die mittlere Expansion des El. meridionalis jedoch deutlich zu sehen, zu dem er

jedenfalls auch zu stellen ist. Die Höhe am 7. Joche, das jedoch schon etwas angekaut ist, beträgt 50 mm, die am 8. Joche, etwas weniger angekaut, 55 mm, die Jochzahl x 8 x.

Länge: 115 mm; Breite am 6. Joche: 45 mm.

Als Gesammtsumme für die Milchzähne ergibt sich demnach:

$$(.3.) + (.5. + .6.) + (.7.)$$

 $(.2. + .3) + (.5. - .6.) + (.7. - .8.)$

Die ursprünglich von Falconer gegebene lautet¹): $\frac{3+6+8}{3+6+8}$

Leith Adams modificirte sie etwas, indem er sie folgendermassen formulirte2):

Es sind diese Formeln — wenigstens den italienischen Vorkommnissen gegenüber — offenbar etwas zu hoch gegriffen. Besser stellt sie Lydekker dar³): $\frac{3+(5-6)+8}{3+6+8}$ -

Durch diese Veränderung ist die Zahn- und Jochformel des *El. meridionalis* mit derjenigen von *El. planifrons*, wie sie gleichfalls Lydekker⁴) gibt, fast identisch geworden, indem genannter Autor für letzteren angibt:

$$\frac{3}{3} \div (5 - 0) - (6 - 7) \\ - (7 - 0)$$

El. Africanus hat eine im Allgemeinen niederere Zahnformel:

$$\frac{(2-3)+(5-6)+(4-7)}{(2-3)+(5-6)-(4-7)}$$

daher er nicht gut mehr ein Nachfolger des *El. meridionalis* sein, noch viel weniger aber natürlich einen noch höher specialisirten Elephanten als Vorläufer haben kann.⁵)

B. Molaren: Konnte schon bei den Milchzähnen eine bedeutende Variabilität constatirt werden, die bei ebenso reichlichem Material, wie von den echten Molaren vorhanden ist, offenbar noch deutlicher hervortreten würde, so ist diese bei letzteren ganz ausserordentlich in die Augen fallend. Diese Unterschiede beziehen sich sowohl auf die Grösse der Zähne, als auch auf die Form und Gestaltung der Joche. Die Zahl der letzteren schwankt dagegen innerhalb ziemlich enger Grenzen und scheidet sie daher sämmtlich sehr scharf von allen anderen bisher aus Italien beschriebenen Formen. Dasselbe gilt auch von der Höhe des Zahnes, die überall sehr gering ist.

Zur besseren Uebersicht über den Grad der Verschiedenheit in der Grösse und über die Zahl der Joche mögen der Beschreibung einige Zahlen vorausgeschickt werden: ⁶)

¹⁾ Pal. Mem II, Seite 118 und 176.

²⁾ L. c. Seite 208.

³⁾ Siwalik and Narbadda Proboscidia, Palaeontologia Jedica. Ser. X. Vol. I. Part. V. Calcutta, 1880. Seite 285 (104).

⁴⁾ L. c. Seite 277 (96).

⁵⁾ Siehe z. B. Leith Adams, 1. c. Seite 244.

⁶⁾ Die mit einem * bezeichneten gehören der Sammlung der Accademia Valdarnese zu Montevarchi an.

	01	perkief	er	Un	terkief	er
	Länge	Breite	Jochzahl	Länge	Breite	Jochzahl
·	165	66	.9.	160	64	.9.
Molar 1.	160	64	.9.	170	67	.9.
Mo	160	62	-9.	140	65	, 8,
ri	210	75	. 10.	210	70	.9.
	240	83	, 10 ,	200	90	. 10.
Molar	190	78	.8.	185	65 (?)	. 10.
M	215	80	.10.		_	. 9 .
	300	122	.11.	315	110	.11.
	310	125	. 13.	320	110	. 15.21)
	230 (?)	95.	.11.	290 (?)	95	.11.
	270 (?)	120	.11.	270	100	. 11.
ŵ	300	107	. 13 .	280 (?)	95	, 12.
ь	235 (?)	87	. 12.	260 (?)	100	.11.
e -	260 (?)	95	.11.	* 275	95	. 12.
0	310	105	. 13.	-		_
M	270	120	. 13.	-	_	_
	320	?	. 13.	_	_	_
	* 280	85	. 13.	_	_	
	* 250	85	. 12.	_	_	

I. Oberer M_1 : Von oberen M_1 , die ich hieher zähle, sind drei vorhanden, von denen zwei jedenfalls demselben Individuum angehört hatten. Falconer beschreibt aus dem Florentiner Museum ausserdem ein Schädelfragment mit erhaltenem linken Stosszahn, das jedoch wahrscheinlich einer anderen Form zugerechnet werden muss. Es wird später erwähnt und ausführlicher behandelt werden.

Dagegen rührt jener "detached left antepennultimate" 2) wohl sicher von einem El. meridionalis her. Die Masse, die auch Falconer angibt, sind:

Das 9. Joch und der Talon sind klein.

Hierauf beschreibt Falconer⁵) "another detached antepenultimate", der jedoch nur "eight ridges besides a front and back talon" zeigen soll. Er ist einer von den beiden wahrscheinlich

¹⁾ Dies ist ein von Falconer schon (Pal. Mem. II., S. 117) beschriebener und hier S. 171 (65) angeführter, ganz abnorm ausgebildeter Zahn.

²⁾ Pal. Mem., II., 111.

³⁾ Doch ist diese, die auch Falconer angibt, sehr schräg gemessen. Vertical (Basis des 3. und Spitze des 5. Joches) beträgt sie etwa nur 80 mm.

⁴⁾ Hier ist die Messung annähernd senkrecht, Der Zahn ist durchgehends fast gleich hoch.

⁵⁾ Ibid.

zusammengehörigen.¹) In consequenter Weise, wie früher, verfahren, muss man ihm jedoch auch 9 Joche zuschreiben, deren letztem ein schmales Nachjoch angehängt ist. Hier betrachtet sie Falconer also als zusammengehörig und den Talon bildend. An dem Zahne der entgegengesetzten Seite ist dieser wahre Talon sammt dem letzten Joch (i. e. Falconer's Talon) jedoch etwas stärker entwickelt, daher hier der Zahn 9 Joche besitzt. Beide Zähne zeigen genau dasselbe Abkauungsstadium und genau denselben Erhaltungszustand, gehören deshalb jedenfalls zusammen. Drei Joche sind von der Usur ergriffen. Masse derselben sind:

			rechts	links
Länge			iúo mm	160 mm,
Breite am 1. Joch			62	61
8	4 .		64	64
Senkrechte Höhe am 3.	Joch		88	89
8.	**		8.	85

Die Joche sind dick, abstehend und an der Kaufläche überall noch in Inseln aufgelöst.

An dieser Stelle möchte ich auch noch gleich bemerken, dass im Jahre 1867 von Anca und Gemmellaro aus der Knochenhöhle von S. Theodoro auf Sicilien ein Gaumenfragment mit zwei Zähnen als El. meridionalis beschrieben und abgebildet worden ist.²) Die Zähne wurden als M_1 gedeutet. Das können sie aber absolut nicht sein, wie der erste Augenschein schon lehren muss. Es sind vielmehr M_3 , und das Exemplar gehört einem jener Zwergelephanten Maltas an. Man muss umsomehr Gewicht darauf legen, als dies ein — vorläufig einzig dastehender — Fall wäre, dass El: meridionalis in so jungen Ablagerungen vorkäme. Es liegt mir dieses Exemplar, sowie einige andere von den genannten Autoren gleichzeitig abgebildete Kieferfragmente und Zähne in Gypsabgüssen vor. Auch letztere, als El. Armeniacus bestimmt, gehören jedenfalls denselben Formen an.³)

Falconer erwähnt aus englischen Lagerstätten keinen oberen M_1 ; Leith Adams einen einzigen, den er auch abbildet.⁴) Dieser ist jedoch von ausserordentlicher Grösse und dürfte wohl als M_2 betrachtet werden müssen.

von d_1 , ein Gypsabguss eines ungefähr gleichalterigen Kieferastes der linken Seite, zwei beschädigte, isolirte Zähne und ein fast vollständiger Unterkiefer mit dem grössten Theil der M_1 und den M_2 im Durchbruch. Endlich ist noch ein weiterer isolirter, bereits von Falconer beschriebener Zahn zu nennen. Er erwähnt auch noch eine linke Kieferhälfte mit dem M_1 in situ, doch kann ich diese nicht vorfinden. Es ist zwar eine solche hier, ebenfalls mit M_1 und den stark niedergekauten d_1 , sie besitzt gleichfalls eine röthliche Färbung, der M_1 eine Länge von 160 mm (6·4 in.) und eine Breite von ungefähr 58 mm (also etwa 2·4 in.) am ersten Joch, sie war ferner zur Zeit Falconer's schon im Museum vorhanden, doch ist sie einmal von der rechten Seite, dann besitzt M_1 9 ausgebildete Joche und die beiden Talone (nicht $x \otimes x$), von welchen ersteren bereits fünf — und auch der 6. ein wenig — angekaut sind (nach Falconer blos drei), endlich ist

¹⁾ Der rechte ist Tafel IX, Fig. I und Ia abgebildet.

²⁾ Fr. Anca e G. G. Gemmellaro, Monografia degli Elefanti fossili di Sicilia. Palermo, 1867. Seite 16, Tafel II, Fig. 1.

³⁾ L. c. Tafel II, Fig. 2 und 4, Tafel III, Fig 1; siehe auch: Forsyth Major: Die Tyrrhenis. Studien über geograph. Verbreitung von Thieren und Pflanzen im westl. Mittelmeergebiet. Kosmos, VII. Jahrg. (Bd. XIII), Seite 5-6.

⁴⁾ Leith Adams, I. c. Tafel 22, Fig. 1.

⁵⁾ Pal. Mem., II. Seite 116.

eine Messung der Höhe am 5. Joche, die Falconer angibt, des Kieferknochens wegen nicht möglich.

Obzwar nun, wie erwähnt, an diesem Exemplar bereits 5 Joche und der Vordertalon angekaut sind, so bildet doch nicht einmal letzterer noch eine einheitliche Marke. Es lassen sich auch hier, wie in den allermeisten Fällen, sehr deutlich drei transversal nebeneinander liegende Complexe in jedem Joche unterscheiden, die, oft noch weiter zerfällt, später zu der einheitlichen Marke verschmelzen. Die Joche sind — auf dem Querschnitt — leicht nach hinten gebogen, was gleichfalls, in mehr oder minderem Grade ausgeprägt, ein Charakter unterer Molaren ist. Oft sind allerdings nur die Enden der Hörner ein wenig vorwärts gekrümmt. An den Oberkiefermolaren findet dann das Entgegengesetzte statt.

Der Zahn (M_1) des erwähnten Gypsabgusses, dessen Original sich in der Sammlung des Marchese C. Strozzi in Montefiesole, einem Landgut bei Pontasieve, befindet, zeigt 9 Joche sammt beiden Talonen. 5 Joche sind angekaut; das Schmelzbeleg ist dick, die Marken sämmtlich noch in Inseln aufgelöst, die Dreitheilung derselben gut ausgeprägt.

Der von Falconer Seite 116 der "British and European fossil Elephants"1) sehr genau beschriebene untere, rechte M_1 ist jedenfalls dasselbe Exemplar, das hier als El. antiquus von Malafrasca bezeichnet ist (Tafel X, Fig. 3 u. 3a). Es trägt allerdings die Jahreszahl 1865, so dass es Falconer, der am 31. Jänner 1865 starb, kaum mehr gesehen haben könnte, doch kann man leider auf die Etiquetten nicht viel Gewicht legen. Die ziemlich detaillirte Beschreibung, die Massangaben stimmen vollkommen, bis auf die Bemerkung, dass bei diesem Zahn nur zwei Wurzelcomplexe vorhanden seien, überein, während der hintere deutlich an der Innenseite einen kleinen dritten Ast vorgelagert hat, der die Joche 4 und 5 trägt. Doch kann da ein Irrthum leichter möglich gewesen sein, da Falconer wahrscheinlich den Zahn nur von der Aussenseite betrachtet hat. Hier trägt die vordere Wurzel das Joch 1 und 2, Joch 3 liegt über dem Intervall der beiden Wurzelcomplexe, während der grosse hintere sämmtliche übrige trägt. Die Wurzeläste erscheinen dabei, besonders an den Enden, stark nach rückwärts gebogen.

An der Innenseite des Zahnes ruht jedoch auf dem vorderen Wurzelast deutlich Joch 1—3, hierauf Joch 4—5 auf dem kleineren, mittleren, dessen Theilungsstelle auch nicht so hoch hinauf geht wie die des ersten, und endlich die übrigen Joche auf dem hinteren Wurzelstock. Die Vertheilung der drei Wurzeläste ist daher nicht dieselbe, wie es Vacek²) als charakteristisch für die oberen Molaren der Mastodonten angegeben hat (deren untere nach ihm aber nur zwei Aeste besitzen).

¹⁾ Pal. Mem., II.

²) Vacek, Ueber österreichische Mastodonten. Abhandl. der k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. VII, Heft 4. Wien 1877. Seite 19 u. 37.

Das Email ist sehr massiv, eine unregelmässige Fältelung nur sehr leicht an den stärker abgekauten Jochen sichtbar. Joch 1—4 bildet bereits einheitliche Marken, die jene bezeichnende Dreitheilung in Form zweier Einschnürungen aufweisen. Bei Joch 5 ist das äussere Drittel noch abgetrennt, die übrigen Joche bestehen aus je vier mehr oder weniger kreisförmigen oder elliptischen Inseln. Das mittlere Dritttheil ist, wie in der Regel, wenn die Abkauung sich in einem gewissen frühen Stadium befindet, in zwei kleine Abtheilungen gespalten.

Dieser Zahn ist auch dadurch bemerkenswerth, dass er wahrscheinlich derjenige, oder einer derjenigen ist, welche Cocchi als Beleg für seine Dreitheilung des Arnothales und dessen Fauna dienten¹). Er behauptet nämlich, dass zwischen Arezzo und Montevarchi ein Terrain sich befindet, wo El. meridionalis und El. antiquus zusammen vorkommen sollen. Doch ist ein solches Zusammenvorkommen, wie auch Forsyth Major bemerkt, bis nun in Italien noch nirgends sicher nachgewiesen worden, wobei natürlich eine wenigstens theilweise Gleichzeitigkeit, wie wahrscheinlich auch in England bezüglich des "Elephant Bed" und des "Forest Bed" (true Forest bed Gunn's), a priori nicht zurückgewiesen werden kann und wohl auch darf.

Die Jochzahl dieses Zahnes ist $x \otimes x$.

Länge dieses Zahnes: 142 mm (5.5 in.2)

Ausserdem sind noch zwei Fragmente des unteren M_1 vorhanden. Sie besassen wahrscheinlich dieselbe Jochformel wie der voran besprochene Zahn, oder vielleicht ein Joch mehr. Das Schmelz ist wieder sehr dick, eigenthümlich wulstig, mit unregelmässiger, grober Wellung, so charakteristisch für Zähne des El. meridionalis. Auch die erwähnte Dreitheilung der Joche ist sichtbar, wobei die mittlere Partie in der Regel etwas rhomboidal und breiter (in sagittaler Richtung) geformt ist.

	21.	B.
Länge des ganzen Zahnes	 . 160 mm	? mm
Breite am 2. Joche	 . 62	00
,, ,, 8	 . 08	05
Höhe ,, 8. ,,	 ,,	So .,

Ein von Catullo im Jahre 1844 abgebildeter, angeblich von der Hochebene des Serbaro im Veronesischen stammender Elephantenzahn 3) ist wahrscheinlich auch ein stark abgekauter unterer M_1 , der vielleicht den vorderen Talon und etwa noch ein Joch bereits verloren hat. Das Email ist wenigstens massiv, die Joche stark und abstehend, die Marken leicht zweimal eingeschnürt und ohne die medianen Sporne. Auch die anderen abgebildeten Zähne gehören jedenfalls — zum Theil sicher — dem El. meridionalis an.

Aus englischen Fundorten bildet Falconer⁴) zwei untere $M_{\rm I}$ ab. Beide stammen aus Mundesley an der Norfolkküste, und haben wahrscheinlich beide eine Jochformel von $x \, 8 \, x$; am zweiten fehlt vielleicht der vordere Talon. Sie sind nach Falconer beide charakteristische Zähne

¹⁾ Cocchi: L'Uomo fossile nell' Italia centrale, Mem, Soc, Ital, Sc, natur, Milano 1867. Seite 16.

²⁾ Nach Falconer l. s. c.

³⁾ F. A. Catullo, Su le Caverne delle Province Venete, Venezia, 1844, Tafel II, Fig. 2, S, 33.

⁴⁾ Fauna antiqua Sivalensis, Tafel 14 B, Fig. 5 und 6; Beschreibung: Pal. Mem. I, S. 445, und II, S. 134-135.

des *El. meridionalis*. Ihre Höhe zum wenigsten stimmt ganz mit toskanischen Exemplaren überein. Sie ist beiläufig die Hälfte der Länge und um ungefähr ein Viertel grösser als die Breite. Das Verhältniss der Länge zur Breite gibt ungefähr 2.5 zum Quotient.

Von El. planifrons findet sich in der "Fauna antiqua Sivalensis" Tafel XII, Fig. 4 und 4a, ein oberer und Fig. 10 und 10a ein unterer M_1 abgebildet. 1) Ersterer erscheint hier sehr gleichmässig gewellt, was aber vielleicht nur durch das hohe Alter des Zahnes so ausgeprägt zu Tage tritt, letzterer — übrigens, wie Falconer sagt, "a invaluable specimen" — nähert sich in der Gestaltung der Marken sehr dem El. meridionalis. Das Email ist dick, grob und unregelmässig gewellt, die Joche abstehend. Falconer gibt als Jochzahl 7 an; dabei zählt er jedoch augenscheinlich als 7. Joch ein Gebilde, das er sonst, an toskanischen Exemplaren, immer nur als hinteren Talon bezeichnet.

Von El. Hysudricus trennt unsere Species schon die höhere Jochzahl — 12. Der Tafel VII, Fig. 2 abgebildete obere M_1 unterscheidet sich durch seine bedeutendere Höhe und die enger stehenden Joche. Der untere M_1 , ibid. Fig. 10, befindet sich ungefähr in demselben Abkauungsstadium wie unser zuerst beschriebener M_1 (mit Kiefer). Doch während bei letzterem sogar der vordere Talon noch keine einheitliche Marke bildet — es sind weiter noch 6 Joche angekaut — sind bei ersterem die Inseln schon dreier Joche confluent. Das Längen- und Breitenverhältniss scheint jedoch bei beiden ungefähr dasselbe zu sein. Eine bedeutende Abweichung findet sich in dieser Beziehung bei dem Tafel XII C, Fig. 6 abgebildeten, aus dem Nerbuddathale stammenden unteren M_1 . Er ist nach Falconer²) 8 in. lang, 26 in. breit und am 8. Joche 42 in. hoch. Die Länge ist daher bedeutend überwiegender als früher, da der Quotient ungefähr 3 beträgt. Die Höhe ist etwas mehr als die Hälfte der Länge.

Gleichfalls durch eine höhere Jochformel sind dann El. antiquus und seine indische Parallelform El. Namadicus ausgezeichnet. Ersterer hat nach Leith Adams 3) nie weniger als $x \circ x$ Joche; gewöhnlich 10—12. Die von Falconer 4) abgebildeten M_1 des letzteren besitzen x 13 x Joche. Die Länge des Zahnes ist im Verhältniss zur Breite viel bedeutender, die Wellung klein und regelmässig, die Joche engstehend und schmäler, die Dreitheilung an der einheitlichen Marke viel weniger markirt, oft ganz fehlend, das mittlere Dritttheil bei frischeren Jochen meist (transversal) breiter als die seitlichen, während es bei El. meridionalis in der Regel bedeutend geringer ist, die Mitte der mehr geradlinigen Marken hinten und vorn in den charakteristischen Sporn ausgezogen. Die Höhe ist natürlich schon sehr beträchtlich. Es liegt mir aus der Provinz von Arezzo ein schönes Exemplar eines M_1 von El. antiquus vor, das bei einer Länge von 200 mm nur eine Breite von 55 mm besitzt, dagegen am 7. noch unangekauten Joche eine Höhe von 145 mm. Die Jochzahl ist dabei x 12 x.

2. Oberer M_2 : Von oberen M_2 liegen über ein Dutzend isolirte Zähne in zumeist gut erhaltenem, doch in der Abkauung fast durchwegs weit vorgeschrittenem Zustande vor, von denen jedoch zweimal je zwei offenbar demselben Individuum angehört hatten. Ausserdem enthält das Schädelfragment F Reste dieses Molaren, die im Ganzen noch 7 Joche zählen.

Vollständig sind zwei Zähne, von denen der eine nach seiner Etiquette von Monte Carlo bei S. Giovanni stammt. Es wäre dies deshalb sehr wichtig, weil Monte Carlo der einzige

¹⁾ Texterklärung hiezu: Pal. Mem. I, S. 432 und 433.

²⁾ Pal. Mem. I, S. 438,

³⁾ L. c. Seite 192.

⁴⁾ F. A. S. Tafel XII D, Fig. 1-2; Pal. Mem. I, 438, und F. A. S. Tafel XIII A, Fig. 5; Pal. Mem. I, S. 440.

Punkt im oberen Arnothal ist, wo sicher Mastodon arvernensis gefunden wurde, wo also diese beiden Formen zusammen getroffen worden wären. Doch darf man leider den meisten hiesigen Etiquetten gar kein Vertrauen schenken. Systematische Ausgrabungen wurden nur einmal gemacht, alles Uebrige stammt von Bauern, die diese Fossilien zufällig fanden, deren Angaben über Fundort aber natürlich sehr unzuverlässig sind. Uebrigens, selbst wenn diese El. meridionalis-Reste wirklich von Monte Carlo stammten, müsste vorerst noch die Einheitlichkeit dieser Lagerstätte bezüglich geologischer Horizonte festgestellt werden.

Der zweite vollständige Zahn (Taf. IX, Fig. 2 und 2 a) stammt gleichfalls aus dem oberen Arnothal; die nähere Fundortangabe fehlt jedoch, wie bei fast allen Exemplaren der alten Museumssammlung. Er zählt 9 Joche mit vorderem und hinterem Talon. Nur das letzte Joch und der hintere Talon sind von der Usur noch verschont. Trotzdem also nebst des Vordertalons noch 8 Joche bereits angekaut sind, bilden doch ausser ersterem nur 2 Joche einheitliche Marken. Am dritten sind die beiden inneren Inseln schon verschmolzen, die äussere ist im Begriffe, sich mit ihnen zu vereinigen. Vordertalon und erstes Joch sind überdies schon mit einander confluent. Daraus erhellt, dass die Zerspaltung der Joche in fingerförmige Gebilde sehr tief herabgeht. Bezüglich der Bildung des Schmelzes und der Joche gilt dasselbe wie früher.

```
      Länge des Zahnes
      103 mm

      Breite am 2. Joch
      77 ...

      , , 6. , ...
      73 ...

      , , 8. , ...
      65 ...

      Höhe des 8. Joches
      100 ...
```

Ein noch älteres Stadium repräsentirt ein weiterer Zahn, an dem nebst Hintertalon noch 6 Joche vorhanden sind; vom vorhergehenden besteht nur ein Theil der Hinterwand, vor der eine ungefähr 35 mm breite, schmelzlose, ebene Fläche sich ausbreitet. Doch sind erst die drei vorderen (der sichtbaren) Joche je vollständig einheitlich, das vierte beginnt es zu werden, und die letzten zwei sind in zwei äussere breitere (transversal) und zwei innere kleinere, kreisrunde Inseln aufgelöst, ebenso wie auch der hintere Talon. An der Hinterfläche besitzt der Zahn eine flache Aushöhlung, herbeigeführt durch den Druck des nachdrängenden letzten Molaren. Das Email ist ausserordentlich dick und unregelmässig wulstig gewellt.

Die grösste Breite mehrerer anderer, sehr stark abgekauter und daher mehr oder weniger unvollständiger Zähne ist: 79 mm, 78 mm, 80 mm, 81 mm etc. Stets ist das Schmelzblech dick, wulstig, besonders gegen die Mitte zu, gewellt, an der Seite oft glatt. Die Joche bilden relativ erst spät mehr oder weniger langgestreckte, fast ausnahmslos nach vorn convex gekrümmte, einheitliche Marken, die ziemlich lange eine ausgesprochene Dreitheilung durch zweimalige Einschnürung bekunden. Von diesen Theilen ist der mittlere sagittal und die beiden seitlichen transversal breiter als die benachbarten. Sie entstanden aus ursprünglich getrennten ovalen Inseln, die in noch früheren Stadien in weitere zwei oder auch mehrere kreisrunde Inselchen (die Fingerung des intacten Zahnes) zerfallen. Die einzelnen Joche, und später Marken, verlaufen jedoch dabei am Zahne in einer Richtung, ununterbrochen von rechts nach links.

Ausser diesen liegen mir jedoch noch zwei Paare offenbar des oberen zweiten Molaren vor, die in letzterer Hinsicht einen ganz abweichenden Charakter zeigen. Die Joche liegen

nämlich transversal nicht in einer Linie, sondern sind in der Mitte getheilt und die Hälften alterniren.

Das grössere der beiden Paare, vom Tasso im oberen Arnothal stammend, zeigt 7 Joche, vorn eine schmelzlose Fläche und hinten den Talon, der auch schon von der Usur ergriffen ist. Die Joche bestehen ursprünglich, wie gewöhnlich, aus 4 Inseln, von denen jedoch die beiden inneren gegen die äusseren nach vorn verschoben sind, so dass sie zum Theil der äusseren Hälfte des vorhergehenden Joches näher liegen als der, zu welcher sie gehören; besonders auffallend tritt dies am linken Zahn hervor, wo auch die Verschmelzung zweier nicht zusammengehöriger Hälften zuerst auftritt, dann erst die der zu einem Joche gehörigen. Am rechten ist der Vorgang normal. Das Email und seine Wellung, die Joche dieser Zähne tragen alle die charakteristischen Eigenthümlichkeiten des El. meridionalis, an deren Zugehörigkeit zu dieser Species daher nicht leicht gezweifelt werden kann. Sie bilden offenbar nur einen höchst sonderbaren, aberranten Typus dieser letzteren. 1)

Das kleinere Paar besitzt vor dem hinteren Talon fünf ganze und zwei blos angedeutete Joche, indem hier vorn das Schmelz schon fast ganz abgekaut ist (Tafel XI, Fig. 3). Alle Joche und der Talon bilden bereits einheitliche Marken, der Zahn ist überhaupt hinten nur wenig über 2 cm hoch. Am linken beginnt nur das letzte Joch mit dem Talon zu verschmelzen, die vorderen sind noch selbstständig; am rechten ist nur mehr noch das vorletzte Joch selbstständig. Dabei sind, an letztgenanntem Zahn besonders auffällig, die äusseren Hälften der Marken nach einer scharf S-förmigen Knickung nach hinten gedrängt und den Thälern zwischen den inneren Hälften entsprechend gestellt. Die Marken sind stark nach vorn convex gekrümmt, ähnlich wie es auch beim vorhergehenden, allerdings leichter, und bei fast allen oberen Molaren der Fall ist; sie sind ferner etwas gestreckter als sonst, was aber wohl nur auf Rechnung des hohen Alters derselben zu setzen ist, wo die Joche immer etwas dünner werden und enger an einander stehen. Die beiden Zähne wurden in der Nähe von Chiusi, Provinz Siena, gefunden.

Ein schön erhaltenes Exemplar eines M_2 , aus dem oberen Arnothal, zählt x 10 x Joche, von denen x 6 angekaut sind. Sämmtliche, ausser dem Talon, sind noch in Inseln aufgelöst; und zwar die ersten drei in je drei, das 4. in sechs, das 5. in sieben, das 6. in acht. Die Joche sind breit und massig, das Schmelz sehr dick, grob gefaltet, von den drei queren Hauptabschnitten stets der mittlere der kleinste. Es ist der von Falconer, Pal. Mem. II. Bd., S. 112, beschriebene "detached penultimad upper molar, having the first five ridges worn".

¹⁾ Ich habe die beiden Zähne als zusammengehörig angeführt, weil sie in der Abkauung, der sonderbaren Gestaltung der Joche bis in's Detail, dem Erhaltungszustande, ihrer Farbe und Form nach so vollständig zu einander passen, wie es vollständiger nicht mehr gedacht werden kann. Doch ist der linke nach seiner Etiquette aus der alten Museumssammlung, wahrscheinlich noch aus Nesti's Zeiten herrührend, der rechte jedoch nach seiner Bezeichnung erst im Jahre 1877 erworben worden. Ersterer trägt als Fundort, wie fast alle die älteren Exemplare, blos die Bezeichnung "Valdarno superiore", letzterer "Il Tasso, Valdarno superiore".

Ein anderer M_2 , von womöglich noch massigeren Formen, ist ein auch von Falconer¹) schon beschriebener Zahn aus dem oberen Arnothal mit schwarzem Email. Die Joche sind sehr dick, durchgehends sehr breit und in der Zahl x g x vorhanden. x g sind davon angekaut, am ersten jedoch blos das äussere Drittheil, am 2. aber schon alle drei getrennt. Die Joche nehmen bis zum vorletzten an Breite sehr langsam zu, das letzte ist etwas schmäler, der hintere Talon von normaler Grösse. Die Höhe ist ziemlich bedeutend, indem sie ungefähr 2/3 der Länge beträgt.

Ein weiterer M_2 stammt von Chiusi, Provinz Siena, und zählt x 10 x Joche, von denen x 3 angekaut sind; vom 4. Joch sind drei der mittleren Spitzen ganz wenig angegriffen. Alle Joche sind noch in Inseln aufgelöst, das Email ist dick, Faltung nur angedeutet. Sehr gering ist die Höhe des Zahnes. Das Email ist licht gefärbt, das Cement rostfärbig, so dass es also nicht der von Falconer, l. c., angeführte M_2 mit schwarzem Email und grauem Cement sein kann, den ich hier in der Sammlung nicht finde.

Die Hinterseite dieses Zahnes ist zum Theil noch von Knochenmasse bedeckt, die eine von der Pression des nachdrängenden M_3 herrührende, flache Grube aufweist.

Von Le Fratte endlich, im oberen Arnothal, stammt ein Paar oberer M_2 , die x 10 x Joche besitzen, davon x 4 angekaut. Alle sind noch in Inseln aufgelöst; die Kaufläche ist scharfkantig von den Flanken getrennt.

Von englischen Lagerstätten thut Leith Adams zweier oberer M_2 Erwähnung. Einer, "from the East coast deposits"²), enthält "eight and a half plates with the posterior talon" bei 204 cm Länge und 91 mm Breite und wird als "very typical" für El. meridionalis bezeichnet. Der zweite, welcher "may be fairly correlated with the preceding"³) hat dieselben Dimensionen, aber 11 x Joche. Er stammt aus dem Forest Bed.

Lortet und Chantre bringen in ihren "Études paléontologiques dans le Bassin du Rhône") mehrere Abbildungen Jourdan's des oberen M_2 aus dem Rhônebecken, die soweit die nicht sehr guten Zeichnungen erkennen lassen, sehr wohl hieher gerechnet werden können. Sie besitzen wenigstens das dicke Email, die abstehenden Joche, die niederen Kronen, die *El. meridionalis* charakterisiren. Tafel XX, Fig. 2, aus einem Eisenbahneinschnitt bei Chagny (Saône-et-Loire), ist zwar sehr reich gewellt, doch ist dies bei stark niedergekauten Zähnen sehr oft der Fall. Seine

¹⁾ Falconer, l. c. S. 112.

²⁾ l. c. S. 193.

^{3) 1.} c. S. 194,

⁴⁾ Lortet et Chantre, Ét. pal. Bass. Rhône. Période Quaternaire. Arch. Mus. d'Hist. Natur. de Lyon. Tome Ier 3. Livr. 1874 Pl. XX, Fig. 2—3; Pl. XXI, Fig. 1—2; 4. Livr. S. 108.

Breite erscheint allerdings für einen M_2 zu gross. Ibid., Fig. 3, aus der Nähe von Marseille, muss wohl schon des überaus starken Schmelzbleches wegen hieher gezählt werden. Tafel XXI, Fig. 1, von Malbattu, dürfte, sowie Fig. 3, gefunden beim Canal von Pouilly zwischen Semur und Beaune (Côte-d'Or), dem Unterkiefer angehört haben. Das schöne Exemplar, ibid., Fig. 2, von Roumoules zwischen Moustier und Puymoisson (Hautes-Alpes), hat, da es in halber natürlicher Grösse abgebildet ist, 206 mm Länge und ungefähr 84 mm Breite, bei einer Höhe des noch unangekauten 6. Joches von circa 108 mm. Diese Dimensionen, sowie auch die Jochformel $x \circ x$ entsprechen vollkommen einem M_2 von El. meridionalis. Auch das Schmelz und die Joche, soweit erkennbar, entsprechen einer solchen Diagnose.

Der indische *El. planifrons* hat im Allgemeinen dieselbe Jochformel wie *El. meridionalis*, und auch das Verhältniss der Länge zur Breite ist so ziemlich genau dasselbe. So z. B. bei Fig. 5a Tafel XII, der F. A. S. Länge = 195 mm, Breite = 78 mm, gibt einen Quotienten von 2.5; dasselbe geben auch die eben beschriebenen zwei vollständigen oberen M_2 von *El. meridionalis*, wie derselbe Quotient auch früher schon bei M_1 Geltung hatte. Dennoch scheint jedoch in der Gestaltung des Schmelzes ein ziemlich deutlicher Unterschied zu bestehen, der aber natürlich nach verkleinerten Abbildungen schwer zu beurtheilen ist. *El. Hysudricus* hat eine viel höhere Jochformel, x 10 x-x12 x, mit reich gefälteltem Email, schmalen, gedrängteren Jochen, deren "Fingerung" auch kürzer zu sein scheint. Eine noch höhere Jochzahl, x12 x-x13 x, und sehr bedeutend verschiedene Grössenverhältnisse hat der M_2 des *El. antiquus*, dem sich *El. Namadicus* beinahe vollkommen anschliesst.

2a. Unterer M_2 : Das von Falconer beschriebene Exemplar eines vollständigen, linken unteren M_2 mit erhaltenen Wurzeln¹) stammt aus der Nähe von Figline im oberen Arnothal (Taf. X, Fig. 4 und 4a). Es besitzt eine Jochformel von $x \circ x$. Die Joche sind, wie dies für untere Molaren als bezeichnend schon öfter erwähnt wurde, leicht nach vorn concav gekrümmt und zeigen nach Falconer "a tendency to an annular expansion or loop". Es sind das jene bereits früher angeführten mittleren Dritttheile des Joches, die eine etwas grössere sagittale und in der Regel geringere transversale Breite besitzen und in früheren Abkauungsstadien in zwei mehr oder weniger kreisförmige Inseln getheilt sind. Diese mediane Partie ist dann auch noch länger, an der bereits einheitlichen Marke, an ihrer grösseren Breite und beiderseitigen, je nach der Abkauung mehr oder weniger intensiven Einschnürung kenntlich. Die Usurfläche des Zahnes ist in sagittaler Richtung leicht concav. Es ist dies auch wieder charakteristisch für untere Zähne, während obere eine verschieden starke convexe Krümmung in derselben Richtung bekunden.

Die ersten beiden Joche werden von einem selbstständigen Wurzelast getragen, die hinteren ruhen auf einem mehr oder minder innig verwachsenen Complex von kleineren und grösseren Aesten. Die Usur hat auch schon den Talon ergriffen.

Der Quotient aus dem Verhältniss der Länge zur Breite ist daher wieder ungefähr 2'5.

Fast genau dieselben Verhältnisse wie dieser bietet ein weiterer M_2 in situ in einer rechten Kieferhälfte. Da auch der Erhaltungszustand derselbe ist, so ist es nicht ausgeschlossen, dass beide demselben Individuum angehört hatten. Jochformel ist $x \circ x$.

¹⁾ Pal. Mem., II, S. 116-117.

Der Kiefer stammt, wie auch ersterer Zahn, aus der alten Museumssammlung und hat ausser "Valdarno superiore" keine weitere Provenienzbezeichnung.

Eine neuere Erwerbung des Museums (1879) ist ein aus Le Ville, Valderno superiore, stammender fast vollständiger Unterkiefer, dem nur die grössere Partie der aufsteigenden Aeste und ein kleiner Theil des Schnabels fehlt. Er besitzt beide M_2 in situ und vorn Spuren der Alveolen für M_1 . Die Zahl der Joche ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Sie beträgt entweder $x \circ x$ oder x 10 x. Die Breite des Zahnes ist etwas weniges grösser als gewöhnlich. Schmelz und Joche zeigen die schon oft angeführten Charakteristika. Joch 1—3 bildet bereits je einheitliche Marken. Bei Joch 4 sind erst die beiden inneren Dritttheile verschmolzen, die sich in der Regel zuerst verbinden, bei Joch 5 ist der mediane Theil selbstständig und in der Mitte stark eingeschnürt. Am 6. Joch ist er hierauf bereits in zwei Theile getrennt, deren jeder wieder, nur in kleinerem Massstabe, dieselbe Gestalt besitzt, die an Joch 7 endlich auch zur Trennung dieser Theile führt, so dass von diesem an nach hinten (Joch 8 und 9, die nur noch sichtbar sind) das mediane Dritttheil aus vier selbstständigen Ringen besteht.

Ein weiteres sehr schönes, doch isolirtes Exemplar eines linken unteren M_2 stammt von Malpasso, Provinz Arezzo, aus lacustrem Pliocän. Es enthält $x \circ x$ Joche, wobei jedoch der hintere Talon ebenso gross ist wie ein Joch. $x \circ J$ Joche sind angekaut, sämmtliche noch in Inseln aufgelöst, doch sind am ersten die beiden inneren Drittel schon verschmolzen. Die Fingerung geht demnach sehr tief. Joche und Email zeigen die gewöhnlichen, für *El. meridionalis* charakteristischen Eigenschaften.

Ausserdem ist dieser Zahn noch an mehreren Kiefern in sehr stark abgekautem Zustande vorhanden. Mehrere derselben werden jedoch erst später besprochen werden. An einem der hieher gehörigen Kiefer besitzt er eine Breite von 78 mm, wobei nebst dem hinteren Talon noch 4 Joche vorhanden sind, an einem kolossalen Kiefer genau desselben Alters jedoch eine solche von 94 mm. Da diese Zähne also ziemlich bedeutenden Grössenschwankungen ausgesetzt sind, was dann noch mehr an M_3 hervortritt, und da diese beiden Molaren in ihrer Jochzahl hart aneinander grenzen, ja sich zum Theil decken, so ist es, wenn die Hinterpartie nicht vollständig erhalten ist, an einem solchen Fragment oft unmöglich, mit Sicherheit anzugeben, ob man einen M_2 oder einen M_3 vor sich habe.

Dies gilt hier von zwei solchen Fragmenten, die aber doch deswegen interessant und eventuell wichtig sind, weil sie beide vom Monte Carlo im oberen Arnothal stammen. Doch ist für diesen Zweck die Stellung des Zahnes im Gebiss vollkommen nebensächlich, wenn er nur einem *El. meridionalis* angehört, woran natürlich nicht gezweifelt werden kann.

Ein typisches Exemplar von El. meridionalis ist der von Leith Adams) abgebildete, von der Norfolkküste stammende untere M_2 mit $x \circ x$ sehr dicken Jochen. Nur scheint die Grösse aller dieser englischen Exemplare eine bedeutendere zu sein, da sie z. B. bei einem Exemplar mit x 10 x Jochen bis zu $8^{1}/_{2}$ in., d. i. 221 mm, ansteigt. Unter 208 mm geht keiner herunter. Falconer bildet in seiner F. A. S. 2) zwei — darunter einen fraglich als M_2 bestimmten — unteren M_2 aus England, doch unsicherer Provenienz ab, wie auch in Fig. 10 und 10a einen wahrscheinlich gleichen Zahn aus dem Valdarno. Nach Leith Adams muss auch das Fig. 12 und 12a abgebildete hintere Fragment eines angeblichen M_3 , nach der vorhandenen Pressionsaushöhlung, bewirkt durch einen nachdrängenden Zahn, hieher gestellt werden.

Ein von Falconer⁴) zur Darstellung gebrachter unterer M_2 (als solcher allerdings mit einem Fragezeichen) besitzt ungefähr dieselbe Jochzahl wie der M_3 von *El. meridionalis*, ein anderer noch vollständig intacter von *El. planifrons*⁵) "nine rigdes and a small heel, or eight and a double heel⁴⁶).

3. Oberer M_3 : Das Cranium Λ enthält ein sehr altes Paar dieser Zähne, die nebst einer vorderen schmelzlosen Fläche nur mehr noch 7x Joche enthalten. Grösste Breite: 11 cm.

Auf ein gleichfalls sehr altes Individuum weisen die beiden Backenzähne des Craniums D (Falconer's No. 7; Pal. Mem. II, S. 122) hin, indem sie auch nur gx Joche besitzen. Diese Zähne zeichnen sich auch durch ihre relativ geringe Breite aus; auch der Schädel ist von geringerer Grösse und schwächlicher gebaut, so dass er vielleicht einem weiblichen Thiere angehört haben konnte. Die Breite beträgt etwas über g cm.

Einen M_3 , dem zur Vollständigkeit wahrscheinlich nicht mehr viel fehlt, zeigt das Cranium C. Er besitzt 12 x Joche, von denen das vorderste jedoch nur zur Hälfte erhalten ist, davor noch eine kleine schmelzlose Fläche. Auch ist der vordere Wurzelast zum grossen Theil noch erhalten. Der hintere Talon allein ist noch nicht angekaut, die letzten 4 Joche besitzen noch keine einheitlichen Marken. Die Joche weisen nicht ganz die typische Form des *El. meridionalis* auf; sie sind transversal sehr gestreckt, die Abschnürung der drei Abschnitte ist nicht so deutlich zu sehen, das Schmelz ist ziemlich stark und mehr regelmässig gefältelt. Es ist das eine Form der Molaren, wie sie bei weiter vorgeschrittener Usur oft zu Tage tritt.

Erst an x 3 Jochen angekaute M_3 enthält das Schädelfragment F. Selbst der Talon ist noch in mehrere Inseln aufgelöst. Diese sind von rundlicher Form und von ungemein dickem, glattem Schmelzblech gebildet. Die Joche sind ebenfalls sehr massig, ihre Dicke schwankt zwischen 22-25 mm; der Zahn ist überhaupt von ausserordentlich grossen Dimensionen. Seine hintere Partie ist grossentheils von Knochenmasse verdeckt, so dass seine wahre Länge nicht sicher bestimmbar ist. Zählbar sind x 14 Joche; ob nun das letzte derselben schon der Talon ist, oder ob dieser noch nachfolgt, ist, wie erwähnt, nicht klar ersichtlich.

^{1) 1.} c. Tafel XXIII, Fig. 1 und 1a, S. 194.

²⁾ Leith Adams, l. c. S. 194.

³⁾ l. c. Tafel XIV, B, Fig. 7, 7a und 11, 11a.

⁴⁾ F. A. S. Tafel VII, Fig. 11 und 11a.

⁵) F. A. S. Tafel XI, Fig. 6.

⁶) Pal, Mem, I, S. 431.

Die beiden stark abgenützten M_3 des Schädelfragmentes G (Tafel IX, Fig. 3) zeigen das El. meridionalis charakterisirende überaus dicke Schmelz mit den groben, wenn schon auch nicht ganz typischen Fältelungen, die sagittal breiten, von einander sehr abstehenden Joche, daneben jedoch eine schon früher an anderen Zähnen bemerkte Eigenthümlichkeit: Bei einem Theil der Joche alterniren die inneren und äusseren Hälften. Das vorderste der neun Joche ist mit einem nur ganz fragmentär noch vorhandenen zehnten fast ganz verschmolzen. Das zweite ist etwas innerhalb der Mitte durch eine (über 1 cm) breite Brücke mit dem nächstfolgenden (3.) verbunden, das jedoch nicht bis an den Innenrand des Zahnes reicht, sondern gleich nach jener Verbindungsstelle aufhört. Gegen innen ist ein freier, mit Cement gefüllter Raum, aus dem nur ganz am Innenrande zwei kleine, stiftförmige Schmelzsäulchen emporragen. Aehnliche Gebilde schliessen am rechten Zahn auch die Thäler zwischen dem ersten und zweiten, sowie dritten und vierten Joche. Am linken entsprechen sie nur dem anscheinend verkürzten Joche. Auf dieses folgt dann ein weiteres, das deutlich aus zwei verschmolzenen Stücken besteht, von denen das innere um seine ganze Breite nach vorn verschoben ist. Es scheint aber nicht die fehlende innere Hälfte des vorhergehenden Joches zu sein, da diese beiden Theile sich auf ein gutes Stück (ungefähr 2 cm) decken. Dasselbe Verhalten zeigt auch der linke Zahn. Man wird sich umsomehr für das Fehlen der Innenpartie des dritten Joches und die Vorschiebung derer des vierten Joches aussprechen können, als sich bezüglich des letzteren schon früher an zwei Zahnpaaren ein ähnlicher Befund ergab. Das fünfte Joch zeigt auf beiden Seiten dieselben Verhältnisse; die beiden Hälften sind noch vollkommen getrennt. Das sechste Joch ist am rechten Zahn normal mit seinen drei Theilen entwickelt; am linken ist davon dagegen nur das den früheren vorgeschobenen Theilen entsprechende Stück vorhanden. Das siebente Joch ist beiderseits normal, das Mittelstück hat sich soeben aus zwei ungefähr kreisförmigen Inseln zusammengesetzt. An den nachfolgenden sind sämmtliche vier Inseln noch getrennt. Das Zerreissen der Marken scheint stets zwischen den beiden das mittlere Dritttheil bildenden Schmelzinseln stattzufinden - eine Reminiscenz vielleicht an die bei Mastodon herrschenden Verhältnisse, die übrigens auch anderseitig öfters zu Tage tritt.

An dieser Stelle möge gleich auch noch eines Fragments eines isolirten oberen M_3 gedacht werden, das die gleiche Alternation der Jochhälften zeigt. Das Schmelz ist jedoch dünner, die Marken bereits viel gestreckter. Auch hier sind es wieder die inneren Hälften, die fast um ihre ganze Breite vorgeschoben sind, und zwar offenbar wieder zwischen den beiden medianen Schmelzinseln. Auch dieses constante Vorschieben der inneren Hälften findet sich in auffallender Weise bei Mast. Arvernensis genau so wieder.

Breite 105 mm.

Ein Zahn von ähnlichen Dimensionen wie jene des Schädelfragmentes F ist ein isolirter M_3 aus dem oberen Arnothal. Er zeigt x 13 x Joche, von denen x 3 angekaut sind. Am ersten Joch sind die drei Abschnitte noch getrennt, deren mittlerer noch weiter in die zwei Inseln aufgelöst ist. Zwischen diesem und dem nächstfolgenden Joche befinden sich an der Aussenseite zwei, in der Mitte ein isolirtes, fingerförmiges Schmelzsäulchen, das zweite Joch selbst ist in 6 Inseln aufgelöst. Das Schmelz ist sehr dick, wulstig, eine Fältelung kaum angedeutet, dagegen eine grobe Verzerrung des Schmelzbleches vorhanden. Die Joche selbst sind massig, sehr breit (transversal und sagittal) und von einander abstehend. Die Dicke derselben variirt zwischen 20—25 mm.

Länge des Zahnes							310	mm
Breite am 1. Joche						•*	100	77
Grösste Breite				•			110	,,
Höhe des 5. Joches							140	12

Etwas geringere Grösse hat ein anderer oberer M_3 mit x 12 x Jochen und einem kleinen fingerförmigen Anhang. x 3 Joche sind angekaut; der Talon hat jedoch die Grösse eines gewöhnlichen Joches. Er, sowie das erste Joch besitzen einheitliche Marken, das zweite ist in 5 Inseln aufgelöst. Der Cementbelag ist sehr schwach, so dass die Schmelzbüchsen alle zu Tage liegen. Sie nehmen vom 3. Joch, das soeben erst ganz wenig von der Usur ergriffen wurde, nach hinten stetig ab, an Höhe sowohl wie zum Theil auch an Breite. Gegen oben endigen sie alle in vier fingerförmige Endspitzen, die an der Oberfläche der Krone vier regelmässige, gerade Reihen bilden. Das Email ist dick, schwach gewellt, der Talon und die ersten zwei angekauten Joche zeigen schon die für El. meridionalis so charakteristische, unregelmässig-grobe und plumpe Verzerrung des Schmelzbleches.

Von ungefähr derselben Länge ist ein M_3 mit x 13 x Jochen, davon x 7 angekaut. Die ersten beiden bilden je einheitliche Marken, am dritten sind die beiden äusseren Abschnitte verschmolzen, das vierte hat drei Inseln, die weiteren Joche zahlreiche. Das mittlere Dritttheil bleibt von den übrigen an der einheitlichen Marke lange mehr oder weniger abgeschnürt. Es ist transversal kleiner oder höchstens ebenso gross als die seitlichen, sagittal jedoch dicker, und bildet so eine breite Ausbauchung des Schmelzbleches, die oft auch von grossen, groben Falten unregelmässig verzerrt ist. Es ist diese Ausbildung äusserst charakteristisch für El. meridionalis, besonders El. antiquus gegenüber mit seiner zipfelförmigen medianen Expansion. Das Email selbst ist ungleichmässig kleingewellt, welche Wellung von der Mitte gegen die Seiten hin an Intensität immer mehr abnimmt.

Die Kaufläche des Zahnes ist gegen seine Flanken durch eine scharfe Kante begrenzt.

Wegen seiner Kürze und überhaupt eigenthümlichen Form bemerkenswerth ist ein M_3 aus dem oberen Arnothal mit einer auffallend geringen Jochzahl, x 10 x, wobei noch der hintere Talon sehr klein ist. An seiner Stellung im Gebiss kann jedoch kein Zweifel sein. Er ist transversal verhältnissmässig dick und mit reichlichem Cementbelag. x 4 Joche sind angekaut, vom fünften ist ein Inselchen sichtbar. Nur das erste hat eine einheitliche Marke, die zugleich auch schon mit dem Talon verschmolzen ist. Die Joche selbst sind weit von einander abstehend, das Schmelz und die Marken normal. Erstere nehmen nach hinten an (transversaler) Breite rasch ab, doch hindert der gleichmässige Cementbelag eine genauere Verfolgung ihrer Eigenschaften. Die Zahl

derselben ist jedoch sicher nicht grösser als x 10 x. Die Dicke der Joche ist vorn reichlich 25 mm. Die Kaufläche ist von den Flanken gleichfalls scharf geschieden.

Der Zahn wurde erst vor kurzer Zeit bei Castello dell' Incisa im oberen Arnothal gefunden.

Ein Paar Zähne von etwas ähnlicher Form enthalten wahrscheinlich gleichfalls nur x 11 x Joche; doch lässt sich die Zahl derselben bei diesen nicht genau feststellen. Die Länge beträgt ungefähr 240 mm, die grösste Breite 90 mm.

Ein anderes Paar von oberen M_3 von bedeutenderer Grösse besitzt je x 13 x Joche, von denen x 11 angekaut sind. Am ersten ist schon fast alles Schmelz verschwunden, die nächsten fünf sind einheitlich, am 7. ist das innere Dritttheil, am 8. sind alle drei noch isolirt; die weiteren sind in zahlreiche Inseln aufgelöst. Das mittlere Dritttheil ist wieder in bezeichnender Weise transversal sehr schmal, sagittal hingegen breiter und beiderseits lange abgeschnürt. Selbst das zweite, fast vollständig niedergekaute Joch zeigt noch eine deutliche Einbuchtung. Das Schmelz ist wieder dick, grob-wulstig und ungleichmässig gewellt.

Von diesen mehr oder weniger typisch ausgebildeten Exemplaren sind noch eine ziemlich bedeutende Anzahl, meist jedoch in vielfach verletztem Zustande vorhanden. Ihre Charaktere, die bezeichnenden für El. meridionalis, sollen daher summarisch zusammengefasst werden. Sie haben alle bis auf gewisse Variationen ungemein dicke, wulstige, grobe und unregelmässig gewellte Schmelzbänder, die Marken sind breit, oft mehr oder weniger verzerrt; ihr Vorder- und Hinterrand ausserdem noch mehrfach aus- und eingebogen. Stets ist die Mittelpartie der Marke durch Einschnürungen abgetrennt, die sich meist bis zum Grunde des Joches erhalten. Jene mittlere Erweiterung, nicht zipfelförmig wie bei El. antiquus, sondern in breiterer Ausdehnung, ist daher fast immer deutlich zu sehen. Die Jochzahl schwankt zwischen x 10 x—x 13 x. Die Joche sind tief gefingert, indem die letzten 4—6 der angekauten Joche, in einem Falle sogar 10, noch stets mehr oder weniger in Inseln aufgelöst sind. Von diesen vereinigen sich in der Regel zuerst die mittleren (meist zwei, doch auch vier) zu einem Complex, der durch jene Abschnürung auch später noch lange kenntlich ist, dann dieser mit dem äusseren Dritttheil und zum Schluss erst diese beiden mit dem inneren.

In dieser Weise sind bei den meisten Exemplaren die Zähne bis in das höchste Alter, bis zur völligen Abkauung ausgebildet. In diesen letzten Stadien tritt jedoch oft eine etwas andere Gestaltung insbesondere der Marken und des Schmelzbleches hervor, die von dem geschilderten Typus nicht unerheblich abweicht. Dass diese Besonderheiten jedoch nicht wesentlicher Natur sind, erhellt daraus, dass sie durch Uebergänge vollständig verbunden sind. In ihren Extremen jedoch zeigen sie allerdings sehr in die Augen springende Unterschiede.

Als ein solches Verbindungsglied kann z. B. das oben zuletzt beschriebene Zahnpaar, besonders aber der rechte Zahn desselben, gelten.

Die Schmelzbänder sind hier schwächer, meist reicher und regelmässiger kleingewellt, die Marken viel schmäler und gedrängter, ihr Vorder- und Hinterrand nahezu parallel und ohne jene groben, unregelmässigen, primären Falten; sie entstehen zwar gleichfalls durch die Verschmelzung jener drei Abschnitte, die Abschnürung des mittleren kann jedoch spurlos verschwinden, so dass dadurch dann eine völlig einheitlich gebaute, mit nahezu parallelen Rändern versehene, enge und gestreckte Marke entsteht. Auch scheint bei diesen Zähnen die Fingerung am Joche nicht so tief herabzugehen; sie zeigen wenigstens stets weniger in Inseln aufgelöste Marken.

Schon die beiden Molaren des Craniums C zeigen ziemlich deutlich diesen Typus, ganz excessiv ist dies jedoch am Schädelfragment E (Taf. IX, Fig. 4) der Fall, wo die oben gegebene Charakteristik in extenso Geltung findet. Hier weisen die Molaren ausserordentlich stark ausgeprägt auch noch eine andere Eigenthümlichkeit auf, die mehr oder weniger deutlich bei allen oberen Backenzähnen zu finden ist, dass nämlich die Joche eine starke halbmondförmige Krümmung besitzen, deren convexe Seite nach vorn gewendet ist, während sie an den unteren Molaren nach hinten zu liegt. Nie habe ich je auch letztere so intensiv ausgebogen bemerkt als erstere.

Der rechte Zahn des in Rede stehenden Schädelfragmentes besitzt 11 x Joche, davor noch die Hinterwand des vorhergehenden Joches und eine etwa 5 cm breite, schmelzlose Fläche.

Ein isolirtes Exemplar eines linken M_3 zeigt ebenfalls sehr deutlich diesen Typus; nur sind hier die Marken fast gerade, die Ecken blos ein wenig nach rückwärts abgekrümmt. Das Email liegt fast parallel, die Wellung ist in der Mitte am stärksten und verliert sich gegen die Ränder. Die Joche der vorderen Hälfte liegen dicht gedrängt, in der hinteren weichen sie allmälig auseinander, so dass die letzten ungefähr 25 mm von einander abstehen. Der Talon ist soeben erst in die Usur eingetreten, trotzdem jedoch blos er und das letzte Joch in Inseln aufgelöst. Das vorletzte Joch ist schon einheitlich, und nur an ihm und dem unmittelbar vorhergehenden ist jene doppelte Einschnürung zu bemerken. Die Zahl der Joche ist x 13 x.

Aehnliche Verhältnisse finden sich noch an etwa 4-5 anderen oberen M_3 .

Ein sehr bemerkenswerthes Exemplar eines oberen $M(_3?)$, das gleichfalls schon ziemlich stark abgekaut ist, befindet sich in der Sammlung der Universität zu Rom. Es stammt wahrscheinlich aus dem Schwemmlande des Tiberthales und besitzt ?7x Joche; vorn hat die weit vorgeschrittene Usur einige Joche schon ganz verschwinden gemacht. Die Joche erscheinen in der Seitenansicht sehr dick und sehr niedrig. Das Email ist jedoch dünn, stark gefältelt, die Joche sehr schmal. Der Zahn gehört aber offenbar trotzdem einem El. meridionalis, und zwar einem solchen, der mit dem zweitgenannten Extrem viel Aehnlichkeit zeigt, an. Für einen El. antiquus ist derselbe zu breit, viel zu niedrig, die rhomboidale Form der Marken fehlt, die charakteristischen medianen Zipfel des Schmelzbleches fehlen. Die Gesammtlänge des noch vorhandenen Stückes beträgt 17 cm, seine vordere Breite 10.5 cm, die Höhe zwischen Talon und letztem Joch, das aber schon angekaut ist, 12 cm.

Bei Besprechung des ursprünglichen Aufenthaltsortes des Mammuth macht Falconer¹) die Bemerkung; dass er in der Sammlung des Marchese C. Strozzi den Gypsabguss eines Zahnes untersucht habe, dessen Original "from the Val di Mugello, an affluent of the Sieve" stammt und mit dem El. Armeniacus von Khanoos identisch ist. Diese zwei Zähne - es sind ihrer nämlich zwei, jedenfalls zu demselben Individuum gehörige - wurden auf einem Hügel bei Vicchio im Sieve-Thal (die Gegend heisst auch Mugello) gefunden und wurden später (1869) vom Besitzer Cav. P. Vivai durch Prof. Cocchi's Vermittlung dem Florentiner Museum geschenkt. Einer derselben gelangte Taf. X, Fig. 2, zur Abbildung. Sie gehören gewiss keinem El. Armeniacus an. Lydekker gibt für den oberen M_3 dieses Elephanten 24 Joche an, und selbst Falconer's Exemplar hat trotz der weit vorgeschrittenen Usur noch immer 17 x Joche. 2) Das vorliegende Exemplar ist vollständig, zählt deren aber trotzdem nur x 11 x, also nicht einmal die Hälfte. Eine Aehnlichkeit mit der Abbildung Falconer's 3) besteht nur in der eigenthümlichen Isolationsform der Inseln der letzten Joche. Die Trennung dieser Schmelzsäulen geht ausserordentlich tief. Während das erste Joch mit dem Vordertalon bereits verschmilzt, das zweite noch eine einheitliche Marke bildet, ist bereits am dritten das äussere Dritttheil vollständig und tief getrennt, beginnt sich am vierten und fünften auch schon das innere loszulösen und erscheinen die weiteren noch vollständig in Inseln zertheilt, ungefähr so wie an Falconer's citirter Abbildung Joch 10-13. Das Email ist jedoch hier viel dicker, die Marken breiter (sagittal), überhaupt der Zahn, bis auf die genannte Eigenthümlichkeit, mit El. meridionalis übereinstimmend. Der Cementbelag ist ausserordentlich reich, bis 14 mm seitlich noch die Marken überragend, die Kaufläche gegen die Flanken scharf rechtwinkelig begrenzt. Doch findet sich diese Eigenschaft auch an anderen Zähnen.

Die Länge dieses Zahnes ist 30 cm, die Höhe am 11. eben erst angekauten Joch 10.5 cm die Breite am 5. Joche 122 mm, die Breite des Joches selbst 102 mm; die Gesammtzahl der Joche wie erwähnt x 11 x.

Einen ganz ähnlichen Zahn von der Norfolkküste bildet auch Leith Adams ab, 1) nur sind hier weniger Joche in Inseln aufgelöst. Er besitzt bei einer Länge von 27.3 cm und einer Breite von 99 mm x 14 x Joche und denselben überaus reichen Cementbelag.

 $_3$ a) Unterer M_3 : Im Museum zu Florenz befinden sich fünf fast vollständige Unterkiefer denen nur Theile der aufsteigenden Aeste mangeln, die den M_3 entweder allein oder mit einem Theil des M_2 enthalten, ferner mehrere Unterkieferhälften mit diesem Zahn, sowie zahlreiche isolirte Exemplare desselben in mehr oder weniger vollständigem Erhaltungszustande.

Gut entwickelt zeigt den Typus des El. meridionalis ein ganzer Kiefer mit beiden M_3 , dem rechtsseitig der aufsteigende Ast ganz, links zum grössten Theil fehlt. Er hat wahrscheinlich x 12 x Joche; die letzten sind jedoch noch nicht vollständig aus der Alveole hervorgetreten. x 9 Joche sind bereits angekaut, davon x 5 schon einheitliche Marken besitzen, während am sechsten das äussere Dritttheil noch isolirt ist und die folgenden in drei und mehr Inseln aufgelöst erscheinen. Das mittlere Dritttheil bleibt durch Abschnürung lange sichtbar; es ist transversal bedeutend schmäler, sagittal jedoch breiter als die beiden seitlichen. Das Email ist sehr dick, wulstig, Fältelung kaum angedeutet.

¹⁾ Falconer, On the American fossil Elephant of the Regions bordering the Gulf of Mexico (E. Columbi Falc.) with general Observations on the living and extinct Species. Pal. Mem. II, S. 250.

²⁾ Pal. Mem. II, S. 247.

³⁾ l. c. Pl. X, Fig. 3.

⁴⁾ Leith Adams, l. c. Taf. XXIV, Fig. 2; S. 198.

Im Gegensatz zu dem soeben beschriebenen zeigt ein anderes Zahnpaar in einem gleichfalls fast vollständigen Kiefer eine sehr starke, doch unregelmässige Fältelung des Schmelzbleches. Auch sind hier an den kaum einheitlich gewordenen Marken die inneren Dritttheile fast nicht mehr zu unterscheiden. An den noch in Inseln aufgelösten sind sie jedoch erheblich schmäler als die seitlichen, wie es für *El. meridionalis* charakteristisch ist. Diese Zähne zeichnen sich auch noch dadurch aus, dass sie eine sagittal sehr stark concave Kaufläche besitzen. In grösserem oder geringerem Grade ist das für alle unteren Molaren der Fall. Die Jochzahl beträgt am linken Zahne 12 x Joche; vorn ist er unvollständig. Die ersten acht Joche sind einheitlich.

Der zum Schädelfragment E mit den eigenthümlich gebildeten Molaren gehörige Unterkiefer zeigt in seinen Zähnen keinesfalls dieselben Eigenschaften wie der Oberkiefer. Sie sind hier normal ausgebildet mit breiten, abstehenden Marken, an denen das mittlere Drittel bis zur völligen Abkauung des Joches sichtbar bleibt. Vorhanden sind 7x Joche, die Hinterwand eines vorderen und eine etwa 5 cm lange schmelzlose Fläche. Nur das letzte Joch und der Talon sind in Inseln aufgelöst.

Dieser Kiefer wurde mit dem Schädelfragment bei Peccioli im Elsathale, Provinz Pisa, gefunden.

In typischer Ausbildung zeigt diesen Zahn ein Fragment eines linken horizontalen Unterkieferastes, der, wie auch die beiden zuerst genannten, aus dem oberen Arnothal stammt (Taf. XI, Fig. 5). Er enthält x 12 x Joche, davon x 9 angekaut; vom 10. sind erst zwei ganz kleine Inselchen sichtbar. x 5 Joche bilden einheitliche Marken; nur an den hinteren derselben ist das mittlere Dritttheil deutlich zu sehen. Das 6. Joch ist in 3, die übrigen in mehrere Inseln zertheilt. Der mittlere Abschnitt zeigt die bekannten Eigenschaften. Das Schmelz ist dick, unregelmässig und grob gefaltet, die Joche sind massig und verhältnissmässig sehr niedrig.

Unter den isolirten Zähnen befindet sich ein vollständiges Exemplar mit x 11 x Jochen, von denen x 5 im Gebrauch standen. Nur das erste besitzt eine einheitliche Marke. Das Schmelz ist dick, unregelmässig verzerrt, die feine Wellung fehlt. Doch ist letzteres wohl nur dem geringen Abkauungsgrade des Zahnes zuzuschreiben, da sich diese immer erst später an der Marke einstellt. Die Joche sind ungemein massig: so nehmen das 6. bis 10. Joch einen Raum von 140 mm an ihrer breitesten Stelle ein; davon misst das letztgezählte (10.) allein 31, das vorletzte (9.) 30 mm.

Ein anderer M_3 mit gleichfalls x 11 x Jochen hat eine Länge von 290, eine grösste Breite (6. Joch) von 95 und eine Höhe (7. Joch) von mindestens 120 mm.

An einem M_3 der linken Seite ist auch ein grosser Theil der Wurzel erhalten. Sie besteht vorn aus mehreren neben- und hintereinander stehenden Aesten, die sich in den hinteren zwei Dritteln des Zahnes zu einem einheitlichen, kammähnlichen Complex vereinigen, der bedeutend schmäler ist als die Basis der Krone (55 mm: 95 mm). Der Zahn hatte wahrscheinlich $x_{12}x_{12}$ Joche; doch ist er vorn schon vollständig niedergekaut. Marken und Email sind in normaler Entwicklung.

Taf. XI, Fig. 4, stellt ein Fragment eines rechten unteren M_3 aus dem oberen Arnothal vor, dessen Joche durch Auswitterung des Cementes fast ganz blossgelegt sind. Es zeichnet sich durch sein ausserordentlich dickes, wulstig gewelltes und grob verzerrtes Schmelz aus.

Endlich muss hier noch eines Zahnes Erwähnung geschehen, der schon von Falconer¹) beschrieben worden war. Während bei den vorher erwähnten M_3 wahrscheinlich keiner die Jochzahl von x 12 x überschritt, x 11 x und x 12 x die Regel bildete, soll dieser Zahn 15 Joche sammt einem complicirten Talon besitzen, doch ist derselbe so sonderbar entwickelt, dass Falconer selbst sagt: "From the abnormal characters of this molar, it cannot be safely taken for a guide as to the rigde formula."

Die äusseren Dritttheile dieses abnormalen Zahnes (Taf. X, Fig. 1 und 1 a) sind, wie schon Falconer erwähnt, von den mittleren durch eine sehr tiefe und zum Theil auch sehr breite Spalte isolirt, so dass selbst am ersten Joch, obzwar es schon fast ganz niedergekaut ist, dieser äussere Theil eben erst im Begriff steht, sich mit dem übrigen Joche zu vereinen. Die inneren Dritttheile sind erst vom 7. Joche an getrennt. Bis zum 11. und etwa noch 12. lassen sich die einzelnen Joche deutlich verfolgen, dann kommt aber ein unregelmässiger Complex von fingerförmigen Schmelzsäulen, bei denen jede weitere Jochzählung aufhört. Man könnte mit derselben Berechtigung 2—4 Joche hier noch annehmen. Uebrigens ist dieser ganze Anhang so unregelmässig gebildet, dass er seine Abnormalität deutlich genug zur Schau trägt.

Jene bei den Oberkiefermolaren bemerkten Eigenthümlichkeiten eines Theiles der älteren Molaren konnten bei denen des Unterkiefers nicht constatirt werden. Die engen, parallelrandigen, klein gefältelten Marken der ersteren setzen keineswegs ähnliche Erscheinungen auch bei den unteren voraus, wie dies am auffälligsten Schädelfragment E und sein zugehöriger Unterkiefer aus Peccioli im Elsathale darthun kann.

Im Allgemeinen ist der Molar des Unterkiefers schmäler als der des Oberkiefers, die Krone ist sagittal mehr oder weniger concav, die Seitenhörner der Marken mehr oder weniger deutlich nach vorne abgekrümmt. Bezüglich der Ausbildung von Schmelz und Markenform gilt dasselbe, was auch schon bei den Oberkieferzähnen bemerkt wurde. Was die Zahl der Joche betrifft, so konnten nirgends mit Sicherheit x 13 x Joche constatirt werden; die stets vorkommenden Zahlen waren x 11 x und x 12 x. Dieselben erscheinen auch an den oberen Molaren wieder, nur dass hier auch ferner oft x 13 x, und andererseits einmal sogar x 10 x Schmelzbüchsen gezählt werden konnten. Die Joche selbst sind bei ersteren oft noch dicker als an letzteren.

Die Länge der letzten Oberkieferzähne schwankt in der Regel zwischen 270—320 mm, geht jedoch einmal (bei dem M_3 mit x 10 x Jochen) auf 245 mm herunter; die Breite zwischen 100—120 mm, selten kommt eine solche unter 100 mm vor; die Höhe endlich zwischen 120—140 mm.

¹⁾ Pal. Mem., II., S. 117-118.

Die Breite beträgt also etwas mehr als ein Drittel, die Höhe ungefähr drei Siebentel der Länge des Zahnes.

Die Länge der letzten Unterkiefermolaren ist ungefähr die gleiche, wie die der Oberkieferzähne, die Breite und Höhe jedoch etwas geringer. Erstere schwankt nämlich meist zwischen 95—105, letztere zwischen 110—130 mm. Die Breite ist ziemlich genau ein Drittel, die Höhe aber ungefähr zwei Fünftel der Länge des Zahnes.

Die Unterschiede den anderen fossilen Elephanten gegenüber wurden schon im Laufe der Beschreibung der einzelnen Zähne des Gebisses eingehend besprochen.

El. antiquus und El. Namadicus, der — nach Leith Adams — in den Zähnen von ersterem so ziemlich gar nicht zu unterscheiden ist, besitzen eine viel höhere Jochformel:

El. antiquus 1):
$$\frac{x 15 x - x 20 x}{x 16 x - x 19 x}$$
;

bei *El. Namadicus* scheint sie unter Umständen vielleicht noch höher zu gehen; wenigstens gibt Leith Adams²) für M_3 an: $\frac{?-22}{?-x19x}$; Lydekker³) hingegen: $\frac{18}{19-20}$.

Weiter sind bei El. antiquus die Zähne viel gestreckter und schmäler, die Joche gedrängter, das Email regelmässiger und intensiver gewellt, die Fingerung geht bedeutend weniger tief, die eigenthümliche mittlere Ausbauchung der Joche und die beiderseitige Abschnürung dieses Theiles fehlen meist gänzlich. Das Schmelzblech verläuft im Allgemeinen — unbeschadet der Wellung — gerade von aussen nach innen, oft eine etwas rhomboidale Marke bildend, was bei El. meridionalis nie vorkommt, und springt hier in der Mitte plötzlich zipfelförmig nach hinten (oder vorn) vor. Die Joche sind ferner ausserordentlich viel höher.

Auch bei *El. Hysudricus* ist die Jochzahl bedeutend grösser; nach Lydekker: $\frac{13-17}{14-18}$; die Zähne sind gestreckter, die Joche höher, das Email reichlicher gewellt.

Allerdings soll nach Falconer⁴) die Abbildung in der "Fauna antiqua Sivalensis"⁵) einen Zahn mit etwas grösserer Länge und Jochzahl (= 18) vorstellen, als sie gewöhnlich vorkommen.

El. planifrons hingegen besitzt an seinem M_3 wieder etwas weniger Joche: $\frac{10-11}{10-13}$; doch gleichen dieselben denen des El. meridionalis sehr. Sie sind ebenso niedrig wie diese, das Schmelz dick, die Fingerung scheint gleichfalls sehr tief zu gehen.⁶)

An Fig. 13, Taf. XII und Taf. VII, Fig. 3 (M_2) der "Fauna antiqua Sivalensis" würde sich z. B. die Form mit reichlicherer Wellung wiederfinden, während andere Abbildungen") auf unsere Formen mit sehr dickem, wulstigem Schmelz und geringer Faltung hindeuten würden.

Als Gesammtformel für die Zähne des *El. meridionalis*, soweit sie hauptsächlich aus dem Material des Museums zu Florenz resultirt, ergäbe sich demnach⁸):

$$\frac{(.3.) + (.5.-.6.) + (.7.)}{(.2.-.3.) + (.5.-.6.) + (.7.-.8.)} + \frac{(.8.-.9.) + (.8.-.10.) + (.10.-.13.)}{(.8.-.9.) + (.9.-.11.) + (.11.-.12.)}$$

¹⁾ Nach Leith Adams, l. c. Seite 47.

²) 1. c.

^{3) 1.} c. S. 104 (285).

⁴⁾ Pal. Mem., I., S. 428.

⁵⁾ F. A. S., Taf. VII, Fig. 12, 12a.

⁶⁾ Vergl. F. A. S., Taf. XI, Fig. 2, und Taf. XII, Fig. 13, 13a.

⁷⁾ Z. B. Tafel XVIIIa, Fig. 1, 1a.

⁸⁾ Der besseren Uebersicht wegen wurden hier statt der x Punkte zur Bezeichnung des vorderen und hinteren Talons eingesetzt.

Nach den vorliegenden Fällen beinahe blos abnorm zu nennen ist die Jochzahl x 13 x für den unteren M_3 .

Falconer gibt für die italienischen Vorkommnisse folgende Jochformel¹):

$$\frac{3+6+8}{3+6+8}$$
 + $\frac{8+(8-9)+13}{8+(8-9)+(13-15)}$

Die letzte Ziffer 15 beruht einzig auf jenem erwähnten, gewiss nicht normal entwickelten letzten unteren Backenzahn, und weiterhin alle Angaben von der Jochzahl 15 für den M_3 bei El. meridionalis.

Nach Lydekker²) ist die Jochformel:

$$\frac{3+(5-6)+8}{3+6+8} + \frac{(8-9)+(8-10)+13}{8+(8-9)+(11-15)}$$

und nach Leith Adams3) für die englischen Vorkommnisse:

Aus letzterer Formel scheint sich, wie früher schon erwähnt, zu ergeben, dass die Jochzahl der englischen Zähne eine durchschnittlich etwas höhere ist. Ob dies blos zufällig sei oder bereits ein weiteres Vorgeschrittensein und geringeres Alter der letzteren andeute, ist natürlich schwer mit Sicherheit zu entscheiden.

3. Elephas lyrodon Weithofer.

1825. El. meridionalis Nesti, Nesti: Lettera sopra alcune ossa etc. Pisa 1825, S. 205.

1857. " " Falconer: British and European fossil Elephants. Pal. Mem. II, S. 122, Nr. 6; S. 123, Nr. 8 und 9.

1889, El. lyrodon Weith., Weith ofer: Tertiäre Landsäugethiere Italiens, Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst., Bd. XXXIX, S. 80.

Bei der Besprechung der fossilen Ueberreste von *El. meridionalis* wurden mehrere von Falconer zu dieser Species gezählte Exemplare weggelassen und auf eine spätere Beschreibung derselben hingewiesen, da sie im Bau des Schädels und der Gestalt der Stosszähne so sehr vom Typus abwichen, dass eine gesonderte Besprechung derselben nothwendig und am Platze schien. Falconer selbst sagt bei Beschreibung des unter Nr. 84) erwähnten Craniums: "And I am unable to say, with confidence, that it belongs to *E. (Loxod.) meridionalis*."

Reste dieser Form, meist Stosszähne oder Kieferstücke, finden sich in den Museen fast ebenso häufig wie jene der typischen Form und figuriren da unter der Bezeichnung *El. meridionalis* Nesti.

Hier in Florenz befindet sich ein völlig ausgewachsener, leider aber nicht besonders gut ers haltener Schädel sammt den beiden Incisiven in situ (Falconer's Nr. 6), ein gleichfalls sehr altes Prämaxillarfragment mit dem rechten Stosszahn vollständig, dem linken zum grössten Theil erhalten

¹⁾ Pal. Mem., II., Seite 118.

²⁾ Lydekker, 1. c, S. 104 (285).

³⁾ l. c., S. 208.

⁴⁾ Falconer: l. s. c.

(Falconer's Nr. 9), ferner ein jüngerer Schädel sammt beiden Stosszähnen und dem Unterkiefer, womit weiter auch die Wirbel, Rippen, Schulterblatt und Becken im Zusammenhang gefunden worden waren (Falconer's Nr. 8), ein Oberkieferfragment mit dem linken Stosszahn und jederseits zwei Backenzähnen in situ, endlich mehrere mehr oder weniger vollständige Unterkiefer oder Unterkieferhälften; einige Stosszähne, sowie offenbar auch einige der isolirten Backenzähne werden hieher gezählt werden können.

Der kürzeren Verständigung halber sei im Folgenden wieder erstgenannter Schädel, Falconer's Nr. 6, als Exemplar a, Falconer's Nr. 9 als Exemplar b, Nr. 8 als Exemplar c, das Oberkieferfragment als Exemplar d angeführt.

Schädel a: Er trägt als Fundortsangabe, wie die meisten Exemplare der alten Collection, blos die Angabe: "Valdarno superiore; Pliocene lacustre", und ist Taf. V, Fig. 2, in seiner Seitenund Fig. 1 in seiner Vorderansicht abgebildet.

Im Profil fällt vor Allem der von El. meridionalis vollständig abweichende Umriss des Schädels auf. Die Frontoparietal-Region ist gegen die Prämaxillaria scharf und sehr stark abgeknickt, so dass der Gehirnschädel sehr niedergedrückt erscheint. Es ist jedoch hier allerdings nicht mit Sicherheit auszusprechen, ob diese Beschäffenheit auf natürliches Verhalten oder erst auf spätere Deformation zurückzuführen ist. Der ganze Schädel ist nämlich hinter den Orbiten quer durchgebrochen und lässt seine ursprüngliche Gestalt nicht mehr präcise feststellen. Allerdings zeigen sich an der Stirngegend Pressionserscheinungen, doch bei weitem nicht in dem Masse, wie man sie annehmen müsste, wenn dieser Schädel von dem normalen Zustand des El. meridionalis derart comprimirt worden wäre. Eine starke Senkung des Scheitels gegen die Alveolen ist hier jedenfalls natürlicher Zustand gewesen. Die demzufolge etwas niederere und nach hinten langgestrecktere Schläfengrube wird nach vorn und innen zu schärfer von dem sie sogar etwas überdachenden Parietale (und zum kleinen Theil auch Frontale) begrenzt; ihre Hinterwand liegt viel flacher.

Während bei *El. meridionalis*, wie aus vorhergehender Beschreibung zu entnehmen ist, die Schädelhinterwand vom Condylus zuerst ungefähr senkrecht aufsteigt, dann sich jedoch ihr Seitenrand nach vorn-innen-oben wendet und so eine nach hinten zu flach abfallende Scheitelebene bildet, die nach vorn zu von dem hohen Scheitelkamme abgegrenzt wird, so fällt hier von letzterem die Schädelhinterwand anscheinend ohne jene Abknickung gegen den Condylus zu ab und besitzt einen gleichmässig leicht nach vorn geneigten, ungefähr halbkreisförmigen Aussenrand. Doch ist die Hinterhauptsregion sehr stark verletzt.

Die Orbita sind klein, aufrecht elliptisch und von den Schläfen durch einen stark vorspringenden Kamm getrennt. Der Vorderrand ist abgebrochen. Das Foramen infraorbitale liegt fast ganz an der Hinterseite der Stosszahnalveolen, während es bei *El. meridionalis* sich an der Seite derselben befindet.

Höchst charakteristisch für unser Fossil und von *El. meridionalis* und *El. antiquus* bedeutend abweichend sind die Prämaxillaria. Sie bilden gegen die Kaufläche der Molaren einen relativ sehr kleinen Winkel (ungefähr 105°), der nur noch von den beiden stärkstbezahnten Repräsentanten dieses Genus, *El. primigenius*¹) und *El. ganesa*,²) sowie merkwürdigerweise theilweise auch von dem schwächstbezahnten, der Mukna-Varietät des *El. Indicus*³) übertroffen wird. In Uebereinstimmung mit den beiden erstgenannten Fällen sind auch hier bei dem vorliegenden Fossil die Zähne im Verhältniss zum

¹⁾ El. primigenius zeigt hier nach der Abbildung bei Leith Adams (l. c. Taf. VI) und in Uebereinstimmung auch nach Falconer (F. A. S. Taf. XLV) nur 100°.

²⁾ Dieser Winkel beträgt hier (nach F. A. S. Taf. XXII) blos 95°.

³⁾ Nach Blainville, Falconer 100-1100.

Schädel von ausserordentlich bedeutender Entwicklung. Die rückwärtige Partie der Alveole wird ferner bei El. meridionalis, primigenius und den meisten übrigen Elephanten in der Profilansicht von den Orbiten ganz verdeckt, oder die letzteren überragen die Alveolen sogar nach vorn, während hier die Stosszahnalveole vor den Augenhöhlen ungefähr zur Hälfte sichtbar ist. Erstere ist in ihrem Verlaufe überhaupt bis in ihren hintersten Theil äusserlich auf's Deutlichste und Schärfste zum Ausdruck gebracht und bildete offenbar an dem Seitenhorn der Nasenöffnung einen sehr bedeutend vorspringenden Höcker. Letzterer ist an seiner Spitze hier derart aufgebrochen, dass der Wurzeltheil des Zahnes sichtbar ist; dieser jedoch bereits überragt mit der umliegenden Alveolarwand etwas die Nasenöffnung. In der Vorderansicht bilden die Prämaxillaria ein langgestrecktes, gegen die Mitte etwas eingeschnürtes Rechteck, dessen längere Kanten von den etwas x-förmig gekrümmten, jedoch auch an der Stelle, wo sie einander am meisten genähert sind, immer noch 11 cm von einander abstehenden Stosszahnalveolen gebildet werden, während längs der Mittellinie ein breiter, tiefer, beiderseits offener Graben sich erstreckt. Bei El. meridionalis ist er, wie früher erwähnt, schmal, schluchtähnlich und gegen die Nasenöffnung zu geschlossen; die Stosszahnalveolen überragen eben nach vorne zu den Vorderrand der letzteren nicht. Die mediane Verbindungswand der beiden Alveolen erscheint oben und in der Mitte als eine die beiden Cylinder hinten tangirende Ebene, während sie gegen abwärts etwas nach vorn zu verlegt ist und dadurch jener Graben hier etwas seichter wird. Die Trennungslinie der beiden Prämaxillaria ist trotz des Alters des in Rede stehenden Schädels sehr deutlich zu sehen und geht nach abwärts sogar in einen ziemlich langen, klaffenden Spalt über.

Da die Molaren im Verhältniss zum Schädel sehr gross sind, so erscheinen auch die Maxillaria voluminöser entwickelt als bei *El. meridionalis*; sie nehmen transversal die halbe Schädelbreite (an den Orbiten) ein. Bei letztgenanntem sind sie bedeutend schmäler.

Der Hinterrand der Molaren ($=M_3$) steht vom Condylus anscheinend sehr weit ab, wie auch die Verbindungslinie beider sehr schief liegt. Doch ist des früher erwähnten Bruches halber eine sichere Bestimmung dieser Verhältnisse nicht möglich. Die Gelenkflächen für den Unterkiefer befinden sich etwas tiefer unter dem Condylus als bei El. meridionalis.

Die Frontoparietal-Region ist sagittal sehr niedergedrückt und sehr leicht concav, transversal jedoch flach. Doch ist dieses zum Theil vielleicht auf einen erlittenen Druck zurückzuführen. Der Scheitel ist, wie bereits gesagt, von dem des El. meridionalis vollständig verschieden geformt und bildet mit dem Schläfengrubenantheil der Parietalia und Temporalia einen etwas flachgedrückten, seitlich gesehen so ziemlich ganz in einer Ebene liegenden und etwas schief nach rückwärts geneigten Halbkreis.

Die Form der Nasenöffnung ist nicht mehr deutlich erkennbar. Die Nasalia sind ziemlich lang, an der Spitze nicht gekerbt und nicht so frei nach oben vorspringend wie bei El. meridionalis.

Die Stosszähne sind beide vollständig erhalten, sollen jedoch später im Zusammenhange mit anderen besprochen werden.

Masse dieses Schädels sind:

Länge der Maxillaria	24.5 cm	1
Gesammtbreite derselben		
Vordere Breite des Gaumens	· · · · · · · · · · 7°5 "	
Hintere " " "		
Länge des (linken) M_3		
Grösste Breite desselben (in der Mitte)	9 "	
Entfernung des Hinterrandes des M_3 vom hintersten Punkte der G	Condylen 40 "	
Gesammtlänge der Prämaxillaria an der Alveole	60 "	
" " in der Mitte	54 "	
" " " Foramen infraorbitale		
Breite der Prämaxillaria in der Höhe der Orbiten	45 "	
" " " " Mitte (schmalste Stelle)		
" " am vorderen Ende	42 "	
Untere Dicke der Alveolen (sagittal)		
Entfernung der Alveolen von einander, zu oberst		
" " " " in der Mitte		
" " " " beim Austritt der Zähne		

Der M_3 ist bereits sehr stark abgekaut und enthält nur mehr noch 9x Joche.

Exemplar b: Dieses Exemplar besteht nur aus den beiden isolirten Stosszahnalveolen; der rechte Zahn ist vollständig, dem linken fehlt ein Stück aus der Mitte. Das Mangelnde war durch Gyps zu einem ganzen Prämaxillare mit beiden Incisiven ergänzt, wie es auch Falconer erwähnt. Es bleibt jedoch trotzdem ein sehr interessantes Object, das unter "Incisiven" näher beschrieben werden wird. Was von den Prämaxillaria vorhanden ist, stimmt mit den soeben angeführten vollständig überein.

Schädel c: Dieser schöne Schädel wurde zusammen mit dem Unterkiefer, den Wirbeln, Rippen, einem Schulterblatt und dem Becken gefunden. Er gehört einem noch nicht erwachsenen Thiere an, da die Kiefer erst M_1 und M_2 (sowie M_3 im Keim) enthalten. M_1 ist jedoch, besonders im Unterkiefer, fast ganz abgekaut. Er ist auf Tafel VI in zwei Ansichten abgebildet.

Dieser Schädel repräsentirt in ganz auffallender Weise wieder jenen eigenthümlich gestreckten, beinahe wie von oben-vorn gegen unten-hinten plattgedrückt erscheinenden Typus, der uns schon bei dem Cranium a entgegengetreten ist. Leider ist jedoch auch hier die Cranialpartie des Schädels in nicht besonders gutem Erhaltungszustand, ebenso wie auch hier die Jochbögen, ausserdem aber noch die Orbita beiderseits fehlen. Doch ist trotzdem das Hinterhaupt viel besser und vollständiger erhalten. Das Supraoccipitale steigt von den Condylen senkrecht empor, sein oberer Rand ist jedoch nicht intact. In der Mitte befindet sich, von der Schädelhöhle nur durch eine dünne Wand getrennt, eine tiefe und breite Aushöhlung für das Ligamentum nuchae, die dann oben am Scheitel eine weite Ausrandung des Scheitelkammes bewirkt, die hier jedoch vielleicht nur auf den Bruch zurückzuführen ist. Seitlich ist das Hinterhaupt beträchtlich ausgedehnt und von der Temporalgrube nur durch einen relativ dünnen Knochenflügel geschieden. Es hat von vorn wieder denselben gedrückt halbkreisförmigen Umriss, ist wieder stark comprimirt, der Scheitel scharf, nach hinten direct dem Condylus zu abfallend, also gleichfalls ohne jene Abplattung des El. meridionalis, der ganze Temporal- und Scheitelkamm von der Seite gesehen nach rückwärts geneigt und in einer Ebene. Die Glenoidfläche

hat genau dieselbe Lage, die Schläfengrube genau dieselbe Gestalt, wie sie schon für den Schädel a erwähnt wurde.

Fast das Gleiche gilt auch für die so charakteristisch gebildeten Prämaxillaria. Sie sind nur einer stärkeren Krümmung der Stosszähne entsprechend seitlich etwas mehr x-förmig ausgerundet; doch ist zwischen den beiden, äusserlich stark hervortretenden Alveolen ein ziemlich bedeutender Zwischenraum, der von einem breiten und auch ziemlich tiefen Graben eingenommen wird. Auch stehen erstere oben beträchtlich vor.

Was jedoch gegen Schädel a einen sehr in die Augen fallenden Unterschied bildet, ist die gegenseitige Lage dieser soeben besprochenen zwei Schädelregionen — der Frontoparietal- und der Prämaxillarregion. Jene bedeutende Knickung ihrer Achsen gegen einander ist hier fast vollständig verwischt, indem sie fast in einer Richtung sich befinden.

Doch glaube ich selbst für den Fall, dass dieser beiderseitige Befund — an Schädel a und Schädel a — der natürliche sei und nicht etwa eine durch spätere Einflüsse erst bewirkte Entstellung, was zum Theil jedoch der Fall sein mag, so glaube ich trotzdem, dass beide Schädel ganz gut demselben Typus zugeschrieben und diese Unterschiede auf Rechnung des verschiedenen Alters beider Individuen gesetzt werden können. Das Gleiche gilt auch für die bei dem ersten Anblick so durchgreifend verschieden erscheinenden Stosszähne. Beides soll an späteren Stellen näher erörtert werden.

Der Winkel, den Stosszahnalveolen und Kaufläche der Molaren mit einander einschliessen, beträgt ungefähr 135°, also annähernd ebensoviel, wie etwa bei dem afrikanischen Elephanten oder manchen Mastodonten, wie *Mastodon Ohioticus* oder *Andium*. Auch sehr junge indische Elephanten erreichen zuweilen annähernd denselben Winkel.

Die directe Entfernung der Molaren (= M_2) vom Condylus ist ziemlich beträchtlich, wenn auch geringer als an Schädel a, die horizontale gleichfalls sehr bedeutend.

Masse dieses Schädels sind:

Gesammtbreite der Condylen	cm
Höhe eines Condylus	2.7
Breite " " (grösste) 5	·5 ··
Höhe des Foramen magnum	• •
Grösste Breite des Foramen magnum	
" " " Hinterhauptes	
Entfernung der Condylen von dem vorderen Ende der Stosszahnalveolen 88	2.7
" der Höhe des Scheitels von dem vorderen Ende der Stosszahnalveolen 100	(?) ,,
Länge der Prämaxillaria	* *
Obere Breite der Prämaxillaria	2)
Mittlere (kleinste) Breite der Prämaxillaria	* 7
Untere Breite der Prämaxillaria	
Länge der Maxillaria	22
Grösste Breite der Maxillaria	22
Breite des Gaumens, vorn	·5 ,,
., " hinten	٠,

Von Backenzähnen sind, wie bereits erwähnt, im Oberkiefer M_1 und M_2 in Usur. Der erstere erscheint jedoch schon ganz niedergekaut und vorn bereits — zum Abstossen bereit — 3.5 cm über

das Maxillare (aus der Alveole) herausgeschoben. M_2 ist in vollem Gebrauche; unter den grossentheils verletzten Pterygoidea sieht man auch schon die Joche der letzten Molaren angelegt.

Exemplar d: Einem etwas jüngeren Individuum als Schädel c gehört dieses Schädelfragment an. Es besteht aus dem Gaumen, beiderseits mit M_1 und M_2 , und dem linken Prämaxillare mit dem vollständigen Stosszahn in situ. Der M_1 steht in vollem Gebrauche, der M_2 ist im Begriffe, in die Usur einzutreten; ersterer wurde von Falconer¹) genauer beschrieben und dieses Schädelfragmentes dabei Erwähnung gethan. Zu bemerken ist an demselben die bedeutende Entfernung, die hier zwischen Stosszahnalveole und Vorderrand des M_1 sich befindet. Von diesem läuft nach vorn zu eine medianwärts convexe, scharfe Leiste, die sich dann weiter auf dem an der Unterseite der Prämaxillaria gelegenen Antheil der Maxillaria allmälig verliert. Beide Leisten schliessen zwischen sich eine seichte Rinne als Fortsetzung des Gaumens ein; gegen aussen liegt beiderseits eine sehr bedeutende Vertiefung, die eben- die Molaren von den Incisivalveolen scharf trennt. Letztere, überhaupt die Prämaxillaria, sind wieder genau so gebildet wie in den vorhererwähnten Fällen. Die Form des Stosszahnes gleicht der des Schädels c.

Die angeführten Schädel und Schädelfragmente zeigen daher nach dem Erwähnten Eigenschaften, die sie in sehr auffallender Weise von den typischen Formen des *El. meridionalis* unterscheiden. Das Hinterhaupt, massig bei letzterem und stark erhoben, mit breitem, schief abgeplattetem Scheitel, ist hier tief niedergedrückt, beinahe schirmförmig ausgebreitet, sein Scheitelkamm relativ scharf, das Supraoccipitale ununterbrochen und senkrecht von ihm abfallend. Die flache Frontoparietalregion bildet bei dem ausgewachsenen Schädel a mit den Prämaxillaria einen stumpfen, jedoch ziemlich kleinen Winkel, was jedenfalls nur zum Theil auf eine erlittene Quetschung zurückzuführen ist; bei dem jüngeren Schädel anähert sich dieser Winkel jedoch bedeutend 180°.

Höchst charakteristisch und von El. meridionalis vollständig abweichend sind weiter die Prämaxillaria mit den Stosszahnalveolen gebaut. Der enge, tiefe Spalt, der früher die beiden mächtigen Alveolen trennte, der sich, wie es an einem Schädel (C) zu sehen war, auch ganz schliessen kann, so dass die Zähne dann nur noch durch die Alveolarwände geschieden sind, macht hier einem breiten, wenn auch immerhin ziemlich tiefen Graben Platz, der die beiden viel kleineren Zahnscheiden auseinanderhält. Auch die Krümmung der letzteren, sowie ihr Verlauf sind für unsere Form sehr bezeichnend.

Die Orbita liegen nicht seitlich auf den Stosszähnen, sondern etwas nach hinten verrückt, so dass letztere über dieselben hinaus nach vorn fast zur Hälfte sichtbar sind. Das Foramen infraorbitale befindet sich fast ganz unterhalb der Incisiven, während es sonst mehr an der Aussenseite derselben zu finden ist. Die Maxillaria sind verhältnissmässig gross, die Pterygoidea schiefer aufsteigend, die Condylen klein. Die Gelenkfläche für den Unterkiefer liegt etwas unterhalb der Ebene der letzteren.

Ein ganz hervorragender Unterschied gegen El. meridionalis liegt dann auch noch in der Gestaltung der Stosszähne, die etwas später besprochen werden wird. Mit El. meridionalis mehr oder weniger gemeinsam, hat die vorliegende Form eigentlich nur den Bau der Backenzähne und den gegen die Kaufläche der letzteren schief gelagerten Jochbogen. Dieser ist zwar an keinem Exemplar vollständig vorhanden, doch befindet sich auf der rechten Seite des Schädels a das vordere Ende desselben und die hintere Ansatzstelle, so dass man sich seinen Verlauf mit Wahrscheinlichkeit reconstruiren kann.

Trennend tritt zwischen diese beiden Elephantentypen ferner die ganz auffallend verschiedene Grösse derselben. Unsere in Rede stehende schlanke, zierliche Form ist fast nur ein Pygmäe

¹⁾ Pal. Mem. II, S. 111.

gegen den gewaltigen und mächtigen El. meridionalis, den Pohlig mit Unrecht kleiner sein lässt, als den ihn in der Grösse allerdings erreichenden El. antiquus. 1)

Unterkiefer: Im Museum zu Florenz befinden sich mehrere Unterkieferstücke — zum Theil nur je ein horizontaler Ast, zum Theil beide in Verbindung — die sich vor der Mehrzahl der übrigen. zu El. meridionalis gehörigen und in demselben Alter stehenden vor Allem durch ihre ganz auffallend geringe Grösse auszeichnen. Auch im Universitäts-Museum zu Pisa ist ein solches Exemplar, aus den beiden horizontalen Aesten bestehend, aufbewahrt.

Ihre besonders kleinen Dimensionen schon unterscheiden sie sehr leicht von denen des typischen *El. meridionalis*. Ferner ist ihr horizontaler Ast schlanker, niedriger und die Symphyse viel mehr nach vorn vorgezogen, als dies bei letzterem der Fall ist.

Ob die im Früheren — unter *El. meridionalis* — beschriebenen jugendlichen Kiefer und Schädelfragmente auch an die dortige Stelle gehören, oder ob vielleicht auch Jugendformen des nun in Rede stehenden Elephanten darunter sind, kann ich nicht entscheiden, da es mir nicht möglich war, die am erwachsenen Thiere so scharf hervortretenden Unterschiede bei der Spärlichkeit des Materiales so weit zurück in die Jugend zu verfolgen, und andererseits die Grösse der Zähne allein nicht immer massgebend zu sein scheint. Ich habe sie daher alle zusammen am angegebenen Orte behandelt.

An etwas späterer Stelle wurde eines linken Unterkieferastes Erwähnung gethan, der D_2 in voller und D_1 im Beginn der Usur enthält, und der gleichfalls zu El. meridionalis gestellt wurde. Es befindet sich hier nun ein weiteres gleiches Fragment, jedoch der rechten Seite angehörig, das auch ein wenig älter ist, indem am D_1 schon x_4 Joche im Gebrauche stehen und auch das fünfte und sechste schon angegriffen wurde. Trotz dieses seines höheren Alters ist er jedoch bedeutend kleiner, wie schon aus folgenden Zahlen — abgenommen von ihren Zähnen — hervorgeht:

	grosser Kiefer	kleiner Kiefer
Länge des D_2	. 67 mm	52 mm
Grösste Breite des D_2	. ļI .,	33
Länge des D_1	. 130 ,	117
Grösste Breite des D_1	. 60 ,,	49

Der D_2 hat wahrscheinlich $x \, 5 \, x$ Joche; er ist jedoch vorne an der Krone verletzt, so dass auch seine wahre Länge nicht sicher zu ermitteln ist. Doch wird sie von der angegebenen nicht viel verschieden sein, da die Wurzel fast ganz intact ist. Der D_1 zählt $x \, 8 \, x$ Joche, also wieder genau so viel wie der im grösseren Kiefer. Im Email ist nicht viel Unterschied, nur ist das des letzteren viel stärker gefältelt.

Nach der sehr bedeutenden Grössendifferenz möchte ich den kleineren Kiefer zu unserer neuen Form stellen. Die Symphyse fällt vorn sehr flach ab, der Winkel, den der Schnabel an seiner Spitze bildet, ist ungefähr 50°; doch ist der Schnabel nicht nach abwärts, sondern in der Verlängerung des Unterrandes vorgezogen.

Ein bedeutend älteres Stadium repräsentirt der zum Schädel c gehörige, prachtvoll erhaltene Unterkiefer (siehe Taf. VI), indem er nebst eines kleinen Restes von M_1 noch M_2 in voller Usur und den M_3 im Keim enthält. Auch die aufsteigenden Aeste sind zum grössten Theil erhalten. Der horizontale

¹⁾ Siehe: Sitz-Ber. Niederrhein. Ges. Bonn. 4. Februar 1884; — Zeitschr. deutsch. geolog. Ges., Berlin 1885, S. 1022; — Quart. Journ. Geol. Soc. London, Bd. 42, 1886, S. 177; — Boll. Soc. geol. Ital. Vol. V. Roma 1887, S. 413.

Ast ist ziemlich schlank und nimmt nach vorn zu sogar an Höhe etwas ab. Die Symphyse ist im Profil sehr schief und in einen ausserordentlich langen Schnabel ausgezogen, der leicht nach abwärts gekrümmt ist. Der Processus coronoideus neigt sich bedeutend nach vorn über, der Condylus liegt hoch über der Kaufläche. In der Aufsicht zeigen sich die beiden Aeste unter spitzem Winkel zusammentreffend und nach hinten sich relativ wenig erweiternd.

Entfernung des Symphysenschnabels von der Verbindungslinie der beiden Condylen	64 cn
" der Mittelpunkte der beiden Condylen	11 "
Grösste Breite der aufsteigenden Aeste in transversaler Richtung (von dem seitlichsten Punkte	
des einen zu dem des anderen)	52 "
Breite des Condylus (transversal)	9.5 "
Länge " " (sagittal)	5.5 »
Grösste Breite des aufsteigenden Astes (sagittal)	
" Dicke " " " (transversal)	15.5 ,
Entfernung des Symphysenschnabels vom Beginn des aufsteigenden Astes (in Projection auf	
die Medianebene)	34 "
Totale Breite an letzterem Punkte	41 "
Entfernung der beiden M_2 am Hinterrand (Mitte des letzteren)	23 "
, , Vorderaussenecken des $M_{ m 2}$	21 "
Kleinster Zwischenraum zwischen den M_2 (ungefähr am 2. Joch)	
Höhe des horizontalen Astes zu Beginn des aufsteigenden Astes	14.5 "
, , unter dem Vorderrand des M_2	13 "

An einem anderen grösseren Kieferfragment (I) ist der rechte horizontale Ast ganz, der linke bis zum Beginn des aufsteigenden erhalten. In ersterem befindet sich ein grösserer Theil des M_2 (7 x Joche), sowie M_3 , von dem vier Joche bereits angekaut sind, in letzterem blos M_2 und ein Fragment des M_3 . Der Kiefer ist wieder niedrig, seitlich gerundet mit schief abfallender Symphyse, die nur wenig nach abwärts abgebogen ist. Der Schnabel ist wahrscheinlich abgestossen. Der schluchtförmige Symphysencanal ist, wie auch früher, sehr seicht.

Ein weiterer Kiefer (II) besitzt noch beide horizontalen Aeste, mit $5\,x$ Jochen des M_2 und je den zehn ersten Jochen des M_3 . Am M_2 stehen jedoch die Joche auffallend weit von einander ab, so dass er gerade so lang ist wie der vorher erwähnte mit $7\,x$ Jochen. An diesem Exemplar zeigt der horizontale Ast besonders gut die angeführten Charakteristika: Er ist schlank, sehr niedrig, transversal gerundet, die Symphyse mit dem sehr seichten Canal weit vorspringend, ihr Unterrand mit dem des Kiefers fast ganz in einer Linie. Der Symphysenoberrand schliesst mit der Alveolarlinie einen Winkel von ungefähr 135° ein.

Ein viertes Fragment (III) mit beiden horizontalen Aesten enthält vom M_2 nur kleine, unförmliche, bereits ganz schmelzlose Reste, sowie die M_3 , von denen je x 7 Joche angekaut sind. Der Kiefer ist etwas höher als die früheren, die Symphyse hat jedoch die gleiche Beschaffenheit. Ihr Winkel mit dem Alveolarrand beträgt ungefähr 125°.

An einem fünften Exemplar (IV) ist der linke Horizontalast ganz und noch ein grosser Theil des aufsteigenden, rechtsseitig jedoch blos der horizontale Ast vorhanden. Beiderseitig ist M_2 mit 7 x Jochen, links auch noch ein Stück des M_3 enthalten. Die Symphyse liegt wieder sehr schief (ungefähr 120°), der Canal ist seicht und breit.

Alle diese Fossilien stammen aus dem lacustren Pliocan des oberen Arnothales. Masse der letzteren vier sind:

	I	11	III	ΙV
Entfernung der Symphysenspitze von der Verbindungslinie des				
Ursprunges des Vorderrandes des aufsteigenden Astes	26.2 cm	29'0 cm	27.0 cm	27.5 cm
Grösste Breite an derselben Stelle	45.0 ,,	40'0 "	46.5 ,,	41.5 ,,
Höhe des horizontalen Astes an derselben Stelle	12'5 ,,	11°5 ,,	13.0 ,,	12.5 ,,
" " " " am Vorderrande der Zahnreihe	14.0 ,,	11'5 ,,	15.0 ,,	15.0 ,,
" " " in der Mitte zwischen diesen Punkten	13.3 ,,	11.0 ,,	13.8 ,,	13.0 "
Grösste Dicke des horizontalen Astes	13.0 "	13'5 ,,	15.0 ,,	14.0 %

Endlich ist noch der grösste Theil eines rechten horizontalen Unterkieferastes vorhanden, der nebst dem vollständig erhaltenen M_3 mit x 10 Jochen in Usur nur noch den letzten Rest der Alveole des ausgefallenen M_2 enthält. Das Fragment gehörte also einem bereits vollständig erwachsenen Individuum an; trotzdem besitzt aber die Symphyse einen ausserordentlich stark geneigten Oberrand. Er schliesst mit der Alveolarlinie einen Winkel von ungefähr 125° ein. Der Unterrand der Symphyse und ihres Schnabels befindet sich mit dem des Alveolartheiles des Kieferknochens fast in einer Linie. Den in obiger Tabelle angegebenen ersten Höhenposten kann man nicht abnehmen, der zweite beträgt 16 cm, der dritte 13 cm. Dieses Kieferfragment gelangte Taf. IV, Fig. 3, zur Abbildung.

Was daher diese Kiefer vor denen des El. meridionalis vor Allem auszeichnet, ist ihre ausserordentlich geringe Grösse, die sie von gleichaltrigen Exemplaren des ersteren sehr leicht unterscheidet. So beträgt z. B. an einem mit Kiefer II gleichaltrigen Exemplar von El. meridionalis die Breite an der Ursprungsstelle des Ramus ascendens 52 cm, an einem mit alleinigen M_3 sogar 60 cm; die Höhe des Kieferknochens an derselben Stelle ist bei ersterem 17 cm, am Vorderrand des M_2 20 cm u. s. w., alles Zahlen, die die früher angegebenen um ein Bedeutendes überragen.

Die Form des horizontalen Astes ist ferner schlanker, seine Höhe geringer, nach vorne wenig oder gar nicht zunehmend, manchmal sogar abnehmend; die Symphysis, die bei El. meridionalis im erwachsenen Zustand sehr steil, deren Schnabel meist ziemlich beträchtlich nach abwärts gezogen ist, ist hier im Allgemeinen auf jugendlicherem Stadium geblieben, indem sie sogar bei alten Thieren relativ noch sehr flach und vorgezogen ist. Ihr Canal ist ferner bedeutend seichter als bei El. meridionalis, bei dem er eine tiefe, steile Schlucht bildet; der Symphysenschnabel ist oft ausserordentlich lang und wenig oder gar nicht nach abwärts abgebogen. Der Unterrand des ganzen Kiefers bildet in letzterem Falle eine mehr oder weniger fast gerade Linie, abgesehen natürlich von der stets vorkommenden seichten Ausbiegung unter den Molaren.

Im aufsteigenden Ast zeigt das einzige — und auch das nur fragmentär — erhaltene Exemplar des Schädels c keine wesentlichen Abweichungen von denen des El. meridionalis.

Bezahnung.

1. Incisiven:

Dieselben sind bei unserem Elephanten in überaus charakteristischer Weise gestaltet. Es ist zwar im Allgemeinen dieselbe Krümmungsart wie bei *El. meridionalis*, doch ist sie so bezeichnend specialisirt, dass eine Verwechslung beider wohl nicht leicht eintreten kann.

Beim erwachsenen Thiere verlassen sie in der Richtung nach unten-vorwärts¹) und etwas nach aussen die Alveolen, wenden sich dann mehr oder weniger rasch immer mehr nach vorne, so dass sie

¹⁾ Die Richtungsangaben beziehen sich stets auf die natürliche Haltung des Schädels.

fast eine horizontale Lage erreichen können, kehren dabei aber, eine lanzettliche Figur einschliessend, ihre Spitzen gegen einander, bis diese sich fast berühren. Letzteres Streben, die Berührung der Spitzen, tritt jedoch erst bei vorgeschrittenerem Altersstadium auf; bei jungen Exemplaren ist die Krümmung der Stosszähne fast genau so wie bei El. meridionalis.

Schädelfragment d: Dieses Schädelfragment ist mit seinem in voller Usur stehenden M_1 und dem noch unangekauten M_2 das jüngste Exemplar des Florentiner Museums. Erhalten ist jedoch nur das vollständige linke Prämaxillare mit unversehrtem Stosszahn in situ. Schon die Alveolen zeigen eine leicht x-förmige Krümmung; die Richtung des Zahnes beim Verlassen derselben ist in constanter Curve nach aussen-vorn, anfangs ferner stark nach abwärts, später sich immer mehr erhebend. Hier beginnt auch die Spitze sich bereits ganz leicht nach einwärts zu wenden. Der Querschnitt ist elliptisch; dabei liegt der grössere Durchmesser beim Austritt von innen-hinten nach aussen-vorn, sein vorderes Ende weicht jedoch immer mehr nach innen, so dass er vor dem Ende des Zahnes fast horizontal liegt.

Schädel c: Hier ist die Abkauung um einen ganzen Zahn weiter vorgeschritten. Beide Stosszähne sind erhalten und in ihrer Form auch mehr ausgebildet. Die Krümmung ist zwar im Grossen und Ganzen dieselbe wie früher, doch haben sich die Zähne schon bedeutend über die Horizontale nach aufwärts und ebenso mehr nach einwärts gedreht, obzwar letztere Krümmung noch immer nur wenig mehr als angedeutet erscheint. Der Querschnitt ist wieder stark elliptisch; der grössere Durchmesser, beim Austritt aus der Alveole mit seinem vorderen Ende nach auswärts geneigt, erreicht eine Stellung senkrecht auf die Transversale ungefähr 2 dm vor der Alveole und nach weiterer Einwärtsdrehung die Horizontale etwa in den letzten 3 dm hinter der Spitze.

Schädel a: Er enthält noch 8 x Joche des M_3 . Beide Stosszähne sind vollständig. Ihre Richtung nach dem Verlassen der Alveole ist stark nach unten, schwächer nach vorn und aussen. Im weiteren Verlaufe wenden sie sich in anfangs etwas stärkerer, dann flacherer Curve immer weiter nach vorn, divergiren dabei bis ungefähr zur Mitte, nähern dann aber einander ihre Spitzen, bis diese sich fast berühren. Die Richtung nach abwärts geben sie jedoch nie auf.

Das obere Ende der Alveole ist, wie an früherer Stelle bereits erwähnt, aufgebrochen und die Pulpahöhlung des Zahnes liegt blos. Die Wandung ist sehr dünn, der Querschnitt stark elliptisch; sein grösserer Durchmesser ist nach vorn und sehr stark nach aussen gerichtet. Mehr gerundet ist der Querschnitt beim Austritt aus der Alveole, wobei der grössere Durchmesser fast ganz transversal liegt. Später dreht sich der Zahn in der Richtung nach einwärts, auch wird die Ellipse des Querschnittes wieder etwas flacher. Der linke Zahn überragt nach vorn etwas den rechten.

Länge des Alveolartheiles (rechter Zahn)	60 cm										
" " frei vorragenden Zahnes	55 ,										
Grösserer Durchmesser am Grunde der Alveole											
Kleinerer ,, ,, ,, ,, ,,	8 ,,										
Entfernung der beiden Zähne ebendaselbst	25 ,,										
Grösserer Durchmesser beim Verlassen der Alveole	11'5 .,										
Kleinerer " " " " "	10.8 "										
Entfernung der beiden Zähne ebendaselbst											
Grösserer Durchmesser in der Hälfte des freien Verlaufes											
Kleinerer " " " " " " " " "											
Entfernung (grösste überhaupt) der Zähne daselbst											
Grösserer Durchmesser 2 dm vor der Spitze (innen-oben nach aussen-unten)											
Kleinerer ,, 2 ,, ,, ,, ,,	7 "										
Geradlinige Entfernung der Spitze vom Austritt aus den Alveolen 1											

Prämaxillarfragment b: Es besteht nur aus den beiden Incisivalveolen; auch die sie verbindende Wand ist durchgebrochen. Der rechte Stosszahn ist vollständig, dem linken fehlt ein ungefähr 3.5 dm langes Mittelstück gleich unterhalb der Alveolen. Dieses Fragment gehörte einem etwas grösseren Individuum an als der Schädel a. Seine Krümmung ist fast genau dieselbe wie bei letzterem. Die beiden Zähne divergiren zuerst auch nur wenig, kehren sich dann aber gegen einander und berühren sich fast mit ihren Spitzen, wodurch wieder jene eigenthümliche und so überaus charakteristische lanzettliche Figur entsteht. Was gegen Schädel a abweichend ist, ist, dass die Zähne in ungefähr ½ ihres Verlaufes sich kräftiger nach vorwärts biegen, eine nahezu horizontale Lage erreichen und im Profil in ihrer vorderen Hälfte dann fast geradlinig erscheinen. Bei ersterem ist diese Profilcurve viel sanfter und gleichmässig sich über den ganzen Zahn erstreckend.

Der Querschnitt ist wieder eine Ellipse. Am Grunde der Alveole ist ihr grösserer Durchmesser nach vorn-aussen gerichtet, beim Verlassen der Alveole liegt er auch hier horizontal und dreht sich dann im weiteren Verlaufe mit seinem äusseren Ende immer mehr gegen innen, so dass er ungefähr beim Beginn des dritten Fünftels senkrecht steht und endlich sich ganz nach innen kehrt.

Isolirte Zähne: Isolirte Stosszähne dieser Art befinden sich im Museum zu Florenz, drei fast vollständige, sowie mehrere kleinere Fragmente. Alle stammen aus dem oberen Arnothal. Einer der vollständigeren (Taf. VIII, Fig. 4) zeigt in ausgezeichneter Weise die Drehung des grösseren Durchmessers seines ziemlich flachelliptischen Querschnittes längs einer sehr losen Schraubenlinie, sowie überhaupt typisch die Gestalt der soeben beschriebenen Zähne. Minder deutlich ist dasselbe auch bei einem anderen, stark angewitterten, sowie dem dritten grösseren Fragmente der Fall, wenn natürlich auch noch immer sehr gut zu sehen. Bei den beiden ersteren ist die Pulpahöhle noch vorhanden, dabei ihre Wandung bei dem zuerst genannten 7 mm, beim zweiten 14 mm dick. Ersterem dürfte daher nur sehr wenig zur vollen Länge fehlen.

	I	II	III
Länge des ganzen Fragmentes	218 cm	190 cm	174 cm
Grösserer Durchmesser, am hinteren Ende	 10 "	105 "	77
Kleinerer " " " "		9.5 ,	"
Grösster Querschnitt { grösserer Durchmesser . kleinerer "	 11'3 "	II "	11.5 "
kleinerer "	 9 "	10 .,	8*8 "
2 dm hinter der Spitze { grösserer Durchmesser kleinerer "		17	17
2 dm ninter der Spitze kleinerer "	 5.5 "	1,	- ,,

Hieher zu zählen ist wahrscheinlich ein sehr junger Stosszahn von Ville im Museum der Accademia Valdarnese zu Montevarchi. Er ist (am convexen Rande gemessen) 90 cm lang, hat am Bruche einen grösseren Durchmesser von 98 und einen kleineren von 75 mm, in der Mitte ferner einen grösseren von 70 mm und besitzt am Hinterende noch ein ungefähr 18 cm langes Stück Alveole.

Ein anderes, sehr grosses Exemplar derselben Sammlung ist bei Terranuova gefunden und gleicht in seiner Form mehr dem Zahn des Schädels α , mit dem kürzeren, (im Profil) mehr geraden Anfangsstück.

Auch im Universitäts-Museum zu Pisa sah ich nebst dem früher erwähnten Kiefer noch zwei Stosszahnfragmente dieser vorliegenden Form.

Also auch bei der Gestaltung der Incisiven treten hier, ganz ebenso wie wir es beim Bau des Schädels gesehen haben, äusserst charakteristische und von allen bekannten Elephanten abweichende Merkmale hervor. Während aber die Schädel, soweit sie erhalten sind, ziemlich gut übereinstimmen und jene Merkmale gemeinsam aufweisen, ist dies bei den Stosszähnen scheinbar durchaus nicht der Fall, es scheinen wenigstens jene der Exemplare a und b von jenen der Exemplare c und d für den ersten Anblick ganz auffallend verschieden und unmöglich auf dieselbe Grundform zurückzuführen zu sein. Es dürfte diese Verschiedenheit jedoch blos auf Altersunterschieden beruhen. Letztere beiden haben relativ jungen Thieren angehört, da M_1 und M_2 in Usur stehen, von ersteren ist nur bei a ein Backenzahn vorhanden, ein M_3 mit nur noch 9 Jochen; b wird wahrscheinlich aber noch älter gewesen sein.

Wenn man sich nun die Gestalt der Stosszähne, besonders die Lageveränderung des grösseren Durchmessers, wie sie oben angegeben wurden, vor Augen hält und sich nun die Incisiven z. B. des Schädels c weiter wachsend denkt, so ist es klar, dass der Zahn beim Vorstossen der durch seine eigenthümliche Bildung veranlassten Bewegung längs einer Schraubenlinie — wie etwa eine durch

eine Schraubenmutter gestossene Schraubenspindel — folgen und eine Drehung gegen die Mediane erleiden werde. Die beiden an Schädel c stark nach aufwärts gewendeten Spitzen müssen sich daher beim weiteren Wachsen des Zahnthums nach innen kehren und endlich genau dieselbe Stellung erreichen, wie sie an Schädel α oder dem Prämaxillarfragment δ zu sehen ist.

In genau derselben Weise erhält man andererseits, wenn man sich die Stosszähne der beiden letzteren durch die Alveolen nach rückwärts gezogen denkt, bei einem gewissen Punkte jene Stellung der Zähne, wie sie Schädel c oder d kennzeichnet. Ich glaube daher, diese scheinbar so divergente Ausbildung blos auf das verschiedene Alter der in Frage kommenden Incisiven zurückführen zu können.

Backenzähne.

a) Milchzähne: Wie bereits an früherer Stelle erwähnt, fehlt zur sicheren Entscheidung, ob jener oben beschriebene jugendliche Schädel oder die ebendaselbst angeführten Schädelfragmente zu der vorliegenden Form oder dem typischen El. meridionalis gehören, jeder entscheidende Anhaltspunkt. Wenn nun an dieser Stelle aber thatsächlich einige Zähne beschrieben werden, so geschieht dies lediglich auf Grund ihrer auffallend geringen Grösse, die sie vor anderen, gleichwerthigen Exemplaren auszeichnet. Dass sie aber zweifellos an dieser Stelle angereiht werden müssen, kann natürlich nicht im Entferntesten behauptet werden.

Hieher gehört vor Allem ein Kiefer aus dem oberen Arnothal, der stark beschädigt und abgekaut den D_2 sowie den D_1 in schöner Erhaltung zeigt. Ersterer hat eine grösste Breite von etwa 34 mm, die vorhandene Länge ist 50 mm, die jedoch in Wirklichkeit nur unbedeutend grösser (vielleicht 54—55 mm) gewesen sein wird. Der D_1 ist 117 mm lang, an seiner stärksten Stelle (7. Joch) 50 mm breit und zählt x8x Joche. x5 sind davon bereits im Gebrauche gestanden. Das erste Joch ist in zwei gleich grosse Inseln getheilt, am zweiten sieht man die drei Abschnitte in der für El. meridionalis charakteristischen relativen Grössenentwicklung, die weiteren sind in mehrere Inseln und Inselchen aufgelöst. Das Email ist verhältnissmässig dünn, mit sehr schwach angedeuteter Wellung. Auch der Kieferknochen zeichnet sich vor einem anderen, etwas jüngeren, Seite 144 [38] (vergl. ebenso Seite 150 [44] und Seite 152 [46]) beschriebenen und Taf. VIII, Fig. 3, abgebildeten Kieferfragmente durch seine besonders geringe Grösse aus.

Ein sehr schönes Exemplar eines linken unteren D_2 stellt ein Taf. VII, Fig. 5 abgebildeter, Zahn aus Le Ville im oberen Arnothal vor. Er enthält x_5x Joche, die alle schon angekaut sind. Alle, bis auf den hinteren Talon, sind auch bereits einheitlich, nur ist die Verbindung der inneren Dritttheile am letzten und vorletzten Joche noch nicht vollständig durchgeführt. Das Email ist im Vergleich mit anderen D_2 dünn und zart, seine Wellung schwach und ungleichmässig, doch sind die Marken stark und unregelmässig verzerrt. Die Joche selbst sind wie mit "Regenfurchen" bedeckt.

Länge	des	Za	ahnes						٠						٠	56	mm
Breite	am	I.	Joch													25	29
12	27	4.	37													35	27
Höhe	dess	elb	en (scl	101	n :	sta	ırk	a	bg	gel	aı	ıt)				22	

b) Echte Molaren: Hier müssen natürlich vor Allem jene in Betracht gezogen werden, die in den oben beschriebenen Schädeln und Unterkiefern enthalten sind. Aus gewissen Gründen sollen zuerst die Zähne des Unterkiefers behandelt werden.

Untere Molaren: In dem zu Schädel c gehörigen Unterkiefer sind alle drei echten Molaren vorhanden. Von M_1 ist jedoch blos nur noch ein etwa 3-4 cm langer, gänzlich schmelzloser Rest

übrig; der M_3 andererseits befindet sich erst in der Anlage und hat noch nicht den Kieferknochen durchbrochen.

Der M_2 enthält x 10 x Joche, die bis auf den hinteren Talon, der noch von dem reichlich vorhandenen Cement verhüllt ist, angekaut sind. Die Abkauung ist jedoch beiderseits nicht gleichmässig vorgeschritten. Links haben x4 Joche je einheitliche Marken, am 5. ist das äussere Drittel vollkommen abgetrennt, am 6. ist auch noch das innere Drittel getheilt, doch stehen die drei inneren Inseln eben im Begriffe, sich zu vereinigen, die 7. und 8. Marke besteht aus je vier, die 9. aus fünf Inseln. Vom 10. Joch sind nur zwei Spitzen je kaum 2 mm breit angekaut. Der rechte Zahn hingegen ist in der Abkauung ein wenig vor, so dass am 5. Joch auch das äussere Drittel sich schon zu vereinigen beginnt und am 6. die drei inneren Inseln schon verbunden sind. Das 7. Joch ist ungefähr in demselben Stadium, wie links das 6. Am 10 sind bereits drei ringförmige Inseln und beiderseits je noch eine Spitze wie früher durch die Abnützung zum Vorschein gekommen.

Die Abschnürung des mittleren Abschnittes bleibt tief herunter bestehen, so dass sie auch noch am 1. Joche sichtbar ist. Dieser mittlere Abschnitt ist wie bei *El. meridionalis* transversal schmäler, sagittal aber breiter als die seitlichen. Das Schmelz ist sehr dick, an den vorderen Jochen stark gewellt.

Von den früherenorts beschriebenen Unterkiefern enthalten alle den M_3 — oder wenigstens Reste des vorhanden gewesenen, später aber verloren gegangenen Zahnes — die meisten auch noch Theile des M_2 .

Kiefer I enthält auf der rechten Seite den vollständigen M_3 mit x_4 angekauten Jochen und beiderseits M_2 mit 7x Jochen. Von letzteren sind alle mit einheitlichen Marken versehen, die, gegen die Mitte sich verbreiternd, dadurch ein etwas an El. antiquus erinnerndes Aussehen bekommen. Auch ist das Schmelz verhältnissmässig dünn und gewellt, die mediane Expansion trägt sogar auch die kleinen, für den genannten Elephanten bezeichnenden Zipfel. Der Zahn ist jedoch sehr breit und niedrig, die Marken dick und abstehend, die Einschnürungen an denselben überall noch wahrnehmbar; der Talon besteht aus zwei gegen die Innenseite zu verschobenen ringförmigen Inseln. Die grösste Breite des Zahnes ist am vorletzten Joch 77 mm, die Länge des Fragmentes etwa 14 cm.

Der M_3 enthält x 11 x Joche, davon x_4 angekaut, welche alle noch in kleine Inseln aufgelöst sind. Die Dicke der Joche beträgt in ihren tieferen Theilen etwa 20—22 mm.

Kiefer M enthält beide M_2 mit 5x Jochen und ebenso die M_3 , die jedoch beide hinter dem 10. Joch abgebrochen sind. An ersteren sind die Joche weit abstehend, was zum Theil jedoch auf die sehr schräge Abkauung zurückgeführt werden muss. Alle, bis auf das letzte, das noch in vier Inseln aufgelöst ist, zeigen einheitliche Marken, an denen das schmale, abgeschnürte mittlere Dritttheil gut zu sehen ist. Der Talon besteht wieder nur aus drei sehr kleinen, gegen innen zu stehenden Inseln. Breite des Zahnes 77 mm.

Vom M_3 sind, wie gesagt, nur x 10 Joche erhalten, die vorn kaum noch von der Abkauung ergriffen sind. Alle endigen sie gegen oben mit vier in Längsreihen gestellten fingerförmigen Spitzen.

Kiefer III zeigt von M_2 nur zwei unförmliche, kleine Reste, dagegen sind vom M_3 beiderseits x7 Joche bereits angekaut. Zwei davon haben einheitliche Marken, beim 3. ist das äussere Drittel, beim 4. alle drei gesondert. Die einheitlichen Marken sind — besonders in der Mitte stark gefältelt, das Email jedoch unregelmässig und grob verzerrt, die Joche mindestens 20 mm dick. Ihre Zahl ist x11 x auf der rechten, und x12 x auf der linken Seite. Ersterer ist um etwa einen halben Centimeter kürzer als letzterer. Die Usurfläche ist vollkommen symmetrisch, auch das hintere Ende fast ganz gleich ausgebildet.

```
Länge des linken Zahnes (mit x12x Jochen)...240 mm
Breite (grösste) desselben am 3. Joch ....85 ...
, des vorletzten Joches (an der Basis) ... 75 ...
```

Am Kiefer M_2 sind nur die beiden M_2 mit 7x Jochen erhalten; M_3 sind ausgebrochen. Grösste Breite des M_2 (am vorletzten Joche) 72 mm.

Ausserdem ist noch ein einzelner rechter Kieferast mit dem M_3 und einem Rest der Alveole des M_2 vorhanden (Taf. IV, Fig. 3). Der Zahn zählt $x_{13}x$ Joche, wobei die Talone jedoch sehr klein sind. $x_{10}x$ Joche sind in Usur. Drei Marken sind einheitlich, an der 4. und 5. ist das äussere Dritttheil, an der sechsten alle drei gesondert. Die weiteren Joche sind in je fünf Ringe aufgelöst. Das Email ist grau mit einer schwarzen Rinde, wie es ähnlich auch schon am Kiefer I und II zu bemerken war; Wellung fehlt fast ganz, Verzerrungen sind jedoch vorhanden.

```
      Länge
      255 mm

      Breite (4. Joch)
      80 m

      Höhe (9. Joch)
      85 m
```

Ebenso $x_{13}x$ Joche zählt ein isolirter linker M_3 (Taf. XI, Fig. 2 u. 2a), der mit dem vorhergenannten überhaupt die grösste Aehnlichkeit hat. Nur sind blos x_9 Joche angekaut; nur an einem (4.) Joche ist blos das äussere Drittel isolirt. Sonst ist die Ausbildung der Marken und des Schmelzes fast vollkommen identisch.

In genau derselben Weise wie die soeben beschriebenen, sind in Form und Bau noch mehrere andere untere M_3 ausgebildet. Es lässt sich diese eigenthümliche Gestaltung schwer beschreiben; doch bereitet es keine Schwierigkeiten, sie wieder zu erkennen, wenn man sie einmal gesehen hat. Der Zahn hat am 3. bis 5. Joch seine grösste Breite, die nach hinten zu fast keilförmig abnimmt; die Breite des Talons, die sich jedoch in gleichmässiger Verschmälerung an die der vorhergehenden Joche anschliesst, ist sehr gering. Auch die Höhe der Joche vermindert sich nach hinten sehr bedeutend, jedoch gleichförmig, ebenso wie sie sich nach oben gleichmässig und besonders hinten fast keilförmig verschmälern. Dabei ist der Zahn ziemlich stark nach aussen gekrümmt, wie auch die Basis sehr stark convex. Dieselbe keilförmige Gestalt besitzt auch die Usurfläche.

Von ein wenig verschiedenem Aussehen sind schon zwei zusammengehörige M_3 von Figline im oberen Arnothal. Beide sind jedoch vorne unvollständig: der linke hat 10x, der rechte blos

¹⁾ Dies ist jedoch auch an vielen Zähnen des typischen El. meridionalis zu schen.

9 x Joche. Cement fehlt fast ganz, so dass die Joche ziemlich isolirt stehen. Der Zahn ist sehr schmal und gestreckt, so dass er hier als *El. antiquus* bezeichnet war. Jedoch ist an diesen natürlich nicht zu denken. Das Email ist dick, sehr wenig gefaltet; die drei queren Abschnitte des *El. meridionalis* sind an den Marken in ganz typischer Entwicklung und stets vorhanden, obzwar schon alle Joche angekaut sind. Die Joche sind ferner dick und sehr niedrig.

Ein anderes, von den zuerst beschriebenen in seiner Gestalt abweichendes Zahnpaar (der linke Zahn, Taf. XI, Fig. 1 und 1a) stammt von Montecarlo im oberen Arnothal. Der rechte Zahn besitzt x13x, der linke jedoch x14x Joche, von denen je x8 angekaut sind. Marke 1 ist einheitlich, 2 besitzt ein isolirtes äusseres, 3 und 4 alle drei Drittel isolirt; die nachfolgenden sind in mehrere Inseln aufgelöst. Was dem Zahn fehlt, sind jene eigenthümlichen keilförmigen Zuschärfungen nach hinten und oben. Das Email und die Marken sind jedoch in genau derselben Weise ausgebildet: ersteres glatt, nicht gefaltet, aussen grünschwarz gefärbt, gegen innen zu licht, die Dreitheilung der Marken und ihre Persistenz vollkommen normal.

Ein stark verletzter und schlecht conservirter rechter M_3 von Le Ville, der wahrscheinlich den typischen Exemplaren zugezählt werden muss, hat $x_{13}x$ Joche und folgende Masse:

Ein anderer isolirter, linker M_3 hat gleichfalls $x_{13}x$ Joche; er ist jedoch nach oben etwas mehr zugerundet, wie es übrigens auch die M_3 der Kiefer I und II sind.

Auch im Museum zu Montevarchi befinden sich mehrere offenbar hieher gehörige Zähne. So ist daselbst ein Kieferpaar mit M_3 , die eine Jochzahl von x II x Jochen besitzen. Ihre Länge ist 280 mm, die Breite am 2. Joch 70 mm.

Ein anderer unterer M_g hat x 12 x Joche bei einer Länge von 260 mm und einer Breite von 80 mm.

Was diese Zähne daher von denen des typischen *El. meridionalis* unterscheidet, ist vor Allem ihre geringere Grösse. Während die Länge hier 250–280 mm ist, ist sie bei *El. meridionalis* 270—310 mm, die Breite der ersteren mit 75—85 mm steht bei letzteren einer Breite von 95—105 mm gegenüber, die Höhe von 100 mm einer solchen von 110—130 mm. Die Zähne der vorliegenden Form sind ferner im Grossen und Ganzen auch etwas schlanker und nicht so massig gebaut, die Form der Marken, der Verlauf des Emailes einfacher; die Jochzahl scheint endlich trotz der Kürze des Zahnes eine im Allgemeinen etwas höhere zu sein. Von neun verschiedenen Individuen angehörigen Zähnen enthalten vier je x11x Joche — wobei der Partisan des einen x12x Joche hat — einer x12x Joche und fünf je x13x Joche — wobei zu dem einen ein solcher mit sogar x14x Jochen der anderen Seite gehört. Bei *El. meridionalis* konnten nur höchstens einmal in einem zweifelhaften Falle x13x Joche angenommen werden.

Obere Molaren: Von diesen enthält wieder Schädel c $M_1 - M_3$ auf einmal. Die Usur ist hier, wie gewöhnlich im Oberkiefer, noch nicht so weit vorwärtsgeschritten wie im Unterkiefer. Während in letzterem von M_1 nur noch ein kleiner formloser Stummel ohne jegliche Spur von Schmelz vorhanden war, ist der M_1 des Oberkiefers noch mit Schmelz — allerdings den letzten Resten der ganz niedergekauten Joche — versehen, zeigt er noch deutlich die Marken von 8x Jochen, wenn er auch vorne schon 4 cm aus der Alveole herausgeschoben ist.

Seine totale Länge beträgt 125 mm, die Breite 68 mm.

Am M_2 sind erst x8 Joche von der Usur ergriffen; im Ganzen sind wahrscheinlich wie im Unterkiefer x 10 x vorhanden. Ein sehr reicher Cementbelag verhindert eine genauere Angabe. x 2 Joche haben einheitliche Marken; am 3. ist das innere Drittel, am 4. und 5. alle drei noch isolirt, die weiteren sind in mehrere ringförmige Inseln aufgelöst.

Bei letzterer Zahlangabe ist das reiche Cement jedoch auch mitgemessen; das Joch allein (das Email) hat blos 70 mm in der Breite.

Der M_3 ist noch weniger entwickelt als der untere; aus der abgeriebenen Knochenmasse hervorragende fingerförmige Spitzen verrathen jedoch seine Anlage.

Den M_1 in voller Usur, den M_2 eben im Begriffe in Gebrauch zu treten, enthält das Schädelfragment d. Ersterer gleicht in seinem Habitus ganz auffallend den Zähnen des Schädels c. Nur die Marken weisen eine öfters schon bemerkte Abnormität auf. Die beiden Inseln des mittleren Abschnittes sind nämlich durch einen grösseren Zwischenraum getrennt als gewöhnlich, die Spaltung des Joches geht hier tiefer, so dass die erwähnten Inseln zuerst mit den Seitenabschnitten verschmelzen und so eine Zweitheilung der Marke entsteht. Der Zahn hat 6x Joche, wobei jedoch vorn noch die Hinterwand eines weiteren Joches und eine breitere schmelzlose Fläche sich befindet. Das als hinterer Talon hier angesprochene Gebilde besteht aus einem bogenförmig gekrümmten kleineren Joch, in dessen Concavität sich zwei weitere kleine Schmelzsäulchen zeigen. Die ersten drei Marken sind einheitlich, die letzten drei in oben angegebener Weise in je zwei Hälften getheilt. Das Schmelz ist dick, glatt und ohne Wellung, doch mit jenen unregelmässigen, grossen und groben Falten.

 Länge des Zahnes
 125 mm

 " der schmelzlosen Fläche
 21 "

 Breite (5. Joch)
 65 "

Der M_2 ist noch nicht angekaut. Er liegt beiderseits ganz frei; sein Cementbelag ist gering. Die einzelnen Joche sind gegen oben bedeutend keilförmig zugeschärft. Nur der linke Zahn ist vollständig; die Zahl der Joche beträgt x 10 x.

Der Schädel a endlich enthält blos M_3 mit schon ziemlich weit vorgeschrittener Usur. Er enthält blos 8x Joche und vorn eine schmelzlose Fläche von 3 cm Länge. Vom 1. Joch fehlt jedoch bereits die innere Hälfte der Vorderwand. Die Fingerung geht ziemlich tief, so dass, obzwar der Zahn vorn bis auf den Grund niedergekaut ist, nur zwei Joche einheitliche Marken besitzen, am 4. das äussere Dritttheil abgetrennt ist und die weiteren vier überhaupt noch in mehrere Inseln und Inselchen aufgelöst erscheinen. Das Schmelz besitzt wieder jene eigenthümliche Glätte, ist in seinen äusseren

Schichten schwarz, innen licht gefärbt, Wellung fehlt fast vollständig, grobe Verzerrungen kommen jedoch vor. Cementbelag ist reichlich.

War es bei Besprechung der Unterkieferzähne jedoch möglich, auf mehrere isolirte Zähne als mit grosser Wahrscheinlichkeit hiehergehörig hinzuweisen, so kann dies bei solchen des Oberkiefers nur mit grosser Reserve geschehen. Während bei ersteren auch die eigenthümliche Form des Zahnes, die Bildung des Schmelzbleches bei der Diagnose massgebend eintrat, stützt sich letztere hier lediglich auf die geringere Grösse und besonders geringere Breite der Molaren. Sonst gleichen sie mehr oder weniger vollkommen denen des typischen El. meridionalis und weisen also nicht ebensolche, denn doch ziemlich eigenthümliche und übereinstimmende Unterschiede, wie die beiden Schädel a und c, sowie das Fragment d auf. Es ist dies hier also lediglich eine Auswahl kleinerer Zähne, die vielleicht ebensogut auch zu El. meridionalis gehören können.

Ein solcher M_3 der rechten Seite hat $x_{12}x$ Joche, von denen x_7 angekaut sind. x_2 Joch sind einheitlich, am 3. ist das äussere Drittel abgetrennt, die übrigen sind in mehrere Inseln aufgelöst. Das Schmelz ist typisch wie bei El. meridionalis entwickelt. Das Cement ist reichlich und sehr consistent, die Kaufläche ganz scharf von den Flanken getrennt.

Ein anderer rechter M_3 besitzt x 11 x Joche, davon x 7 angekaut. x 3 Joche sind einheitlich, das 4. ist in drei, die nächsten in mehrere Inseln aufgelöst. Von der Form der Marken und des Emails gilt dasselbe wie oben.

Von Figline im oberen Arnothal stammt ein schon ziemlich stark abgekauter M_3 , der nebst einer vorderen schmelzlosen Fläche von ungefähr 3.5-4 cm Länge noch 11x Joche besitzt. Nur das letzte ist noch nicht angekaut. Die ersten fünf haben einheitliche Marken, das 6. ein abgelöstes äusseres Drittel, am 7. und 8. sind alle drei isolirt, während die nächsten zwei in mehrere ringförmige Inselchen zertheilt sind. Die Abschnürung des mittleren Dritttheiles ist fast überall deutlich zu sehen, das dicke Email ist stark und grob gefältelt, sowie von schwarzer Farbe. Es ist nach Gestaltung der Marken wieder ein typischer El. meridionalis-Zahn.

Von Chiusi, Provinz Siena, befindet sich hier ein sehr kleiner oberer M_3 , von dem es jedoch ungewiss ist, ob er vollständig ist. Doch fehlt ihm wahrscheinlich nur der vordere Talon. Die Zahl der Joche betrüge dann x 10x, von denen x 8 angekaut wären. Marken und Email sind von ganz normaler Entwicklung.

Auch unter den M_2 und M_1 befinden sich Exemplare von auffallend geringen Dimensionen. Zu diesen gehört z. B. ein M_1 , gefunden bei Figline. Er hat die Grösse des am Schädel fragment d erhaltenen Zahnes, ja selbst die mediane Zertheilung der Marken findet sich hier wieder. Er dürfte wohl sicher hieher gerechnet werden können. Er hat $x \otimes x$ Joche, von denen x_4 angekaut sind. Das Schmelz ist nicht besonders dick und fast ohne jede Wellung.

Ebenso dürfte an diese Stelle ein kleiner, oberer, linker M_2 gehören, der bei Monte Carlo, im oberen Arnothal, gefunden wurde. Er zeigt auch in seinem ganzen Habitus die grösste Achnlichkeit mit den Zähnen der Schädel a und c. Die Zahl der Joche beträgt $x \circ x$, von welchen $x \circ 3$ in Gebrauch standen. Nur der Talon bildet eine einheitliche, jedoch unregelmässig verzerrte Marke. An Marke i ist auch das isolirte mittlere Dritttheil noch in seine zwei primären Theile getrennt, die beiden anderen Marken sind noch in kleine, ringförmige Inseln aufgelöst. Der Cementbelag ist sehr reichlich. Das Email ist wieder in seinen äusseren Schichten schwarz gefärbt, eigenthümlich glatt, wie das an den Zähnen der Schädel a, c, d und den zahlreichen Unterkieferzähnen der Fall ist; vorn ist auch eine schwache Wellung angedeutet.

Die im Vorhergehenden beschriebenen Zähne zur besseren Uebersicht in einer Tabelle zusammengestellt, ergeben:

	.1/ ₁				.17,		27						
Jochzahl	26 x	? 8.v	$x \otimes x$	x 10 x	x 10 x	x 9 x	x 12 x	x11 x	x 10 x	? 8 x			
Länge	115	125	131	200	175	195	250	223	170	235			
Breite	65	68	60	80 (70)	77	7.1	50	92	85	()-)			
Höhe			80	_	92	100	100	130	(85)	_			

Die Länge der oberen M_1 schwankt bei El. meridionalis zwischen 160—165 mm, die Breite zwischen 62—66 mm. Was letztere betrifft, ist es für die Molaren unserer vorliegenden Form überhaupt auch charakteristisch, dass sie von M_3 zu M_1 nicht in so bedeutendem Grade abnimmt wie El. meridionalis. Bei letzterem ist der weiteste Unterschied 120:62, die Breite also fast um die Hälfte kleiner, bei ersterer jedoch nur 90:60, die Breite am M_1 also höchstens um ein Drittel kleiner als am M_3 .

Die Länge des M_2 beträgt bei El. meridionalis fast immer mehr als 200 mm, einmal sogar 240 mm; die Breite ist durchschnittlich 80 mm. Letztere erscheint in unserem Falle deshalb ähnlich gross, weil stets ein sehr dicker Cementbelag vorhanden ist.

Der M_3 endlich hat bei *El. meridionalis* eine Länge von 270—320 mm, eine Breite von 100—120 mm.

Als Jochformel unserer vorliegenden Form, soweit sie sich ermitteln liess, ergibt sich daher:

$$\frac{?+?+?+?}{?+x5x+x8x} \cdot \frac{(x8x-?x10x)+(x9x-x10x)+(x10x-x12x)}{?+x5x+x8x}$$

Erwähnt muss dabei auch noch werden, dass an einem linken unteren M_3 x 14 x Joche vorkamen, während aber der dazu gehörige rechte deren nur x 13 x besass.

Zum Schlusse endlich ist es nothwendig, die Stellung dieses Thieres unter den übrigen Elephanten etwas näher zu besprechen. Und da ist es vor Allem *El. meridionalis*, dessen grosse Aehnlichkeit, insbesondere das Gebiss betreffend, zuerst in die Augen springen muss. In der That geht hier die Uebereinstimmung so weit, dass wohl die allermeisten Zähne kaum irgend einen berechtigten Grund an und für sich an die Hand geben würden, sie in irgend einer Weise von den typischen Vorkommnissen abzutrennen. Erst nachdem die Verschiedenheit an anderen Skeletttheilen nachgewiesen war, liessen sich gewisse Differenzen ziemlich constant auch an den Zähnen verfolgen.

Es handelt sich nun vorzüglich darum, welcher Werth kann und darf diesen verschiedenenorts zu Tage getretenen Unterschieden beigemessen werden? Dabei können wohl nur drei Gesichtspunkte in Betracht kommen.

Wenn man die kleinere Statur, den wohl vielleicht auch etwas schwächlicheren Bau, die grosse Aehnlichkeit in den Backenzähnen in Berücksichtigung zieht, so kann wohl sehr leicht die Vermuthung auftauchen, ob man es bei diesen Formen nicht mit weiblichen Thieren des El. meridionalis zu thun habe, dessen männlichen Angehörigen dann jene Schädel A, C und D, sowie die zahlreichen anderen Reste angehören würden? Allein so sehr diese Ansicht für den ersten Anblick auch genügen mag, so zeigte doch bald ein eingehendes Studium, dass eine solche Erklärung wohl kaum befriedigen kann. Auch Nesti¹) war schon geneigt, die bedeutende Variabilität in der Stärke der Stosszähne auf die Verschiedenheit des Geschlechtes zurückzuführen, die sehr viel schmächtigeren Zähne unserer Form also weiblichen Individuen zuzuschreiben. Doch muss dies wohl, wie gesagt, zurückgewiesen werden, weil man da Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Thieren voraussetzen müsste, wie sie wohl bei keinem Säugethier vorkommt.

Man könnte da ferner den Einwand gebrauchen, dass nach dem Vorhergehenden von dem typischen El. meridionalis nur entweder alte Individuen (mit M_3) bekannt seien, oder sehr junge (mit D_3 oder D_2 oder D_1), deren Stellung noch dazu nicht ganz entschieden präcisirt werden konnte dass dagegen die zwei ein Mittelstadium (mit M_1 und M_2) repräsentirenden Schädel d und c der schwächeren Form zugewiesen wurden, die aber möglicherweise bloss eine noch unentwickelte Jugendform des typischen El. meridionalis sein könnten. Doch dies zugegeben — obzwar es mir ganz unerklärlich schiene, dass jener Schädel c, der M_3 schon in der Anlage besitzt, sich binnen der kurzen ihm noch zur Verfügung stehenden Zeit sich zu dem gewaltigen Typus entwickeln könnte — existirt das sehr alte Cranium a, das in gleichalterigem Entwicklungsstadium die vollen Gegensätze einander gegenüberstellt.

Dazu kommt endlich noch, dass man auf eines der erwähnten drei Crania — Cranium D — wegen seines schwächlicheren Baues vielleicht als auf ein weibliches hinweisen kann.

Weiter wäre nun die Frage zu beurtheilen, ob diese Reste nicht etwa eine bestimmte Varietät der typischen Form vorstellen könnten? Diese Frage scheint allerdings mit Hinweis auf die geringen Unterschiede — abgesehen von der Grösse — zwischen den Molaren beider sehr viel Berechtigung für sich zu haben. Doch muss man hiebei im Auge behalten, dass andere Skeletttheile wohl ebenso viel Berücksichtigung erheischen wie die Zähne, denen man vielleicht seit Falconer's mathematischen

¹⁾ Nesti: Lettera sopra alcune ossa etc. Pisa, 1825; St. 203.

Speciesdiagnosen allzuviel absoluten Werth zuzumessen geneigt ist. Sie sind ja natürlich unbestritten sehr wichtige Factoren bei der Systemisirung irgend einer Form, und mit vollem Recht legt man auf sie so grossen Werth, da sie ja doch einer für den Organismus bedeutungsvollsten Function dienen und praktisch dem Paläontologen oft allein nur vorliegen, aber über sie hinaus andere bekannte Merkmale mehr oder weniger zu vernachlässigen, kann für die richtige Erkenntniss einer Form doch nur üble Folgen nach sich ziehen. Auch Falconer legte auf die Beschaffenheit der Molaren ein vielleicht allzugrosses Gewicht, wie er übrigens später auch selbst eingesehen haben musste; überhaupt "tragen seine systematischen Aufstellungen ein zu künstliches Gepräge". 1) So konnte er denn El. insignis und Gancsa nicht gut als distincte Species betrachten, nachdem in den Molaren zumeist gar kein Unterschied zu finden war, wenn auch die Schädelmerkmale sehr weit auseinandergingen. Lydekker nennt El. Ganesa "a species in process of evolution" aus El. insignis und führt sie unter besonderem specifischen Namen an. 2) An einer späteren Stelle 3) bemerkt jedoch Falconer selbst: "On the other hand, in all the welldetermined species, fossil and recent, of which perfect crania are known, we invariably find that the latter gield strongly-marked distinctive characters even when molar teeth are similar." Er führt dies an zum Beweise, dass die verschiedenen indischen Elephanten des Festlandes sowohl, wie der Inseln nur einer Species angehören, und dass den besonders in Schädelmerkmalen hervortretenden Unterschieden nur der Werth von Varietäten zukommt. Die allgemeine Form des Schädels, die Proportion und gegenseitige Anlagerung der einzelnen Knochen desselben seien überall die gleichen und die Abweichungen, wie es scheint, in verschiedener Variation gemengt.

Nicht dasselbe kann jedoch von unserer neuen Form behauptet werden. Die äussere Statur muss eine sehr verschiedene gewesen sein, da der Schädel vollständig andere Umrissformen zeigt und die Grösse bedeutend hinter der des typischen El. meridionalis zurückbleibt. Der Bau des Schädels weist auffallende Abweichungen auf, die Stosszähne sind ganz verschieden gestaltet, und, was das Ausschlaggebendste ist, diese Unterschiede sind nicht etwa die Extreme einer fortlaufenden Variationsreihe, sondern, wie man sich an sehr zahlreichen Resten beider Formen überzeugen kann, einander schroff gegenüberstehende Gegensätze, die durch keine Zwischenglieder verbunden sind. Ich sah in den verschiedenen italienischen Museen eine für Elephanten wohl sehr bedeutende Anzahl von Relicten dieser Arten, Schädel, Schädelfragmente, eine sehr grosse Menge von Stosszähnen, doch nie habe ich irgend ein Exemplar gefunden, das in irgend einer Beziehung einen Uebergang zwischen beiden bilden würde. Stets war entweder die eine Form oder die andere mit allen ihren Charakteren auf's Beste zu erkennen. Und auf diesen Umstand glaube ich hauptsächlich bei der Beurtheilung der Stellung unserer vorliegenden Form grosses Gewicht legen zu müssen. Bei solcher Constanz gewisser wichtigerer Charaktere kann wohl nur schwer mehr von einer blossen Varietät gesprochen werden, solange man das Wort Varietät in dem Sinne gebraucht, wie man es gewöhnlich anzuwenden pflegt. Selbst von einer "im Werden begriffenen" Species kann da nicht mehr die Rede sein.

Ich glaubte daher, durch die angeführten Umstände gezwungen, diese neue Form als eine distincte Species betrachten zu müssen, die ich nach der so überaus charakteristischen Form ihrer Stosszähne Elephas lyrodon nov. spec. benannte.

¹⁾ Ed. Naumann: Ueber japanische Elephanten der Vorzeit. Paläontographica. 28. Bd., Cassel, 1882; S. 6.

²⁾ Lydekker: Siw. and Narb. Proboscidia. Paläont, Ind. Ser. X, Vol. I, Pt. V.; 1880; S. 274 (93). — Naumann (l. c. S. 20) hält nach dem Schädelbau eher einer Annäherung, eventuell Vereinigung des El. Ganesa mit El. bombifrons als mit El. insignis für möglich; doch ist durch die Beschreibung eines neueren Fundes durch Lydekker (Description of a Cranium of Stegodon Ganesa, with notes on the Subgenus and allied forms. Rec. Geol. Surv. India, Vol IX) die Selbstständigkeit ersterer Art wohl zweifellos. Nach Martin wären sie (El. insignis und Ganesa) allerdings wieder am besten zu vereinigen (K. Martin: Ueberreste vorweltlicher Proboscidier von Java und Banka. Beitr. z. Geol. Ostasiens und Australiens in "Sammlungen des geol. Reichsmus, in Leyden", Bd. IV, Heft I, 1884, S. 1—24. Nach einem Referate von Branco in "Neues Jahrb. f. Mineral. etc.", 1885.)

⁸⁾ Pal. Mem. II, S. 259.

4. Elephas antiquus Falconer.

- El. primigenius, plur. ant. (p. p.).
- 1821. El. priscus, Goldfuss (Nova Acta Acad. Leop.-Carol. Nat. Curios. Vol. X, S. 485).
- 1825. El. meridionalis, Nesti (p. p.; Lettere sopra alcune ossa foss. del Valdarno non per anco descritte. Sulla nova specie di Elefante fossile del Valdarno. Pisa 1825; Cranium B).
 - 1846-1847. El. meridionalis, Falconer (Fauna antiqua Sivalensis).
 - 1857. El. meridionalis, Falconer (p. p.; British and European fossil Elephants. Pal. Mem. II, S. 122; Nr. 5 = Cranium B). 1857. El. antiquus, Falconer (Ibid. S. 109; 176).
 - 1867. Leptodon giganteus, aminor, Gunn (Teste Gunn: Geolog. Magaz. Dec. II; Vol. X, 1883, S. 458).
 - 1868. El. Gunnii, Lartet (Teste Gunn: Ibid.).
- 1874. El. intermedius, Jourdan M. S. (Teste Lortet et Chantre: Archives du Mus, d'Histoire natur. de Lyon. T. I; Livr. 3, 1874, S. 79).
 - Nach 1883. El. Ausonius, Major. 1)
- 1884. El. trogontherii, Pohlig (Sitz.-Ber. niederrh. Ges. Bonn. Sitz. v. 5. November 1883; S. 8; sowie: Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch. XXXIX. Bd., 1887, S. 79).

Historisches.

Diese Art wurde von Falconer bekanntlich irrthümlicher Weise auf die Proboscidierreste des Crag begründet, indem er letztere als von dem *El. meridionalis* Nesti Italiens verschieden und diesen mit den jüngeren Vorkommnissen der Norfolkküste und des Thamesthales identisch annahm. In diesem Sinne findet sich auch die Nomenclatur in seinen Tafeln zur "Fauna antiqua Sivalensis". Doch corrigirte er später selbst diesen Missgriff, nachdem er besser erhaltene Originalia der erwähnten italienischen Art, die in London fehlten, in Oxford und dann in Italien selbst gesehen hatte; der Name *El. antiquus* ging auf jene jüngere Form über.

Hatte die Kenntniss der Species des "mittelländischen" Elephanten von Italien her nach England ihren Weg genommen, so fand man hier im Süden alsbald auch, dass jener im Norden entdeckte "alte" Elephant ebenso auch auf Italiens Boden heimisch gewesen war und sich in gewissen Gegenden fast ebenso häufig fand wie im oberen Arnothal El. meridionalis. Nicht dass man früher seine Reste nicht gekannt hätte, man hatte sie wahrscheinlich immer als zu letzterem oder zum Theil zu El. primigenius gehörig betrachtet. So hat Nesti²) selbst schon ein prächtiges Schädelfragment, "enorme di grandezza" (= seinem "Cranium B"), dieser Species unter dem Namen El. meridionalis beschrieben, und selbst Falconer zählt dasselbe noch zu letztgenannter Art, obzwar die beiden erhaltenen Molaren einen Zweifel an seine Zugehörigkeit nicht leicht aufkommen lassen können. Sie tragen den charakteristischen Typus des El. antiquus an sich. Andere hingegen, wie Cuvier, Blainville, Owen, die die specifische Selbstständigkeit des El. meridionalis nicht anerkennen wollten, konnten natürlich um so viel weniger in Resten von El. antiquus eine besondere Art, verschieden von El. primigenius, ersehen.

Als nun aber Falconer's umfassende Studien über die fossilen Elephanten erschienen und er hier unsere in Rede stehende Species aufstellte, konnte wohl nicht leicht mehr ein Zweifel über ihr thatsächliches Vorhandensein auftauchen.

¹⁾ Wann eigentlich diese Species begründet wurde, konnte ich nicht ermitteln. Schon 1875, in seinen "Consider. fauna Mammif. plioc. Toscana" (Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Vol I, fasc. 1), S. 37, spricht er von ihr; sie erhält hier jedoch noch keinen Namen. In dem Verzeichniss vom Jahre 1883 über die Fauna des Arnothales im Quart. Journ. Geol. Soc. London. Vol. XLI, 1885 S. 2, ist sie noch nicht angeführt; desgleichen fehlt sie der Fossilliste derselben Localität in seiner "Tyrrhenis" (Kosmos VII. Jahrg., 13. Bd.), S. 2. Im Jahre 1886 spricht jedoch schon Verri (A. Verri: Boll. Soc. Geol. Ital. Vol. V, 1886, Roma 1887 S. 453) von ihr.

²) Nesti: Lettera sopra alcune ossa fossili del Valdarno non per anco descritte. Sulla nova specie di Elefante fossile del Valdarno. Pisa, 1825, S. 199.

Cocchi¹) betrachtet *El. antiquus* bekanntlich als leitend für sein oberes Pliocän: "L'elefante antico caratteristico del pliocene superiore e di parte almeno del post-pliocene inferiore o antico." Gunn²) sieht ihn als durch unzweifelhafte Uebergänge mit *El. primigenius* verbunden an.

Leith Adams und Duncan.3) halten ihn für identisch mit dem indischen El. Namadicus Falc. u. Cautl.

Schädel.

Das grösste Schädelfragment von El. antiquus, das bisher gefunden wurde, scheint das des Florentiner Museums zu sein.⁴) Falconer erwähnt zwar ein Skelett, bestehend aus Schädel und Unterkiefer, den Wirbeln und Rippen, Femur, Tibia und Fussknochen, gefunden bei Rignano und im Museum zu Rom aufbewahrt, doch ist von diesem Schädel nur die Gaumenpartie mit jederseits M_1 und M_2 , ersterer sehr stark abgekaut, vorhanden.⁵) Dieselbe Collection enthält noch ein anderes Fragment aus dem Tiberschwemmland beim Ponte Molle, das aus den mächtigen Prämaxillaria, dem Gaumen mit zwei sehr zerstörten Zähnen und einem grossen Stück beider Stosszähne besteht.

Das Florentiner Exemplar besitzt wohlerhalten die Occipitalregion, die Maxillaria mit beiden M_3 und die Prämaxillaria mit der Alveolarpartie des rechten Stosszahnes. Das ganze Schädeldach, die beiden Jochbögen, mit Ausnahme des glenoidalen Antheiles des linken, die Orbita und die zwischenliegenden Knochen fehlen. Nach dem vorhandenen letzten Molar ist an der specifischen Zugehörigkeit nicht zu zweifeln. Dieser zeigt eine Länge von 26.5 cm und enthält dabei 15 sichtbare Joche. Der Wurzeltheil des Zahnes ist vom Knochen bedeckt, nur an einer Stelle ist er bis zu einer Höhe von 18 cm freigelegt. Doch ist er offenbar noch höher. Seine vordere Breite beträgt 8.5, seine hintere 7 cm. Das Email ist klein gewellt; die Marken haben, wenn einheitlich, die charakteristische schwach rhomboidale Gestalt, in der Mitte mit ausgezogenen Zipfeln und, wenn noch in Inseln zerlegt, ein mittleres Dritttheil, das die seitlichen an transversaler Ausdehnung bedeutend übertrifft. Es ist dies also ein Molar, typisch für El. antiquus.

Weitaus am charakteristischesten für dieses Schädelfragment sind seine Prämaxillaria. Wenn bei El. meridionalis die beiden Alveolen der Stosszähne einander bedeutend genähert waren und an ihrem Beginne fast ebensoweit auseinander standen wie an der Austrittsstelle der Zähne, so erweitern sie sich hier ganz ausserordentlich in fächerförmiger Weise. Die Plastik des Incisiven, bei El. meridionalis so deutlich schon äusserlich zu sehen, tritt hier fast ganz zurück. Im oberen Theile befindet sich eine breite, flache Grube, ganz verschieden von jener spaltförmigen, tiefgehenden Kluft bei letzterem, welche Grube sich noch dazu gegen vorne fast ganz ausflacht. Die beiden Alveolen sind hier durch eine an 40 cm breite, etwa 7 cm dicke Knochenplatte auseinander gehalten. Der Vorderrand ist bogenförmig gekrümmt und aufgewulstet. Seine grösste Breite in gerader Linie beträgt 95 cm. Ungefähr 65 cm weiter nach aufwärts ist die Breite der Prämaxillaria nur mehr noch die Hälfte. Die Länge ihres frei vorragenden Theiles misst 63 cm, die Dicke der Alveole seitlich an der Stelle, wo sie frei vorzuragen beginnt, 27 cm, an ihrem vorderen Ende etwa 23 cm, an der schmalsten Stelle dazwischen etwa 20 cm. Oben ist das hintere Ende der Alveole freigelegt; sie zeigt hier elliptischen Durchschnitt

¹⁾ Cocchi: L'Uomo fossile, S. 16-17.

²⁾ J. Gunn: Does the Mammoth occur in the forest-bed? Geol. Mag. Dec. II, Vol. X, 1883, S. 456.

³⁾ Quart. Journ. Geol. Soc. London, Bd. XXXIII, 1877, S. 133.

⁴⁾ Ein vielleicht noch besser erhaltenes Exemplar mag der von Mantovani in seinem "Catalogo illustrato delle Collezioni di Storia Naturale del R. Istituto tecnico di Livorno", Livorno, 1883, erwähnte Schädel eines *El. antiquus*, gefunden zu Livorno, sein, dessen jetzigen Aufbewahrungsort ich jedoch nicht kenne. Seine Stosszähne sollen fast 4 m lang gewesen sein.

5) Pal. Mem. II, S. 187.

mit einem kleineren Durchmesser von 13.5 und einem grösseren von ungefähr 17 cm, welch letzterer von innen-hinten nach aussen-vorn liegt.

Von Incisiven ist nur das Alveolarstück des rechten erhalten. Er hat bei seinem Austritt so ziemlich kreisrunden Durchschnitt mit einem Durchmesser von 16 cm.

Bemerkenswerth sind die Umstände des Fehlens des linken Stosszahnes. Er war, wie auch schon ein früherer Autor bemerkt hatte, offenbar bereits während des Lebens abwesend und wahrscheinlich schon ziemlich lange verloren gegangen. Letzteres geht daraus hervor, dass das linke Prämaxillare in seiner Entwicklung bedeutend zurückgeblieben ist. Die Alveole fehlt vollständig. In ihrem oberen Theile, wo sie auf der rechten Seite auch äusserlich von vorne zum Ausdruck gelangt, ist der entsprechende Theil des Prämaxillare viel kleiner, reducirter und mit grosscellulärer Knochenmasse ausgefüllt. Er bildet jedoch auch äusserlich einen bedeutenden Wulst. Der Zahn war vielleicht in früher Jugend vorhanden, ist aber dann sammt der Alveolenhinterwand ausgebrochen worden. Letztere fehlt nämlich gänzlich. Die fächerförmige Ausbreitung verdickt sich nur etwas gegen ihren Seitenrand, dieser ist aber vollkommen gerundet.

Wie bereits erwähnt, ist das linke Prämaxillare gegen das rechte im Wachsthum zurückgeblieben. So nimmt am Vorderrand von den 95 cm seiner Breite 50 das rechte Prämaxillare ein, ebenso entfallen auf dieses weiter oben von den 48 cm Breite 27 cm.

Weitere Masse dieses Schädelfragmentes von ausserordentlicher Grösse sind:

Gesammtbreite der Condylen	30	cm
Höhe der Condylen	15	,,
Obere Breite des Foramen magnum	9.5	"
Untere " " " "		
Höhe von der Ebene der Kaufläche bis zu den Condylen		
Länge vom Hinterrande der Maxillaria (resp. Pterygoidea) bis zur Abtrennung der Incisivalveole	37	,,
Gesammtbreite der Molaren, sammt Gaumen, hinten	28	22
,, ,, ,, ,, vorn		
Entfernung des Hinterhauptscondylus von der Vorderfläche des Schädels, parallel mit der		
Kaufläche der Molaren	83	"
Erhaltene Länge der Prämaxillaria, in der Mittellinie		

Wie bereits zu Anfang erwähnt, befindet sich in der paläontologischen Sammlung der Universität zu Rom ein ziemlich bedeutendes Schädelfragment, bestehend aus den Prämaxillaria, dem Gaumen mit zwei sehr zerstörten Molaren und einem grossen Stück beider Stosszähne, das aber, wie alle Fossilien aus den Alluvien des Tiber und seiner Nebenflüsse, durch den Transport sehr beschädigt wurde. Es zeigt jedoch klar die ungeheuere Verbreiterung der Prämaxillaria gegen vorn, die bedeutende Divergenz der gestreckten Stosszähne, die hier von relativ ganz ausserordentlicher Stärke sind. Obzwar dieser Schädel offenbar kleiner ist als der zu Florenz, so haben doch die Stosszähne 60 cm vor der Alveole einen transversalen Durchmesser von 18 5 cm. Die Molaren sind leider zu sehr verletzt, um etwas Bemerkenswerthes von ihnen sagen zu können. Derselbe ungünstige Erhaltungszustand lässt auch keine sicheren Massabnahmen zu.

Ein kleineres Schädelfragment (Hinterhauptscondylen), gefunden mit anderen Resten (M_3 , Incisiven etc.) dieser Species im Hafen von Livorno, liegt im Museum der Universität von Pisa.

Dieses fragmentäre Vorkommen, insbesondere der Mangel der eigentlichen Cranial- und der Frontalpartie an den vorhandenen Schädeln von El. antiquus, lässt diesen Umstand besonders in Hinsicht auf die Confrontation mit den indischen Elephanten als höchst beklagenswerth erscheinen.

Unter letzteren steht bekanntlich nach jetziger Kenntniss der pleistocäne *El. Namadicus* (Nerbuddathal) dem *El. antiquus*, was die Zahnbildung betrifft, so ausserordentlich nahe, dass Leith Adams die Zähne, die einzig und allein beiderseits vorhanden waren, als überhaupt ununterscheidbar von einander ansieht 1) und die beiden Species zu vereinigen geneigt ist. 2)

Wenn man nun, soweit als es nach den Fragmenten möglich ist, auch die Schädel der indischen Elephanten mit in Vergleich zieht, so ist es wieder nur El. Namadicus, dessen Prämaxillaria, und auf diese muss man sich vorläufig beschränken, eine ganz auffallend ähnliche Bildung zeigen wie bei unserem El. antiquus. Dem Taf. XII A der "Fauna antiqua Sivalensis" abgebildeten prächtigen Schädel fehlt zwar gerade dieser Theil, doch ist er fast vollständig an einem Taf. XXIV A, Fig. 4 und 4a, abgebildeten kleineren Schädel mit fehlender Hinterhauptsregion vorhanden. Und hier ist die Uebereinstimmung fast vollkommen. Es ist dieselbe fächerförmige Ausbreitung der Prämaxillaria, dieselbe seichte und breite Grube, die sich nach vorn zu fast ganz auszuflachen scheint, zwischen den äusserlich verhältnissmässig nur wenig hervortretenden Stosszahnalveolen, die wir schon früher bei El. antiquus zu constatiren hatten und die auch hier ganz ebenso auftritt. Nur ist der Winkel, den Stosszahnalveole und Kaufläche der Molaren bildet, anscheinend etwas grösser (etwa 130°). Doch kann dies auf individuelle Variation oder vielleicht noch besser auf das geringere Alter des von Falconer abgebildeten Individuums zurückzuführen sein. Es besitzt nämlich noch zwei Molaren auf jeder Seite — davon der letzte im Keim — die nach Falconer wahrscheinlich M_1 und M_2 sind. 3)

Einige weitere Unterschiede bestehen zwischen beiden Formen in der Gestalt der Hinterhauptsregion und der Pterygoidea. Die Condylen stehen — in Projection auf die Ebene der Kaufläche — bei El. Namadicus dem Hinterrand des (letzten) Molaren 1) viel näher, daher die Pterygoidea viel steiler aufgerichtet erscheinen als bei El. meridionalis, wo sie eine ziemlich bedeutende Curve bilden; ferner sind die Pterygoidea und damit auch die Maxillaria bei ersterem im Verhältniss zur Länge entschieden höher als bei letzterem, wo hinwiederum das Supraoccipitale offenbar weniger nach vorn geneigt erscheint.

Doch könnte wohl auch dieses immer noch individueller oder vielleicht localer Variation zugeschrieben werden, und man wird daher wohl mit umso grösserem Interesse dem Auffinden eines Schädels mit erhaltener Stirn- und Scheitelregion entgegensehen, als diese bei El. Namadicus in besonders charakteristischer, von den übrigen Elephanten abweichender Weise ausgebildet ist.

Unterkiefer: Von Unterkiefern, die zu El. antiquus gerechnet werden könnten, befindet sich im Museum zu Florenz nur ein einziger, ziemlich vollständig erhaltener — jedoch zahnloser — aus den quarternären Schichten von Maspino im Chianathal. Doch dürfte er vielleicht besser zu El. primigenius gezählt werden. Er besass jederseits zwei Zähne, von denen der hintere jedoch wahrscheinlich noch gar nicht angekaut war. Da man an der inneren Alveolarwand desselben die Eindrücke von 12-14 Jochen sieht, so dürften diese beiden Zähne M_1 und M_2 von El. antiquus, oder dem jugendlichen Aussehen des Kiefers zufolge, besser D_1 und M_1 von El. primigenius sein. Für letztere Ansicht spricht auch der sehr flache und breite Bogen, den die beiden horizontalen Aeste in der Aufsicht bilden. Der Symphysenschnabel liegt nicht in der Verlängerung der Kieferunterfläche, sondern — mastodontenähnlich — etwas oberhalb derselben.

¹) So z. B. in seiner Zusammenfassung der Resultate über El. antiquus (l. c. S. 67): "As to Elephas Namadicus, it seems to me, as far as its dentition extends, to be indistinguishable from Elephas antiquus."

²⁾ Teste Lydekker: Siw. and Narb. Proboscidia. Pal. Ind. X, Vol. I. Pt. V, S. 105 (286).

³⁾ Pal. Mem. I, S. 256.

⁴⁾ F. A. S. Taf. 12 B, Fig. 1-3.

Bezahnung.

Incisiven.

Von Stosszähnen des *El. antiquus* besitzt das Museum zu Florenz keinen. Prachtvolle Exemplare derselben liegen jedoch in den Museen von Pisa und Rom, zwei kleine auch in Neapel, die sämmtliche aus diluvialen Lagerstätten oder jungem Schwemmland stammen.

Viele dieser Zähne sind von ganz ungeheurer Grösse. Sie sind hauptsächlich nur einfach mehr oder weniger intensiv bogenförmig gekrümmt und zeigen meist eine nur geringe Andeutung einer Schraubendrehung, wie sie bei *El. meridionalis* vorkommt.

Ein solcher Stosszahn in Pisa, gefunden mit vier Molaren des typischen *El. antiquus* im Hafen von Livorno, ist ziemlich stark bogenförmig, doch nur sehr wenig in Schraubenform gekrümmt und ist wahrscheinlich in seiner ganzen Länge erhalten. Wenigstens ist seine Pulpahöhle etwa 1 m lang und ihre Wand zu Beginn des Zahnes kaum 1 cm dick. Er ist offenbar ein rechter Zahn; sein Querschnitt annähernd kreisrund.

Totale I	Länge des Zah	ines (er	ıtla	ang	de	er I	ζrü	imi	nu	ng)	388	cm	
Umfang	am hinteren	Ende									58°	5 ,,	
77	in der Mitte										57	5 n	
77	ı m vor der	Spitze	3								46.	5 ,,	

Ein anderer Stosszahn im Museum der Universität zu Pisa stammt gleichfalls aus Livorno (Panchina di Livorno, Lazzaretto San Giacomo [Scuola navale]), zeigt jedoch eine etwas stärkere Schraubendrehung, hiedurch mehr an *El. meridionalis* gemahnend. Er ist zwar etwas kleiner als ersterer, doch noch immer von ganz bedeutender Grösse.

Im Universitäts-Museum von Rom befinden sich mehrere grosse Exemplare von Incisiven des El. antiquus. Drei derselben stammen aus den Alluvien des Aniene, eines Nebenflusses des Tiber, und haben bereits in einer Arbeit R. Meli's Erwähnung 1) gefunden. Die Zähne sind leicht bogenförmig gekrümmt, von einer Schraubendrehung ist fast nichts zu bemerken.

Masse des grössten derselben, der jedoch nicht vollständig ist, sind:

Gesammtlä	änge (entlang	de	Krümm	unş	g)			390	cm	
Grösserer	Durchmesser	am	Grunde					27	"	
Kleinerer	77	"	27				• ,	23	77	
Umfang in	der Mitte							77	11	

In den Alluvien des Ponte Molle, nördlich ausserhalb Roms, wo auch jenes früher erwähnte. Schädelfragment gefunden wurde, fand sich auch ein junger Stosszahn von *El. antiquus*, sowie in denselben Alluvien von Monte Verde ein ungeheures Exemplar eines solchen. Es ist etwa 3.4 m lang und an seiner stärksten Stelle ungefähr 17 cm dick.²)

Zusammen mit dem von Falconer angeführten Skelett eines *El. antrquus* im Museum zu Rom³) wurde in den marinen Pliocänmergeln von Rignano auch ein kleiner Stosszahn desselben jungen Individuums (mit M_1 und M_2) gefunden.

¹) R. Meli: Notizie ed osservationi sui resti organici rinvenuti nei tufi leucitici della Provincia die Roma. R. Comit. Geol. Roma. 1881, S. 17.

²⁾ Clerici, E.: Sulla Corbicula fluminalis dei Dintorni di Roma etc. Boll. Soc. geol. Ital. Vol. VII, 1888. S. 18.

³⁾ Pal. Mem. II, S. 187.

Seine Masse sind:

Länge .							108	cm
Grösserer	Durchmesser	am	Grunde				7 .5	,,
Kleinerer	"	27	55				7.0	22

Stosszähne von ähnlicher Grösse von *El. antiquus*, wie die beiden oben angeführten, erwähnt Mantovani, 1) gefunden im Hafen von Livorno. Sie sollen ebenfalls gegen 4 m lang sein. Es ist mir jedoch unbekannt, wo dieser Schädel, mit dem sie gefunden wurden, jetzt aufbewahrt wird.

Aus dem Museum des technischen Institutes daselbst wird jedoch ²) ein anderes Zahnfragment derselben Species, gefunden in demselben "limo palustre sottostante alla panchina negli scavi della Darsena nuova", angeführt. —

Wohl am besten an dieser Stelle muss auch noch eines weiteren, etwas räthselhaften Zahngebildes gedacht werden, das seit nicht langer Zeit im Museum zu Arezzo aufbewahrt wird. Es ist ein vollkommen gerade gestrecktes Stosszahnfragment aus den dortigen diluvialen Ablagerungen, das in seinem Verlaufe an Stärke nur sehr wenig abnimmt, an beiden Enden abgebrochen ist und ziemlich stark elliptischen Querschnitt besitzt.

Masse desselben sind:

Länge					110 cm
Vorderes Ende	grösserer	Durchmesser	٠	٠	7.8
vorderes Ende	kleinerer	27			7.0 "
Hinteres "	grösserer				8.5 ,
minteres "	kleinerer	**			7.5 "

Das vordere Ende zeigt sich solid, das hintere hatte offenbar eine Höhlung, die aber jetzt mit Gyps ausgefüllt ist. An Knochen- oder Gesteinsfragmenten, die beim Wenden des Zahnes innen auf und ab laufen, erkennt man jedoch, dass sie sich über eine ziemlich beträchtliche Strecke ausdehnen muss, wobei es freilich natürlich dahingestellt bleiben muss, ob sie ursprünglich oder erst durch Verwitterung und Ausbröckelung entstanden ist. Der Zahn ist völlig glatt, mit mehreren Längsrissen versehen, sein Erhaltungszustand sieht beinahe wie recent aus, was aber übrigens auch an anderen Knochenresten derselben Ablagerungen, wie z. B. an einem prachtvoll erhaltenen Rhinozerosschädel des Florentiner Museums, zu bemerken ist. Die Structur stimmt, soweit man sie beobachten kann, vollständig mit der von Elephantenstosszähnen überein.

Ich glaube dieses merkwürdige Gebilde deshalb hier am besten anreihen zu können, weil El. antiquus unter allen den fossilen italienischen Elephanten die gestrecktesten Stosszähne besitzt, ohne erstere jedoch dieser Species zuzählen zu wollen. Die Gestrecktheit, die ausserordentlich geringe Stärkenabnahme bei sehr kleinem Durchmesser lassen sich mit keiner der bis jetzt bekannten Formen vereinigen, dürften sich jedoch vielleicht am besten auf ein junges Individuum einer im erwachsenen Zustand viel grösseren Form mit vielleicht normaler gestalteten Zähnen zurückführen lassen.

Backenzähne.

Decid. 3: Von diesem ist mir bisher kein Exemplar aus mittel- oder süditalienischen Ablagerungen bekannt geworden.

¹⁾ Mantovani: Collezioni di Storia naturale del R. Istituto Tecnico di Livorno. Catalogo Illustrato. Livorno, 1883. S. 13.

200 Weithofer. [94]

Decid. 2: Im Museum zu Florenz befindet sich ein vollständiges, noch wenig angekautes Exemplar von diesem Zahne, sowie ein Bruchstück eines zweiten, die beide in Montetignoso bei Livorno gefunden wurden. Sie sind jedoch sehr schlecht erhalten. Ersterer zeigt augenscheinlich $x \ 7 \ x$ Joche, bei einer Länge von $85 \ \text{mm}$ und einer grössten Breite (am 4. Joche) von $27 \ \text{mm}$. Die Höhe des 4. Joches ist ungefähr $50 \ \text{mm}$. Angekaut sind nur $x \ 3$ Joche, deren Marken in der Mitte deutlich die zipfelförmige Ausbreitung des El. antiquus zeigen.

Schlechter noch ist jenes Bruchstück erhalten, dessen 5. Joch über 50 mm hoch war.

Von Maspino dagegen im Chianathal stammt ein gleichfalls im Museum zu Florenz aufbewahrtes Exemplar eines unteren D_2 . Er besitzt nur $x \ 5 \ x$ Joche und ist bereits bis auf eine Höhe von 8 mm niedergekaut. Seine Breite ist eine im Verhältniss zur Länge sehr beträchtliche, wodurch die Form des Zahnes sehr an den entsprechenden des *El. meridionalis* erinnert, doch ist er noch immer gestreckter als mehrere Exemplare desselben Zahnes von letzteren, die sich hier im Museum befinden. Die Joche sind sehr breit, ihre Form jedoch und die Bildung des Emails vollständig die des *El. antiquus*.

Die Marken besitzen die charakteristischen medianen Zipfel, das Email ist regelmässig und fein gewellt, welche Wellung sich an der Aussenfläche der einzelnen Joche als Längsrunzeln zu erkennen gibt. Der Zahn besitzt zwei wohlerhaltene Wurzeln, von denen die vordere den Talon und ein Joch, die hintere Joch 3—5 trägt, während das 2. Joch über dem Zwischenraum zwischen beiden sich befindet.

Einen weiteren D_2 , sammt dem Unterkieferast, sah ich im Universitäts-Museum von Neapel. Er stammt von Pontecoro im Lirithal (Terra di Lavoro), wo er mit zwei älteren Kiefern, zwei jungen Stosszähnen und Theilen des Skelettes gefunden wurde. Er enthält x 6 x Joche und ist 66 mm lang. Es sind dieselben Reste, die auch schon von Nicolucci mehrfach erwähnt wurden.

Decid. 1: Ein typischer unterer D_1 des El. antiquus befindet sich hier im Museum zu Florenz, der als Fundortsangabe Montopoli im unteren Arnothale trägt. Er zählt x 10 x Joche, die alle schon angekaut sind. Das Email ist fein gewellt, die Marken in der Mitte in Zipfeln ausgezogen; die ersten sechs sind einheitlich, an den letzten vier ist das innere Dritttheil abgetrennt. Der Zahn ist sehr schmal, die Höhe jedoch relativ nicht besonders gross. Doch muss die bedeutende Abkauung in Betracht gezogen werden.

Bemerkenswerth ist an diesem Exemplar die geringe Grösse, insbesondere aber seine sehr geringe Breite, daher der Zahn sehr gestreckt erscheint. Bei Falconer¹) ist die grösste Breite stets mindestens 2 in. = 52 mm. Leith Adams bildet keinen unteren D_1 ab und gibt auch keine neuen Breitenangaben.

Ein unterer D_1 , ebenso schmal wie dieser, befindet sich im Museum zu Rom. Er zählt x 10 x Joche und zeigt alle Charaktere eines El. antiquus. Sein Fundort ist Tor di Quinto, nördlich von Rom, jenseits des Tiber.

¹⁾ Pal. Mem. I, S. 442-443, und Bd. II, S. 179-180.

Länge											145 f	nm
Breite	am	2.	Joch						٠	٠	38	27
**		7.									10	

Derselbe Zahn wird auch von Falconer 1) erwähnt, der ihn jedoch als M_1 bestimmt; doch ist für einen solchen die Länge schon eine sehr geringe, obzwar man auch so kleine M_1 kennt, als insbesondere die Breite, die schon für einen D_1 zu gering war, viel zu klein. Sie beträgt bei M_1 ungefähr 60 mm. Endlich wäre auch die Jochzahl x 10 x für einen unteren M_1 wohl das allergeringste Minimum.

Ein anderer D_1 , gleichfalls im Museum zu Rom, zählt nur $x \ 8 \ x$ Joche; doch ist er jedenfalls nicht vollständig. Er stammt aus den Alluvien des Aniene, eines Nebenflusses des Tiber.

Die volle Breite der englischen Exemplare zeigt ein unterer D_1 im Museum von Arezzo. Er hat $x \circ x$ Joche und trägt die Fundortangabe: Valdarno superiore, pliocene lacustre.

Im Allgemeinen ist über die Milchzähne, den englischen Vorkommnissen gegenüber, nur das Vorkommen von x 5 x Jochen an einem unteren D_2 zu bemerken, während die kleinste Zahl bei ersteren x 6 x beträgt, sowie die sehr geringe Breite vieler D_1 .

Molar 1: Konnte schon Leith Adams trotz des gewiss reichen Materiales von Zähnen des El. antiquus, das ihm bei seinen Untersuchungen zu Gebote stand, nicht umhin, an mehreren Orten zu gestehen, dass eine sichere Diagnose, ob letzter Milchzahn oder erster wahrer Molar, in vielen Fällen bei den vielfach übereinstimmenden Charakteren beider unmöglich sei, so muss dies natürlich umsomehr der Fall sein, wenn nur vereinzelnte Zähne oder gar blos Bruchstücke oder stark abgekaute Exemplare derselben zur Verfügung stehen. Irrthümer werden dann wohl nur schwer zu vermeiden sein.

Im hiesigen Museum befindet sich ein Bruchstück eines Backenzahnes, das wohl als Theil eines M_1 gedeutet werden kann. Es zeigt sechs und ein halbes Joch bei einer Länge von 9 cm und einer grössten Breite (am 6. Joche) von 58 mm. Letztere insbesondere dürfte für einen D_1 zu gross sein. Die Marken zeigen alle Charaktere eines El. antiquus: Dünnes, kleingewelltes Email, die charakteristische, schwachrhomboidale Dilatation gegen die Mitte mit dem zipfelförmigen Vorsprung ebendaselbst, so dass ein Zweifel an der specifischen Bestimmung nicht leicht möglich ist. Als Fundortsangabe besitzt dieses Exemplar: Pliocene lacustre presso Figline, Valdarno superiore.

Ein anderes Exemplar (Taf. XII, Fig. 3), wohl sicher auch ein M_1 , und zwar des Oberkiefers, wurde bei Hafenarbeiten in Livorno zu Tage gefördert, bei welchen Gelegenheiten schon viele Reste dieser Elephantenart angetroffen wurden. Es ist stark abgekaut und besitzt 10 x Joche. Vom vordersten ist jedoch nicht mehr viel vorhanden, das auch an drei Stellen schon mit dem nachfolgenden vereinigt ist. Dieses steht eben im Begriffe, durch eine schmale Brücke sich mit dem dritten Joche zu verbinden. Die übrigen Marken sind selbstständig und einheitlich, nur der Talon in drei Inseln aufgelöst. Das Schmelzblech ist sehr innig gewellt, die Marken verbreitern sich allmälig gegen innen, besitzen hier jedoch nicht jenen charakteristischen Sporn, den ich bei so ziemlich allen italienischen Zähnen dieser

¹⁾ Pal. Mem. II, S. 183.

Art bemerken konnte. An Leith Adams' und Falconer's Figuren englischer Exemplare fehlt er jedoch anscheinend ziemlich oft. Bis zum letzten Joche nimmt die Höhe derselben stets zu, der Talon nimmt jedoch erst vor halber Höhe des letzten seinen Ursprung, tritt dann aber nach hinten sammt seinem grossen Cementansatz stark vor. Es beruht dies jedenfalls auf der Pression des nachdrängenden M_2 .

Ein M_1 des Unterkiefers liegt im Museum zu Arezzo und stammt aus den postpliocänen Ablagerungen derselben Gegend. Er enthält x 10 x Joche, auch der hintere Talon ist schon von der Usur ergriffen. Das Schmelz ist ziemlich dick, durchaus gefaltet und in der Mitte der rhomboidalen Marken zipfelförmig ausgezogen.

Die auffallend grosse Breite hat darin ihren Grund, dass an diesem Zahn der Cementbelag ausserordentlich reichlich ist. Die eigentliche Breite des 8. Joches beträgt nur 60 mm.

Dasselbe Museum enthält auch noch einen anderen Zahn, der wahrscheinlich gleichfalls als M_1 zu deuten ist. Er stammt nach seiner Etiquette aus dem Süsswasserpliocän des oberen Arnothales, Provinz Arezzo, und zeigt nur $x \, 8 \, x$ Joche; doch mag eines verloren gegangen sein. Das Email ist wieder ziemlich dick, durchaus gefaltet.

Die Breite nimmt von der Mitte nach beiden Seiten zu ab.

An dem Schädelfragment, das zu dem von Falconer 1) erwähnten Skelette gehört, sind jederseits zwei Molaren vorhanden, die wohl als D_1 und M_1 , kaum als M_1 und M_2 gedeutet werden können. Von dem vorderen Backenzahne sind nur noch $5\,x$ Joche vorhanden. Seine Breite ist 63 mm; das Schmelz ist dünn, fein gewellt, die Marken offen. Der dahinterstehende, von der Usur noch nicht ganz ergriffene Molar enthält x 12 x Joche; neun derselben sind erst angekaut. Davon besitzen drei einheitliche Marken, drei sind in je drei, die übrigen in zahlreiche Inseln aufgelöst. Diese starke Fingerung ist etwas für El. antiquus Ungewöhnliches. Bei den in je drei Theile getheilten Marken ist der mittlere bedeutend grösser als die seitlichen, was im Gegensatz zu El. meridionalis wieder für El. antiquus charakteristisch ist. Das Schmelz ist dünn, sehr stark gefaltet, der Cementbelag massig. Masse dieses M_1 sind:

Mit diesem Schädelfragment wurden, nebst Skelettknochen, auch die beiden Unterkiefer gefunden. Gemäss dem allgemeinen Befund, dass die Zähne des Unterkiefers in der Abkauung denen des Ober-

¹) Pal. Mem. II, S. 187.

kiefers etwas voraus sind, ist hier der vordere Backenzahn (jedenfalls D_1) etwas stärker abgenützt. Es sind nur noch drei und ein halbes Joch im Ganzen vorhanden, die sämmtliche schon mit einander verschmolzen sind, so dass sie zwei gezackte Linien bilden, die hinten verbunden sind. Der M_1 enthält x 12 x sichtbare Joche, doch ist sein hinterer Theil von Knochenmasse noch bedeckt, so dass es nicht unmöglich ist, dass hier noch ein weiteres Joch zum Vorschein kommen könnte. Es ist sogar wahrscheinlich. Auch dieser Zahn ist in der Usur weiter vorgeschritten als sein Antagonist im Oberkiefer. x 3 Joche besitzen einheitliche Marken, das 4. besteht aus zwei Inseln, indem das äussere Dritttheil, das wir auch bei El. meridionalis stets zuletzt erst verschmelzen sahen, noch frei ist. Joch 5 und 6 enthält je drei Inseln, die nächsten 5 Joche deren zahlreiche. Im Ganzen sind also bereits 11 Joche angekaut. Die Höhe des Zahnes, die am Oberkiefer durch einen Bruch blossgelegt war, ist hier nicht zu sehen.

Dieses Skelett wurde in den marinen, pliocänen Thonen von Rignano am Fusse des Soracte gefunden. 1)

Molar 2: Im Museum zu Florenz ist ein frisch angekauter, ganzer oberer Backenzahn eines El. antiquus aufbewahrt, der jedenfalls ein M_2 ist. Er besitzt x 12 x Joche, von denen sechs im Gebrauch standen. Nur das letzte von diesen ist in mehrere kleine Inseln aufgelöst. Diese sehr leichte Zerschlitzung der Joche ist für El. antiquus im Gegensatz zu El. meridionalis bezeichnend. Das Email ist verhältnissmässig dick, sehr innig und klein gewellt, die Marken wieder von der charakteristischen, schwachrhomboidalen Form mit medianen Zipfeln. Dass die feine Wellung des Schmelzbleches auf der Oberfläche der Joche als schwache Rippen und Furchen zum Vorschein kommt, wurde bereits früher erwähnt.

Ein bemerkenswerthes Exemplar eines unteren M_2 enthält das Museum von Arezzo. Es ist ein linker Zahn, der sammt einem Symphysenfragment erhalten ist. Er weist zwar nur 9 x Joche auf, doch ist er nicht vollständig. Ihn als M_1 aufzufassen, verbietet seine bedeutende Grösse. Seine grösste Breite befindet sich am 5.—6. Joche; von da nimmt er nach vorn zu, wie nach hinten sehr beträchtlich ab. Der Cementbelag ist sehr stark, die Form der Kaufläche gleicht überhaupt sehr der eines El. meridionalis. Die Marken sind zwar transversal von ansehnlicher Breite, gleichen jedoch denen des El. antiquus: Sie erweitern sich gegen die Mitte zu allmälig und stetig und besitzen hier zipfelförmige Vorsprünge, wenn letztere auch nicht so deutlich wie gewöhnlich ausgeprägt sind. Es ist dies jedenfalls ein für El. antiquus abnormer Zahn.

Molar 3: Ein rechter Backenzahn ist sammt einem Gaumenfragment erhalten und stammt angeblich aus pliocänen Schichten eines Tunnelbaues bei Malafrasca, Provinz Arezzo. Der Zahn ist vorn nicht vollständig und zeigt 15 x Joche. Doch dürfte vorn vielleicht nur ein Talon noch vorhanden gewesen sein. Sämmtliche Joche, bis auf die zwei letzten, sind bereits angekaut. Nur die letzten

¹) Siehe G. Ponzi: Le Ossa fossili subapennine dei dintorni di Roma, Mem. R. Accad, dei Lincei. Ser. 3, Vol. II, 1878, S. 6 und 22 des Separatabzuges.

drei sind in Inseln aufgelöst, wobei die mittlere die breiteste ist. Marke 1 ist zerstört, Marke 2—5 hat fast parallele Vorder- und Hinterränder, die übrigen erweitern sich nur wenig gegen die Mitte. Alle besitzen jedoch hier die bezeichnenden Zipfel des *El. antiquus*. Das Email ist klein und regelmässig gefaltet.

Für einen M_3 ist hier die Länge zu gering; die Jochzahl beträgt wohl 15, doch ist das letzte sehr klein, der Talon besteht nur aus zwei kurzen, fingerförmigen Säulchen. Die Höhe der Joche nimmt ferner anscheinend erst an den letzten zwei sehr rasch ab, was bei einem M_3 nicht vorzukommen pflegt, wohl aber bei M_2 . Bei ersterem pflegt die Höhe langsamer abzunehmen. Es lassen sich daher gegen eine Bestimmung als M_3 einige Bedenken äussern; man müsste denn annehmen, dass man hier den Rest eines sehr grossen Zahnes vor sich habe.

Ein anderer Molar, dessen genauere Bestimmung auch dahingestellt bleiben soll, soll ebenfalls aus lacustren Pliocän-Ablagerungen des oberen Arnothales stammen. Eine genauere Angabe fehlt. Er zählt 12 x Joche und ist von der Verwitterung ziemlich stark angegriffen. Die Joche besitzen das klein und regelmässig gewellte Schmelzblech, die gegen die Mitte zu allmälig erweiterten Marken mit jenen zipfelförmigen medianen Erweiterungen. Der Zahn erhält ferner dadurch ein eigenthümliches Aussehen, dass die Joche bei der Abkauung sehr schief getroffen wurden, eine Abnormität der Usur, die man auch bei El. meridionalis und anderen finden kann.

Auch bei diesem Zahn ist es die Bildung der letzten Joche, die ihn als M_3 zweifelhaft erscheinen lassen und mehr an einen M_2 gemahnen.

Zweifellose M_3 wurden schon bei Gelegenheit der Beschreibung des grossen Schädelfragmentes von El. antiquus im Florentiner Museum, das auch aus dem lacustren Pliocän des oberen Arnothales stammen soll, genauer erwähnt.

Ein weiterer oberer M_3 von ganz ungeheuerer Grösse wird ebendaselbst aufbewahrt und trägt als Fundortangabe: Sansino bei Maspino, Prov. Arezzo; Pliocän. Die Jochzahl ist wenigstens x 18 x. Leider ist er sehr ungünstig erhalten. Doch die Form der Marken, die Bildung des Emailes — soweit überhaupt sichtbar — die bedeutende Höhe lassen ihn unverkennbar als einem El. antiquus angehörig erscheinen.

Ausser diesem riesigen Zahne besitzt das Museum zu Florenz noch zwei kleinere, doch viel besser erhaltene, einen linken und einen rechten, die zwar, zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Gelegenheiten erworben, ganz gut demselben Individuum angehört haben könnten. Auch die angegebenen Fundorte sind verschieden, doch nahe bei einander in der Nähe von Montioni in der Provinz Arezzo gelegen. Sie stammen aus quarternären Ablagerungen. Beide sind hinten leider nicht vollständig; der rechte besitzt x 13 Joche, der linke x 12, wobei jedoch vom 13. Joch noch ein Stück

anhaftet. Der Erhaltungszustand ist vollkommen der gleiche: Cement ist nur an der Spitze der Krone vorhanden, unten ist es ausgewittert. Es ist von lichtbrauner Farbe, während die Schmelzbüchsen schwarz sind. Je x6 Joche sind angekaut, die letzten drei noch in Inseln aufgelöst; auch an dem dritten ist das äussere Dritttheil noch isolirt. Das Schmelz ist reich gefältelt, die Form der Marken jedoch nicht so regelmässig wie gewöhnlich.

Fast den gleichen Erhaltungszustand bietet auch ein linker unterer M_3 aus dem Chianathal (postpliocän). Auch er hat das gleiche schwarze Email, das stark ausgewitterte Cement von lichtbrauner Färbung wie früher und acht angekaute Joche; das Email ist intensiv gefältelt, die Marken gegen die Mitte allmälig erweitert, jedoch mit undeutlichen Zipfeln. Die erste ist in zwei gleich grosse Inseln getheilt, die nächsten drei sind einheitlich, die fünfte und sechste ist in je drei Inseln aufgelöst, von denen die mittlere in bezeichnender Weise mehr als dreimal grösser ist als jede der seitlichen. Vorhanden sind im Ganzen x 13 Joche; hinten fehlt jedoch noch ein Stück.

Gleichfalls aus dem Chianathal stammen zwei untere M_3 (Taf. XII, Fig. 2 u. 2a), die jedenfalls demselben Thiere angehört hatten. Sie sind beide auffallend gut erhalten und mit einer ziemlich starken, glänzenden, fast porzellanartigen Cementschichte bedeckt. Der rechte zählt x 17 x Joche, der linke jedoch nur x 16 x; an letzterem trägt der vordere, wie stets, isolirte Wurzelast x 2 Joche, an ersterem jedoch x 3. Schmelzblech und Marken sind normal gebildet, auch hier ist es das äussere Dritttheil, das am längsten isolirt bleibt.

Im Gypsabguss liegt mir auch ein von Anca und Gemmellaro 1) schon beschriebener und abgebildeter, rechter, unterer M_3 mit einem anhaftenden $Pecten\ \mathcal{F}acobwus\ L$. vor, der mit den Festlandsexemplaren vollständig übereinstimmt. Bemerkenswerth ist an ihm die lang andauernde Theilung der Marken. Die Reihenfolge der Vereinigung ist auch hier die schon öfter erwähnte. Die Krone enthält auf 180 mm 12 Joche. Die Breite am 2. Joche ist 65 mm, die (geradlinig gemessene) Höhe des 8. Joches 130 mm.

Endlich müssen aus dem Museum zu Florenz noch zwei, jedenfalls zusammengehörige untere letzte Molaren namhaft gemacht werden, die bei San Romano in pliocänen Schichten des unteren Arnothales gefunden wurden (Taf. XII, Fig. 1 u. 1 a). Sie zeichnen sich durch eine ausserordentliche Grösse aus und sind bis auf eine Verletzung ihres vordersten Theiles wohl erhalten. Die Zahl der Joche beträgt 18 x oder 19 x, je nachdem, was man als hinteren Talon ansehen will. Davon sind 13 Joche angekaut; das vorderste, nur zur Hälfte erhalten, verfliesst bereits mit dem zweiten. Bis inclusive zum 7. Joche sind die Marken einheitlich, das achte zeigt das äussere Dritttheil, 9—11 auch noch das innere abgetrennt — wobei das mittlere weitaus das grösste — von Joch 12 sind erst vier,

¹⁾ Fr. Anca e G. G. Gemmellaro: Monografia degli Elefanti fossili di Sicilia. Palermo, 1867. S. 9, Taf. I, Fig. 5.

von Joch 13 erst zwei der fingerförmigen Endigungen von der Usur ergriffen. Die Marken zeigen in ausgezeichneter Weise die leicht rhomboidale Form mit den medianen Zipfeln, welch letztere zwischen benachbarten Jochen hinten noch ziemlich weit von einander abstehen, nach vorne zu sich allmälig nähern, berühren und, wie erwähnt, zwischen den beiden ersten Jochen bereits zu einer Vereinigung der Marken geführt haben. Die seitlichen Enden der Marken sind vorne wohl und breit gerundet, in der Mitte der Kaufläche findet eine ziemlich beträchtliche Abknickung derselben nach vorne statt, die letzten 4–5 haben ihre Charaktere in dieser Beziehung noch nicht zur Entwicklung gebracht. Diese Abbiegung der Seitenhörner der Marken findet auch an den früher beschriebenen Molaren von El. antiquus statt, wie sie denn, in mehr oder minder intensiver Ausbildung oder vielleicht blos nur Andeutung bei allen Elephanten — zuweilen selbst auch Stegodonten — an den Unterkiefermolaren zu sehen ist. An den Oberkieferzähnen findet im Allgemeinen das Verkehrte statt. Das Email unseres in Rede stehenden Zahnes zeigt die charakteristische kleine Fältelung, bei der die Amplitude der einzelnen Welle geringer ist, als die Dicke des Schmelzbleches.

Die Joche stehen etwas schief zur Längsachse des Zahnes; daher die Verschiedenheit zwischen Kronenbreite und Jochbreite. Der Zahn stimmt in seiner Grösse und Form so ziemlich mit einem von Falconer in seiner "Fauna antiqua Sivalensis" 1) abgebildeten unteren M_{3} von El. Namadicus überein.

Ein linker unterer M_3 , in Form und Gestalt ähnlich dem soeben beschriebenen Paare, befindet sich im Museum der Universität von Pisa. Er stammt aus derselben Gegend, S. Romano im unteren Arnothal, ist jedoch bedeutend kleiner. Er liegt mir auch im Gypsabguss vor. Die Zahl der Joche ist 15 x, wobei vorn noch der Rest eines weiteren Joches zu sehen ist. Die Marken zeigen ganz ausgezeichnet die rhomboidale Form mit den medianen Zipfeln, die Seitenhörner dieselbe Beschaffenheit — wenn auch schon viel weniger deutlich — wie früher. Die ersten sechs Marken sind einheitlich, die nächsten drei in je drei Inseln zerlegt; vom 10. Joche sind erst die mittleren "Finger" angekaut. Das Email ist intensiv und klein gewellt.

Bezüglich dieser beiden Reste wurde von Forsyth Major die Ansicht ausgesprochen, dass sie einer noch unbeschriebenen Form angehören ²), die er späterhin *El. ausonius* benennt. Ich glaube jedoch nicht, dass sie etwas Anderes wären, als eine der vielen Variationen des *El. antiquus*. Es ist ja eine bekannte Thatsache, wie überaus veränderliche Gebilde Elephantenmolaren sind, und auf wie überaus schwachen Füssen alle jene blos auf einzelne Zähne begründeten Species stehen, von denen einige schon ihrem begründeten Schicksal anheimgefallen sind.

Zahlreiche Zähne von El. antiquus befinden sich im Museum von Arezzo, unter denen unter Anderem ein Paar M_3 , die sammt dem ganzen Kiefer erhalten sind, genannt zu werden verdienen. Es sind typische Exemplare mit etwas rhomboidalen, in der Mitte zipfelförmig ausgezogenen Marken;

¹⁾ F. A. S. Taf. 12 C, Fig. 4 und 4 a.

²) Forsyth Major: Considerazioni sulla fauna dei Mammiferi plioc, e post-plioc, della Toscana. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa, 1875; Vol. I, fasc. 1, S. 37.

nur die letzten drei Joche sind in Inseln aufgelöst. Im Ganzen sind x 15 x Joche vorhanden; es ist jedoch nicht sicher, ob der Zahn ganz ist.

Die Symphysis fällt steil ab und hat in der Schlucht eine horizontale Breite von 14 cm in sagittaler Richtung. Der Kiefer wurde bei Montioni (Provinz Arezzo) gefunden.

Ein anderer, ebendaselbst aufbewahrter, doch oberer M_3 enthält x 15 x Joche und stammt gleichfalls aus den quarternären Ablagerungen der Provinz Arezzo. x 13 Joche sind angekaut, davon jedoch nur die letzten zwei in Inseln aufgelöst.

Im Museum der Universität zu Rom befindet sich ein rechter unterer M_3 von Grillo bei Monterotondo im Tiberthal, der x 18? Joche zeigt; doch sieht man am Hinterende noch den Rest eines weiteren Joches.

Ein sehr bemerkenswerther Zahn ist jener auch schon von Falconer 1) als höchst merkwürdig bezeichneter Molar im Museum zu Rom, den er nach langen Zweifeln endlich als letzten M_3 eines El. antiquus bestimmt hatte. Der Zahn ist in der That sehr breit, die Wellung des dicken Schmelzes unregelmässig und insbesondere gleichen die hinteren Marken ziemlich denen eines El. meridionalis; doch sind die medianen Zipfel wohl zu sehen und das mittlere Dritttheil der noch in Inseln aufgelösten Joche mehr als doppelt so gross als die seitlichen. Jene rhomboidale Form ist nur an den vordersten Marken deutlich zu sehen, die ja auch Falconer unter Anderen vermuthen liess, einen El. priscus vor sich zu haben. Doch ist hier wohl an der Bestimmung als El. antiquus ein Zweifel nicht gut möglich.

Als sehr zweiselhast zu El. antiquus gehörig muss jedoch ein andere Zahn ebendaselbst angesehen werden. Er stammt wahrscheinlich, wie zahlreiche andere Reste, von El. meridionalis, antiquus und primigenius, aus den Alluvien des Tiberslusses. Es ist ein oberer $M(\mathfrak{g}^2)$; er hat in der Seitenansicht sehr dicke Joche und ist sehr niedrig. Die Marken sind jedoch schmal und stark gefältelt. Er dürste jedoch trotzdem zu El. meridionalis gerechnet werden müssen. Jene eigenthümlich rhomboidale Form der Marken des El. antiquus sehlt, desgleichen die medianen Zipseln, dann ist der Zahn sehr breit. Es scheint jene Abänderung des El. meridionalis mit den schmalen Marken, mit dünnem, stark gefaltetem Email zu sein. Die Zahl der Joche ist sehr klein, ? ? x; vorn besindet sich noch ein Fragment eines weiteren, der Zahn ist offenbar nicht vollständig. Auch das letzte Joch ist schon angekaut, und in diesem Zustande sinden sich bei El. meridionalis am letzten oberen Molar immer nur mehr noch 7-10 Joche. Allerdings sehr bedeutend für letzteren ist die Höhe.

Ein unterer Backenzahn von ganz ausserordentlicher Grösse wird von Fortis²) abgebildet. Er stammt von Romagnano im Veronesischen und zählt nach dem Autor 18 Joche, wobei der Zahn

¹⁾ Pal. Mem. II, S. 185-186.

²⁾ Alb. Fortis: Delle Ossa d'Elefanti e d'altre Curiosità naturali de' Monti di Romagnano nel Veronese. Vicenza, 1786.

jedoch hinten noch unvollständig ist. Nach der Abbildung sind die Joche dick, der Zahn überhaupt sehr massiv, seine Höhe jedoch für *El. meridionalis* viel zu gross und vollkommen der des *El. antiquus* entsprechend. Mit letzterem aber wieder nicht übereinstimmend ist die Faltenlosigkeit und anscheinende Dicke des Emailes, sofern man bei der rohen Zeichnung darauf ein Gewicht legen kann. Die Höhe und Jochzahl sprechen aber entschieden für einen *El. antiquus*.

Wenn nach dem Vorhergehenden auch einzelne Zähne in der Unterscheidung zwischen El. antiquus und El. meridionalis Schwierigkeiten bieten, so ist doch in weitaus den meisten Fällen eine Verwechslung derselben nicht leicht möglich. Schon die Zahnformel, die bei beiden sehr verschieden ist, gibt ein gutes Mittel in die Hand, sie auseinanderzuhalten; weiter sind jedoch bei El. meridionalis die Zähne viel massiver, breiter und niedriger, während sie bei El. antiquus, selbst bei den breitkronigen der englischen Vorkommnisse, viel schmäler, schlanker und besonders höher sind. Die Joche sind ferner bei ersterem in sagittaler Richtung stärker, wenn dieser Unterschied auch weitaus nicht so hervortretend und allgemein ist, als man ihn gemeiniglich hinzustellen pflegt. Besonders bei Seitenansicht der Zähne würde hier selbst das geübteste Auge, wenn ihm nur die Dicke der Joche zur Beobachtung steht, wohl oft in sehr grobe Irrthümer verfallen. Viel charakteristischer und bezeichnender sind hingegen wieder die Form der Marken und die Bildung des Schmelzbleches. Erstere werden bei El. antiquus im Allgemeinen viel früher einheitlich, indem die "Fingerung" der Joche, die Auflösung und Zertheilung ihrer Platten nach oben in fingerförmige Säulchen, viel weniger weit heruntergreift als bei El. meridionalis. Bei letzterem erscheinen daher fast stets mehr der hinteren Joche in Inseln aufgelöst als bei dem zuerst genannten. Aber auch an diesen Inseln kann man einen so ziemlich durchgreifenden Unterschied zwischen beiden Formen beobachten. Nach den ersten Stadien der Ankauung treten eine ganze Reihe, 4-8, solcher kleiner, ringförmiger Inselchen auf, die bald zu vier und weiter durch Vereinigung der mittleren zwei zu drei grösseren Inseln verschmelzen. In vielen Fällen treten iedoch von Anfang an blos vier auf. Unter diesen drei Inseln ist nun bei El. antiquus die mittlere weitaus die grösste, zweimal, oft dreimal so gross als jede der seitlichen, während sie bei El. meridionalis in den meisten Fällen bedeutend kleiner oder höchstens annähernd so gross ist als die letzteren. Ich habe nur sehr wenige Ausnahmen von dieser Regel beobachten können.

Bei weiterer Usur verschmilzt jedoch diese grosse Mittelinsel bei *El. antiquus* viel inniger mit den seitlichen als bei *El. meridionalis*, bei welchem eine Incisur der Marke an der ehemaligen Vereinigungsstelle dieser Inseln noch bestehen bleibt, wenn das Joch auch schon sehr tief herabgekaut erscheint. Die frühere Mittelinsel bildet dann stets in der Mitte der Marke eine breite Ausbauchung, ganz im Gegensatz zu *El. antiquus*, wo die Marken, wenn sie einheitlich geworden, von der Seite medianwärts allmälig an Breite zunehmen und dadurch eine schwach-rhomboidale Figur bilden und dann in der Mitte plötzlich zipfelförmig vorspringen. Dies ist die typische Entwicklung. Doch verschwindet, wenn auch selten, auch bei *El. meridionalis* manchmal die seitliche Einschnürung, oft kann in der Mitte eine der unregelmässigen groben Falten die Gestalt jenes medianen Zipfels annehmen, so dass einzelne Joche, isolirt gefunden, in der Deutung oft Schwierigkeiten bereiten könnten. Doch sah ich eine solche Annäherung an die Form des *El. antiquus* nie an allen Marken eines Zahnes von *El. meridionalis* stattfinden; stets waren es höchstens einige wenige, und auch bei denen meist blos in einzelnen Merkmalen.

Beiden Formen, wie überhaupt den meisten Elephanten gemeinsam ist die convexe Krümmung nach vorn an den Marken der Oberkiefermolaren und die verkehrte Biegung an denen der Unterkieferzähne. Oft ist sie sehr schwach ausgeprägt, oft nur durch eine geringe Abbiegung der Seitenhörner der Marken angedeutet, aber sehr selten sind die Fälle, wo sie an keinem Joche zu bemerken ist oder vielleicht gar der verkehrten Krümmung Platz macht. Bei El. antiquus sah ich letzteres

nie, nur ein- oder zweimal bei *El. meridionalis*. Bei ersterem ist eine deutliche und etwas stärkere Krümmung der ganzen Marke überhaupt seltener zu beobachten, meist beschränkt sie sich hier auf eine, oft aber dafür sehr energische Abknickung der seitlichen Enden.

Auch in der Beschaffenheit des Schmelzbleches ist zwischen beiden Elephanten ein ziemlich bedeutender Unterschied. Bei El. antiquus ist es im Allgemeinen dünner als bei El. meridionalis. Doch nur im Allgemeinen; denn oft ist es bei letzterem so dünn, dass es von ersterem an Dicke erheblich überholt wird. Uebrigens sah ich Zähne von El. antiquus, die es auch mit dem normalen Typus von El. meridionalis in dieser Hinsicht aufnehmen konnten. Allerdings gibt es dabei auch wieder Zähne von letzterem, die ein mehr als zweimal so starkes Email besitzen als El. antiquus. Sehr charakteristisch sind auch die Faltungen des Schmelzbleches für beide Formen. Bei dem zuletzt genannten ist es meist klein und mehr gleichmässig gewellt, während bei El. meridionalis diese kleinen Fältelungen, deren Schwingungsweite meist kleiner ist als die Dicke des Schmelzes, oft ganz fehlen oder sehr zurücktreten, und das oft wulstige Email fast stets von grossen, groben, unregelmässigen Falten verzerrt wird.

In weitaus den meisten Fällen sind daher Zähne des *El. antiquus* sehr gut und sicher von solchen des *El. meridionalis* zu unterscheiden, wenn auch die sehr bedeutende Variabilität ein Uebergreifen einzelner oder sogar auch mehrerer Merkmale aus den Grenzen des einen in das Gebiet des anderen oft stattfinden lässt.

Wie überall bei den Elephanten, sind auch bei El. antiquus die Molaren des Oberkiefers meist bedeutend breiter und auch massiver gebaut als die des Unterkiefers, was natürlich bei Bestimmung der Variabilitätsgrenzen sehr zu beachten ist. So unterscheidet z. B. Leith Adams 1) unter den M_3 dieses Elephanten drei Varietäten: Varietät zl mit breiten Kronen und dicht gedrängten, medial nicht wesentlich erweiterten Jochen, welche Zähne dann, fragmentär erhalten, zu Verwechslungen mit El. meridionalis Anlass geben können; weiter die in britischen Lagern zumeist vorkommende Varietät B mit langen, schmalen und oft sehr gekrümmten Kronen und endlich Varietät C (Falconer's El. priscus) mit dicken Jochen und meist sehr stark ausgeprägter medianer Erweiterung der Marken

Es ist entschieden richtig, dass diese Abänderungen vorkommen; doch muss man dabei im Auge behalten, dass die von Leith Adams zu ersterer Varietät gezählten fast nur Oberkieferexemplare sind, während unter Varietät B mit schmalen Kronen nur untere Molaren angeführt erscheinen. Dadurch wird natürlich die Schwankungsweite viel mehr ausgedehnt, als sie wohl in Wirklichkeit ist. Unter den italienischen Vorkommnissen sind fast nur schmale Kronen vertreten. Jene erwähnten Exemplare mit etwas breiteren Jochen können wohl nur als Abnormitäten, nicht aber als eigentliche Varietäten — in dem Sinne, wie man dieses Wort gewöhnlich zu gebrauchen pflegt — betrachtet werden. Noch viel weniger berechtigen sie aber wohl dazu, vom Vorhandensein von Uebergangsformen zwischen El. antiquus und El. meridionalis zu sprechen.

Die Varietät B mit den langen, schmalen Kronen kann ferner nach Leith Adams "be without difficulty, traced in a series towards the third variety, to which Falconer assigned the name of El. priscus, from its close agreement with the tooth of El. Africanus. (2) In ähnlicher Weise sind offenbar nun auch die von Forsyth Major El. Ausonius genannten Zähne, von denen auch Verri einen als mit El. primigenius im Tresathal zusammen gefunden anführt, 3) nichts Anderes als solche

¹⁾ Leith Adams: l. c., S. 31 u. ff.

²⁾ Leith Adams: l. c., S. 242.

⁸) A. Verri: Azione delle Forze nell' assetto delle valli con appendice sulla distribuzione dei fossili nella Valdichiana e nell' Umbria interna settentrionale. Boll. Soc. geol. Ital., Vol. V, 1886. Roma 1887; S. 453.

langgestreckte Zähne, deren Marken im mittleren Abkauungsstadium eine etwas deutlichere rhomboidale Figur bilden.

In welchem Verhältnisse El. antiquus zu dem indischen El. Namadicus steht, lässt sich vorläufig noch nicht mit Sicherheit entscheiden. Die Zähne sind nach Leith Adams so gut wie ununterscheidbar, und auch im Schädelbau bestehen, wie die leider nur spärlich vorhandenen Reste es darthun, ganz auffallende Anklänge an einander. Jedenfalls stehen sich aber diese beiden Arten ausserordentlich nahe. Nach Leith Adams sind sie identisch, nach Duncan ist El. Namadicus, sowie auch El. Armeniacus blos eine Localform des El. antiquus. 1)

5. Elephas primigenius Blumb.

```
1796. Elephas Mammonteus Cuvier, M. S. (Teste: Falconer, Pal. Mem. II, S. 158.)
             primigenius Blumb. (Voigt Magaz. 1803, Bd. V, S. 16.)
1803.
1806.
                         Cuvier (Teste Falconer, Pal. Mem. II, S. 158).
             jubatus Schlth. (Petrefk., 1820, I, 4; teste Bronn, Leth. geogn., Bd. III, S. 814.)
1820.
             proboletes
             campylotes
                           Fischer v. Waldheim (Bull. Soc. Moscou, 1829, T. I, S. 275, und Mem. Soc. Moscou,
1829.
             Kamenskii
                                                               T. I, S. 285).
             Panicus
             pygmaeus
1831.
             primordialis Brayley (Philos. Mag. Ann. 1831, IX, S. 411-419).
```

1834. macrorhynchus Morren (Mém. sur les oss. foss. d'Éléph. 1834. Teste Lartet, Sur la dentition des Probosc. etc. Bull. Soc. géol. Fr., Sér. II, T. XVI, Paris 1858-59, S. 502. — Bull. Soc. géol. Fr., T. II, S. 231).

1834. Elephas odontotyrannus Eichwald (De Pecorum et Pachydermorum Reliquiis foss., etc. Nov. Act. Acad. Caes. Leop.-Carol, Nat. Curios, Vol. XVII, P. II, 1835).

1841. Cymatotherium antiguum Kaup (Akt. Urwelt, 1841, I, S. 11; T. IV, Fig. 1-4).

1845. Elephas minimus Giebel (Isis, 1845; Teste: Bronn, l. c. S. 815).

Nach Boyd Dawkins2) ist auch Elephas Americanus Leidy3) [= El. Columbi Falc.4) = El. Texianus Owen⁵) = El. Jaksoni Billings⁶) = El. imperator Leidy⁷), sowie El. Armeniacus Falc. blos eine Varietät des El. primigenius.

Elephas Americanus Pennant (1793) = Mammut Ohioticum Blumb. (1797) = Elephas Americanus Cuvier (1798) = Elephas macrocephalus Camper (1803), ist jedoch ein Mastodon = Mastodon giganteus (1805) und maximus (1824) Cuvier (als er später die Proboscidier in die zwei Genera zerlegte) = Mastodon Ohioticus Blumb., wie es meist genannt wird.8) -

Auch auf Italiens Boden war dieses Thier, gleichwie es durch Leith Adams auch in Spanien nachgewiesen wurde,9) heimisch und bewohnte diese Halbinsel bis zum südlichsten Ende (Otranto). Auf Sicilien sind sichere Reste desselben noch nicht gefunden worden.

^{1).} Quart. Journ. Geol. Soc. London. Bd. XXXIII, 1877; S. 133.

²⁾ B. Dawkins: On the Range of Mammoth in Space and Time. Quart. Journ. Geol. Soc. London, Bd. XXXV; 1879, S. 145.

³⁾ Leidy: Contrib. to the Extinct Vertebr. Fauna of the Western Territ. Rep. Unit. Stat. geol. Surv. Territ. Washington, 1873; S. 238 u. 329.

⁴⁾ Falconer: On the Americ, foss, Elephant, etc. Pal. Mem. II, S. 212.

⁵) Falconer: l. c. S. 215 ff.

⁶⁾ Teste Falconer, Pal. Mem. II, S. 14: "Silim, Journ. 1838, vol. XXXIV, p. 363"; teste Leidy, l. c S. 330: "Briggs and Foster: Canad. Nat. and Geol., 1863, 135, 147"; siehe auch Bronn: Leth. geogn., Bd. III, S. 815, Note ***).

⁷⁾ Leidy: Proc. Ac. Nat. Sc. 1858, 10.

⁸⁾ Siehe die Darlegung dieser Verhältnisse bei Falconer, Pal. Mem. I, S. 55 u. ff.

⁹⁾ Observations on Remains of the Mammoth and other Mammals from northern Spain. Quart. Journ. geol. Soc. Bd. XXXIII, 1877, S. 357, sowie S. 135. — Siehe auch S. Calderon: On the fossil Vertebrata hitherto discovered in Spain. Ibid. S. 124.

In Toskana ist es besonders die Umgebung von Arezzo und Theile des Chianathales, welche zahlreiche Reste dieses nordischen Gastes geliefert haben. Im Museum von Arezzo werden isolirte Zähne, mehrere zum Theil sehr schön erhaltene Unterkiefer verschiedenen Alters, sowie ein Gaumenfragment zusammt der Occipitalregion mit beiderseits erhaltenen M_2 und M_3 aus diesen Gegenden aufbewahrt.

Im Museum zu Florenz befinden sich aus Italien nur sechs Zähne, sowie ein rechter Unterkieferast von diesem Elephanten.

Von Milchzähnen ist nur ein Gypsabguss eines D_1 aus den Alluvien des Tiber in der Umgebung von Rom, wo *Elephas primigenius* zusammen mit *El. antiquus* und *El. meridionalis* gefunden wird, vorhanden. Er ist vorne verletzt und dürfte x 12 x Joche besessen haben. Vorhanden sind 12 x, die eine Länge von 130 mm und eine Breite von 55 mm aufweisen. Das Email ist sehr dünn, unregelmässig und scharfzackig gefaltet, die Joche sehr gedrängt.

Von Maspino, nördlich von Arezzo, stammt ein Fragment eines rechten oberen M_1 , das bei 11 cm Länge x II Joche enthält. x 8 Joche sind angekaut, davon x 2 einheitliche Marken besitzen. Der äusseren Hälfte des dritten Joches entsprechen jedoch zwei vollständig ausgebildete, getrennte (hinter einander gelegene) Innenhälften. Das 4.—6. Joch ist in je drei, die folgenden in sehr zahlreiche Inseln aufgelöst. Die Breite beträgt am 3. Joch 64 mm, die Höhe am 9. Joche 140 mm. Das Email ist ein wenig dicker wie früher, zart gefaltet, die Joche sehr dünn und gedrängt.

Etwas weiter abstehende Joche zeigt ein unterer linker M_1 , gleichfalls aus der Nähe von Arezzo. Er besitzt x 13 x Joche, davon x 10 angekaut. Nur die letzten drei sind in (3, 4 und 5) Inseln aufgelöst. Der Zahn ist verhältnissmässig niedrig, eine Dilatation oder jener zipfelförmige Vorsprung in der Mitte, bezeichnend für El. antiquus, fehlt ihm jedoch vollständig. Er ist 225 mm lang, am 5. Joch etwa 70 mm breit und am 10. Joch etwa 100 mm hoch. Es ist jedoch immerhin möglich, dass er einem Elephas antiquus angehört hat.

Ein typischer Zahn eines Mammuth ist aber ein M_1 von Montioni, westlich von Arezzo. Er zählt x 15 Joche und einen sehr kleinen hinteren Talon. Trotzdem beträgt seine Länge nur 180 mm. Die grösste Breite (am 5. Joch gemessen) ist 56 mm; die Höhe des schwach angekauten 11. Joches 120 mm. Das Email ist dünn, sehr wenig gewellt, die Joche endigen nach oben in sehr zahlreiche (bis 9) kleine Papillen.

Von Montecatini im Val di Nievole, Provinz Lucca, stammen zwei jedenfalls demselben Individuum angehörige obere M_2 , die auch schon von Issel¹) erwähnt wurden. Sie sind fragmentarisch erhalten; beide besitzen blos 7 x Joche und dabei eine Länge von 105 mm. Die Breite beträgt 80 mm. Das Email ist undeutlich gefaltet, die Joche sehr gestreckt, ohne oder mit kaum merklicher medianer Ausweiterung.

Ein schönes Exemplar eines rechten unteren M_3 besitzt 18 x Joche; vorne ist aber noch ein halbes sichtbar, weitere dürften abgebrochen sein. Email und Joche zeigen die schon mehrfach erwähnten Charakteristika. Die totale Länge beträgt 300 mm, die grösste Breite (3. erhaltenes Joch) 80 mm. Die Höhe des noch nicht angekauten 11. Joches ist 140 mm. Die ersten sieben Joche haben einheitliche Marken, das 8. Joch eine sehr breite mittlere und kleinere seitliche, das 9. und 10. Joch mehrere Inseln. Die unangekauten Joche zeigen alle eine reichliche Fingerung.

Dieser Zahn wurde bei Montioni, unmittelbar bei Arezzo, gefunden.

¹) A. Issel: App. pal. IV. Descrizione die due denti d'Elefante raccolti nella Liguria occidentale. Ann. Mus. Civ. Stor. nat. di Genova. Vol. XIV, 1879, S. 167 (15).

Das erwähnte Kieferfragment wurde bei Maspino gefunden und enthält einen M_3 in voller Usur. Dieser besitzt wahrscheinlich x 22 x Joche, bei einer totalen Länge von 390 mm. Diese ausserordentliche Ausdehnung rührt jedoch nur daher, dass die letzten Joche ungemein schief liegen, daher auch fast ihre volle Höhe mitgemessen wird. Vom Vorderrand des Zahnes bis zur Spitze des Talones beträgt die Länge blos 290 mm. Die Breite misst am 4. Joch 75, am 10. Joch 95 mm. Das Email ist etwas mehr und ziemlich regelmässig gewellt; zehn Joche haben einheitliche Marken, an den nächsten vier ist das äussere Drittel abgelöst, weitere vier sind in mehrere Inseln zertheilt.

Aus dem Chianathal citirt Verri¹) Reste dieser Species, sehr zahlreiche finden sich, wie erwähnt, in den Alluvien des Tiber und seiner Nebenflüsse.²) Im Lirithal, mitten ungefähr zwischen Rom und Neapel (Castelliri, Isoletta), sollen sie nach Nicolucci³) gefunden worden sein, ebenso wie auch in der Höhle von Cardamone bei Novoli und weiter südlich in der von Romanello bei Castro in Apulien.⁴)

Auch Norditalien hat natürlich Ueberreste dieser Thiere geliefert.

II. Entwicklungsgeschichtliche Bemerkungen.

Rütimeyer war es und Kowalewsky, die es zuerst unternommen hatten, darzuthun, welche tiefgreifenden Veränderungen im Bau des Schädels bei den Hufthieren, oder wenigstens einer Abtheilung derselben, im Laufe philogenetischer sowohl als ontogenetischer Entwicklung vor sich gegangen sind und in welcher Weise ein durch die natürliche Zuchtwahl ganz besonders begünstigtes und nach und nach daher oft ganz ausserordentlich ausgebildetes Organ auf die allgemeine Configuration des Schädels sowohl als damit im Zusammenhange auf die Grosse, gegenseitige Lagerung und Verbindung einzelner Knochenelemente oder gewisser Gruppen derselben Einfluss gewonnen hat.

Während Kowalewsky insbesondere die Einwirkung der bei den Ungulaten so gewaltig anwachsenden Molaren verfolgte, zeigte Rütimeyer, in welch bedeutendem Masse individuell sowohl als im Verlaufe geologischer Zeiträume bei der Heranbildung unserer heutigen Formen die Last der Frontalaufsätze ihre modellirende Thätigkeit entfaltet und im Verein mit dem Gebisse dem Ruminantierschädel ein so überaus charakteristisches Gepräge verliehen hatten.

Gewiss aber noch viel eigenthümlicher, bizarrer, von der normalen Schädelform noch viel sonderbarer abweichend und "tout-à-fait extraordinair et anomal", wie Cuvier bemerkt, tritt uns der Bau des Proboscidierschädels entgegen. Die in ihrer Anlage und Function beispiellosen Oberkiefer, die fast senkrecht aufsteigende Schädelbasis, die seltsam geformte Scheitel- und Stirnregion, die in die Mitte des Schädels hinaufgerückte Nasenöffnung, endlich die so ganz abnorm gestalteten Zwischenkiefer mit den zwei Stosszähnen vereinigen sich zu einem Gebilde, das den Elephanten ihre so streng isolirte, durch keinerlei Zwischenglieder gemilderte Stellung allen übrigen Säugern gegenüber anzuweisen behilflich ist.

Doch ist diese exceptionelle Beschaffenheit in typischer Entwicklung nur dem erwachsenen Schädel eigen. Im Jugendzustand ist er weitaus nicht so abnorm gebildet; alle jene excessiven

¹⁾ A. Verri: Azione delle forze nell' assetto delle valli, etc. Boll. Soc. geol. Ital., Vol. V, 1886. Roma 1887; S. 452.

²⁾ Ponzi: Ossa foss. supappenine dei dintorni di Roma, S. 22.

³⁾ G. Nicolucci: Su gli elefanti fossili della valle del Liri. Mem. Soc. Ital. Sc., T. IV, Nr. 5; Napoli, 1882; S. 5.

⁴⁾ Ibid, und Forsyth Major: Sul. Myolagus Sardus Hensel. Proc. verb. Soc. Tosc. sc. nat. Pisa, 9. März 1879, S. 72.

Charaktere sind nebst der Unterdrückung fast jeglicher spongiöser Knochenconsistenz in sehr viel geringerem Grade vorhanden. Leider besitzen wir noch keine eingehendere Schilderung der hiernach beim Wachsthum vor sich gehenden Veränderungen, die zu verfolgen gewiss ebenso interessant und für das Verständniss dieser seltsamen Thiergruppe gewiss ebenso wichtig wäre, wie jene Untersuchungen Rütimeyer's für die Wiederkäuer es waren.

Sicherlich waren es doch wohl vor Allem die Stosszähne, die durch ihre Entwicklung zu so gewaltigen Dimensionen bei der Modellirung des Schädels von ganz hervorragendem, ja vielleicht entscheidendem, wie ich anzunehmen geneigt bin, Einfluss waren. Man wird wohl der ausserordentlichen Massenzunahme dieser Gebilde und der damit zusammenhängenden Verladung eines sehr bedeutenden Gewichtes weit nach vorne hin umsomehr die bestimmende Einwirkung kaum absprechen können, als es ja nach den Untersuchungen der oben genannten Forscher eine bekannte Thatsache ist, welch bedeutende Veränderungen die Gehörne bei Steigerung ihrer Grösse, die Molaren beim Hinausschieben des Wurzelansatzes im Bau des Schädels, in der Lage seiner Achsen hervorbringen konnten. Und die Heranbildung von Stosszähnen von so kolossalen Dimensionen, bestehend noch dazu aus so viel bedeutend schwererem Material als jene Aufsätze der Frontalia, sollte nicht auch zum mindesten ebenso tief eingreifende Spuren im Gefüge und in veränderten Beziehungen der einzelnen Schädelelemente zurückgelassen haben? — Ja, ich glaube sogar noch weiter gehen zu können und auf diese Endursache auch den sonderbaren Vorgang beim Ersatz der Molaren zurückführen zu müssen.

Enscheinung — geschritten werden soll, möchte ich hier noch einige osteologische Details, die Schädelbasis und ihre Foramina betreffend, vorausschicken. Sie lassen sich natürlich am jugendlichen Schädel am besten studiren. Mir lagen solcher drei von El. Africanus vor, sowie von älteren Exemplaren in verschiedenem Wachsthumsstadium über ein halbes Dutzend von El. Indicus und zwei von El. Africanus. 1)

Ein Foramen condyloideum fehlte zum Unterschied gegen alle anderen Hufthiere stets. Von Meckel und Blainville wird zwar ein solches ausdrücklich, wenn auch in geringer Grösse, als vorhanden angegeben, von Cuvier, Turner und Flower wird sein Dasein jedoch gleichfalls entschieden geleugnet.

Die Bulla ist an ihrer Innenseite zum Durchtritt der Carotis interna tief ausgebuchtet; die beiden Ränder dieser Ausbuchtung greifen dabei so weit über, dass sie meist einen vollständigen Canal bilden. Die Innenmündung desselben befindet sich an der Vorder-Innenecke des Petrosum.

Der Körper des Basisphenoids wird durch das weit nach hinten vorgeschobene Backenzahnlager bald zu einer hohen, seitlich comprimirten Platte. Seine Pterygoidfortsätze bilden eine weite nach vorn geöffnete Calotte zur Umhüllung der Molaren. Die Alce besitzen in der Gehirnhöhle, insbesondere durch den Mangel jenes zwischen Frontale und Temporale eingeschobenen Fortsatzes, sehr geringe transversale Ausdehnung. Sowohl ein eigenes Foramen rotundum als ein ovale fehlen ihnen. Dagegen sind sie gegen das Petrosum zu stark ausgerandet und bilden mit diesem eine weite Fissur, die wahrscheinlich auch den dritten Trigeminusast durchlässt. Eine ähnliche, doch mehr furchen artige Ausrandung zeigt sich auch an ihrer Vorderseite; doch schlägt sich hier, gegen die Aussenseite des Schädels zu, der laterale Rand dieser Furche gegen den inneren zu dütenförmig um, so dass so

¹⁾ Vergl. hiezu die Werke von Meckel (System d. vergl. Anatom., Bd. IV.), Cuvier (Rech. sur les Oss. foss., 2. Éd., Bd. I), Blainville (Ostéogr.), Turner (Rep. Zool. Soc. London, 1848, S. 71), Flower (Osteology of the Mam.); ferner C. Mayer: Beiträge z. Anat. d. Elephanten. Verhandl. k. Leop.-Carol. Akad. d. Naturf., Bd. XIV, Abth. I, 1847, S. I. — Die Arbeiten von M. Watson und L. C. Miall and F. Greenwood im Journ. of anatomy and physiology, Vol. VI—IX und XII—XIII, waren mir nicht erreichbar.

schliesslich ein allseitig vom Alisphenoid abgeschlossener Canal mit deutlicher Verwachsungsnath entsteht. Innen nimmt jedoch auch das Orbitosphenoid an seiner Bildung theil, wie auch gegen aussen zu, in der tiefen Fissur ober dem Maxillare, dieser letztere Knochen als ein Begrenzungselement desselben angesehen werden kann. Vor demselben, d. i. gegen den Gesichtsschädel zu, liegt ein kleinerer Canal, der mit ihm zugleich im Gehirnraum unter dem Processus clinoideus anticus mündet und ungefähr vom Lumen des Opticus ist. Dieser wird von dem erwähnten umgeschlagenen Rand der Alisphenoidfurche und dem Orbitosphenoid, aussen zum Theil auch vom Frontale gebildet und tritt aussen und hinten vom Foramen opticum in der Postorbitalfalte an die Aussenseite des Schädels. Er entspricht seiner Lage und Begrenzung nach also ganz dem Foramen lacerum anterius (= Fissura orbitalis superior der menschlichen Anatomie), von dem jedoch ein Theil durch jenen umgeschlagenen Rand abgetrennt erscheint. Letzterer mündet nach aussen in die erwähnte Alisphenoidcalotte ein, wo man allerdings, wie oben gesagt, in der Spalte ober dem Maxillare eine Fortsetzung desselben erblicken kann.

An der Hinterseite dieser Calotte und nahe ihrem Grunde ist ein weiteres Foramen zu sehen, das gleichfalls in deren zum grössten Theil vom Maxillare ausgefüllten Hohlraum tritt. Es steht jedenfalls zu dem zuletzt besprochenen Canal in derselben Beziehung, wie die hintere Oeffnung des Alisphenoidcanales zum Foramen rotundum.

Das Orbitosphenoid besitzt im Inneren des Schädels ungefähr dieselbe Ausdehnung wie das Alisphenoid, beschränkt sich jedoch aussen fast nur auf die unmittelbare Bildung des Sehnervcanales. Zwischen Orbitosphenoid und Frontale mündet dann oben und etwas medianwärts vom Foramen opticum ein Foramen ethmoidale in die Postorbitalfurche.

Alle die letztgenannten Foramina treten in einer tiefen Falte an die Aussenseite, welche Falte durch einen vom Postorbitalfortsatze auslaufenden, oben mehr seitwärts, gegen unten aber immer mehr nach vorn geneigten Kamm gebildet wird. Er geht schliesslich in den Vorderrand der Alisphenoid-calotte über. Diese Furche, die sich andeutungsweise auch bei anderen Formen, am besten vielleicht noch beim Bären, findet, ist in der Jugend seichter und breiter, später jedoch sehr eng und tief, so dass die genannten Foramina von aussen nur schwierig zu sehen sind.

Es ist dies schon eine jener — oft sehr tiefgreifenden — Veränderungen, welche am Elephantenschädel im Laufe des Wachsthums platzgreifen.

Die Praemaxillaria des jugendlichen Schädels sind entsprechend der geringen Entwicklung der Stosszähne ziemlich klein und schwach. Die Nasenöffnung erscheint am Schädel nicht so weit zurückgeschoben. Die vorderen plattenförmigen Fortsätze der Maxillaria, die die Stosszahnalveolen tragen helfen, bilden mit der Palatinalebene einen sehr flachen Winkel, daher diese Alveolen auch nicht nach abwärts, sondern ganz beträchtlich mehr nach vorn zu gerichtet sind.

In den massigen Stosszähnen erwächst jedoch hierauf dem Schädel vorne eine ausserordentliche Belastung. Wir finden daher, dass als natürliche Folge die nunmehr auch sehr vergrösserten Praemaxillaria ihre Richtung nach vorn aufgeben und sich stark nach abwärts neigen. Der Winkel, den sie mit der Alveolarlinie der Backenzähne oder dem Gaumen einschliessen, ist daher ein viel kleinerer geworden als früher. Durch das weite Vorragen der gewichtigen Zähne und ihren Zug nach abwärts entstand somit das Bestreben einer Winkelbewegung, die sich hauptsächlich als bedeutender Druck auf die Maxillaria nach hinten, andererseits aber wohl auch als Zug nach vorne in der Gegend der Nasenöffnung geltend machen musste. Und diese Kraftäusserung war jedenfalls für den Schädel und seine Theile von bestimmendem Einfluss.

Ferner waltete einem allgemeinen mechanischen Gesetz zufolge offenbar auch das Bestreben vor, diese bedeutende Last so nahe als möglich dem Aufhängepunkte, den Condylen zu, zu verladen, was den Druck auf die Maxillaria und dann auf die Schädelbasis noch weiter vermehren musste. Der Schädel musste daher kürzer werden. Da trat aber als gewaltiger Antagonist die aus der Pflanzennahrung dieser Thiere unbedingt resultirende Nothwendigkeit hervor, im Laufe der Zeit die Kauoberfläche der Molaren thunlichst zu vergrössern oder diese überhaupt den gesteigerten Anforderungen anderen Concurrenten gegenüber gewachsen zu machen. Bei diesem Widerstreite stand der Organismus in seiner Entwicklung offenbar einem harten und gefährlichen Dilemma gegenüber: die Molarenreihe sollte in ihrer so wesentlichen Ausdehnung verkürzt werden, andererseits war eine ausgiebige Kaufähigkeit derselben unerlässliche Existenzbedingung.

Aus dieser schwierigen Lage befreite sich nun der Organismus dadurch, dass er die einzelnen Molaren zu einer für ihre Zwecke im ganzen Thierreich unerreicht dastehenden Vollkommenheit ausbildete und sie nacheinander in die Usur eintreten liess. Damit war das Princip gegeben; seine wahre Brauchbarkeit beruhte jedoch erst darauf, dass die Wiege des zum Nachrücken bestimmten Zahnes nicht horizontal neben, sondern fast senkrecht aufgerichtet über den Hinterrand des in Action stehenden Molaren placirt wurde. Dadurch ward äusserste Raumökonomie mit möglichst grösster Vollkommenheit des in Frage stehenden Organes erzielt. Daraus resultirte dann die Kieferkürze, aber auch seine bedeutende Höhe. Während am normalen Säugethierschädel Schädelbasis und Gaumen mehr oder weniger in einer Ebene liegen, beide beim jungen Elephanten relativ sehr wenig gegen einander geneigt sind, sind sie hier fast um einen rechten, jedoch ausspringenden Winkel gegen einander geknickt. Bei den Ruminantiern entsteht aus ähnlichen Gründen hier ein einspringender Winkel. Die ausserordentliche Erhöhung der Maxillaria beruht aber natürlich weiter auch auf der gesteigerten Höhe der Molaren.

Dass, als sehr bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit des Elephantenschädels, das Palatinum seitlich gar nicht sichtbar ist, sondern das Maxillare direct an das Alisphenoid stösst, dass letzteres ferner mit dem Parietale in keine Verbindung tritt, möge an dieser Stelle nur im Vorübergehen Erwähnung finden.

Die Pterygoidflügel des Alisphenoids steigen in der Jugend von vorn nach hinten flach an und liegen fast in derselben Ebene wie der Körper des Basoccipitale. Die Entfernung zwischen ihnen und den Condylen ist relativ sehr gross und wird zum nicht geringen Theil von den mächtig aufgetriebenen Bullen eingenommen. Letztere selbst sind seitlich in bedeutendem Umfang sichtbar. Die Gehirnschädelbasis ist es nun hauptsächlich, die bei der beginnenden sagittalen Zusammenschiebung des Schädels am meisten betroffen wird. Sie wird verhältnissmässig stark verkürzt und geknickt. Vom Condylus fällt daher jetzt der Schädelumriss jäh zur Kaufläche der Molaren ab. Auch die Bullen flachen dabei ganz aus.

Das Occiput wird sehr breit. Das Schläfenbein, das in der Jugend sagittal mehr flach und länger als hoch ist, springt jetzt seitlich weit vor. Die Schläfengrube wird dadurch tiefer, wie auch in Folge der Zusammenschiebung des Schädels höher und kürzer.

Die Orbita sind anfangs relativ ungemein gross und liegen meist vollständig über den Backenzähnen und fast ganz hinter der Wurzel der Stosszähne. Später erscheinen sie im Verhältniss zum Schädel viel kleiner, sowie ganz vor die Backenzähne und, zum Theil wenigstens, an die Seite der Stosszähne gerückt.

Inwieweit die erst im Laufe des Wachsthums sich heranbildenden Sinuositäten der Parietalia, Frontalia, Squamosa, Nasalia und Praemaxillaria, des Keilbeincomplexes und der Oberkieferknochen an der Umformung des Schädels Antheil nehmen und dass dieser Vorgang in erster Linie auf die exceptionelle Ausbildung der Zähne zurückzuführen sei, braucht hier wohl weiter nicht erörtert zu werden. Dass hiebei primär die mächtigen Stosszähne betheiligt gewesen sein dürften, wurde bereits früher erwähnt.

Bei den im Vorhergehenden gemachten Bemerkungen wurde zumeist blos der indische Elephant berücksichtigt. Was nun den afrikanischen Vertreter dieses vorweltlichen Typus betrifft, so entspricht der Knochenbau des Schädels vollkommen den Resultaten, die aus der Vergleichung der Zähne bereits gewonnen wurden. Er zeigt ein entschieden jugendliches Stadium des *Elephas Indicus*. Das Schädeldach ist nicht so hoch und steil aufgerichtet, die Praemaxillaria nähern sich in ihren Alveolen mehr der Horizontalen, die Schädelbasis fällt vom Condylus bedeutend langsamer zu den Molaren ab. Der Schädel erscheint dadurch noch erheblich wenig in sagittaler Richtung comprimirt.

Allerdings scheint man aber hier einem Widerspruch zu begegnen, indem die Stosszähne des afrikanischen Elephanten viel besser entwickelt erscheinen als wenigstens bei der "Muknah" benannten Rasse des indischen. Bei letzterem haben wir es aber hier offenbar mit einem interessanten Fall von rückläufiger Entwicklung zu thun, insofern als ja alle bekannten Formen, die als seine Vorläufer gelten können, weitaus stärkere, ja sogar überaus starke Stosszähne besitzen. Der Zahn wurde also hier reducirt, die durch sein ehemaliges Anwachsen bewirkte Formveränderung seiner Tragknochen aber blieb trotzdem erhalten.

Es soll nur noch mit wenigen Worten auf ein interessantes Analogon im Schädelbau hingewiesen werden, den Menschen. Hier wie dort wurde die Kieferpartie sehr verkürzt und unter den Gehirnschädel geschoben. Aus welchen Gründen es beidemale erfolgte und wie sich beide Theile in Beziehung auf sich selbst dabei verhielten, ist für den Effect vollkommen gleichgiltig. Wir finden, dass auch beim Menschen das Palatinum fast vollständig von der Schädelseite verdrängt wurde, wo es bei den normalen Säugern mit mehr oder minder entwickelter Gesichtspartie einen sehr bedeutenden Antheil besitzt. Es zieht sich bei diesen breit bandförmig um das Hinterende des Maxillare herum und erstreckt sich bis zum Lacrymale. Es ist daher beim Menschen Maxillare und Pterygoidfortsatz des Keilbeines nur durch die dünne Pars perpendicularis getrennt. Beim Elephanten ist auch diese noch verschwunden, und das Palatinum ist von den Orbiten vollkommen getrennt. Der Hauptantheil des Palatinum ist in beiden Fällen gegen die Choanen zu gelegen. Der Pterygoidfortsatz ist auch beim Menschen schon eine Art Stützknochen des Maxillare geworden.

Jene Postorbitalfalte des Elephanten ist beim Menschen viel bedeutender entwickelt, vereinigt sich aussen mit dem Jugale und bildet so die nach hinten bis auf die langen Fissuren geschlossenen Orbitae. Nur nimmt beim Elephanten das Alisphenoid einen nur ganz minimalen Antheil an jener Falte. Zwischen letzterem Knochen und dem Maxillare versteckt münden in beiden Fällen das Foramen rotundum — beim Elephanten allerdings nicht gesondert entwickelt — und der Vidianische Canal. —

Von ganz besonderem Interesse ist es nun aber, dass man jene im Vorhergehenden flüchtig skizzirten Schädelveränderungen, die beim Wachsthum des Individuums sich einstellen, im Grossen und Ganzen und in ähnlicher Weise auch bei den verschiedenen Entwicklungsstadien des Proboscidierstammes auftreten sehen kann.

Bei Mastodon sind die Maxillaria zumeist noch sehr niedrig, der Condylus wenig hoch über der Verlängerung der Kaufläche gelegen, die Alisphenoidfortsätze und Schädelbasis flach ansteigend (M. Perimensis, Ohioticus, Andium). Bei den tetralophodonten M. Sivalensis und Arvernensis, die ja auch schon zum sechsjochigen Aufbau des M_3 stark hinneigen, findet sich hierin schon mehr Annäherung an die Elephanten. Der Scheitel ist jedoch bei allen noch sehr zugerundet, das Hinterhaupt mehr oder weniger nach vorn zu geneigt. Die Prämaxillaria mit den Stosszähnen gehen unter sehr stumpfem Winkel mit dem Gaumen ab; die Orbitae liegen zumeist ganz oder doch zum grössten Theil über der Zahnreihe.

Bei Elephas hingegen nehmen die Maxillaria oft gewaltige Dimensionen an, schieben sich weit unter den Jochbogen nach abwärts heraus, werden hiebei nicht nur relativ, sondern sogar auch absolut

schmäler, so dass dadurch die Basalregion des Schädels mit den nun in sehr bedeutendem Masse zur Bergung der Molaren in Anspruch genommenen Pterygoidfortsätzen der Alisphenoidea steil zum Condylus emporsteigt. Die Schädelkapsel wird sagittal schmäler, höher, neigt sich zumeist bedeutend nach hinten über, die Stosszahnalveolen senken sich immer mehr, die Orbita rücken allmälig vor die Zahnreihe. Am wenigsten ist Letzteres bei den Stegodonten, am meisten bei Euelephas ausgebildet.

Was die Stammesverhältnisse unter den Elephanten selbst betrifft, können die bis jetzt bekannten Schädelformen nur für die allgemeinsten Züge Verwendung finden. Weit geeigneteres Material geben hiezu die Backenzähne ab, nach welchen eben Falconer seine Hauptabtheilungen unter den Proboscidiern gebildet hat. Allerdings ist diese Classification bei Elephanten sowohl wie bei Mastodonten — worauf auch schon anderweitig hingewiesen wurde — keine natürliche, indem hiedurch gleich hoch stehende Glieder möglicherweise verschiedener Entwicklungslinien, nicht aber diese letzteren einzeln als solche zusammengefasst wurden. Doch sind wir in der Erkenntniss der letzteren überhaupt noch nicht so weit, anderseits geben aber solche durch Horizontalschnitte am Stammbaum entstehende Gruppen ein Bild besserer Uebersicht über die gleichwerthigen Glieder, so dass sie stets auch von Werth bleiben werden.

Die ursprünglichsten Typen stellen nach dieser Eintheilung Falconer's die Stegodonten dar, die in ihrer Zahnbildung ganz ausserordentlich sich den Mastodonten nähern, so dass es oft "kaum möglich ist, zu entscheiden, in welches der beiden Genera sie gehören".¹) Es ist daher auch mehrfach der Vorschlag gemacht worden, sie thatsächlich als eigene Gattung Stegodon den beiden andern gleichwerthig gegenüberzustellen.²) So berechtigt dieser Vorgang aber an und für sich auch sein mag, scheint er jedoch die Schwierigkeiten statt aufzuheben nur zu verdoppeln, indem nunmehr zwei Grenzen zu ziehen sind an Stelle der früheren einen. Die Stegodonten sind nach jetziger Kenntniss auf die chinesisch-indisch-malayische Region beschränkt.

Einen jüngeren Typus bildet das Subgenus Loxodon, das in dem afrikanischen Elephanten einen heute noch lebenden Vertreter aufzuweisen hat. Er besitzt sogar die niederste Zahnformel, so dass nicht gut einer der bis jetzt bekannten Loxodonten als sein Vorfahr betrachtet werden kann. Unter den Stegodonten sind El. Ganesa und insignis in ihrem Schädelbaue oder Stosszahnbildung bereits zu sehr specialisirt; El. bombifrons entspräche hier am besten noch den gestellten Anforderungen.

El. planifrons und meridionalis gleichen sich in der Gestaltung der Backenzähne in bedeutendem Masse, so dass sie direct als Parallelglieder hingestellt wurden. Doch einmal ist die Zahnformel der indischen Art thatsächlich etwas kleiner, dann besitzt sie noch Zahnwechsel; die Prämaxillaria liegen ferner sehr flach, die Orbita anscheinend etwas weiter zurück, so dass El. planifrons als eine ursprünglichere Form betrachtet werden kann. El. meridionalis ist daher wahrscheinlich der abendländische Nachkomme einer planifrons-ähnlichen Stammform, der von Indien aus gegen das Mittelmeer vorgedrungen ist und sich hier über dessen Nord-, wie vielleicht auch Südküste von Osten her verbreitet hat.

Auch in Indien scheint sich derselbe Stamm, anfangs vielleicht sogar noch vereinigt, weiter entwickelt zu haben; wenigstens deutet der siwalische *El. hysudricus* darauf hin. In der Schädelconfiguration gleicht er *El. meridionalis* ausserordentlich — es fehlte ja sogar nicht an dem Versuche,

¹⁾ H. v. Meyer: Studien über das Genus Mastodon. Palaeontographica, Bd. XVII, 1867, S. 1.

²⁾ Ed. Naumann: Ueber japanische Elephanten der Vorzeit. Palaeontographica, Bd. XXVIII, 1882, S. 7.

sie specifisch zu vereinigen — doch zeigt der Aufbau der Zähne ein bedeutend weiter vorgeschrittenes Stadium, so dass er von Falconer bereits in sein drittes Subgenus *Euclephas* eingereiht wurde.

Von einer solchen Urform vom Typus des El. hysudricus gelangt man dann zu dem beträchtlich weiter ausgebildeten El. Namadicus. Auch von seinem Typus sehen wir eine Form nach Westen wandern und an dem Mittelmeer sowie anderen Theilen Europas als El. antiquus auftreten. Die Uebereinstimmung zwischen beiden ist so vollständig, dass man über die Berechtigung dieser beiden Arten noch heute im Streite liegt. Jedenfalls zeigen aber beide in gleicher Weise im Bau der Zähne, der Maxillaria und der Schädelbasis, sowie in der Zahnformel den jüngeren Typus.

In den letzteren Punkten, gleichwie in der Entwicklung der Stosszähne weist die extremsten Verhältnisse wohl El. primigenius auf. Wie und wo er sich aber so entwickelt hat, liegt noch im Dunkel. Als sicher kann man wohl annehmen, dass er ein directer Nachkomme des ihm zeitlich vorangehenden El. antiquus nicht sei. Dazu bietet die Bildung der Prämaxillaria dieses letzteren, sowie der Stosszähne, die ja trotz ihrer Grösse nur eine einfache und ziemlich flache Krümmung aufweisen, zu bedeutende Hindernisse. Er wird sich jedenfalls — wenn auch natürlich nicht als El. primigenius — vor ihm von der von Meridionalis-hysudricus ausgehenden Linie abgezweigt haben. Die Entwicklung der Prämaxillaria sowohl als die der Stosszähne findet hier günstigere Vorbedingungen. Er bildet offenbar gleichfalls das Endglied einer Reihe.

Der nach seinem geologischen Vorkommen jüngste Spross des Proboscidierstammes ist der lebende *El. Indicus*. Ueber seinen Ursprung ist man aber gleichfalls noch völlig im Unklaren. Er dürfte jedoch aus der gleichen Gruppe wie das Mammuth abzuleiten sein. Auffallend ist bei ihm (Varietät Muknah) die Verkümmerung der Stosszähne. Man muss wohl von Verkümmerung, also rückläufiger Entwicklung sprechen, da alle bis nun bekannten Proboscidier bedeutend stärker entwickelte Stosszähne besitzen.

Hier dürfte es auch am Platze sein, eines weiteren eigenthümlichen Verhaltens zu gedenken das sich ebenfalls gerade bei dieser Species im gleichen Gegensatz zu den — soweit bekannt — übrigen Vertretern dieser Gruppe in der Constellation der Carpalknochen findet. Es wurde dies an anderer Stelle 1) bereits ausführlicher behandelt; hier erst ist es mir jedoch möglich, eine Abbildung der dort erwähnten Carpen von Mastodon Arvernensis (Taf. XV, Fig. 3), Elephas meridionalis (Fig. 2) und Elephas antiquus (?) (Fig. 1) zu geben.

Sie zeigen das Eigenthümliche, dass bei ihnen das Lunatum nebst — wie normal — dem Magnum, auch dem Trapezoid zum bedeutenden Theil auflagert, dass also keine rein seriale Anordnung der Carpuselemente stattfindet. Es konnte dies als Regel sowohl bei den obigen drei Proboscidiern als auch bei Elephas primigenius, sowie bei dem lebenden El. Africanus constatirt werden; auch die Abbildungen zweier Carpen siwalischer Elephanten zeigten dieselben Verhältnisse. Rütimeyer bestätigt dieses Verhalten in einer erst kürzlich erschienenen Abhandlung²), nur ist aus ihr die Species der untersuchten Thiere nicht genau zu ersehen.

Merkwürdigerweise ist nun jedoch bei *El. Indicus* von einer solchen Ueberschiebung des Lunatum über das Trapezoid so viel wie gar nichts zu bemerken. Es findet sich fast reine Taxeopodie vor, die aber jedenfalls ebenso erst als secundäre anzusehen ist.


Die auf folgender Seite beigefügten Skizzen mögen schliesslich weiter zur Versinnbildlichung des in meiner obgenannten Schrift über die Stellung des Proboscidiercarpus dem der anderen Huf-

¹⁾ K. A. Weithofer: Einige Bemerkungen über den Carpus der Proboscidier. Morphol. Jahrb., Bd. XIV, 1888, S. 507.
2) L. Rütimeyer: Ueber einige Beziehungen zwischen den Säugethierstämmen alter und neuer Welt. Abhandl. schweiz.

²) L. Rütimeyer: Ueber einige Beziehungen zwischen den Säugethierstämmen alter und neuer Welt, Abhandl. schweiz. paläont. Gesell. Vol. XV, Zürich 1888, S. 11 u. bes. 12.

thiere gegenüber Gesagten dienen. Bezüglich des Näheren sei Raumersparniss wegen auf diese verwiesen.


Die Constellation des Proboscidiercarpus, diametral entgegengesetzt der gewöhnlich z. B. bei Hufthieren auftretenden, wo eine Ueberschiebung der proximalen Reihe gegen die distale nach aussen zu stattfindet, dürfte entschieden auf das verschiedene Verhalten der Vorderarmknochen zurückzuführen sein. Bei allen Hufthieren sehen wir den Radius, also den inneren Mittelarmknochen, zum hauptsächlichen, fast alleinigen Träger der Körperlast sich ausbilden, weshalb er, weitaus stärker entwickelt, sich schliesslich über nahezu die gesammte proximale Articulationsfläche der proximalen Carpalien ausdehnt. Diese selbst verlassen im Verlaufe der Entwicklung ihre ursprünglich jedenfalls reihenweise Anordnung mit der distalen Reihe (das condylarthre Stadium) und schieben sich zur



Verfestigung des Carpus nach einfach mechanischer Nothwendigkeit über die letztere nach aussen vor, um so sämmtlichen Metapodien — vor Allem Mc III und IV — die Körperlast übertragen zu können. Zuerst machte sich diese Nothwendigkeit selbstredend bei den äusseren Carpalknochen — besonders dem Uncinnatum — geltend, während dabei die inneren noch serial angeordnet bleiben (amblypodes Stadium) wie dieses Stadium von zahlreichen alten Formen repräsentirt wird. Später erst dringt auch hier, unter dem Radius, diese Gruppirung durch (diplarthres Stadium).

Bei den Proboscidiern wird nun der umgekehrte Weg eingeschlagen: Die nach aussen zu gelegene Ulna wird zum bevorzugten Mittelhandknochen. Nun sehen wir bei ihnen — spiegelbildlich — genau dasselbe geschehen, was soeben von den übrigen Ungulaten erwähnt wurde. Die Ueberschiebung der proximalen Reihe geht nach innen zu vor sich, wobei vorläufig jedoch, aus gleichen Gründen wie oben, unter dem bevorzugten Mittelhandknochen die seriale Anordnung noch gewahrt bleibt. Es entspricht diese Stellung ganz dem amblypoden Stadium der übrigen Hufthiere. Man könnte es hier das proboscidoide nennen. Eine Verrückung der äusseren Carpalia gegen einander, entsprechend dem diplarthren Stadium, ist jedoch nicht mehr erfolgt. Der Stamm der Proboscidier ist anscheinend bezüglich der Carpusentwicklung auf der zweiten Etappe stehen geblieben, und es scheint nach Allem wenig Aussicht vorhanden, dass er sie je überschreiten wird.

Das oben bezüglich der Stammesentwicklung Gesagte liesse sich vielleicht kurz in folgendem Schema wiedergeben:



III. Zeitliches und räumliches Auftreten.

1. Geologisches Vorkommen.

A. Europa.

a) Mastodon Arvernensis und Elephas meridionalis.

Anlass gegeben hat, ist die betreffs des Zusammenvorkommens der im Früheren beschriebenen Proboscidier, ausserhalb der Apenninenhalbinsel sowohl als innerhalb derselben und besonders im Arnothal. Vor Allem war es hier die Frage nach dem gegenseitigen zeitlichen Verhältnisse, in welchem das Auftreten von Mastodon Arvernensis und Elephas meridionalis stehen, die zum Austausch vielfach entgegengesetzter Ansichten geführt hat, und als vollständig geklärt kann die Sache wohl auch heute noch nicht angesehen werden. Ich selbst habe eigene, im Terrain durch Autopsie gemachte Erfahrungen in dieser Richtung nur wenige; dies erforderte, der Natur des Gebietes gemäss, langwierige Untersuchungen, setzte langjährige Bekanntschaft mit den Gegenden voraus, und auch dann noch hing der gewünschte Erfolg sehr viel vom Zufall ab. Die Fossilien liegen hier, mit vielleicht wenigen Ausnahmen, nicht in eigentlichen Knochenlagern, wie etwa bei Pikermi, Maragha etc., sondern weitaus der grösste Theil aller der in den Museen befindlichen stammt von gelegentlichen Funden, die von

Landleuten beim Bestellen ihrer Weinberge und Gärten, von Erdarbeitern, Sandgräbern u. s. w. gemacht und dann in die verschiedenen Museen verkauft wurden. Oft machten diese Fossilien, bevor sie in einem solchen endlich zur Ruhe kamen, wahre Odysseen durch; in den letzten Zeiten vereinigen sich die Funde einer Gegend in der Regel in den Händen eines unternehmenden Bauern, der sie dann erst an die verschiedenen Sammlungen gelangen lässt. Dass dies Alles aber für ihre Authenticität nicht sehr förderlich sein kann, liegt auf der Hand, ebenso wie man auf diese Weise noch lange zu keinem definitiven Resultat in dieser Frage gelangen wird. Ein weiterer Uebelstand ist ferner auch noch der, dass man in den Museen selbst in früherer Zeit die Fundortsangabe sehr leicht nahm und man z. B. in dem zu Florenz bei fast der Hälfte der Exemplare die Bezeichnung "Valdarno superiore" lesen kann, die man damals eben jedem Fossil kurz aufoctroyirte, das dem Aussehen nach ungefähr daher stammen konnte. Es mag darunter ein guter Theil im unteren Arnothal, manche vielleicht gar nicht im Arnothal gefunden sein.

Dies sei hier nur gesagt zur richtigen Beurtheilung der im Folgenden angegebenen Fossillisten von den einzelnen Oertlichkeiten des Arnothales. Allerdings muss hier wohl auch beigefügt werden dass dieser Schaden, der durch solche eventuell unrichtige Fundortangaben angerichtet wird, solange sich diese Unrichtigkeiten nur auf dem Gebiete des Arnothales selbst bewegen, in manchen Beziehungen — z. B. Alter von Mast. Arvernensis und Elephas meridionalis — nicht so gross ist. Man wird ja gleichzeitige Bildungen — lacuster im oberen, marin im unteren Arnothal — doch über jenes ganze Areal annehmen müssen; a priori werden die Reste der damaligen Thiere daher überall gefunden werden können. Der Streitpunkt kann daher wohl nur eine eventuelle Frage der Unterscheidung älterer und jüngerer Sedimente betreffen, die aber natürlich wieder nur ein an Ort und Stelle befindlicher Fachmann lösen könnte.

Dass man diese marinen Sedimente, in denen die Säugethierreste gefunden wurden, wirklich als gleichzeitig mit den lacustren wird betrachten müssen, scheint mir schon aus dem Vorkommen der letzteren zu erhellen. Dass sie in den marinen Thonen und Sanden überhaupt eingebettet liegen, kann mit einem jüngeren Alter dieser Knochen und weiter der lacustren Ablagerungen, wo sie normalmässig vorkommen, nicht mehr gut in Einklang gebracht werden, dass man daselbst aber ganze Skelette oder grössere Theile des Skelettes im vollen Zusammenhange findet, scheint auch ein jüngeres Alter auszuschliessen und unbedingt auf ihre Gleichzeitigkeit hinzuweisen. Man kann doch nur annehmen, dass diese Reste durch Wassertransport an diese ihre Stelle in den marinen Schichten gelangt sein können; befänden sie sich nur hier durch Umlagerung der Sedimente auf secundärer Lagerstätte, so könnten sie unmöglich in solcher Vollständigkeit — ganze Skelette — vorkommen, die Knochen müssten ja zerstreut worden sein. Es kann daher nur angenommen werden, dass vom Lande her durch die Gewässer (oder durch Verunglückung am Ufer) ganze Cadaver in's Meer hinausgeschwemmt und hier primär eingebettet worden wären.

Dieselbe Ansicht bezüglich des gegenseitigen Altersverhältnisses zwischen den diesbezüglichen marinen und lacustren Sedimenten vertreten, basirt auf langjährige Studien in diesen Gegenden, nebst Anderen auch de Stefani¹) und Forsyth Major²), die sich mir gegenüber zu öfters auch mündlich in diesem Sinne aussprachen. Ich kann daher bezüglich des Details auf diese verweisen.

¹⁾ C. de Stefani: Molluschi continentali pliocenici d'Italia. Abdruck aus den Atti della Società Tosc. di Scienze nat; Pisa. 1876—84; S. 4—6. — Id.: Descrizione degli strati pliocenici dei dintorni di Siena. Boll. R. Com. Geo. d'Italia, No. 5 u. 6. 1877, S. 155. — Id.: Quadro comprensivo dei Terreni, che costituiscono l'Apennino settentrionale. Separatabdruck aus: Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa, Vol. V, Fasc. 1. 1881; S. 88—89.

²) C. J. Forsyth Major: Considerazioni sulla Fauna dei Mamiferi pliocenici e post-plioc. della Toscana. Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa, Vol. I, Fasc. 3, 1876, S. 223.

Eine andere Frage ist nun weiter die, ob Mastodon Arvernensis und Elephas meridionalis im Arnothal zusammengelebt hatten oder ob sie verschiedenen Faunen angehörten, und zwar ob der zuerst genannte Proboscidier eine frühere Epoche des Pliocän charakterisire als der letztere.

Schon Strozzi¹) nahm im oberen Arnothal drei Horizonte an, von denen der untere, begründet auf angebliche Zähne von *Mastodon Pyrenaicus* Lart. und *Mastodon (Trilophodon) angustidens* Cuvier, dem oberen Miocän, der mittlere mit

Cervus pl. sp.,

Equus ,, ,,

Bos ,, ,,

Elephas (Loxodon) meridionalis Nesti,

Hippopotamus major Cuvier,

Rhinoceros leptorhinus Cuvier,

Mastodon (Tetralophodon) Arvernensis Croiz. et Job.,

Ursus, 2 sp.,

Sus, Tapirus, Hyaea, Felis,

dem subapenninen Pliocan angehört, das endlich von den "sables jaunes" mit Rindern, Hirschen, Pferden etc. und wahrscheinlich auch Rhinoceros hemitoechus Falc. überlagert würde.

Jener Zahn von Mastodon angustidens aus der Umgebung von S. Giovanni (Monte Carlo) gehört jedoch einem Mast. Arvernensis an, der Molar des angeblichen Mastodon Pyrenaicus, aufbewahrt zu Pisa, stammt nach Forsyth Major²) vielleicht aus Amerika. Schichten dieses von Strozzi vorgegebenen Alters wurden im Arnothal überhaupt noch nie gefunden; denn, abgesehen dass diese miocäne Säugethierfauna auf Irrthum beruht, gehört auch der von Gaudin angegebene untere Pflanzenhorizont mit der Flora von Oeningen nach de Stefani³) dem Pliocän an. Neuerdings hat insbesondere Ristori⁴) nachzuweisen gesucht, dass jene Pflanzen "communi alle flore mioceniche sono abbastanza ristrette di numero e non tali da imprimere alla flora valdarnese un carattere spiccato di maggiore antichità" und ihre längere Erhaltung hier der weit südlicheren Lage zuzuschreiben sei. Auch miocäne Mollusken wurden im Arnothal zwar gefunden, doch in schlechter Erhaltung in Rollstücken, die in ihrer Gesteinsbeschaffenheit mit dem Briocoenkalk vom benachbarten Monte della Verna so ziemlich vollkommen identisch sind. In anstehenden Schichten wurden sie hier noch nie getroffen.⁵)

Aus der soeben citirten Arbeit de Stefani's ist ferner auch noch zu bemerken, dass er Elephas meridionalis, Mastodon Arvernensis, Hippopotamus major als zusammen vorkommend angeführt.

Reste des zuerst genannten Thieres sind bei S. Giovanni, wie überhaupt in der ganzen Umgebung, überaus reichlich gefunden worden; nicht so häufig, wenn auch immerhin in den Museen zu Florenz, Montevarchi, Pisa durch sehr zahlreiche Exemplare vertreten, Mastodon Arvernensis. Nebst

¹⁾ Ch. Gaudin et C. Strozzi: Contributions à la flore fossile Italienne. Second Mémoire. Val d'Arno. I. Partie stratigraphique par M. le Marquis Carlo Strozzi, Zürich 1859, S. 14—15.

²) Fors. Major: Sul Livello geologico del Terreno in cui fu trovato il così detto Cranio dell' Olmo. Soc. Ital. di Antropol. e di Etnolog. 20. April 1876, S. 10 des Separatabzuges.

⁸⁾ C. de Stefani: Brevi appunti sui terreni pliocenici e miocenici della Toscana, Boll, R. Com. Geol. d'Italia, No. 11 u. 12, Roma 1877, S. 395—396.

⁴⁾ G. Ristori: Contributo alla flora fossile del Val d'Arno superiore. Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa, Vol. VII, 1886; S. 143—148.

⁵) Vergl. G. Ristori: Considerazioni geologiche sul Valdarno superiore, etc. Atti Soc. Tosc. Sc. nat., Vol. VII., 1886, S. 253—256.

der oben erwähnten Angabe bei Strozzi findet sich das Vorkommen dieses letzteren bei S. Giovanni (Monte Carlo) auch bei Nesti¹) citirt, indem sein schönes Cranialfragment sammt Unterkiefer nach seiner Aussage von dieser Localität stammt. In einer Abhandlung, die ein Jahr vor der zuerst genannten erschien, gibt Strozzi auch wiederum das Vorkommen der genannten Thiere im oberen Arnothal an, allerdings citirt er dabei auch El. antiquus, der wohl einer späteren Epoche angehören dürfte; sein Rhinoceros leptorhinus (syn. megarhinus de Montpellier), vielleicht sogar auch Rhin. tichorhinus dürfte auf Reste von Rhin. Etruscus basirt sein, welche Species von Falconer erst 1860²) aufgestellt wurde.³)

Auch Savi nennt im Jahre 1863⁴) als bezeichnende Thiere der "sabbie gialle plioceniche": Mastodon Arvernensis, Elephas meridionalis, Elephas antiquus, Rhinoceros hemitoechus, Rhin. megarhinus, Physeter sp., Balaena sp., Delphinus sp.

Im Jahre 1867 stellte Cocchi⁵) eine Zweitheilung des Pliocäns auf, dessen untere Abtheilung nach ihm durch Drepanodon, Ursus Etruseus Cuv., Hyaena 2 sp., Equus Stenonis n. sp., Hippopotamus major, Sus, Mastodon Arvernensis, Bos Etruseus, Cervus dieranius, besonders aber durch Elephas meridionalis charakterisirt ist, während das bezeichnende Thier für sein Oberpliocän Elephas antiquus, für das darauffolgende Pleistocän Elephas primigenius ist. Da jedoch der zweitgenannte Elephant einer späteren Zeit angehört, so bleibt hier also auch nur wieder das Interesse jener mit El. meridionalis vergesellschaftet angeführten Fauna für die vorliegenden Zwecke übrig.

Eine gleiche Vergesellschaftung — wenigstens bezüglich der hier in Betracht kommenden Species — citirt auch Falconer aus dem Arnothal.⁶) Er geht jedoch hier das erste Mal auf die Frage ein, die uns eben beschäftigt, in welchem Verhältniss zu einander, bezüglich der Zeit des Auftretens, Mastodon Arvernensis und Elephas meridionalis stehen, und spricht sich für die Gleichzeitigkeit derselben aus.

Fuchs') hingegen und Neumayr's) betrachten Mastodon Arvernensis (mit Mast. Borsoni, Tapirus priscus) als entschieden älter als Elephas meridionalis. Während Neumayr jedoch letzteren mit dessen Fauna (Hippopotamus major, Equus Stenonis, Bos Etruscus, Canis etc.) als Repräsentanten seiner zweiten Pliocänfauna (jüngere Fauna des Arnothales) und Mast. Arvernensis als solchen seiner ersten Pliocänfauna betrachtet, soll sich nach Fuchs Elephas meridionalis auf's Innigste den Quartärbildungen, Mastodon Arvernensis hingegen auf's Engste den Congerienschichten — Pikermi-Fauna — anschliessen. Letztere sieht er daher als unteres Pliocän, die Schichten mit Mast. Arvernensis als oberes Pliocän, die mit Elephas meridionalis aber als quartär an.

¹⁾ F. Nesti: Lettera seconda dell' Osteologia del Mastodonte a denti stretti. Pisa 1826, S. 6.

²⁾ Und auch da ohne jede Beschreibung, die erst 1858 folgte.

³⁾ Ch. Th. Gaudin et C. Strozzi: Mémoire sur quelques gisements de feuilles fossiles de la Toscane. Partie stratigraphique par M. le Marquis Carlo Strozzi. Zürich 1858, S. 8—9.

⁴) P. Savi: De' movimenti avvenuti dopo la deposizione del Terreno Pliocenico nel suolo della Toscana, etc. Estr. del Nuovo Cimento. Fasc. di Aprile e Maggio, Pisa 1863, S. 11, Note.

⁵⁾ Ig. Cocchi: L' Uomo fossile nell' Italia centrale. Mem. Soc. Ital. Sc. nat., T. II., Nr. 7, Milano 1867, S. 16-17.

⁶⁾ Falconer: British and Europeen fossil Mastodonts. Quart. Journ. Geol. Soc. London, Nov. 1857, und Wiederabdruck in den Pal. Mem. II, London 1868, S. 47.

⁷⁾ Th. Fuchs: Ueber neue Vorkommnisse foss. Säugethiere von Jeni Saghra in Rumelien und Ajnácskö in Ungarn, nebst etc. Verh. k. k. geol. Reichsanst. 4. Febr. 1879, Nr. 3, S. 50—58. — Id.: Beiträge z. Kenntniss der plioc. Säugethierfauna Ungarns. Ibid. 18. Nr. 12. — Id.: Einige Bemerk. zu Prof. Neumayer's Darstellung der Gliederung der jungtert. Bildungen im griech. Archipel. Ibid. 31. Mai, 1881, Nr. 10, S. 173. — Id.: L'âge des couches à Hipparions. Boll. R. Comit. geol. d'Italia. Nr. 1 u. 2, Roma 1876, S. 17—18.

s) M. Neumayr: Mastodon Arvernensis aus den Paludinenschichten Westslavoniens. Verh. k. k. geol. Reichsanst., 31. Mai 1879, Nr. 9, S 176—180. — Id.: Ueber den geolog. Bau der Insel Kos etc. Denkschr. math.-naturw. Classe d. k. Akad. Wissensch. Bd. XL, Wien. 1879, S. 42 (des Separatabdruckes).

Sandberger¹) spricht sich auf's Allerbestimmteste für das Zusammenleben der gesammten in Rede stehenden Fauna aus und stellt sie sammt den nach ihm blos eine etwas tiefere Stufe bildenden Sanden von Asti etc. in's obere Pliocän.

Für die Einheitlichkeit der gesammten Fauna tritt auch ausdrücklich Gastaldi ein,²) nur dass er sie postpliocän, doch präglacial nennt. In derselben Arbeit druckt er auch ein Schreiben Cornalia's ab, worin dieser sich für das entschieden postpliocäne Alter der Lignite von Leffe (Lombardei) gleich Stoppani³) erklärt — dem jedoch von Forsyth Major⁴) ebenso entschieden widersprochen wird — und bezüglich des Arnothales sagt: "Il proboscideo che vi (i. e. Leffe) trovai abondante è l'Elephas meridionalis, che invero è indicato come pliocenico, ma per errore, perchè anche tutta la giacitura di quell' animale in Toscana (Val d'Arno) è a torto ritenuta pliocenica." (S. 23.)

Auch Forsyth Major war zu Anfang nicht so ohne weiteres geneigt, ein Zusammenleben dieser gesammten Fauna zuzugeben, sondern er forderte zur Anerkennung dieser Ansicht vorerst bessere Beweise als diejenigen, welche bis dahin die einzelnen Fundstellen geliefert hatten. Schon 1876 aber sprach er sich auf's Bestimmteste dahin aus, "che maggior parte dei Mammiferi sopra enumerati (d. h. die gesammten die "Valdarnofauna" bildenden Säuger) sono in fatti contemporanei ed appartengono ad un orizzonte, che per ragioni le quali spiegherò, chiamo pliocene superiore, "5) und an anderer Stelle, 6) dass gegenwärtig kein Zweifel existiren kann, dass die marinen Pliocänlager des unteren und die lacustren des oberen Arnothales und des übrigen Toskana eine vollkommen identische Fauna enthielten.

De Stefani hält, wie er die marinen Schichten des unteren mit den lacustren des oberen Arnothales für gleichzeitig ansieht, auch die gesammte sogenannte Fauna des Arnothales für einheitlich.⁷)

Auf folgender Seite wurde lediglich nach den den einzelnen Fossilien im Florentiner Museum beigegebenen Fundortsangaben eine Tabelle der letzteren zusammengestellt, die jedoch nur das hier zunächst in Betracht kommende Arnothal umfasst. Die Zahl der Sternchen soll — natürlich ganz im Rohen — die Häufigkeit der bisher gemachten Funde andeuten. Hiebei sei noch Folgendes bemerkt: Die nahe bei einander gelegenen Oertlichkeiten Monte Carlo, Tasso, Infernuzzo, Figline, Terranuova, Le Ville, Vacchereccia, Castellfranco, Reggello bilden einen Complex, wo überall diese Valdarnofauna seit langen Zeiten sehr reichlich gefunden wurde und stets noch gefunden wird, so dass man bei vielen der Reste wahrscheinlich einen Namen ebensogut wird anwenden können wie den eines benachbarten Ortes. Hierauf beruht es, dass im Früheren gesagt wurde, dass im Grossen und Ganzen eine eventuell unrichtige Fundortsangabe, so lange sie sich innerhalb dieser Grenzen bewegt — und das ist wohl meist der Fall — keinen so erheblichen Schaden anstiften kann. Rignano liegt etwas weiter thalabwärts am Knie des Arno, Malpasso wieder etwas thalaufwärts, während Percussina sich eigentlich nicht mehr im Arnothal, sondern südlich von Florenz befindet.

S. Miniato liegt etwas oberhalb, Montopoli unterhalb von Empoli, wo die Bahn nach Siena abzweigt, Palaja etwas südlich von Montopoli nicht mehr im eigentlichen Thal des Arno, noch südlicher, im Thal der Era, Peccioli bei Pontedera.

¹⁾ F. Sandberger: Die Land- und Süsswassermolusken der Vorzeit. Wiesbaden 1870–1875. S. 743 u. 747–748.

²) B. Gastaldi: Appunti sulla Memoria del. sig. G. Geikie: On changes of chimate during the glacial epoch. Atti R. Accad. Scienze Torino, Vol VIII, 20. Apr. 1873.

³⁾ A. Stoppani: Corso di Geologia. Milano, 1873, S. 667 u. ff.

⁴⁾ F. Major: È glaciale l'Ossario della Val d'Arno superiore? Proc. verb. Soc. Tosc. Sc. nat. Adun. 9 Marzo 1879, S. 85.

⁵⁾ F. Major: Considerazioni sulla fauna dei Mammiferi della Toscana, S. 223.

⁶⁾ Quart. Journ. Geol. Soc., Vol. 41, 1885; S. 4.

⁷⁾ Natürlich bis auf die diluvialen Vorkommnisse. — Diese seine Ansicht findet sich an zahlreichen Stellen ausgesprochen, wie. z. B.: Molluschi cont. d'Italia, 1876; S. 5. — Quadro comprensio etc., 1881; S. 39.

						Ope	res	Ar	noth	hal							Unt	Unteres		Arnothal	ıal	
					[(.natio)					bei Rignano			Florenz		1 1	ser.		(*puo)		b. Peccioli	iol
	Monte Carlo	ossaT II	ozzuntəlaİ	Figline	Тетгапиоуа	Le Ville (bei	Vacchereccia	Castellfranco	Reggello	Renacci	ouvz -zaumzs	Bisticci Percussina (I	S, Casciano Viale dei	Colli Evang, Friedh, ausserhalb d, Porta Romana	ossedieik	S. Miniato al	A) iloqotaolZ 81 s'toįslZ	iloqomold	Palaja (südl. r. l	Peccioli bei P	Cerreto Guidi	Terriciola
Macacus Joventinus		×			X	X																
Felis sp. minima		×		×		×		,						•	•							
" " media		X			٠	×		X							٠		×					
	٠	X			,		٠	×		_				•								_
Machairodus cultridens .	•	X		X							×											
ds	×	×	×	×	×		,							٠								
» • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		*		,							×		-									
Hyaena Topariensis		٠			. •				٠		4						×					
" robusta	×	×	×		,						\times	_	· ·	•		-						_
Canis Falconeri						×								•								-
" Etruscus		X			×	×					_ ×			•		-	×			-		
Ursus Etruscus		×	×	×		X					_		-	*								
Equus Stenonis		×	×	X	X	X	×				-		-			·	×	×				
" quaggoides						×						-		•		_				-		
Rhinoceros Etruscus	×	X		X	X	×	×	×						•	•	\times	×	×				
Sus Strozzii	\times	X					×			•				٠								
Bos Etruscus	×	×		X	XXX	×									\times		×	×				
Cervus dicranius		٠		×		×								_						-		
" Nestii		X	•	×	,		-					-		_	٠		×					•
" Perrieri		•	•	×			,					-		•	•							
Hippopotamus major	×			X		-	×	×		×	-				×							
Mastodon Arvernensis .	×			,	•		×				×	×		×	٠	×	×	×	×	×	X	•
Elephas meridionalis	X	X	٠	,	X	×	×	×	\times		×(3)	4	× -		×		X	×	-	X		X
Castor Rosinae					×										٠							
" plicidens	×	٠	٠		×				-					,	٠							
Lepus Valdarnensis		X			,				,			,		,					٠			
Arvicola pliocaenicus				•	X										٠					-		
		_	_	_																		_

Was die Tabelle jedoch - ich möchte sagen durch die Massenwirkung - lehren kann, ist, dass eine Scheidung der Fauna sowohl im marinen unteren, als im lacustren oberen Arnothal, als auch ferner zwischen beiden wohl nicht gut durchführbar ist. Dieselben Thiere, die man an sehr zahlreichen Punkten in den Süsswasserschichten gefunden, kommen ebenso wieder in den marinen Bildungen vor, und zwar, wie anfangs erwähnt, in einem Zustande, dass man auf die Gleichzeitigkeit dieser Meeresablagerungen und der betreffenden Thiere schliessen muss. So wurden bei der Ausgrabung im Jahre 1880 bei Montopoli durch Forsyth Major1) unter zahlreichen anderen gefunden: zusammengehörige Metacarpus, Phalanx 1 und 2 von Equus Stenonis, ein vollständiger, sehr gut erhaltener Vorderfuss von Bos Etruscus, zahlreiche, mehr oder weniger vollständige Reste von Vorderund Hinterfüssen eines grösseren Hirsches; so befinden sich hier im Museum von derselben Localität, vor Langem schon gefunden, zusammengehörige Stücke eines alten Mastodon Arvernensis (Oberkieferfragment, Unterkiefer, Atlas, Epistropheus, Schulterblatt, Radius und Ulna, Carpus und Metacarpus, Becken, Femur, Patella, Tibia und Fibula), ferner die vier fast vollständigen Extremitäten, Unterkiefer, Fragmente des Schädels, Wirbel, Rippen, Schulterblatt, Becken eines Rhinoceros Etruscus, ebendaselbst und gleichfalls im Jahre 1880, jedoch von Prof. Toscani ausgegraben und von ihm dem Museum zu Florenz geschenkt.

Ebenso vollständige und wohlerhaltene Reste — natürlich nur in grösserer Zahl — besitzt das Museum auch aus den Süsswasserbildungen des oberen Arnothales: Eine vollständige Vorderextremität und eine solche bestehend aus Vorderarm, Carpus und Metacarpus, die jedenfalls demselben Individuum angehören, von Mastodon Arvernensis von Monte Carlo; aus dem "Valdarno superiore" ein vollständiger Hinterfuss (Carpus, Metacarpus und Phalangen), sowie ein vollständiges Skelett, bis auf die Füsse, von El. meridionalis; von Tasso mehrere fast ganz erhaltene Extremitäten von Cervus; besonders ist es aber die Ortschaft Figline, von der nicht weniger als vier mehr oder weniger vollständige Hinterfüsse und zwei ebensolche Vorderfüsse von Hippopotamus, zwei Vorderfüsse von Rhinoceros Etruscus, mehrere Extremitätenpartien von Equus Stenonis u. s. w. vorhanden sind. Auch ein vollständiges, montirtes Skelett von Hippopotamus major ist hier im Museum mit der Fundortsangabe Figline, doch ist es offenbar aus verschiedenen Funden zusammengesetzt worden.

Nach dem Allem, glaube ich, ist der Schluss berechtigt, dass sämmtliche diese Thiere auch in derselben Zeit gelebt haben müssen, wo diese Schichten, in welchen diese ihre Cadaver oder doch wenigstens noch durch Weichtheile verbundene Partien derselben eingebettet wurden, zur Ablagerung gelangt sind.

Aber auch, was die Thiergesellschaft selbst betrifft, scheint das Auftreten ihrer Reste sehr dafür zu sprechen, dass sie eine einheitliche, gleichzeitige sei, besonders aber dass Mastodon Arvernensis keinen älteren gesonderten Horizont charakterisire als Elephas meridionalis; es mag ja vielleicht sein, und es ist sehr gut möglich, dass der letztere beim ersten Auftreten des ersteren noch nicht vorhanden war, dass er ihn andererseits aber etwas überlebte, aber nach den Verhältnissen hier liesse sich dies wohl nicht beweisen. Es ist ferner richtig, dass unter den Augen eines Fachmannes noch nie ein Rest von Mastodon Arvernensis unmittelbar zusammen mit Elephas meridionalis ausgegraben wurde; zu öfters jedoch schon, dass eines der beiden mit Angehörigen genau derselben Fauna gefunden wurde. So lieferte vor Allem Forsyth Major's Ausgrabung bei Montopoli:

Mastodon Arvernensis Croizet et Jobert. Rhinoceros Etruscus Falconer. Equus Stenonis Cocchi.

¹⁾ Es existirt darüber nur ein Bericht A. Stoppani's in dem Tagesblatt "Nazione" vom 23. Mai 1880.

Bos Etruscus Falconer.
Cervus Nestii Major.
Cervus sp. major.
Hyaena Topariensis Major (= Perrieri Croiz. et Job.)
Felis sp. media.
Canis Etruscus Major.

Ferner wurde auch, zwar nicht an derselben Stelle, aber nicht weit davon, wie mir Forsyth Major selbst versicherte, ein Molar eines Elephanten gefunden. Es ist ein Fragment eines typischen oberen M_3 von Elephas meridionalis.

An demselben Orte, wo Major die obgenannten Säugethiere ausgrub, fand Pantanelli¹) folgende Mollusken: Ostrea lammellosa, Pecten varius, Pecten flabelliformis, Cardium edule und Cerithium doliolum, und in jenem Lager, aus dem Prof. Toscani das fast vollständige Skelett eines Rhinoceros Etruscus zu Tage geschafft hat: Cerithium tricinctum, Ostrea lammellosa, Venus islandicoides und Cardium edule (S. 267). Ebendaselbst wurde auch der von Capellini²) beschriebene Idiocetus Guicciardinii Cap. gefunden, der jedoch keine Schlüsse auf das Alter dieser Schichten erlaubt.

"Dicht bei der Stelle, die das Skelett des Mastodon Arvernensis im Florentiner Museum geliefert hat", wurde ferner von Capellini ein Astragalus eines Equus Stenonis nebst Zähnen zweier Hirsch arten ausgegraben.³)

An derselben Stelle führt Forsyth Major auch an, dass Prof. Capellini aus der Umgebung von Chiusi (Val di Chiana) *Elephas meridionalis* zusammen mit Ueberresten von *Equus Stenonis* und "Cervus ctenoides" erhalten habe. Aus derselben Gegend stammten nach ihm ferner Gebissstücke des *Equus quaggoides* Maj.⁴).

Wie *Elephas meridionalis* hier mit pliocänen Arten angetroffen zu sein scheint — denn es ist leider nicht angegeben, ob diese Knochen zusammen und von wem gefunden worden sind — so gibt andererseits Stoppani selbst das Vorkommen desselben mit *Bos Elruscus*⁵) — also einer Art, die im Arnothal allüberall mit *Mastodon Arvernensis* (auch Montopoli), vergesellschaftet ist — bei Leffe in der Lombardei an, während nach Fuchs *Elephas meridionalis* mit *Hippopotamus major* nur in pleistocänen Schichten vorkommen soll.

Was Hippopotamus major betrifft, so gilt bezüglich seines Vorkommens genau auch das schon früher Gesagte. Er ist nach jetzigen Erfahrungen von der übrigen Valdarno-Fauna nicht gut trennbar. Dass er sich dabei vorzüglich an gewissen Stellen sehr häufig, an anderen wieder gar nicht findet, kann wohl seiner Lebensweise gemäss nicht auffallen. So lieferte Renacci bisher nur eine grosse Zahl von Knochen dieses Thieres, weiter thalaufwärts findet es sich bei Figline am häufigsten. Im unteren Arnothal wurde es meines Wissens noch gar nicht gefunden; hier fehlen überhaupt die eigentlichen Sumpfthiere (Flusspferd, Schwein), die wahrscheinlich durch ihren Aufenthalt an Orten mit mehr ruhigem Wasser vor allen jenen Zufällen, die ihre Körper in das Meer hinaustragen konnten, geschützt waren. Es ist ja sogar nach heutiger Kenntniss nicht so ganz unmöglich, dass das jetzige obere Arnothal mit dem unteren zur Pliocänzeit überhaupt gar nicht in Verbindung gestanden

¹) D. Pantanelli: Conchigli Plioceniche di Pietrafitta in Provincia di Siena Boll. Soc. Malac. Ital., Vol. VI, 1880, Pisa 1881; S. 266.

²⁾ G. Capellini: Sulle Balene fossili Toscane. Atti R. Acad. dei Lincei. T. III, Ser. 2; Roma 1876, S. 6.

³⁾ Forsyth Major: Beiträge zur Gesch. der fossilen Pferde, insb. Italiens. Abh. schweiz. pal. Gesellsch., Vol. VII, 1880, S. 51.

⁴⁾ Fors. Major, l. c., S. 117.

⁵⁾ Stoppani: Corso di Geologia, S. 669.

ist, sondern blos nach Süden zu mehrfachen Abfluss hatte. Auch dass sie z. B. am Strande selbst verunglückten, ist bei ihrer Lebensweise wenig wahrscheinlich.

Aus der Nähe von Chiusi wird es von Pantanelli¹) direct als Begleiter des *Mastodon Arver-nensis* in den "sabbie gialle" von Chianciano angeführt, allerdings nicht auf Grund eigener Funde, sondern auf die Angaben Targioni's hin.²)

In einer wieder etwas verschiedenen Gesellschaft finden wir Mastodon Arvernensis in den Ligniten von Spoleto. Die spärliche Fauna derselben besteht nach Pantanelli⁸) aus folgenden Vertebraten:

Mastodon Arvernensis, Cr. et. Job., Mastodon Borsoni, Hays., Tapirus Arvernensis, Cr. et Job.

Im Liegenden befindet sich in lacustren Bildungen folgende Molluskenfauna:

Belgrandia prototypica Brus.,
Neumayria labiata Neum.,
Emmericia umbra de Stef.,
Melanopsis Esperi Ferr.,
Melanopsis flammulata de Stef.,
Valvata piscinalis Müll.,
Neritina Pantanellii de Stef.,
Pisidium Lawleyanum de Stef.,
Lymnacea subpalustris Thom.,
Unio sp.,

die nach Prof. d'Ancona eine vollständig pliocäne ist. Zum Theil findet sie sich auch in den Pliocänbildungen des Arnothales.

Aus denselben Ligniten sah ich selbst in Rom einen Molar und Stosszahn von Mastodon Arvernensis und weiter einen letzten unteren Backenzahn der rechten Seite eines Castor, der von dem Zahn eines recenten Bibers wohl kaum zu unterscheiden ist.

Aehnlich ist sein Vorkommen in den Ligniten von Castelnuovo di Garfagnana im Thal des Serchio (Provinz Massa). Hier wurde von de Stefani⁴) von unten beginnend folgende Schichtenserie mit folgenden Fossilresten beobachtet:

- I. Sus Arvernensis, Tapirus sp.
- II. Zahlreiche Pflanzenreste; nach de Bosniaski dieselben, die sich auch im Pliocän des Arnothales und bei Caniparola (bei Sarzana) finden.
- III. Hyalinia olivetorum Gmel.
- IV. Ein bedeutenderer Schichtencomplex, ober dessen Mitte ungefähr vor vielen Jahren ein Stosszahn von Mastodon Arvernensis gefunden wurde.

¹) D. Pantanelli: Sul Pliocene dei dintorni di Chianciano (Toscana). Boll. R. Com. geol. d'Italia, 1878, Nr. 1—2 Roma, S. 11.

²⁾ Targioni Tozzetti: Analisi chimica delle acque minerali di Chianciano. Firenze, 1833.

³⁾ D. Pantanelli: Vertebrati fossili delle ligniti di Spoleto. Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Pisa, Vol. VII, 1886, S. 93.

⁴⁾ C. de Stefani: Le Ligniti del Bacino di Castelnuovo di Garfagnana. Abdr. aus dem Boll. R. Com. geol. d'Italia, 1887, Nr. 7 u. 8, S. 14-20.

V. Ccrvus sp., Mastodon Arvernensis (Spitze eines kleinen Stosszahnes), Tapirus sp., Machairodus cultridens (Schneidezähne), Helix Italica de Stef., Helix Brocchii Mayer, Hyalinia cfr. Isseliana Paul., Hyalinia olivetorum Gmel., Glandina lunensis d'Anc., Carychium rufolabiatum de Stef., Vivipara sp. nov., Unio cfr. Pillae de Stef.

VI. —.

VII. Neritina Bronni d'Anc., Bythinia sp. (Deckel), Nematurella ovata Bronn, Melania sp. vic. M. curvicostae Desh., Melanopsis sp. (Fragment), Unio sp. (Fragment), Cypris sp., Holz, Blätter.

VIII. Mastodon Arvernensis (Molar).

IX. Conglomerate mit Mast. Arvernensis (ein unterer M3 im Museum zu Florenz).

X. Mastodon Arvernensis (Molar).

De Stefani bemerkt dabei betreffs *Mastodon* (S. 20): "Il *Mastodon* è il fossile più recente, ed invece di trovarsi negli strati più antichi, come pretendono i facitori di piani, vi manca." Doch hätte dies Vorkommen von *Mastodon* offenbar nur dann den ihm hier beigemessenen Werth, wenn sich nachweisen liesse, dass diese obersten Schichten auch wirklich den jüngsten Pliocänschichten, z. B. im Arnothal, entsprächen.

Doch wenn man diesen Fall auch entschieden nicht als Beweis anführen kann, dass Mastodon mit Elephas meridionalis zusammen gelebt haben muss, so fehlt es andererseits doch nicht an directen Angaben, dass diese beiden Formen zusammen gefunden worden seien. Doch muss man gestehen, dass sie alle noch nicht vollständig überführend sind, theils weil sie auf zu unsicheren Resten beruhen, theils weil der Nachweis der Auffindung in derselben Schichte zu wünschen übrig lässt und noch immer nicht als vollkommen beweiskräftig angesehen zu werden braucht.

So berichtet Mantovani¹) von zwei Molaren mit Theilen der Maxillaria und einer Tibia, die von Cav. Dario Nicodemi in seinem Garten bei S. Miniato zusammen mit einem Stosszahnfragment gefunden wurde, das von Ersterem "nach seiner Form" einem El. meridionalis zugeschrieben wird. Das Exemplar ist 49 cm lang und hat an der Bruchstelle einen grösseren Durchmesser von 12 und einen kleineren von 9 cm. Mehrere Stosszähne beider Arten des Florentiner Museums zeigen an derselben Stelle folgende Masse:

Elephas meridionalis:

```
Grösserer Durchmesser . . 14.5 - 14.0 - 12.5 - 12.5 - 11.5 cm Kleinerer . . . 12.5 - 13.0 - 11.0 - 10.5 - 0.5 ...
```

Mastodon Arvernensis:

Nach der Grösse und insbesondere der stark elliptischen Form des Querschnittes dürfte sich dieses Fossil in der That also am besten dem *Elephas meridionalis* anschliessen. Desselben oder eines ähnlichen Falles thut von S. Miniato auch de Stefani Erwähnung²), indem er aus den dortigen Thonen Reste von Elephanten zu einem im Gymnasium von S. Miniato aufbewahrten Stosszahn von *Mastodon*, aus den tieferliegenden Schichten einen *Rhinoceros-*Zahn citirt.

Die zweimalige Auffindung von Mastodon und in deren Nähe Reste von Elephas bei Montopoli weiter thalabwärts wurde bereits im Früheren erwähnt.

¹⁾ Pio Mantovani: Catalogo illustr. collez. storia nat. R. Ist. techn. Livorno, 1833, S. 61-62.

²⁾ C. de Stefani: I Terreni supapennini etc. Atti Soc. Tosc., Sc. nat., Vol. I, Fasc. I, Pisa 1975, S. 47.

Endlich muss auch noch auf die Angaben Sismonda's 1) hingewiesen werden, nach welchen bei Villafranca "a poca distanza" von dem von ihm beschriebenen fast vollständigen Mastodontenskelett "Zähne von Elephanten, Geweihstücke von Hirschen und ein Unterkiefer von Rhinoceros" gefunden wurden. Und weiter fanden sich "ancora nell' istesso terreno, ma più verso il paese detto Ferrere" mit Molaren und einem prächtigen Stosszahn eines Mastodonten, Zähne von Hippopotamus und Tapirus. Allerdings muss aber hier bezüglich der Authenticität F. Major's Bemerkung 2) wiederholt werden.

Was aus all diesem bezüglich des zeitlichen Vorkommens der Mitglieder der sogenannten Valdarno-Fauna hervorzugehen scheint, glaube ich in Folgendem zusammenfassen zu können:

In der That kann man nach den bisherigen Vorkommnissen im Thal des oberen Arno selbst nicht unbedingt nachweisen, dass Mastodon Arvernensis, Elephas meridionalis, Hippopotamus major, Rhinoceros Etruscus, Bos Etruscus, Equus Stenonis etc. auch zusammen dort gelebt hätten; man muss es vorläufig durch Combination der einzelnen Vorkommnisse blos als überaus wahrscheinlich verzeichnen. Die Marinbildungen des unteren Arnothales zeigen genau dieselbe Fauna, nach deren Vorkommen man auch auf die Gleichzeitigkeit dieser Meeresablagerungen schliessen kann.

Nichtsdestoweniger könnte man nach gewissen Fällen für Mastodon Arvernensis doch annehmen, dass es schon etwas früher aufgetreten war. Dahin gehört insbesondere sein Vorkommen bei Castelnuovo di Garfagnana und Spoleto. An beiden Localitäten tritt es mit Tapirus vereint auf, bei Spoleto auch noch mit Mastodon Borsoni. Man muss wohl ohne weiteres zugeben, dass diese beiden Thiere der typischen Valdarno-Fauna eigentlich bis jetzt ganz fremd gegenüberstehen. Es wäre denn doch eigenthümlich, dass bei der ausserordentlichen Menge von Fossilien, die das obere Arnothal bis heute geliefert hat, ein Tapir bis jetzt nicht gefunden worden wäre, trotzdem das Terrain doch hier für ihn gewiss günstig war und sein Vorkommen bei Castelnuovo und Spoleto relativ sogar häufig genannt werden muss, wenn er dort ebenso zahlreich wie an den letztgenannten Orten vorhanden gewesen wäre. Wohl findet er sich aber zusammen mit Semnopithecus monspessulanus (Mesopithecus? nach Major), Hipparion, Antilope Cordieri etc. bei Casino³) in einem bedeutend älteren Niveau, das seine zunächstliegendste Vergleichsfauna offenbar bei Pikermi besitzt, wie er denn überhaupt für Europa einen alterthümlicheren Typus repräsentirt, dessen Mangel im eigentlichen Arnothal, und wo sonst noch diese Fauna gefunden wurde, auffallen muss.4)

Auch Mastodon Borsoni scheint solch einen etwas älteren Typus zu repräsentiren. Nebst dem Originalzahne von Asti in Piemont existirt von italienischen Vorkommnissen nur noch ein zweiter im Museum der Accademia Valdarnese zu Montevarchi, der aus dem "Valdarno superiore" stammen soll, dessen genauer Fundort jedoch unbekannt ist. Er muss deshalb vollständig bei Seite gelassen werden.⁵)

In Oesterreich fanden sich nach Vacek⁶) Reste dieser Art in den marinen Sanden von Neudorf a. d. March, in denen nach H. v. Meyer und Kornhuber sogar eine typisch obermiocäne

¹⁾ E Sismonda: Osteogr. d'un Mast. angust. Mem. R. Accad. Scienze nat. Torino, Ser. II, Tom. XII, 1851, S. 58.

²⁾ Consid. Mammif. foss. Toscana, S. 29

³) Major führt zwar bei Besprechung dieser Fauna (Consider. Mammiferi foss. Toscana. Atti Soc. Tosc. Sc. nat. Vol., I, Fasc. 3, S. 229) *Tapirus* nicht an, doch sah ich Zähne desselben von dieser Localität im Museum zu Pisa, wie sie auch von de Stefani neuerdings citirt werden (Quadro comprens., S. 37).

⁴⁾ Falconer citirt zwar als Mitglied der Valdarno-Fauna auch einen Tapirus (Pal. Mem. II, S. 47), doch weiss ich nicht, worauf er dies sein Citat basirt. Auch Major (Considerazioni etc. S. 38) weiss nichts von einem solchen Fund. Ohne Fundortsangabe traf ich Reste von Tapirus in der Universitätssammlung zu Rom und in dem Museum der Accademia dei Fisiocritici von Siena. — Vergl. jedoch eine Berichtigung F. Major's in Proc. verb. Soc. Tosc. Sc. nat., 3. März 1890, S. 69. Bezüglich jenes Kiefers konnte ich mich natürlich nur auf die Angaben des Herrn Prof. C. de Stefani stützen (Anm. währ. d. Correct.)

⁵⁾ Im Museum zu Rom sah ich zwei Molaren eines tapiroiden Mastodon, jedoch ohne Fundortsangabe.

⁶⁾ M. Vacek: Ueber österreichische Mastodonten etc. Abh. d. k. k. geol. Reichsanst., Bd. VII, Hft. 4; Wien 1887, S. 9-11.

Fauna mit Dinotherium, Anchitherium, Palaeomeryx etc. vorkommt; ferner im Belvedèreschotter bei Strass-Sommerein (Wieselb. Com.), in Congerienschichten¹) bei Theresiopel und endlich bei Baltavár, also stets in Schichten, denen ein höheres Alter zukommt.

β) Uebriges Europa: Oesterreich. In der gleichen Gesellschaft wie bei Castelnuovo findet sich Mastodon Arvernensis auch in den Ligniten von Bribir; Vacek²) gibt als Begleitfauna nach Hoernes Cervus und Tapirus an, zu dem dann nach einem Stosszahnfragment jedoch auch ein Elephas hinzukommt. Auch Fuchs eitirt dieses Vorkommen³).

England. Von englischen Lagerstätten beschreibt Lankaster 4) Zähne von Mastodon tapiroides aus dem Sussolk Bone-bed, dem Liegenden, oder auch der tiefsten Schichte (Woodward) des Coralline Crag. Der von ihm und Busk 5) als ganz zweifellos vollständig bezeichnete Zahn wird von Lartet 6) und insbesondere Lydekker 7) ebenso entschieden als unvollständig bezeichnet und zu Mastodon longirostris gestellt, mit dem auch die Zeichnung bei Lankaster wohl gewiss mehr Aehnlichkeit hat als mit ersterem. Dagegen sind die beiden andern von Lankaster abgebildeten Reste wirklich tapiroide Mastodonten, gehören jedoch dem Mastodon Borsoni an. Dass jedoch die Fauna, mit der diese Zähne vergesellschaftet gefunden wurden:

Sus sp.

Rhinoceros Schleiermacheri (+ (?) Rh. Etruscus + (?) Rh. megarhinus)

Tapirus priscus

Mastodon Arvernensis

Cervus sp.

Hipparion sp.

Equus sp.

Castor veterior

Ursus Arvernensis

Felis sp.

Hyacna antiqua

auch wirklich eine einheitliche sei, kann wohl mit vollem Recht bezweifelt werden, zumal eine Vermischung schon durch das Vorkommen sogar eocäner Typen (Hyracotherium, Coryphodon) evident gemacht ist.

Lydekker^s) beschreibt dieselbe Fauna als aus dem Red Crag kommend, wohin auch Geikie sie stellt.⁹) Nur zählt er (sowie auch die *Hyaena Arvernensis* aus Frankreich und Italien) die Craghyäne zu *Hyaena striata* ¹⁰), thut bezüglich der Mastodonten obige Berichtigungen, stellt das *Sus* vorläufig zu *S. palacochoerus*, den Tapir lieber zu *Tapirus Arvernensis*, die Rhinoceronten zu *Rh. incisivus*, *Schleiermacheri* und vielleicht *Etruscus* und nennt endlich als neues Mitglied einen Albatros.

¹⁾ Nach Th. Fuchs; Neumayr sieht sie als Aequivalente der levantinischen Stufe an.

²⁾ M. Vacek: l. c., S. 36.

³⁾ Th. Fuchs: Intorno alla posizione degli strati di Pikermi, Boll, R. Com, geol, d'Italia, No. 3 u. 4, Roma 1878, S. 114.

⁴⁾ E. Ray Lankaster: Contributions to a knowledge of the Newer Tertiaries of Suffolk and their Fauna. Quart. Journ. Geol. Soc. London, Bd. XXVI, 1870, S. 493.

⁵) I. c. S. 508, Note.

^{6) 1.} c

¹⁾ R. Lydekker: Note on some Vertebrata from the Red Crag. Ibid., Vol. XLII, 1886, S. 365.

S) Lydekker, l. c.

⁹⁾ A. Geikie: Textbook of Geology. London, 1882, S. 879; — Ch. Lyell: Elements of Geology. London 1865, S. 196-201; — A. de Lapparent: Traité de Géologie. 2. Éd. Paris 1885, II. Bd., S. 1213. — Von Prestwich (Geology, Vol. II, Oxford 1888, S. 420-424) wird M. Arvernensis aus allen drei Horizonten angegeben.

¹⁹⁾ Siehe darüber Weithofer: Fossile Hyänen des Arnothales, Denkschr. k, Akad. Wiss, Wien. Bd. 55, Abth. I, 1889.

Ob aber andererseits die hypothetische Zertheilung dieser Fauna, insbesondere die aus dem Norfolk Stone-bed, wie sie Lankaster vornimmt, eine berechtigte ist, muss natürlich vorläufig noch völlig dahingestellt bleiben. Für das Alter des Mastodon Borsoni kann man daher hieraus keinen Gesichtspunkt ableiten; wohl aber scheint nach diesen Vorkommnissen der Schluss erlaubt, dass Mastodon Arvernensis früher aufgetreten ist als Elephas meridionalis.

Dieser erscheint — nach jetziger Erfahrung — zuerst im Norwich Crag (Fluvio-marin Crag, Stone-bed) und wird hier mit *Mastodon Arvernensis* gefunden; Lankaster bestreitet jedoch, wie erwähnt, ihre Gleichzeitigkeit. Es werden seine Reste jedoch auch noch aus dem präglacialen Forestbed citirt, wo er nach Einigen (Falconer, Leith Adams, Boyd Dawkins) zusammen mit *Elephas primigenius* gelebt haben soll, während das Vorkommen des letzteren daselbst von Anderen wieder bestritten wird (Gunn).

Frankreich. Ueber die französischen Vorkommnisse dieses in Rede stehenden Zeitraumes finden wir eine eingehende Zusammenstellung und Vergleichung mit ausserfranzösischen Faunen in einer der jüngsten Arbeiten Depéret's¹) enthalten. Bezüglich des Zusammenvorkommens von Mastodon Arvernensis und Elephas meridionalis sind jedoch die Daten sehr spärlich. Depéret selbst sagt²): "Quant au genre Elephas, si sa coexistence avec le Mastodon arvernensis ne paraît pas douteuse dans l'astien du Piémont, et dans le pliocène supérieur du val d'Arno, il n'est pas aussi certain que le même fait ait eu lieu en France." Er citirt eigentlich nur den Grobsand von Trévous und von Saint-Germain au Mont d'Or, wo diese beiden Proboscidier zusammen angetroffen worden wären. An sämmtlichen übrigen französischen Fundorten seiner ersten Fauna des oberen Pliocän kommt nach ihm Mastodon Arvernensis nur allein vor: Perrier mit dem gleichartigen und gleichzeitigen Depot von Coupet (Haute-Loire), ferner Vialette (bei Puy) und der Grobsand von Cheilly (Saône-et-Loire). An allen den von ihm zur zweiten Oberpliocän-Fauna gerechneten Localitäten fehlt dieses jedoch, dagegen ist El. meridionalis vertreten: Saint-Prest (Eure-et-Loire), Chagny (Saône-et-Loire), Malbattu (Haute-Loire), Durford (Gard) und Saint-Martial (Hérault)⁴). Die Fauna an letzteren Orten ist meist schon eine sehr bezeichnend diluviale.

In seinem mittleren Pliocän (Étage astien: Montpellier, Perpignan) tritt dagegen wieder nur Mastodon ohne Elephanten auf. 5)

Was die Gruppirung der einzelnen Faunen in den verschiedenen Etagen bei Depéret anbelangt, so möchte ich nur bemerken, dass der genannte Autor dieselben viel zu viel als stets wirklich einheitliche Complexe betrachtet, eine mögliche mechanische Vermengung von Resten verschiedener Epochen nie in Betracht zieht. Trotzdem werfen jedoch die Vorkommnisse wieder ein sehr bezeichnendes Licht auf die gegenseitigen Altersverhältnisse von Mastodon und Elephas.

Deutschland. In Deutschland endlich fanden sich Reste von Mastodon Arvernensis bei Rippersroda zusammen mit Hystricomys Thuringiacus, einem andern Nager kleiner als Arvicola, Rhinoceros sp., Bos sp., Cervus sp., welcher gewissen Hirschen von Perrier am nächsten stehen soll.⁶)

¹⁾ Ch. Depéret: Description géologique du Bassin tertiaire du Roussillon. Ann. Sc. géol., T. XVII. Paris 1885, S. 1-272.

²) 1. c., S. 254.

³⁾ An allen den genannten Oertlichkeiten kommt auch Mistodon Borsoni vor. Von auswärtigen Vorkommnissen werden diese den ober den "marnes blanchâtres" liegenden Schichten des oberen Arnothales gleichgestellt.

⁴⁾ Als Aequivalent wird das Forest-bed angegeben.

⁵⁾ Gleichaltrig sind nach Depéret das marine untere Arnothal und die "marnes blanchâtres" des oberen Arnothales mit Mastodon Arvernensis, sowie der Red Crag.

⁶⁾ K. v. Fritsch: Das Pliocän im Thalgebiet der zahmen Gera in Thüringen. Jahrb. kgl. preuss. geol. Landesanst., 1884, S. 389-437.

Rumänien. Bei Giurgewo wurden Molaren von M. Arvernensis mit solchen von El. meridionalis zusammen angetroffen. 1)

Können daher diese ausseritalienischen Vorkommnisse wohl als sichere Andeutungen betrachtet werden, dass *Elephas meridionalis* den *Mastodon Arvernensis* überlebte und wahrscheinlich noch im präglacialen Diluvium existirte, zusammen mit *Elephas antiquus* und vielleicht sogar auch noch dem Mammuth, sind solche Anzeichen in Italien selbst minder deutlich vorhanden.

b) Elephas meridionalis und El. antiquus.

Bezüglich des von Anca und Gemmellaro²) aus dem Quaternär Siciliens beschriebenen *Elephas meridionalis* wurde schon an früherer Stelle bemerkt, dass diese Bestimmung offenbar falsch ist und die Reste einem jener Pygmäenelephanten — wahrscheinlich *Elephas Mnaidriensis* — angehören. Der sichere Nachweis eines *Elephas meridionalis* von dieser Insel ist mir nicht bekannt.

Am weitesten nach Süden scheint er bisher in der Provinz Neapel gefunden worden zu sein.³) Nicolucci³) beschreibt Zähne desselben von Roccasecca (ungefähr in der Mitte zwischen Neapel und Rom), von denen der abgebildete zweifelsohne nur dieser Species angehören kann. In der Nähe sollen sich auch Zähne von El. primigenius (Castelliri u. Isoletta) und El. antiquus (bei Pontecorvo) gefunden haben. Doch ist bezüglich der Schichten, in denen diese Funde gemacht wurden, nicht die geringste Andeutung gegeben. In der Einleitung erwähnt er auch zwei Molaren von El. meridionalis von Chieti (Abruzzo citeriore) und eben daher einen solchen von El. antiquus. Doch kann man auf diese Funde vorläufig kein Gewicht legen.

Eine ähnliche Unsicherheit herrscht auch bei all den zahlreichen Zähnen, die bisher in den Alluvien des Tiber (Ponte Molle, Monte Rotondo, Monte Verde) und seiner Zuflüsse (Aniene) aufgesammelt worden sind und Elephas meridionalis, antiquus und primigenius angehören.⁵)

Allerdings möchte ich ihnen aber doch nicht allen Werth absprechen, wie dies oft geschieht, da eben hier stets blos Elephas meridionalis, antiquus und primigenius, bis auf einen einzigen, doch sehr zweifelhaften Fall des Auffindens von Mastodon Arvernensis (bei Montoro im Nerathal⁶), angetroffen wird, zusammen mit Bos primigenius, Cervus claphus, Equus caballus, Rhinoceros sp., Hyaena crocula etc. und auch Hippopotamus. El. meridionalis ist sehr häufig; die alleinige Annahme der Einschwemmung dürfte daher bei dem vielleicht völligen Mangel seiner Begleitfauna im Arnothal an diesem Orte kaum ausreichen.

Die Angabe Ponzi's betreffs des Vorkommens von El. Africanus und Melitensis beruhen offenbar auf Irrthum.

¹⁾ Kittl: Annal. k. k. naturh. Hofmus. Wien 1887, S. 75.

í) 1. c.

⁸) Doch sind das nicht die südlichsten Punkte des Auftretens von Elephanten auf dieser Halbinsel. *Elephas primigenius* und *antiquus* wurden in Höhlen (Cardamone, Romanello) in der Nähe von Lecce (Terra d'Otranto) angetroffen; nicht sicher bestimmte Reste fanden sich auch anderen Orten in Calabrien. Siehe: G. Niccoluci: Su gli Elefanti fossili della Valle del Liri. Soc. Ital. delle Scienze, T. IV, Nr. 5, Napoli 1882.

⁴⁾ In vorhergehender Note citirtes Werk; S. 12.

⁵) G. Ponzi: Le Ossa fossili subapennine dei dintorni di Roma, Atti R. Acc. d. Lincei, Ser. 3, Vol. II, Roma 1878.—
R. Meli: Sopra alcune ossa foss. rinvenute nelle ghiaie alluvionali presso la via Nomentana al 3º Km. da Roma. Boll. R. Com. geol., Nr. 7. u. 8., 1886.— E. Clerici: Sulla *Corbicula fluminalis* dei dintorni di Roma e sui fossili che l'accompagnano. Boll. Soc. geol. Lal., Vol. V, fasc. 2.

⁶⁾ Aber ohne andere Reste; diese Süsswassermergel werden jedoch jetzt als Pliocan betrachtet. (Vergl. G. Terrenzi: Il Pliocene nei dintorni di Narni. Boll. Soc. geol. Ital., Vol. V, 1886, Roma 1887, S. 321.)

Sehr bemerkenswerth wegen ihres Fundortes sind jedoch drei Molaren von Elephas meridionalis in der paläontologischen Sammlung der Universität zu Rom, von denen einer vom Janiculus und zwei vom Monte Mario stammen. Während am linken Tiberufer die Travertinhöhen der Monti Parioli sich befinden, wird das rechte in der Richtung thalabwärts vom Monte Mario, dem vaticanischen Hügel und dem Janiculus begleitet. Zu unterst lagern hier die Pteropodenmergel des Vaticans 1), der Stufe von Asti, Siena entsprechend (am Janiculus jedoch unsichtbar, wahrscheinlich in der Tiefe), darüber folgen dann graue oder gelbe, zum Theil mergelige Sande mit Meeresthieren (Zyphius), weiter hinauf wieder Sande, eingeschaltet auch Mergel, und zu oberst junge Tuffe. Aus diesen letztgenannten Sanden stammen nun, wie mir Herr Prof. Meli auf's Bestimmteste versicherte, die oben erwähnten Zähne von El. meridionalis, die deshalb bemerkenswerth sind, weil diese Sande von de Stefani bereits in's Quartär, von Neumayr2) jedoch noch in's Pliocän und dem Norwich Crag gleichgestellt werden.

Da nun das zeitliche Vorkommen von *El. meridionalis*, besonders in Italien, selbst noch sehr unsicher begrenzt ist, da man ja ganz unzweifelhafte Reste desselben aus postpliocänen Ablagerungen noch nicht nachweisen konnte, so können natürlich diese Funde in dieser Streitfrage auch keine Entscheidung, nicht einmal ein Argument mehr für die eine oder die andere Seite abgeben.

Sollte sich nun aber anderseits die zuletzt genannte Ansicht als die richtige erweisen, so wären diese Reste wohl zweifellos als pliocäne anzusprechen. Wäre hingegen erstere Version die richtige, so könnten sie wohl pliocän, jedoch mit vollem Recht auch quaternär genannt werden, da dann eine Einschwemmung in diese diluvialen Sande aus zerstörten Pliocänbildungen nicht unmöglich wäre.

Aus vielleicht gleichaltrigen Sanden, von Ripatranzone, bei Rimini, sah ich in derselben Sammlung auch eine Oberkieferzahnreihe von Equus Stenonis.

In anderer Richtung sehr wichtig erscheinen aber jene auch schon von Falconer³) besprochenen und von Ponzi⁴) erwähnten Reste von *Elephas antiquus*, bestehend aus bedeutenden Schädelfragmenten, beiden Unterkieferhälften, einem fast vollständigen linken Hinterfuss und den Stosszähnen. Sie stammen aus den marinen Mergeln von Rignano, am Fusse des Soracte, die nach Meli eine charakteristische oberpliocäne Conchilien-Fauna geliefert haben, und würden so den ersten sicheren Nachweis des Vorkommens dieser Elephantenart in typisch tertiären Ablagerungen bilden, falls sich nicht Tertiär und Diluvium hier als auf secundärer Lagerstätte befindlich erweisen sollten.

Sehr unsicher zur Entscheidung der vorliegenden Fragen gegenseitiger Altersbestimmung ist der Werth der Fossilien aus dem Thal des oberen Arno und der Chiana. Es ist richtig, dass aus ersterem Reste von El. antiquus stammen; es kommen aber auch sehr bedeutende diluviale Ablagerungen daselbst vor, und die Authenticität ist meines Wissens bei keinem einzigen der erwähnten Funde festgestellt. Auch ob Elephas meridionalis in pliocänen Schichten bei Arezzo vorkommen soll, wie Major angeführt hat⁵), oder ob dies nach Ristori⁶) auf Irrthum beruht, da diese Gegend zur Pliocänzeit, wie schon Verri zu zeigen versucht, trocken gelegen hätte, muss noch dahingestellt bleiben. Südlich der Enge von Capo di Monte treten im Chianathal dann wieder dieselben Verhältnisse wie im oberen Arnothal ein, die bis in die Gegend von Montepulciano und Chianciano anhalten, wo bereits wieder marine Sedimente auftreten und sich durch das Chiana- und Tiberthal weiter fortsetzen.

¹) Aus diesen vaticanischen Mergeln zeigte mir Herr Prof. Meli in der Universitätssammlung zu Rom auch die Phalange eines Ruminantiers.

²⁾ M. Neumayr: Geolog. Bau d. Insel Kos., S. 39.

³⁾ Falconer: Pal. Mem., II, S. 187.

⁴⁾ Ponzi: 1. c., S. 6 u. 22.

⁵⁾ Forsyth Major: Sull Livello geol. del. Terreno etc., S. 12.

⁶⁾ G. Ristori: Consider, geol. sul. Vald. sup., S. 275.

c) Elephas antiquus, primigenius und die Zwergelephanten.

Elephas primigenius wurde an vielen Orten mit Elephas antiquus zusammen in diluvialen Bildungen (Höhlen) bis tief hinab nach Apulien getroffen. Das Quartär Siciliens hat bisher noch keine Reste desselben geliefert.¹) Die Elephanten, die sich hier finden, sind: Elephas antiquus, Elephas Mnaidriensis und vielleicht auch (?) Melitensis, sowie Zähne, die gewöhnlich unserem Elephas Africanus²) zugeschrieben werden. Ich habe von letzterem keine Originalia gesehen, so dass ich mir über die Richtigkeit dieser Bestimmung kein Urtheil erlauben kann. Möchte jedoch nur bemerken, dass manche derselben, nach Abbildungen oder Gypsabgüssen zu urtheilen, eine sehr bedeutende Aehnlichkeit mit Zähnen von Elephas Mnaidriensis besitzen. Jedenfalls wäre in dieser Beziehung eine genaue Ueberprüfung nothwendig, ehe man sie endgiltig als dem jetzigen afrikanischen Elephanten angehörig anerkennen kann.³) Weiter bezieht sich aber nicht nur das von Anca und Gemmellaro abgebildete Gaumenfragment mit angeblichen M_1 eines El. meridionalis gleichfalls auf El. Mnaidriensis, sondern — und vielleicht auch noch auf El. Melitensis — sämmtliche von ihm als Elephas Armeniacus beschriebenen und abgebildeten Zähne. Ueberhaupt gehören auch sämmtliche sonst noch mit diesem Namen belegte Molaren aus Italien entweder dem Elephas antiquus oder selbst dem meridionalis an, auch wenn die Bestimmung auf Falconer's eigene Autorität sich stützen sollte.

Einen weiteren Zwergelephanten — Elephas Lamarmorae Major — hat Forsyth Major auch in den Quaternärablagerungen von Morimentu bei Gonnesa auf Sardinien entdeckt.⁴) Issel⁵) führt an, dass nach Reboux ein solcher sich auch in den Alluvien der Umgebung von Paris gefunden haben soll, was jedoch nach Lartet auf einen Bestimmungsfehler zurückzuführen wäre. Auch Gervais⁶) sagt ausdrücklich: "Il n'a pas encore été signalé en France d'ossements de l'E. Melitensis."

B. Aussereuropäisches Vorkommen.

Das erste Mal im östlichen Mittelmeerbecken hat Forsyth Major auf Kos eine vollständige Arnothal-Fauna entdeckt.⁷) Er citirt aus marinen Ablagerungen dieser Insel isolirte Zähne und Kieferfragmente von: Mastodon Arvernensis, Elephas meridionalis, Equus Stenonis, Hippopotamus major, Cervus (2 sp.).

Elephas meridionalis wird von Gervais⁸) auch aus Algier (Mansurah bei Constantine) zusammen mit Rhinoceros sp., Equus, das an Equ. Sivalensis erinnern soll, Bos sp., Antilope strepsiceros, Anti-

¹) Gervais führt zwar aus Sicilien "ganz unzweiselhaft" das Vorkommen von El. primigenius an (Zool. et. Pal. fr., S. 73) und beruft sich dabei auf Blainville, Ostéographie, G. Elephas, S. 181. Auf dieser Seite steht jedoch überhaupt nichts von sicilischen Elephanten, wohl aber auf Seite 153 und 154. Hier spricht aber Blainville von nach Kircher (Mundus subterraneus), Boccace (Généalogie des Dieux) etc. im 14.—16. Jahrhundert ausgegrabenen Riesen, sowie ganz unbestimmten Zähnen und Knochen von Elephanten, die gleichfalls schon zumeist im 18. Jahrhundert gefunden wurden.

²⁾ Hieher gehört auch Elephas Cornaliae Aradas; teste Seguenza: L'Elef. Afric., S. 12.

³⁾ Leith Adams zweifelt an der richtigen Bestimmung derselben. Discussion zu Calderon's Notiz: On the foss. Vertebrata, hitherto discovered in Spain. Quart. Journ. Geol. Soc. London, Bd. XXXIII, 1877, S. 124.

⁴⁾ Fors. Major: Tyrrhenis, S. 7.

⁵) A. Issel: App. pal.; IV, Descrizione di due denti d'Elefante raccolti nella Liguria occidentale. Ann. Mus. Civ. di Storia nat. di Genova, Vol. XIV, 1879, S. 10.

⁶⁾ P. Gervais: Zool. et. Pal. générales, S. 98.

⁷⁾ Forsyth Major: Faune mammologiche dell' isole di Kos e di Samos, Proc, verb, Soc. Tosc. Sc. nat. Sitzg. 3. Juli, 1887, S. 272.

⁸⁾ Gervais: Zool. et. Pal. gén., S. 91.

lofe sp. und Hippopotamus (major?) angeführt. Nach der gegebenen Abbildung scheint dieser geringe Rest (zwei Joche) eines Elephanten jedoch sehr wenig Aehnlichkeit mit Elephas meridionalis zu haben.

Auch anderweitige Angaben über tertiäre und quaternäre Elephanten Nordafrikas scheinen sowohl bezüglich der Bestimmung als Lagerung noch sehr unsicher zu sein und genauerer Untersuchung zu bedürfen.¹) Letzteres gilt insbesondere von Pomel's neuer Species: Elephas atlanticus aus dem Quartär von Eghis (Provinz Oran), die nach ihm in gewissen Beziehungen dem El. meridionalis, in anderen aber wieder dem El. Africanus nahe stehen soll.²)

Endlich muss noch erwähnt werden, dass *Elephas meridionalis* nach Brauns³) auch in Japan zur Diluvialzeit gelebt haben soll, zusammen mit einem zweiten, der nach ihm mit *El. antiquus* identisch wäre. In demselben Jahre erschien jedoch in der "Palaoeontographica" eine Arbeit Naumann's⁴) über "Japanische Elephanten der Vorzeit", worin er die in Japan vorkommenden Elephanten als theils pliocän, theils quartär erklärt und als *Stegodon Clifti, insignis* und *Elephas Namadicus* und *primigenius* bestimmt. In einer neuerlichen Schrift⁵) besteht jedoch Brauns auf seiner ersten Ansicht und nennt nach einem Referat Branco's⁶) Naumann's *Elephas Namadicus* und *primigenius Elephas antiquus* und *Stegodon insignis Elephas meridionalis* (!). Lydekker¹) schliesst sich in jeder Beziehung Naumann an, etwas reservirter verhält sich Martin³), der zum Theil Brauns' Ansichten zuneigt.

2. Geographische Verbreitung.

Als Resultat bezüglich der geographischen Verbreitung der hier in Frage stehenden Proboscidier im Mediterrangebiete ergibt sich demnach:

a) Elephas meridionalis: In Spanien noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen, wurde er in (zumeist Süd-) Frankreich in zahlreichen Resten angetroffen, ebenso wie auch in Ungarn an mehreren Localitäten sein Vorkommen constatirt ist. Sehr häufig ist er in Italien bis etwa in die Gegend von Neapel; weiter südlich oder von den Mittelmeerinseln (Sicilien, Sardinien, Corsica) ist von der Auffindung eines sicheren solchen Restes nichts bekannt. Desgleichen fehlt er bis jetzt der südlichen Balkanhalbinsel, wurde jüngsthin jedoch von Forsyth Major auf Kos, von Kittl in Rumänien constatirt. Er wird zweifellos auch noch an anderen Localitäten dieser einstigen Festlandmasse zum Vorschein kommen. Einer weiteren Bestätigung oder genaueren Untersuchung wird aber sein Vorkommen in Nordafrika noch bedürfen.

¹⁾ Die bezügliche Literatur ist ziemlich zerstreut. Der Hauptsache nach zusammengefasst erscheint sie in dem Werke von A. Peron: Essai d'une description géologique de l'Algérie. Ann. sc. géol., Bd. XIV, Paris 1883, p. 193—198 und über 1882 weitergeführt und ergänzt in M. Blanckenhorn's Arbeit: "Die geognostischen Verhältnisse von Afrika, I. Th. Der Atlas." Petermann's Mittheilg., Ergänzungsheft 90, Gotha 1888, pag. 40 u. ff.

²) M. A. Pomel: Ossement d'Éléphants et d'Hippopotames découverts dans une station préhistorique de la plaine d'Eghis (prov. d'Oran). Bull. Soc. géol. Fr., Sér. III, T. VII, 1878—79, p. 44.

³⁾ D. Brauns: Geology of the Environs of Tokio. Memoirs of the Science Department Tokio Daigaku (University of Tokio), Nr. 4, Tokio 2541 (1881), S. 22—24.

⁴⁾ Ed. Naumann: Japan. Eleph. der Vorzeit. Palaoeontographica, XXVIII. Bd., Cassel 1882 (das Heft 1 mit der Abhandlung erschien jedoch schon im Juni 1881).

⁵) D. Brauns: Ueber japanische diluviale Säugethiere. Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges., Bd. XXXV, 1883, S. 1-58.

^{6) &}quot;Neues Jahrb. f. Mineralogie etc." 1884; II, S. 101. — Brauns Originalarbeit war mir hier in Florenz nicht erreichbar.

7) Ebenfalls nach Branco's Referat, Ibid., S. 102: R. Lydekker: Note on the probable occurrence of Siwalik strata in China and Japan. Rec. geol. Surv. India, Vol XVI, Pt. 3, 1883, S. 158—161.

⁸⁾ K. Martin: Ueberreste vorweltlicher Proboscidier von Java und Banka. — Nach einem Ref. Branco's 1. c., 1885, II, S. 152, und Schlosser's im "Archiv f. Anthrop., Bd. XVII, S. 145".

- b) Elephas antiquus: Busk¹) gibt dessen Vorkommen bei Gibraltar an, aus Frankreich wird er von zahlreichen Orten citirt, wie er auch durch die Apenninen-Halbinsel bis Neapel gefunden wurde. Aber auch in Sicilien kommt er vor²), von woher Anca und Gemmellaro einen schönen Molaren abbilden und beschreiben.³) Nach Blanckenhorn gibt ihn Pomel auch von Cherchel und vom Oued Rha (Algerien) an.⁴) Von Sardinien, Corsica ist von ihm nichts bekannt.
- c) Elephas primigenius: Dieser nordische Kosmopolit war, wie es zahlreiche Reste beweisen, auch in den warmen Mediterranländern zu Hause. Calderon und Leith Adams berichten seine Auffindung in Spanien⁵), sehr häufig war er im südlichen Frankreich, in Italien erstreckt sich sein Verbreitungsgebiet bis nach Apulien. In Sicilien, wie auch in Nordafrika wurde er noch nicht getroffen.
- d) Elephas Melitensis und El. Mnaidriensis: Die ersten dieser Zwergelephanten fand man auf Malta; als unverkennbare Reste derselben müssen wie übrigens auch Forsyth Major⁶) schon andeutete wohl auch die obenerwähnten Zähne von Sicilien angesehen werden, und ebenso hat Sardinien ein Exemplar geliefert. Angaben von Auffindung derselben auf dem Festland (Frankreich, Italien) beruhen auf Irrthum.

Desgleichen scheinen auch die Angaben über das Vorkommen von *Elephas Africanus* auf dem Continente von Europa höchst zweifelhafter Natur zu sein. Dies gilt insbesondere von Italien, gilt aber wahrscheinlich auch von Spanien, von wo Lartet und Falconer sein Vorkommen zwar angeben, während er sich jedoch in Calderon's Liste⁷) nicht vorfindet. Die Vorkommnisse auf Sicilien wurden oben besprochen. Nach Peron⁸) soll Vatonne denselben auch in quaternären Ablagerungen Algeriens (Cherchel, Alger) constatirt haben.

Aus dem Gesagten geht demnach hervor, dass der afrikanische Elephant das Mittelmeer wahrscheinlich nie überschritten hat, trotzdem er fossil in Nordafrika getroffen wurde. Das Gleiche gilt auch von dem Mammuth, das in Italien und Spanien zwar vorkommt, nicht aber jenseits des Mittelmeeres in Afrika. Die klimatischen Verhältnisse können da wohl kaum ausschliesslich zur Erklärung herbeigezogen werden.

Ein ganz eigenthümliches Vorkommen bieten dazwischen die kleinen Elephanten Maltas, Siciliens und Sardiniens. Auf dem Festland sind sie bis jetzt unbekannt. Dies scheint auf eine Trennung dieser Inseln zur Zeit ihrer Existenz von ersterem hinzudeuten, wozu allerdings wieder das Vorhandensein von El. antiquus und vielleicht El. Africanus auf Sicilien einen Widerspruch bilden würde.

Gehen wir in die jüngere Pliocänzeit, in das Zeitalter der Arnothal-Fauna zurück, so finden wir, dass auch hier die Strasse von Messina, und zwar bedeutend breiter, offen war, dass auch längs der Westküste Italiens sich reichlich marine Ablagerungen finden. Auch in dieser Zeit kann daher eine Verbindung Europas mit Afrika über Italien nicht gut stattgefunden haben. Dies beweist übrigens auch schon das vollständige Fehlen der genannten Fauna auf Sicilien. Ebenso unwahrscheinlich wird ein Zusammenhang Spaniens mit Marokko.

¹⁾ Mem. Zool. Soc. London, Vol. X, Pt. 2, 1887, S. 128; ferner Falconer: Pal. Mem., II., S. 557.

²⁾ Falconer: Pal. Mem., II, S. 545 u. 552 (Grotta di S. Ciro b. Palermo, Gr. di Maccagnone).

³⁾ Anca e Gemmellaro: Monogr. degli Elefanti foss. di Sicilia, S. 9, Tf. I, Fig. 5.

⁴⁾ Blanckenhorn: l. c., S. 44.

⁵) Quart. Journ. geol. Soc. London, Bd. XXXIII, 1877, S. 133 u. 537.

⁶⁾ Forsyth Major: Die Tyrrhenis, S. 6.

⁷⁾ Quart, Journ. Geol. Soc. London, Bd. XXXIII, 1877, S. 124.

⁸⁾ Peron: l. c., S. 191.

Wohl gegen Ende dieser Periode wird am besten jenes seltsame Auftreten nordischer Gäste in der Mediterranfauna zu setzen sein, oder jedenfalls in die Uebergangszeit zwischen dem typischen Pliocän und dem typischen Diluvium. Von C. de Stefani werden sie auch schon als letzterem zugehörig betrachtet. Es sind Formen aus den bekannten Ablagerungen vom Monte Pellegrino und Ficarazzi bei Palermo, Monte Mario und Vallebiaja. Nebst ihnen findet sich auch ein oft beträchtlicher Percentsatz atlantischer Arten gemässigterer Zonen (England).¹) Dies ist aber nicht gut anders erklärlich, als dass die Communication des Mittelmeeres gegen den Atlantischen Ocean hin eine freie gewesen ist, die der Einwanderung obiger Thiere keine Hindernisse in den Weg setzte. Ganz dasselbe beweisen übrigens auch die an einigen Orten vorhandenen westafrikanischen Typen, da eine Wasserstrasse am Südfusse des Atlas nach neueren Untersuchungen offenbar nie vorhanden war. Dieser Zuzug nordischer Arten hat jedenfalls bis in's untere Quartär angedauert; Seguenza's Saariano inferiore, in etwa 830 m Seehöhe oberhalb Reggio in Calabrien, das wahrscheinlich dem älteren Diluvium angehört, zählt unter etwa 300 Mollusken neun nordische Formen; Formen, deren letzte Reste noch jetzt das Mittelmeer bewohnen (Nephrops Norvegicus u. a. im Quarnero). Auch das keltische Element ist in der Tiefsee noch heute stark vertreten.

Im jüngeren Diluvium (Reggio, Saariano sup.) zeigt sich jene nordische Invasion zwar ganz zurückgetreten, dafür treten aber zeitweise westafrikanische Formen auf.

Andererseits scheint es auch, dass jene Zwerghaftigkeit wirklich auf Isolirung auf Inseln beruht; wenigstens ist eine befriedigendere Erklärung in biologischer wie zoogeographischer Hinsicht nicht gegeben worden.

Auch Kreta weist bekanntlich eine gleiche Pygmäenform eines grossen Dickhäuters auf. Allerdings soll ein Zahn eines solchen *Hippopotamus* auch in dem benachbarten Peloponnes gefunden worden sein; doch scheint da eine Einschleppung nicht ausgeschlossen.

Was jedoch wieder gegen eine solche Trennung zu sprechen scheint, ist Thomas' Angabe von dem Vorkommen von Equus Stenonis und auch Elephas meridionalis, Hippopotamus etc. aus Algier. Aus dem Nilthale erwähnt Lydekker einen Pferdezahn von pliocänem Typus. Bekannt ist auch das Vorkommen von Hipparion gracile von mehreren Punkten Algiers (nach Thomas und Tournouër), wenn es auch jedenfalls einer älteren Periode angehört. Dazu kommt dann endlich die mannigfaltige Uebereinstimmung der recenten Fauna und Flora des nördlichen und südlichen Mittelmeergestades,²) welche eine innigere Verbindung der letzteren in nicht allzuferner Vergangenheit sehr plausibel erscheinen lässt.

Doch sind diese Widersprüche nur scheinbar. Dass die angeblich äthiopischen Charakter tragende Fauna von Pikermi, die Flora von Kumi und deren Zeitäquivalente keine unmittelbare Communication voraussetzen, wurde schon anderwärts mehrfach betont. Viel wahrscheinlicher ist dafür, dass Europa, als westliches Anhängsel Asiens, seine Bewohner von Osten her erhalten hat. Ueber Samos, die Troas, Maragha ist ja deutlich die Verbindung mit den Siwalikhügeln hergestellt. Indem die Fauna der letzteren allmälig sich gegen Westen ausbreitete, vielfach natürlich localer Auslese und mannigfaltiger Abänderung unterworfen war und durch die ungleiche Propagationsfähigkeit der einzelnen Vertreter etwas verschiedene Zusammensetzung erfuhr, nahm sie im Laufe des unteren Pliocän von dem mittleren und südlichen Europa, sowie den afrikanischen Mittelmeerküsten Besitz

¹⁾ Vergl. E. Suess: Antlitz der Erde, I. Bd., S. 432 u. ff.

²) Fors. Major: Die Tyrrhenis; — eine Uebersicht bei Blanchard: Les preuves de la formation récente de la Méditerranée. Compt. rend. Ac. sc. Paris. Bd. 93, II, 1881, S. 1042.

Doch drang sie offenbar auch noch weit in den afrikanischen Continent vor, wie wenigstens die häufigen Anklänge siwalischer Typen an heute lebende Thiere Afrikas zu beweisen scheinen. Solche sind nach Lydekker Vertreter der afrikanischen Genera: Troglodytes (Sivalensis), Cynocephalus (subhimalayanus Falconeri), dem Crocuta-Typus angehörige Hyänen (H. Colvini, felina), Canis curvipalatus (wahrscheinlich verwandt mit Otocyon), Lutra bathygnatha (verwandt mit L. Lalandi Afrikas), ein zur Gruppe des Rh. simus gehöriges Rhinoceros (platyrhinus)1) mehrere Antilopengeschlechter, wie Strepsiceros (?), Oreas, Alcelaphus, Hippotragus, Cobus (?), Cephalopus (?), ferner nebst den Sivatheriiden eine echte Giraffe (G. Sivalensis), dann zwei Hippotramus-Arten, ein Manis-artiges Thier und ein Strauss (St. Asiaticus)2).

Dieser allgemeine Zuzug von Osten her erhielt sich dann auch noch später in der jüngeren Pliocänzeit. Auch die Arnothal-Fauna hat im Grossen und Ganzen jedenfalls in Asien ihre Heimat, "Equus Stenonis, Sus Strozzii wurden (von Forsyth Major) direct mit indischen Formen identificirt, die Boviden stammen nach Rütimeyer von ebensolchen ab, Mastodon Arvernensis steht einem indischen Typus, dem Mastodon Sivalensis, weitaus am nächsten und dasselbe findet vollständig auch bei Elephas meridionalis statt. Auch unter den Raubthieren zeigt Machairodus crenatidens, mehr aber noch Hyaena robusta Hinneigung zu siwalischen Arten."3) Die nordafrikanischen Vorkommnisse finden nun in ebenderselben Weise ihre Erklärung, ohne auf eine Landverbindung gegen Norden angewiesen zu sein.

Aehnliches gilt schliesslich auch für das Diluvium. Dass in Mitteleuropa die Steppenfauna auf's Allerentschiedenste nach Asien weist, ist allgemein bekannt. Der für das ältere Quartär bezeichnende Elephas antiquus ist der allernächste Verwandte des indischen Elephas Namadicus, ebenso wie es mir jüngst gelang, den Rest eines unicornen Rhinoceros in der Universitätssammlung zu Rom nachzuweisen.⁴) Doch ist gerade beim Diluvium wegen der Schwierigkeit der Parallelisirung der Vergleich mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden.

Gilt dies schon für die gut untersuchten Theile Europas, so macht es sich natürlich umsomehr bei weniger durchforschten Ländern fühlbar. Nichtsdestoweniger ist ein bedeutender Anklang der diluvialen Säuger Indiens (Höhlen des Karnuldistrictes) an heutige Bewohner Afrikas nicht zu leugnen, der sich besonders in nachfolgenden Formen manifestirt: Cynocephalus sp., Hyacna crocuta, Equus asinus, Rhinoceros Karnulensis (bicorn), sowie Manis gigantea. Die Verbreitung der lebenden Hyaena striata, deren Vorfahren möglicherweise schon zu pliocäner Zeit (H. Sivalensis) Indien bewohnten, zeigt am besten den Zug gegen Nordafrika. Auch ein Stachelschwein, das bekanntlich im Norden wie im Süden des Mittelmeeres zu Hause ist, haben die genannten Höhlen (Hystrix crassidens), sowie die Siwaliks (H. Sivalensis) geliefert.

Wenn durch alle diese Thatsachen natürlich auch nicht der unumstössliche Beweis geliefert werden kann, dass die Besiedelung der Mittelmeergestade im Allgemeinen von Osten her erfolgte, so bieten sie doch eine ausreichende und ungezwungene Erklärung mancher Erscheinungen, die in thiergeographischer Hinsicht in diesem Gebiete seit dem Pliocän auftreten, wenn man eine directe Landverbindung quer über dieses Meer durch die paläontologischen Ergebnisse nicht gut annehmen zu dürfen glaubt.

¹⁾ In meiner Schrift: Die tert. Landsäugethiere Italiens, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1889, Bd. XXXIX, ist Seite 82, 4. Zeile von oben, statt *platyrhinus* natürlich *Sivalensis* zu lesen.

²) Die beiden letzteren wurden in nahestehenden Formen letzthin von Forsyth Major (Compt. rend. Ac. sc. Paris, 31, Dec. 1888) auch in Samos nachgewiesen: *Palaeomanis Neas* und *Struthio Karatheodoris*,

³⁾ Weithofer: Tertiäre Landsäugethiere Italiens. Jahrb d. k. k. geol. R.-A. 1889, Bd. XXXIX, S. 81.

⁴⁾ l. c.

Weithofer. [134]

Man wird da aber vielleicht noch weiter gehen können und die Herkunft der gesammten Proboscidier, die seit dem Beginn des Miocän in Europa aufgetreten sind, nach Osten oder Südosten verlegen müssen, von wo sie nebst anderen auffallenden Gruppen (anthropoide Affen, Edentaten) nach Absperrung jenes bis in's Oligocän herein existirenden "centralen Mittelmeeres" nach Europa vorgedrungen sind. Von dieser Zeit an haben wir augenscheinlich in Mitteleuropa kein allgemeines "Entwicklungscentrum" zu verzeichnen.¹)

Wien, 1. Juni 1890.

Dr. K. A. Weithofer,

¹⁾ Aus den vorhergehenden Perioden des Tertiärs kennen wir aber ausser Mitteleuropa nur noch Nordamerika genauer. Jedenfalls kann für diese Zeit Haacke's etwas phantastische Nordpol-Theorie für keinen Fall mehr angewendet werden, wie auch Schlosser zugibt (Biolog, Centralblatt, Bd. VIII, 1888, S. 583). Ob sie aber für die mesezoische Zeit gelten kann, scheint wohl vorläufig noch mehr in Frage zu stehen. Directen Beweis durch Auffindung entsprechender Belegstücke haben wir soviel wie gar keinen, der indirecte Beweis der Geologie spricht nach heutiger Kenntniss aber jedenfalls ganz entschieden dagegen.

Bemerkung: Da das Manuscript zu vorliegender Arbeit bereits im November 1888 an die Redaction abgeliefert wurde, so findet die Nichtberücksichtigung seither erschienener Literatur in dieser Druckverzögerung seine Erklärung.

BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER TIEFEREN ZONEN DES UNTEREN LIAS IN DEN NORDÖSTLICHEN ALPEN.

VON

DR. FRANZ WÄHNER.

(Sechster Theil mit Tafel XVI[XLVI]—XXI[LI].)

Arietites subsalinarius n. f.

(Taf. XVI[XLVI], Fig. 1-2.)

							Fig	. I ¹)			Fig. 12)					Fig. 2			
Durchmesser			٠			61	mm	(===	1)		21	mm	(===	I) '	18	mm	(= I)	
Nabelweite .	٠				۰	32°5	,,	(==	0.23)		11	22	(===	0.2)	9	22	(= 0.20)	
Windungshöhe		4			٠	15	22	(==	0.52)		5°5	27	(===	0°26) :	5 °5	22	(= 0.31)	
Dicke						19	22	(===	0.31)	1	8	27	(===	0'38)	8	2.7	(= o.44)	

Diese merkwürdige Form ist mir bisher nur in zwei Exemplaren bekannt geworden. Die inneren Windungen erinnern durch die Gestalt des Querschnittes (Fig. 1 g, 1 i, Fig. 2 c) und die Sculptur (vgl. insbes. Fig. 2 b und 2 d) an das gleiche Entwicklungsstadium von Ariet. Coregonensis Sow. (Canav.), Die Externseite ist daselbst abgeflacht und stösst mit den Flanken in einer Kante zusammen, längs welcher die Windungen ihre grösste Breite erreichen, und von welcher die Flanken ziemlich rasch gegen die Naht abfallen. Dadurch erhält der Windungsquerschnitt, welcher stets breiter als hoch ist, eine trapezähnliche Gestalt. Die Rippen verlaufen auf den Flanken in von der radialen nach rückwärts abweichender Richtung und verbreitern sich bis zur Kante zwischen Flanke und Externseite zu einem knotenähnlichen Gebilde, von welchem aus nun auf der Externseite eine sehr deutliche Gabelung erfolgt, indem jede Rippe sich in zwei viel feinere spaltet, welche in nach vorne gewölbtem, verhältnissmässig flachem Bogen über die Externseite verlaufen. Die vordere der beiden zu einem Paare gehörigen feinen Rippen ist häufig etwas stärker ausgebildet als die rückwärtige, insbesondere bei fortschreitendem Wachsthum (Fig. 1 d), wobei der rückwärtige Streifen immer undeutlicher wird, der vordere sich immer stärker nach vorwärts biegt, bis später nur mehr dieser als Fortsetzung der Rippe über die Externseite zieht. Da auf den inneren Windungen ausser den beiden Streifen, in welche die Rippe sich spaltet, weitere, noch feinere Streifen (Anwachsstreifen) über die Externseite ziehen, von denen manchmal einer etwas stärker ausgebildet ist, so wird hie

¹⁾ Eine Viertelwindung hinter dem Ende des äusseren Umganges gemessen.

²⁾ Innere Windung.

und da das Bild der Bifurcation ein wenig beeinträchtigt. Eine andere Unregelmässigkeit besteht darin, dass manchmal (Fig. 1 a, 1 e, 1 f) schon auf der Flanke ein undeutlich ausgebildetes, auf gemeinsamem Sockel aufsitzendes (durch eine sehr seichte und schmale Furche getrenntes) Rippenpaar auftritt, wobei dann an der Externseite keine weitere Spaltung erfolgt. Zu Beginn der in Fig. 1 g, 1 h dargestellten Windung ist an einer beschränkten Stelle auf der obersten Schalenlage ein System äusserst feiner, erhabener Quer- und Längslinien zu beobachten. Die Querlinien schliessen sich in ihrem nach vorne gebogenen Verlaufe den Rippenstreifen an und sind von ungleicher Stärke; die Längslinien sind nur mit einer stark vergrössernden Lupe und bei besonders günstiger schräger Beleuchtung erkennbar.

Die Kielentwicklung beginnt früher als bei Ariet. Coregonensis.¹) Zu Beginn der einem Durchmesser von 16 mm entsprechenden Windung, auf welche sich die Abbildungen Fig. 1 e-1 h beziehen, ist bereits ein breiter, allerdings sehr schwach erhabener Mediankiel vorhanden, und auf derselben Windung entwickeln sich die den Kiel begleitenden Furchen schon so weit, dass auch die Anlagen der Nebenkiele erkennbar sind. Viel deutlicher noch ist der Kiel auf dem zweiten, nur 18 mm im Durchmesser zählenden Exemplare ausgebildet, welches grössere Dicke und kräftigere Sculptur zeigt als die entsprechenden Windungen des grösseren Exemplars. Man sieht hier deutlich die Rippenstreifen sich kreuzen mit den dem Kiel entsprechenden Sculpturelementen, und hie und da findet an einer Kreuzungsstelle eine leichte, knotenähnliche Anschwellung statt.

Die rasch an Dicke zunehmenden äusseren Windungen runden schnell ihren Querschnitt und verlegen dabei die grösste Dicke in die Mitte der Flanken. Die Rippen verlaufen auch hier zunächst in von der radialen stark nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanken, vollführen aber auf diesen einen nach vorne offenen Bogen, indem sie sich allmälig nach vorn wenden und die ungemein starke Vorwärtsbeugung vorbereiten, welche die Rippen auf der Externseite erleiden. Die auf den Flanken gerundeten und mässig erhabenen Rippen verschmälern sich auf der Externseite in ausserordentlich feine, aber (auf der Schalenoberfläche) sehr scharf markirte, erhabene Linien, welche sich sehr deutlich durch die den Kiel begleitenden Furchen und über den Kiel selbst verfolgen lassen. Jeder dieser über die Externseite ziehenden Streifen entspricht einer über die ganze Flanke verlaufenden Falte; Spuren einer Rippenspaltung sind hier nicht erkennbar. Der Mediankiel ist sehr breit und überragt stark die schwach ausgeprägten Nebenkiele, welche durch eine geringfügige Abplattung der in der Richtung gegen die Flanke angrenzenden Schalentheile mehr hervortreten; die Furchen sind mässig eingesenkt. In diesem Entwicklungsstadium (das Exemplar erreicht nur eine mittlere Grösse) stimmt die Form in dem Verhalten der Sculptur fast vollkommen mit der Gruppe des Ariet. Haueri Gümb. und des Ariet. salinarius Hau. überein und erinnert in Folge der Windungsverhältnisse insbesondere an den letzteren; es ist jedoch auch hier ein wichtiges Merkmal zu beobachten, in welchem sich ein wesentlicher Unterschied ausspricht.

An der auf der äusseren Windung sichtbaren Involutionsmarke erkennt man, dass der Ammonit mindestens noch einen ganzen weiteren Umgang gehabt hat. An einem Theile des jetzigen äusseren Umganges ist auf der Externseite, wo die einst noch weiter nach aussen folgende Windung abgebrochen ist, die Schale in guter Erhaltungsweise haften geblieben, während sie an anderen Stellen grösstentheils entfernt ist. Hier erkennt man Spuren einer Längsstreifung und sieht, dass der Eindruck der Schlankheit an den nach vorn gezogenen Theilen der Rippen dadurch verstärkt wird, dass auf der eigentlichen Falte noch eine besondere scharfe erhabene Linie aufsitzt. Gerade an der

¹⁾ Sie schreitet aber langsamer vor als bei der Gruppe des Ariet. Haueri, zu welcher ebenfalls nahe Beziehungen bestehen; in letzterer finden wir in der Regel schon an den inneren Windungen Kiel und Furchen wohl entwickelt.

Involutionsmarke des fehlenden Umganges, bis zu welcher die Schale der jetzigen äusseren Windung erhalten ist, während der nach innen sich anschliessende Theil der Schale (auf den Flanken) fehlt, zeigt sich (Fig. 1 a, 1 b) auf jeder Rippe ein kleiner, aber deutlich erhabener Knoten, welcher noch der erwähnten erhabenen Linie aufzusitzen scheint und auf dem Steinkerne in dieser Form kaum bemerkbar sein dürfte. Die Stelle, wo der Knoten aufsitzt, entspricht jener, wo wir an den kräftigen Falten der inneren Windungen knotenähnliche Anschwellungen beobachtet haben, von welchen aus gegen die Externseite zugleich mit der raschen, einer plötzlichen Endigung nahekommenden Abschwächung der Rippe ihre Theilung in je zwei Streifen erfolgt.

Das grössere Exemplar trägt auf dem einem Durchmesser von 49 mm entsprechenden Umgange ungefähr 42, auf den nach innen folgenden Windungen 35, 21 und 16 Rippen. Die Anzahl derselben ist nicht immer vollkommen genau anzugeben, zum Theile wegen des Erhaltungszustandes, zum Theile wegen der schon erwähnten, auf den Flanken vorhandenen Rippenspaltungen (Doppelrippen). Solche Unregelmässigkeiten in der deutlichen Ausbildung der Rippen, wie wir sie in den Gruppen des Ariet. proaries und des Ariet. Ilaueri kennen gelernt haben, finden sich nicht blos auf den inneren Windungen, sondern auch noch etwas weiter nach aussen. Das kleine Exemplar trägt auf dem äusseren Umgange 21, auf dem vorletzten 15 Rippen.

Die Lobenlinie (Fig. 1 k, 1 l), welche an dem grösseren, bis zum Ende gekammerten Exemplare an vielen Stellen gut zu beobachten ist, zeichnet sich durch ziemlich starke Zerschlitzung, einen ausgesprochenen Suspensivlobus und zugleich durch einen sehr tiefen Siphonallobus aus. Der letztere reicht weit tiefer herab als der erste Lateral und die Auxiliaren. Zwei Hilfsloben vereinigen sich mit dem zweiten Lateral, welcher nicht so tief herabreicht als der erste Hilfslobus, zu einem herabhangenden Nahtlobus. Durch die starke Zerschlitzung und den typischen Suspensivlobus erinnert die Lobenlinie an jene des Ariet. salinarius, von welchem sie sich aber durch den tiefen Siphonallobus sehr bestimmt unterscheidet. In letzter Hinsicht steht sie auf dem Standpunkte der Gruppe des Ariet. Coregonensis, während bei Ariet. salinarius Siphonallobus und erster Lateral ungefähr gleich tief sind.

Vorkommen: Das grössere Exemplar stammt aus dem bunten Kalke mit Schloth. marmorea von der Hinter-Mandling, das kleine aus dem rothen Kalke mit Brauneisenconcretionen (dem gleichen Horizonte) vom Schreinbach.

Arietites anastreptoptychus n. f.

(Taf. XVI[XLVI], Fig. 3-5.)

					Fi	g. 3		Fig. 4					Fig. 51)			
Durchmesser .				55	mm	(= 1)	36.2	mm	$\langle ==$	I)	24.2	$_{\mathrm{mm}}$	(=	1)
Nabelweite			٠	30	22	(== 0.2	(5)	19	27	(==	0.25)	12	22	(==	0.49)
Windungshöhe				14'5	22	(= 0.2	26)	10	22	(==	0.52)	7	27	(=	0°29)
Dicke				19	,,	(= 0.3	35)	12'5	22	(===	0.31	.)	9.5	"	(=	0.30)

Im ersten Anblick erinnert die Form durch die Windungsverhältnisse und die schief nach rückwärts verlaufenden Rippen an Ariet. retroversicostatus Canav.; ²) ein sehr wichtiger Unterschied besteht jedoch darin, dass bei letzterem die Rippen auf der Externseite fast senkrecht gegen die

¹⁾ Eine Strecke hinter dem Ende des äusseren Umganges gemessen.

²) Canavari, Unt. Lias v. Spezia, Palaeontographica, XXIX, S. 177, Taf. XX, Fig. 13, 14; Lias inf. di Spezia, Mem. R. Comit. Geol. d'Italia, III, 2, p. 122, tav. VI, fig. 13, 14.

Nebenkiele verlaufen und hier ziemlich stumpf endigen, während bei unserer Form die Rippen hier sehr weit nach vorwärts gezogen sind und sich dabei allmälig zu sehr feinen Streifen abschwächen. Durch dieses Verhalten der Sculptur sowie durch die früh beginnende und weit vorgeschrittene Kielbildung erweist sich die Form als in die Gruppe des Ariet. Haueri Gümb. gehörig. Was das Höhenwachsthum betrifft, so besteht eine recht gute Uebereinstimmung mit jener "Varietät" des Ariet. Haueri, welche wir als Ariet. altior bezeichnet haben; von diesem unterscheidet sich unsere Form durch die bedeutendere Dicke und durch die weit kräftigeren, durch breitere Zwischenräume getrennten, minder zahlreichen Rippen. Dieselbe Verschiedenheit in der Sculptur besteht auch gegenüber dem eben beschriebenen Ariet. subsalinarius, welcher auch durch seine inneren Windungen und die damit zusammenhängenden Sculptureigenthümlichkeiten gut unterschieden ist; die Kielentwicklung schreitet ferner bei unserer Form rascher vor, die Furchen sind sehr bald deutlich eingesenkt, und ebenso bald kommt es zur Bildung von Nebenkielen. Die letzteren sind von der Flanke häufig durch eine Region geringer Abplattung geschieden, und bei Exemplaren, an welchen dieses Merkmal bei guter Erhaltungsweise deutlich sichtbar ist, fällt insbesondere die Aehnlichkeit mit gewissen Vorkommnissen von Ariet. Haueri in die Augen, welche durch die gleiche gute Entwicklung dieser Abplattung und das dadurch bewirkte Hervortreten der Nebenkiele ausgezeichnet sind. Es sind dies Exemplare aus der Zone der Schloth. marmorea, welche vor den typischen Vorkommnissen des Ariet. Haueri aus der nächst tieferen Bank des Psil. megastoma durch kräftigere (stärker erhabene), von breiten Zwischenräumen begleitete Rippen ausgezeichnet und daher als eine Mutation des Ariet. Haueri zu betrachten sind. (Vgl. dieser Arbeit IV. Theil, V. Bd. dieser Beiträge, S. 39, 40 [128, 129]; das daselbst auf Taf. XIX[XXXIV], Fig. 1 abgebildete Exemplar ist nichtbezeichnend für die erwähnten Vorkommnisse mit scharf markirten Nebenkielen, welche überdies dicke, gerundete Windungen haben, über deren Externseite der Mediankiel stark hervorragt.)

Die Rippen verlaufen fast immer in von der radialen stark nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanken und gehen auf der Externseite sehr rasch in den nach vorwärts gerichteten Zug über, auf welchem sie sich allmälig zu feinen Streifen abschwächen. Das in Fig. 3 abgebildete Exemplar trägt auf dem äusseren Umgange 38, auf den nach innen folgenden Windungen 31 und 24 Rippen. Das in Fig. 4 abgebildete Exemplar hat auf dem äusseren Umgange 28, auf dem vorletzten 21 bis 22, auf dem drittletzten 17 Rippen. Das in Fig. 5 dargestellte Exemplar hat aufder einem Durchmesser von 245 mm entsprechenden Windung 20, auf der vorhergehenden 18 Rippen. Hie und da zeigen sich, insbesondere auf den inneren Windungen, gewisse Unregelmässigkeiten in der Sculptur, indem zwei Rippen, von denen die eine schwächer ausgebildet ist, einander stark genähert, durch einen schmäleren und seichteren Zwischenraum getrennt sind (Doppelrippen). Die inneren Windungen (Fig. 4 c-4 e) sind gerundet, es fehlt jene Kante zwischen Flanke und Externseite, welche bei der Gruppe des Ariet. Coregonensis dem Windungsquerschnitt eine trapezähnliche Gestalt verleiht, und der Beginn der Kielbildung ist schon bei einem Durchmesser von 9 mm deutlich erkennbar; Spuren einer Rippenspaltung sind hie und da auf der Externseite zu beobachten. Auf demselben Umgange, bei einem Durchmesser von 12 mm, gelangen Kiel und Furchen bereits zu guter Entwicklung, und die Nebenkiele sind angedeutet.

Auf den inneren Windungen des in Fig. 4 dargestellten Exemplares ist die Lobenlinie deutlich zu beobachten. Merkwürdigerweise ist dieselbe unsymmetrisch, indem der Sipho aus der Medianlinie gegen die rechte¹) Flanke verschoben ist, und sie bleibt dies weiter aussen, soweit man sie

¹⁾ Wenn man die Externseite als die Bauchseite des Thieres betrachtet, so ergeben sich für "links" und "rechts" die entgegengesetzten Bezeichnungen als bei der üblichen Betrachtungsweise der Lobenlinie. Die rechte Flanke ist diejenige, bei deren Ansicht die Schale nach links gewunden erscheint.

beobachten kann, so noch auf dem vorletzten Umgange, bei einem Durchmesser von 16 mm, bei voller Kielentwicklung, woselbst der Sipho längs des rechtsseitigen Nebenkieles und der linke Ast des Siphonallobus in der rechten Externfurche verläuft. Der Siphonallobus ist weit tiefer als die übrigen Loben; ausserhalb der Nahtlinie ist ein Hilfslobus entwickelt. Ein Secundärzacken greift, was für viele Arieten charakteristisch ist, von der Seite des ersten Laterals ziemlich tief in den Externsattel ein, welcher dadurch in zwei ungleiche Theile getheilt wird.

Vorkommen: In dem rothen Kalke mit Brauneisenconcretionen vom Schreinbach (Horizont der Schloth, marmorea) und von Adnet.

Im Anschlusse an die eben beschriebene Form dürften am besten einige Jugendformen von Arieten zu besprechen sein, von welchen die dazugehörigen Entwicklungszustände eines höheren Lebensalters nicht bekannt sind. Sie stammen sämmtlich aus dem tiefliasischen rothen Kalke mit Brauneisenconcretionen von der Kammerkaralpe, in welchem derartige kleine Ammoniten mit trefflich erhaltener Schale nicht allzu selten vorkommen; an solchen kann man in der Regel wichtige Beobachtungen über Anwachsstreifen und alte Mundränder anstellen. Das Verhalten der Sculptur, insbesondere die starke Vorwärtsbeugung der Rippen auf der Externseite, erinnert an die Gruppe des Ariet. Haueri.

Den inneren Windungen des Ariet. Haueri kommt am nächsten der in Taf. XVI[XLVI], Fig. 12 abgebildete kleine Ammonit. Er ist hochmündiger und dicker als jene und wahrscheinlich auch als die entsprechenden Windungen des Ariet. altior. Der Jugendzustand des letzteren ist nicht mit Sicherheit bekannt, doch dürfte der im IV. Theile dieser Arbeit (Bd. V der Beiträge), Taf. XXI[XXXVI], Fig. 4 abgebildete kleine Ammonit die Jugendform eines Exemplars mit schwach entwickeltem Kiele darstellen. Es ist möglich, dass der hier zu besprechende kleine Ammonit ein Jugendexemplar von Ariet. salinarius ist, doch lässt sich dies nicht mit Sicherheit entscheiden. da die wenigen vorhandenen kostbaren grossen Exemplare dieser Form eine Kenntnissnahme der inneren Windungen nicht gestatten. Von den inneren Windungen des Ariet. anastreptoptychus unterscheidet er sich ebenfalls durch etwas grössere Dicke und Windungshöhe, ferner durch die langsamere Entwicklung des stark hervorstehenden, aber noch nicht von Furchen begleiteten Kieles sowie durch zahlreichere, enger aneinander gereihte Falten. Die letzteren verlaufen auf der vorletzten Windung in radialer, auf dem äusseren Umgange in von dieser nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanken und biegen sich auf der Externseite, indem sie sich rasch zu feinen Streifen abschwächen, sehr stark nach vorwärts; Spuren einer an der Biegungsstelle erfolgenden Rippenspaltung sind erkennbar. Der der starken Vorwärtsbeugung der Rippe entsprechende vordere, in ihrer Verlängerung liegende, deutlich ausgeprägte Streifen hat hinter sich, auf der wohlerhaltenen Schalenoberfläche der Externseite, zahlreiche feine Anwachsstreifen, welche mit ihm nicht vollkommen parallel sind, sondern der Reihe nach von ihm ausgehen, etwa wie die Hauptnerven einer Blatthälfte von dem in der Verlängerung des Blattstieles liegenden Mittelnerven. Es wurde dies zwar nicht in Fig. 12 d, aber ziemlich gut bei anderen Formen, in Fig. 9 d und 11 d derselben Tafel, sowie auf Taf. XX[L], Fig. 3 g dargestellt. Gegen Ende der äusseren Windung kommt es zur Andeutung einer Kante zwischen Flanke und Externseite; da aber die letztere nicht flach, sondern stark gewölbt, oder vielmehr steil dachförmig ist, welcher Eindruck durch den hoch emporstehenden Kiel verstärkt wird, so wird der Windungsquerschnitt nicht trapezähnlich, wie bei der Gruppe des Ariet. Coregonensis. Das Exemplar trägt auf dem äusseren Umgange 23 Rippen. Dimensionen: Durchmesser 15 mm (= 1), Nabelweite 6 mm (= 0.40), Windungshöhe 5 mm (= 0.33), Dicke 7 mm (= 0.47). Die Lobenlinie ist nicht deutlich erkennbar. Der Siphonallobus scheint tiefer zu sein als der erste Lateral.

Dieses Merkmal würde, wenn in beträchtlichem Masse vorhanden, auch gegen eine Identificirung mit Ariet. salinarius sprechen. Das Exemplar lag mit mehreren anderen von geringer Grösse unter der Bezeichnung "A. stellaeformis Gümb." in der Sammlung des kgl. Oberbergamtes zu München. Wenn auch die innersten Windungen dieses im V. Theile unserer Arbeit beschriebenen Ammoniten (Taf. [XLV], Fig. 2) nicht bekannt sind, so ist doch mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass dieselben viel dicker und höher sind und mit weit kräftigeren (dickeren), minder zahlreichen Falten besetzt sind als bei der eben beschriebenen kleinen Form, und der Umstand, dass bei jenem die Falten und Anwachsstreifen an der Externseite des letzten Umganges nur äusserst schwach nach vorwärts gebogen sind, schliesst eine Identificirung vollkommen aus. Es kommt zwar vor, dass bei Arieten die Sculptur auf der Externseite der inneren Windungen fast gar nicht, auf jener der äusseren Windungen stark nach vorwärts gebogen ist; der umgekehrte Fall ist jedoch noch nie beobachtet worden.

Der in Taf. XVI[XLVI], Fig. 6 abgebildete kleine Ammonit unterscheidet sich von dem soeben besprochenen durch (im Verhältniss zur Windungshöhe) etwas dickere Windungen (entfernt sich also in dieser Richtung noch weiter von den bisher bekannten Jugendformen der Gruppe des Ariet. Haueri), ferner durch die kräftige Ausbildung der Rippen auf der Externseite und insbesondere durch die schon bei dieser geringen Grösse sehr weit fortgeschrittene Entwicklung von Kiel und Furchen. Von den inneren Windungen des Ariet. anastreptoptychus unterscheidet er sich hauptsächlich durch die beiden zuletzt genannten Merkmale, ferner durch die enger aneinander gereihten, zahlreicheren Falten, welche schon bei dieser geringen Grösse an der Externseite stark nach vorwärts gebogen sind. Die sehr stark erhabenen Rippen verlaufen auf den Flanken in von der radialen stark nach rückwärts abweichender Richtung, biegen sich beim Uebertritt auf die Externseite energisch nach vorwärts, erleiden, indem sie sich den Nebenkielen nähern, eine allmälige Abschwächung, sind aber bei ihrer Vereinigung mit den letzteren noch immer deutlich markirt. Die Windungen sind viel breiter als hoch, gerundet, die Externseite ist schwach gewölbt, der Mediankiel ragt über die Nebenkiele empor, die Furchen sind schon zu Beginn des äusseren Umganges tief eingesenkt. Der äussere Umgang trägt 22 einfache Rippen. Dimensionen: Durchmesser 14 mm (= 1), Nabelweite 6 mm (= 0'43), Windungshöhe 4'5 mm (= 0'32), Dicke 7 mm (= 0'50). — Die Lobenlinie ist nicht erkennbar. — Wir haben es hier wahrscheinlich mit einer neuen Art zu thun, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass der Ammonit die Jugendform von Ariet. salinarius darstellt.

Der in Taf. XVI[XLVI], Fig. 11 abgebildete kleine Ammonit zeigt weit weniger vorgeschrittene Kielentwicklung als die zuletzt besprochene, in Fig. 6 abgebildete Form, aber etwas weiter vorgeschrittene gegenüber der früher beschriebenen, in Fig. 12 abgebildeten Form. Ausser der ziemlich grossen Dicke und der Gestalt des Windungsquerschnittes ist die rasche Abschwächung der Sculptur auf der Externseite, wodurch diese fast ganz glatt erscheint, besonders charakteristisch. Flanken und Externseite sind stark gewölbt; zwischen beiden ist eine gerundete Kante ausgebildet, gegen welche die Externseite zu beiden Seiten der Medianlinie dachförmig abfällt. Zu Beginn des äusseren Umganges ist der Kiel bereits deutlich ausgebildet, von zwei sanften, noch nicht rinnenartig vertieften Einbuchtungen und den Andeutungen der Nebenkiele begleitet; auf der zweiten Hälfte des äusseren Umganges sind die Furchen bereits als eingetiefte Rinnen entwickelt. Die Nebenkiele, über welche der Mediankiel stark emporragt, treten in Folge von gegen die Flanken hin ausgebildeten leichten Abplattungen deutlich hervor. Die Rippen verlaufen in von der radialen stark nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanken, nehmen bis zu der erwähnten Kante zwischen Flanke und Externseite an Breite zu und erlöschen hier beinahe, indem sie sich zugleich mit einer starken Vorwärtsbeugung zu feinen Streifen abschwächen. Auf der ausgezeichnet erhaltenen Schalenoberfläche

sind an der Externseite sehr feine Anwachsstreifen sichtbar, welche in sehr stark nach vorwärts geneigter Richtung über Nebenkiele, Furchen und Mediankiel zu verfolgen sind, sowie einige noch stärker nach vorwärts gezogene alte Mundränder, welche sich an je ein Rippenpaar anschliessen, und von welchen eine grosse Anzahl weiter nach rückwärts gelegener Anwachsstreifen ausgehen, wie oben S. 245 (188) bei dem in Fig. 12 abgebildeten Ammoniten beschrieben. Der äussere Umgang trägt 26 Rippen. Dimensionen: Durchmesser 19 oder 19.5 mm (wegen einer bestehenden Verletzung nicht sicher zu messen), Nabelweite 8.5 mm, Windungshöhe 6 mm, Dicke 8.5 mm. — Die Lobenlinie ist nicht erkennbar. — Es liegt hier wie in dem nachfolgend zu beschreibenden Ammoniten zweifellos eine neue Art vor; ich halte es aber nicht für angemessen, lediglich auf Grund von so kleinen Exemplaren neue Arten zu benennen, besonders bei Formen wie den Arieten, welche im Laufe der individuellen Entwicklung so grosse Veränderungen erfahren.

Der in Taf. XVI[XLVI], Fig. 9 abgebildete kleine Ammonit zeigt unter den hier besprochenen Formen den spätesten Beginn der Kielbildung und zeichnet sich überdies durch rasches Höhen- und Dickenwachsthum sowie durch dicke, wulstige Rippen aus, welche auf der Externseite zuerst noch ziemlich schwach nach vorwärts gebogen sind, später aber ebenfalls eine sehr starke Beugung erfahren. Die Windungen sind weit dicker als hoch, die Externseite ist flach gewölbt, zwischen dieser und den Flanken ist eine Art Kante ausgebildet, der Querschnitt ist daher trapezähnlich wie bei den inneren Windungen in der Gruppe des Ariet. Coregonensis. Zu Beginn der einem Durchmesser von 14 mm entsprechenden Windung ist auf der Externseite noch keine Spur eines Kieles vorhanden; die erste Andeutung zeigt sich gegen Ende der ersten Hälfte dieser Windung. Bis zum Ende der Windung wird der Kiel zwar ganz deutlich, kommt aber über eine schwache Emporwölbung der Medianregion, welche auf dem Querschnitte nicht sichtbar ist, und eine kaum merkbare Andeutung der künftigen Furchen nicht hinaus. Auf einem kleinen Reste eins weiteren Umganges, welcher sich um eine halbe Windung weiter nach aussen erhalten hat, erkennt man jedoch bereits einen hoch emporstehenden dicken Kiel, begleitet von einer noch nicht zur ausgesprochenen Rinne vertieften Einbuchtung, die sich um eine kurze Strecke weiter nach aussen zur eingetieften Furche entwickelt haben dürfte. 1) Die stark erhabenen dicken Falten verlaufen in von der radialen nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanke, verbreitern sich dabei allmälig bis zur Kante an der Externseite zu knotenähnlichen Gebilden, um dann eine plötzliche Abschwächung zu erfahren, welche fast einem Erlöschen gleichkommt; sie spalten sich hier jedoch in der Regel in je zwei feine Streifen, von welchen der vordere der kräftiger markirte ist und schief nach vorwärts verläuft, während der rückwärtige in radialer Richtung oder sogar eine kurze Strecke schief nach rückwärts verläuft und erst gegen die Mitte der Externseite hin eine schwache Biegung nach vorwärts erfährt. Entlang dem vorderen Streifen ist häufig ein scharf markirter alter Mundrand erhalten, der stark nach vorwärts gezogen ist, aber nicht so stark wie bei den in Fig. 11 und 12 abgebildeten Formen. Auf der wohlerhaltenen Schalenoberfläche sind ausserdem zahlreiche Anwachsstreifen sichtbar, welche, wie oben S. 245 (188) beschrieben, von dem vorderen Streifen (dem alten Mundrande) ausgehen. Auf dem früher erwähnten, weiter aussen erhaltenen Windungsstück ist die äussere Hälfte von drei Rippen erhalten, welche verhältnissmässig schlank sind, keine Spur einer Rippenspaltung mehr erkennen lassen und bereits sehr stark nach vorwärts gebogen sind, wobei sie eine allmälige Abschwächung erfahren. Dieses Windungsstück gehört, so gross auch die Verschiedenheit gegenüber den weiter nach innen befindlichen Windungstheilen ist, zweifellos zu diesen inneren Windungen; es war in fester

¹⁾ Bezüglich des hier öfter angewandten Ausdruckes "eingetieft" vgl. die Note auf S. [158], V. Theil dieser Arbeit VI. Bd. der Beiträge, S. 301.

248 Wähner. [191]

Verbindung mit denselben (Fig. 9 a) und wurde von mir zum Zwecke der vollkommenen Blosslegung der vorhergehenden Windung abgetrennt. Der einem Durchmesser von 14 mm entsprechende Umgang trägt 18 Rippen. Für diesen ergeben sich folgende Dimensionen: Durchmesser 14 mm (= 1), Nabelweite 6 mm (= 0.43), Windungshöhe 4.5 mm (= 0.32), Dicke 7.5 mm (= 0.54). — Die Lobenlinie (Fig. 9 e) ist gut erkennbar. Der Siphonallobus ist beträchtlich tiefer als der erste Lateral, ein Auxiliar ist entwickelt. — Die inneren Windungen erinnern durch die grosse Dicke und die Andeutung einer Rippenspaltung an die gleich grossen Windungen von Ariet. centauroides, wie sie von Canavariabekannt gemacht wurden; die letzteren unterscheiden sich aber schon durch die kräftigere Ausbildung der Sculptur auf der Externseite. Die viel langsamere Kielentwicklung bei der letztgenanhten Form und die auch noch bei grossen Exemplaren derselben zu findende schwache Vorwärtsbeugung der Rippen an der Externseite lassen an eine Identität mit dem hier besprochenen kleinen Ammoniten nicht denken.

Arietites ligusticus Cocchi (Canav.).

(Taf. XVI[XLVI], Fig. 7-8.)

1882. Arietites ligusticus, Canavari, Unt. Lias v. Spezia, Palaeontographica, XXIX, S. 182, Taf. XXI, Fig. 7-8.
1888. " " " Lias inf. di Spezia, Mem. R. Com. Geol. d'Italia, III, 2, pag. 134, tav. VII, fig. 7-8.

						Fig. 7	Fig. 8			
Durchmesser.				•	٠	26 mm (== I)	17 mm (== 1)			
Nabelweite .			·			11.2 " (= 0.41)	7 " (= o·41)			
Windungshöhe						8·5 " (= o·33)	$6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$			
Dicke						13 " (=0.50)	9 " (= 0.53)			

Diese Form ist einer der fremdartigst gestalteten Arieten, welche die tieferen Zonen des alpinen Lias geliefert haben. Neben der grossen Dicke ist insbesondere die Gestalt des Windungsquerschnittes auffallend. Derselbe ist überall stark gewölbt, besonders auf den Flanken, welche einerseits sehr steil gegen die Naht abfallen, andererseits rasch in die gerundete Externseite übergehen; dadurch verengert sich die Flanke, welche bei anderen Ammoniten einen viel breiteren Raum einnimmt, zu einem schmalen Kamme, welcher, entsprechend der grössten Dicke der Windung, nahe an der Nahtlinie verläuft. Die Kielentwicklung ist schon bei geringer Grösse vollendet; die Furchen sind schon an sehr kleinen Exemplaren deutlich eingetieft, und ebenso bald sind die Nebenkiele entwickelt, über welche der Mediankiel stets mässig emporragt. An dem in Fig. 7 abgebildeten Exemplare sind Kiel und Furchen bereits zu Beginn der vorletzten Windung gut entwickelt, an einer Stelle, welche einem Durchmesser von kaum 8 mm entspricht.

Trotz der im Verhältnisse zum Durchmesser bedeutenden Windungshöhe und der noch beträchtlicheren Dicke wächst der Ammonit sehr langsam an; die Schale besteht deshalb aus verhältnissmässig zahlreichen Windungen, und die Exemplare sind älter, als sie ihrem Durchmesser nach zu sein scheinen. Das in Fig. 7 abgebildete Exemplar lässt deutlich fünf Umgänge erkennen; weiter nach innen ist es nicht erhalten. Wenn es gelänge, die inneren Windungen blosszulegen, müsste man auch bei dieser Form die Entwicklung des Kieles gut verfolgen können. Zu dem langsamen Anwachsen der Höhe und Dicke der Windungen kommt ihre für einen Arieten sehr beträchtliche Involubilität, welche mit zu dem langsamen Wachsthum des Durchmessers des Ammoniten beiträgt. An dem ebenerwähnten Exemplare ist auf der äusseren Windung die Involutionsmarke des fehlenden, nach aussen folgenden Umganges erhalten. Daran lässt sich die Involubilität des letzteren genau messen; dieselbe beträgt $\frac{3 \text{ mm}}{8 \text{ mm}} = \frac{3}{8}$ oder o 38 für die Windungshöhe = 1.

Obwohl Ariet. ligusticus im alpinen Lias nicht zu den ganz seltenen Formen gehört, sind doch fast nur kleine Exemplare bisher gefunden worden, welche nicht leicht über die Grösse des in Fig. 7 abgebildeten Exemplares hinausgehen. Das letztere ist nun wohl, wie die erhaltene Involutionsmarke beweist, vor der Sedimentirung mindestens um einen ganzen Umgang grösser gewesen; dennoch dürfen wir derartige Exemplare als der Mittelgrösse anderer Ammoniten ungefähr entsprechend betrachten, wie auch aus der Ausbildung der Radialsculptur hervorgeht.

Die stets sehr schlanken, eng aneinander gereihten Rippen verlaufen an der Naht, wo sie als feine Streifen beginnen, in starker Neigung nach rückwärts, vollführen dann im Aufsteigen von der Naht in der Regel einen kleinen nach vorne offenen Bogen, behalten aber auch in ihrem weiteren Verlaufe über die stark gewölbte schmale Flanke eine Richtung, welche von der radialen stark nach rückwärts abweicht, und erlangen erst auf der Externseite, indem sie sich der Kielregion nähern, allmälig eine leichte Neigung nach vorwärts, welche unmittelbar, bevor sich die Rippe mit dem Nebenkiele vereinigt, in eine etwas stärkere, aber gegenüber anderen Formen noch immer schwache Vorwärtsbeugung übergeht. Wie dieser Form die starke Vorwärtsbeugung der Rippen fehlt, welche wir an der Externseite so vieler Arieten zu beobachten gewohnt sind, so vermissen wir auf der äusseren Windung von Exemplaren wie dem in Fig. 7 abgebildeten auch die starke Abschwächung der Rippen, welche gleichzeitig mit dieser Beugung einzutreten pflegt. Die Rippe bleibt hier auf der Externseite kräftig markirt, und erst unmittelbar vor der Vereinigung mit dem Nebenkiele, wo die Rippe, wie geschildert, eine etwas stärkere Vorwärtsbiegung erfährt, erfolgt auch eine leichte Abschwächung derselben. Auf dem in Fig. 7 abgebildeten Exemplare erkennt man trotz der Ueberrindung mit Brauneisen hie und da Spuren von schwachen Streifen, welche in der Fortsetzung der Rippen und ihrer letzten Vorwärtsbeugung durch die Furche und über den Kiel verlaufen. Dem Ariet, ligusticus fehlte also am Mundrande nicht ein nach vorne gezogener Externlappen, nur war er schmäler (auf die Kielregion beschränkt) und kürzer als bei anderen Formen. Bei dem in Fig. 8 abgebildeten kleineren Exemplare, welches in Kielentwicklung und Radialsculptur noch nicht ganz den Charakter ausgewachsener Exemplare erkennen lässt, wie das in Fig. 7 abgebildete, zeigen die Rippen auf der Externseite schon vor ihrer letzten Biegung eine Abschwächung, und die Fortsetzungen der Rippen sind hier nebst anderen sich dazu gesellenden feinen Streifen deutlich durch die schwach eingetieften Furchen und über den Mediankiel zu verfolgen. Das in Fig. 7 abgebildete Exemplar trägt auf dem äusseren Umgange 31, auf den nach innen folgenden Windungen 25, 19 und 13 einfache Rippen.

Ein aus dem grauen Kalke mit *Psil. megastoma* vom Breitenberg stammendes schlecht erhaltenes Exemplar erreicht die sonst nicht beobachtete Grösse von ungefähr 70 mm im Durchmesser; die Nabelweite beträgt ungefähr 30 mm, die Windungshöhe etwa 20 mm, die Dicke etwa 30 mm. Es hat ganz die Stephanoceraten-ähnliche Gestalt und den Sculpturcharakter bewahrt, welche wir nach den kleineren Exemplaren beschrieben haben. Die dicke, gerundete Form der inneren Windungen geht also nicht wie bei anderen Arieten verloren, sondern bleibt, wie es scheint, bis in hohes Alter erhalten.

Die alpinen Exemplare sind der Mehrzahl nach etwas dünner als die Originale Canavari's, welche ich vergleichen konnte. Bei manchen Exemplaren, wie bei dem grösseren Originale Canavari's, sind die den Kiel begleitenden Furchen sehr schmal, wodurch die ganze Kielregion gegenüber der breiten Externseite äusserst schmal wird. Die Lobenlinie konnte nicht vollständig blossgelegt werden.

Der von Canavari in seiner oben an zweiter Stelle citirten Abhandlung, tav. VIII, fig. 9 abgebildete, als Ariet. ligusticus bezeichnete kleine Ammonit kann nicht hieher gehören. Er ist so eng genabelt, dass eine Identificirung mit dem viel weniger involuten Ariet. ligusticus ganz ausgeschlossen ist. Trotz seiner Kleinheit müsste er bei dieser Grösse in den Windungsverhältnissen schon den grossen Exemplaren gleichen.

Die Gestalt und das Anwachsen der Windungen, die schwache Vorwärtsbiegung und kräftige Ausbildung der Sculptur auf der Externseite lassen Ariet. ligusticus leicht von anderen, irgendwie ähnlichen Arieten unterscheiden.

Es ist nicht überflüssig, zu erwähnen, dass diese Form vor dem Erscheinen der Abhandlungen Canavari's von mir mit dem Manuscriptnamen Ariet. oxyplagius bezeichnet wurde, weil dieser Name mit meinen Bestimmungen in einige Sammlungen übergegangen ist.

Vorkommen: Im grauen Kalke mit *Psil. megastoma* vom Breitenberg, im röthlichen Kalke mit Brauneisenconcretionen, dem Horizonte der *Schloth. marmorea*, vom Schreinbach, im tiefliasischen rothen Kalke mit Brauneisenconcretionen vom Lämmerbach und im grauen Kalke mit *Schloth. trapezoidalis* und *Ariet. Coregonensis* (wahrscheinlich dem Horizonte der *Schloth. marmorea*) vom Rotheisgraben (Hinter-Riss, N.-Tirol); ausserdem im unteren Lias der Gegend von Spezia.

Der in Taf. XVI[XLVI], Fig. 10 abgebildete Ammonit aus dem gelbgrauen Kalke mit Brauneisenconcretionen, dem Horizonte der Schloth. marmorea vom Breitenberg, stimmt mit Ariet. ligusticus in der Form der äusseren Windung und dem Verhalten der Sculptur überein und unterscheidet sich von diesem hauptsächlich durch viel kräftigere Falten. Er zählt deren 23 auf dem äusseren Umgange bei einem Durchmesser von 23 mm. Die Lobenlinie (Fig. 10c) konnte beobachtet werden. Der Ammonit stellt wahrscheinlich eine neue mit Ariet. ligusticus nahe verwandte Art dar.

Arietites Cordieri Canav.

(Taf. XVII[XLVII], Fig. 1—4; Taf. XVIII[XLVIII], Fig. 1—6.)

1856. Ammonites Conybeari, Hauer, Cephalop. aus d. Lias d. nordöstl. Alpen, S. 16, Taf. II, Fig. 1—6. (Denkschr. k. Ak. d. W., XI.) 1888. Arietites n. sp., Canavari, Lias inf. di Spezia, Mem. R. Com. Geol. d'Italia, III, 2, pag. 130, tav. IX, fig. 10. (Ar. Cordieri, pag. 131.)

	Durchmesser	Nabelweite	Windungshöhe	Dicke		
A. Tat. [XLVII], Fig. 11)	205 mm (== 1)	135 mm (== 0.66)	36 mm (= 0.18)	42 mm (= 0.50)		
B. Hau. Orig. Taf. II, Fig. 1-32).	93 " (== 1)	56 " (= 0.61)	20.5 " (= 0.55)	21 , (= 0.23)		
C. Taf. [XLVIII], Fig. 1	66 " (= 1)	39°5 " (= 0°60)	15 " (= 0·23)	16.5 " (= 0.52)		
D. Hau. Orig. Taf. II, Fig. 4-62).	57 " (== 1)	33 " (== o·58)	13 , (= 0.23)	11.2 " (= 0.50)		
E. Taf. [XLVIII], Fig. 3 ³)	40 " (= 1)	23.5 " (=0.20)	8.5 " (= 0.51)	11.5 " (= 0.50)		
F. Taf. [XVII], Fig. 3	33 " (= 1)	19 " (= 0.58)	7.5 " (= 0.53)	8.5 " (= 0.26)		

Das Wiedererkennen der von Sowerby in der Mineral Conchology beschriebenen und abgebildeten Arieten ist durch das Erscheinen von Wright's trefflicher Monographie der britischen Lias-Ammoniten bei zwei wichtigen Formen (Ariet. Bucklandi und Conybeari) wenig gefördert worden, einerseits weil dieselben nicht in natürlicher Grösse dargestellt wurden, andererseits weil dieser Autor in seine Synonymen-Verzeichnisse fast sämmtliche seit Sowerby unter dem betreffenden Namen veröffentlichten Bestimmungen, Beschreibungen und Abbildungen kritiklos aufnahm. Wenn F. v. Hauer im Jahre 1856 die Vergleichung der alpinen Lias-Ammoniten mit den englischen Formen wiederholt nur mit Vorbehalt vornimmt, so sind wir heute, nach mehr als dreissig Jahren, wenigstens mit Bezug auf Ariet. Conybeari nicht viel weiter gekommen. Wright's Abbildung⁴) dieser Form stellt ein

¹⁾ Ungefähr zwei Fünftel-Windungen hinter dem Ende des äusseren Umganges gemessen.

²⁾ F. v. Hauer's Original-Exemplare.

³⁾ Eine Viertel-Windung hinter dem Ende des äusseren Umganges gemessen.

⁴⁾ Wright, Lias Ammonites, Palaeontogr. Soc., XXXII (1878), pl. II, fig. 1-3.

sehr grosses Exemplar in halber natürlicher Grösse dar; wie sollte es möglich sein, auf Grund derselben die Zugehörigkeit mittelgrosser oder kleiner Exemplare zu Ariet. Conybeari mit Sicherheit festzustellen?

An dieser Abbildung, welche für uns die Stelle einer Original-Abbildung vertreten muss, ist jedoch ein entscheidendes Merkmal gut zu erkennen, welches ausser Zweifel stellt. dass der von Hauer zu A. Conybeari gestellte Ammonit mit dieser Form nicht identisch ist, obgleich beide demselben stratigraphischen Horizonte angehören. Die Rippen verlaufen an dem englischen Ammoniten in von der radialen stark nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanken; sie sind insbesondere im Aufsteigen von der Naht sehr schräg, vollführen aber im weiteren Verlaufe eine allmälige Biegung. so dass ihre Richtung gegen die Externseite hin oft in eine radiale übergeht. In allen Fällen endigen sie in einer knoten- oder dornenähnlichen Anschwellung (keinem wirklichen Sculpturknoten), in dem sie die grösste Höhe und Dicke erreichen und fast senkrecht gegen den Nebenkiel hinlaufen. An der Externansicht (Fig. 2 bei Wright) ist die feinere Schalensculptur deutlich erkennbar: die feinen Anwachsstreifen vollführen nach der Endigung der kräftigen Falte noch eine sehr schwache Biegung nach vorwärts. Dasselbe Verhalten zeigt die Sculptur bei A. longidomus Quenst. 1) und A. latisulcatus Quenst.,2) welche mit Ariet. Conybeari identisch sein dürften, zweifellos aber zu demselben in der engsten morphologischen und verwandtschaftlichen Beziehung stehen, ferner bei A. spiratissimus Quenst., welcher von A. latisulcatus nur durch zahlreichere, niedrigere Windungen unterschieden ist. 3)

Diese Formengruppe, welche nach meiner Kenntniss der alpinen Vorkommnisse trotz der bisherigen häufigen Angaben in der mediterranen Juraprovinz nicht vertreten ist und zu den bezeichnenden Versteinerungen der mitteleuropäischen Provinz gehört, zeigt manche Verschiedenheiten in
Bezug auf die Windungsverhältnisse, die mehr oder weniger kräftige Sculptur, den Verlauf der Rippen
über die Flanken, die stärkere oder schwächere Eintiefung der den Kiel begleitenden Furchen und
das entsprechend schwächere oder stärkere Emporragen des Mediankieles über die Nebenkiele. So
mannigfaltig auch diese minder bedeutsamen Unterschiede sein mögen, so kommt der kleinen Gruppe

¹⁾ Quenstedt, Ammoniten des schwäb. Jura, Tab. 6, Fig. 1.

²⁾ L. c., Tab. 12, Fig. 1.

³) Vgl. die Bemerkungen über die beiden letztgenannten Formen in der Beschreibung des Ariet, supraspiratus im V. Theile dieser Arbeit (VI. Bd. der Beiträge), S. 299 [156] u. ff.; vgl. ferner die Abbildung des schwäbischen Ariet, spiratissimus in diesem Theile, Taf. XVIII[XLVIII], Fig. 7b, 7c, 7e—g.

⁴⁾ Das bei Wright abgebildete Exemplar von Ariet. Conybeari stellt insofern nicht den Typus der Form dar, als Exemplare mit auf den Flanken so stark nach rückwärts geneigten Falten seltener zu sein scheinen. (Sowerby's Original, Min. Conch., tab. 131 hat radial verlaufende Falten.) Mir liegt ein derartiges schwäbisches Exemplar vor, welches sich von dem englischen dadurch unterscheidet, dass seine Windungshöhe grösser ist als die Dicke. Der gleichen Abänderung scheint A. longidomus Quenst. anzugehören. A. obliquecostatus Zieten (Verstein. Württemb., Tab. XV, Fig. 1) mit sehr stark nach rückwärts geneigten Rippen gehört ebenfalls hieher. Die Kielentwicklung ist weit vorgeschritten. Nach dem Querschnitte c, welcher dicker als hoch ist, wäre die Form dem Exemplare Wright's an die Seite zu stellen; nach der Externansicht b (weit geringere Dicke) würde sie hingegen mehr dem gerade erwähnten schwäbischen Exemplare entsprechen. Quenstedt hat die Zieten'sche Form ursprünglich richtig gedeutet, später aber den Namen auf einen Harpoceraten des mittleren Lias (= A. retrorsicosta Oppel, Pal. Mittheil., I., S. 139) bezogen. Oppel (l. c.) hält A. obliquecostatus für eine bezeichnende Art des unteren Lias (Zone des A. Bucklandi von Vaihingen), wogegen Quenstedt noch in den "Ammoniten", I., S. 343, auf seinem Standpunkte beharrt. Ein Vergleich des daselbst, Tab. 42, Fig. 44 vollständiger als früher abgebildeten Harpoceraten mit der Abbildung Zieten's zeigt, dass eine solche Verwechslung für jeden unbefangenen Beobachter ausgeschlossen ist. Die charakteristische steife Endigung der Rippen gegen den Nebenkiel bei Zieten's A. obliquecostatus ist ganz naturgetreu wiedergegeben. Wenn Quenstedt mit Bezug auf Oppel erklärt, er habe sich vergeblich bemüht, jene bezeichnende Art des Lias a auch nur einmal unter die Augen zu bekommen, so ist es wohl erstaunlich, dass man der Form unter dem verhältnissmässig kleinen Materiale der Wiener Sammlungen in einem schönen Stücke begegnet. Uebrigens hat Quenstedt in den Ammoniten, Tab. 12, Fig. 2, ein Exemplar von "A. latisulcatus" (auf welches er selbst I., S. 343 verweist) mit (allerdings schwächer) nach rückwärts geneigten Falten abgebildet, und seinen A. longidomus habe ich im Verdacht, eine ausgewachsene Schale der erörterten Abänderung von Ariet, Conybeari zu sein. Auch bei Ariet, spiratissimus Quenst. kommen schief nach rückwärts verlaufende Rippen vor.

doch ein wichtiges gemeinsames Merkmal zu: die schon erwähnte steife Endigung der Rippen an den Nebenkielen. Nach der gegen die Externseite zu erfolgten Anschwellung vereinigen sich die Rippen entweder sogleich mit kaum merklicher Vorwärtsbeugung mit den Nebenkielen, oder sie vollführen von der Anschwellungsstelle an noch eine schwache Biegung nach vorwärts, wobei sie zugleich eine rasche Abschwächung erfahren. Um den Sculpturcharakter dieser Formen richtig zu beurtheilen, genügt es nicht, eine (vielleicht noch schematisch gehaltene) Seitenansicht zu betrachten, welche durch die auf den Flanken sich vollziehende Vorwärtsbeugung in Verbindung mit der immerhin vorhandenen schwachen Vorwärtsbeugung an der Externseite leicht zu der Meinung verleiten kann, es vollziehe sich hier vor der Einlenkung der Rippe in den Nebenkiel eine stärkere Biegung. 1) Es kommt noch ein Umstand hinzu, um diesen Eindruck zu verstärken. Die Rippe oder der von der Anschwellungsstelle ausgehende, nach vorn geneigte Streifen verbindet sich so innig mit dem Nebenkiele, dass der vordere Rand der Rippe unmittelbar in den inneren (gegen die Flanke zu gelegenen) Rand des Nebenkieles übergeht. Dadurch wird der Schein hervorgerufen, als bildete der zwischen je zwei Rippen gelegene Theil des Nebenkieles die Fortsetzung der Rippe, 2) was nicht der Fall ist; denn bei ausnahmsweise gut erhaltenen Stücken zeigt sich, dass die die Fortsetzung der Rippen bildenden feinen Streifen quer über den Nebenkiel, die Furchen und den Mediankiel hinüberziehen. Hier, in der Kielregion, vollführen nun diese feinen Sculpturstreifen stets eine deutliche, wenn auch mässige Biegung nach vorwärts, welche zeigt, dass auch diese Formen einen Mundrand mit vorgezogenem Externlappen besassen.

Es liegen mir zwei schwäbische, zu Ariet. Conybeari zu stellende Ammoniten vor, welche durch ansehnliche Dicke und dadurch ausgezeichnet sind, dass der Kiel hoch über die Externseite emporragt und von nur angedeuteten, nicht wirklich eingetieften Furchen begleitet ist. Auf den äusseren Windungen dieser Exemplare zeigen die Rippen nach der Anschwellungsstelle und vor ihrer Einlenkung in die schwach markirten Nebenkiele eine stärkere Vorwärtsbeugung als bei den typischen Vertretern der Gruppe. Bei dem grösseren Exemplare, an welchem die ungemein (bis 2.5 mm) dicke, aus mehreren Lagen bestehende Schale erhalten ist, vollführen ausserdem die Anwachsstreifen in der Kielregion eine sehr kräftige Biegung nach vorwärts, so dass hier ein sehr weit nach vorn gezogener Externlappen vorhanden gewesen sein muss. Diese Vorkommnisse können wegen des erwähnten Verhaltens des Kieles nicht zu einer Verwechslung mit der zu beschreibenden alpinen Form Anlass geben. Ueberdies zeigen die inneren Windungen bis zu mittlerer Grösse die gleiche steife Endigung der Rippen an der Externseite, welche wir als für die Gruppe des Ariet. Conybeari (in dem oben erörterten Umfange) charakteristisch bezeichnet haben. Wir haben es hier mit Individuen zu thun, welche mit Bezug auf das Merkmal der Vorwärtsbeugung der Sculptur an der Externseite gegenüber den typischen Formen als weiter vorgeschritten gelten können. 3)

¹⁾ Vgl. Quenstedt, Ammoniten, I., Tab. 6, Fig. 1, Seitenansicht — dagegen die zugehörige Externansicht; ferner daselbst Tab. 12, Fig. 1 — dagegen r, a und b; Fig 2 — dagegen r; Fig. 6 — dagegen r.

²⁾ In extremer Weise ist dies ausgebildet bei A. Arnouldi Dumortier, Dépôts jurass., II., pl. VI., fig. 1, 2.

³⁾ Es würde zu weit führen, hier auf die Synonymik von Ariet. Conybeari einzugehen. Nur das Wichtigere sei erwähnt. Ich halte A. Conybeari Sow., A. obliquecostatus Ziet., A. longidomus Qu., A. latisulcatus Qu. und A. spiratissimus Qu. für eine gute, ziemlich enge natürliche Gruppe, von welcher ich vorläufig nur A. spiratissimus Qu. (= A. latisulcatus Qu. pars, vgl. die Note 3 auf S. 251 [194]) als besondere Art abtrennen möchte. (Die Dicke und die davon abhängende Gestalt des Windungsquerschnittes sind nicht von grosser Bedeutung.) Die Windungsverhältnisse des von Wright abgebildeten grossen Exemplars von A. Conybeari lassen sich schwer beurtheilen. Aus Sowerby's Originalabbildung und mehreren mir vorliegenden englischen Exemplaren ersehe ich, dass die englische Form ziemlich niedrige, zahlreiche Windungen besitzt und in dieser Hinsicht nahe an A. spiratissimus heranreicht. D'Orbigny's A. Conybeari (Terr. jurass., I., pl. 50) ist in der Abbildung leider auch stark verkleinert und führt dadurch irre. Nach den im Text (pag. 203) angegebenen Windungsverhältnissen scheint er nur wenig hochmündiger als die englischen und deutschen Vorkommnisse, nach der Abbildung aber besitzt er minder zahlreiche und rascher anwachsende Windungen. A. Conybeari bei Chapuis et Dewalque, Terr. sec. de Luxembourg, pl. V, fig. 4, und bei Reyn'es, Monographie des Ammonites,

Die alpine Form, welche F. v. Hauer aus den gelben Enzesfelder Kalken beschrieben hat, wo sie zusammen mit Ariet. rotiformis Sow. vorkommt, gleicht dem aus dem gleichen Horizonte des mitteleuropäischen Lias bekannten Ariet. Conybeari Sow. nicht nur in den Windungsverhältnissen und in dem allgemeinen Sculpturbilde, sondern sie hat mit diesem noch ein wichtiges Sculpturmerkmal gemein. Die Rippen zeigen das Streben, gegen die Externseite hin anzuschwellen, sie erreichen in der Nähe der Nebenkiele (an der Umbiegungsstelle) ihre grösste Höhe (und Dicke), es kommt aber auch hier nicht zur Bildung eines wirklichen Knotens. Dieses Merkmal tritt insbesondere bei den schlanken und hohen Rippen der inneren Windungen und auch bei mittelgrossen Exemplaren sehr deutlich hervor, wo die Rippen fast dornenartig gegen aussen vorspringen, während es bei den mehr abgeflachten Falten auf den äusseren Windungen grosser Exemplare weniger ausgeprägt ist und sich hier mehr in einem Anschwellen der Dicke kundgibt. Der wesentliche Unterschied gegenüber der ausseralpinen Formengruppe besteht darin, dass unmittelbar nach dem Erreichen der grössten Höhe der Rippe zugleich mit der sehr raschen Abschwächung stets eine kräftige Umbiegung derselben nach vorwärts eintritt, und dass der nach vorne gerichtete Zug der ungemein niedrig und dünn werdenden Rippe noch eine Strecke zu verfolgen ist, bevor die Einlenkung in den Nebenkiel stattfindet. Die an der Umbiegungsstelle eintretende rasche Abschwächung der Rippe bringt es mit sich, dass diese Eigenthümlichkeit der alpinen Form (die starke Vorwärtsbeugung der Rippe) bei schlechter Erhaltungsweise leicht übersehen werden kann. Sie ist aber stets, und zwar sowohl auf der Schale als auf dem Steinkern zu beobachten; bei manchen Exemplaren wird sie so stark, die feinen Rippenenden lenken in einem so spitzen Winkel in den Nebenkiel ein, dass man in Betrachtung der Anwachsstreifen, welche bei wohlerhaltener Schalenoberfläche der Rippe aufgesetzt erscheinen und deren Verlauf dann leichter verfolgen lassen, sogar an das bezügliche Verhalten von Ariet. Haueri erinnert wird. (Vgl. Taf. XVIII[XLVIII], Fig. 1, insbesondere 1c, wobei zu bemerken ist. dass das Exemplar kein Extrem in dieser Richtung darstellt, sondern als typisch gelten kann.) Es handelt sich dabei, wie gesagt, um den noch innerhalb (auf der Flankenseite) des Nebenkieles sichtbaren Zug der Sculptur, nicht um den weiteren Verlauf der Anwachsstreifen in der Kielregion, wo dieselben in dem nach vorn gerichteten Zuge bei guter Erhaltung der Schalenoberfläche durch die Furchen und über den Mediankiel zu verfolgen sind und eine Querstreifung des letzteren veranlassen. Diese Querstreifen rufen manchmal (l. c., Fig. 1 d), indem sie in breiten, erhöhten Bündeln über den Kiel ziehen, Einschnürungen des letzteren hervor.

Eine so starke Vorwärtsbeugung der Sculptur ist bei der Gruppe des Arict. Conybeari niemals zu beobachten, auch nicht in jenen Fällen, wo ausnahmsweise in höherem Alter eine stärkere Umbiegung der Rippen eintritt. Jeder Zweifel aber wird durch den wichtigen Umstand beseitigt, dass dieses Merkmal bei der alpinen Form stets schon auf den Jugendwindungen, sobald nur die Sculptur deutlich zu beobachten ist, ausgeprägt erscheint. (Vgl. besonders Taf. XVIII[XLVIII], Fig. 1 g.)

Neben diesem durchgreifenden Unterschiede wäre als weiteres unterscheidendes Merkmal hervorzuheben, dass bei der alpinen Form fast in allen Fällen sowohl die Radialsculptur als der Externkiel zumeist eine weiter fortgeschrittene Entwicklung erkennen lassen als die oben besprochenen mitteleuropäischen Formen. Die Rippen sind in der Regel höher und von entsprechend tieferen Zwischen-

pl. XII etc., stellen zweifellos eine weit rascher anwachsende (hochmündigere und dickere) Form dar, welche in den Windungsverhältnissen an A. Bucklandi Sow. erinnert, aber denselben Sculpturcharakter zeigt wie A. Conybeari. — Oppel (Juraformation, S. 78) hielt irrthümlich eine weit rascher anwachsende (hochmündigere und dickere) Form, die sonst zu A. Bucklandi Sow. gestellt wird, für identisch mit A. Conybeari Sow. — Quenstedt's A. Conybeari (Ceph., Tab. 3, Fig. 13, und Amm., Tab. 15, Fig. 1) ist identisch mit A. rotiformis Sow.

räumen begleitet, die Externfurchen ausserordentlich tief eingesenkt (vgl. besonders l. c., Fig. 1 b, oben), der hohe Mediankiel ragt gewöhnlich nur schwach über die gleichfalls hohen, gut markirten Nebenkiele empor. Die Kielentwicklung beginnt sehr früh und schreitet so rasch vorwärts, dass die Furchen schon bei sehr geringer Grösse deutlich eingetieft erscheinen, beispielsweise an einer Stelle, welche einem Durchmesser von 8 mm entspricht (l. c., Fig. 1 g).

Die Lobenlinie lässt keine wesentlichen Unterschiede gegenüber jener der ausseralpinen Formen erkennen, wenigstens nicht bei mittelgrossen Individuen; dagegen zeigen ältere Exemplare (Taf. [XLVII], Fig. 4) eine etwas stärker verzweigte Lobenlinie als der ausgewachsene Ariet. Conybeari bei Wright und Quenstedt's grosser A. longidomus. Der zweispitzige erste Laterallobus ist kein allgemeines Merkmal der englischen Form. Auch die alpine Form zeigt häufig einen ausgesprochen zweispitzigen ersten Lateral, ein Merkmal, das nicht einmal bei demselben Individuum sehr beständig zu sein scheint. Es gibt alpine Exemplare mit starker Asymmetrie der Lobenlinie, bei welchen der Sipho in einem Nebenkiel verläuft.

Von den beiden Originalen v. Hauer's mag das grössere (B,1) Taf. II, Fig. 1—3) als der Typus der Form betrachtet werden. Die Windungen sind um ein Geringes dicker als hoch, die Rippen sehr stark erhaben, verhältnissmässig dick und durch breite, tief eingesenkte Zwischenräume getrennt. Das kleinere Exemplar (D, Taf. II, Fig. 4—6) ist durch geringe Dicke, daher durch einen Windungsquerschnitt, der höher ist als dick, sowie durch die weniger kräftigen, schlanken Rippen ausgezeichnet.

An dem in Taf. [XLVII], Fig. 1 abgebildeten grossen Exemplare (A) ziehen die schlanken und zahlreichen Rippen nicht, wie bei den meisten anderen Exemplaren, in radialer, sondern in von dieser ziemlich stark nach vorwärts abweichender Richtung über die Flanken. Die äusseren Umgänge sind nicht vollständig erhalten. Der Beginn des letzten Umganges scheint noch gekammert zu sein.

Das in Taf. [XLVIII], Fig. 1 abgebildete Exemplar (C) entspricht dem grösseren Originale v. Hauer's. Die inneren Windungen bieten, mit der Lupe betrachtet, ein ähnliches Sculpturbild wie Ariet. multicostatus Sow.2) Wenn es auch bei unserer Form nicht zur Bildung von Knoten kommt, so erreicht doch der Kamm der Rippe bis zur Biegungsstelle an der Externseite eine so ansehnliche Höhe, dass man nahezu denselben Eindruck erhält. Die Lobenlinie (l. c., Fig. 1e, 1f, 1h) ist vollkommen symmetrisch und auch sonst sehr regelmässig ausgebildet, indem sie sich der peripherischen Sculptur der Schale anschmiegt. Die beiden Aeste des Siphonallobus liegen in den Externfurchen des eigenen Umganges, der zweispitzige Internlobus heftet sich auf den Externkiel der vorhergehenden Windung, er liegt also, wenn man die unbeschalte Internseite eines Windungsstückes betrachtet (Fig. 1f), in der Furche, welche hier durch den Abdruck des Externkieles des vorhergehenden Umganges entstanden ist. Der Sattel, welcher den Internlobus und den intern gelegenen Auxiliarlobus scheidet, legt sich genau in die entsprechende Externfurche des vorhergehenden Umganges (vgl. Fig. 1 f und besonders 1 e), und die feinen Verzweigungen dieses Sattels (in 1 e nicht gezeichnet) schmiegen sich an die der Furche zugekehrten Ränder des Mediankieles und der Nebenkiele. Dadurch entsteht eine sehr innige Verbindung der Windungen mit einander. Der Nahtlobus besteht im Ganzen aus drei Auxiliaren: einer liegt ausserhalb der Naht, einer innerhalb derselben auf dem Nebenkiele der vorhergehenden Windung (beziehungsweise in der Furche, welche letzterer auf dem Steinkerne des folgenden Umganges zurückgelassen hat), der dritte Auxiliar liegt zwischen den beiden anderen an der Naht. Längs der Naht bleibt am Steinkerne ein schmaler peripherischer Streifen frei von jeder Radialsculptur, während ausserhalb die Radialfalten der Flanken beginnen, innerhalb schief nach vorn die erhöhten Abdrücke

¹⁾ Die Buchstaben beziehen sich auf die Tabellen S. 250 [193] und 255 [198].

²⁾ Vgl. die Externansichten in Wright, Lias Ammonites, pl. III, fig. 2; pl. IV, fig. 3.

verlaufen, welche den Zwischenräumen der Rippen an der Externseite des vorhergehenden Umganges entsprechen (Fig. 1 f). Dieser schmale peripherische Streifen ist leicht vertieft, und genau in diese seichte Furche legt sich der mittlere Auxiliar.

Das in Taf. [XLVIII], Fig. 3 abgebildete Exemplar (E) ist dick und hat kräftige Rippen wie das ebenerwähnte Exemplar, hat aber niedrigere (langsamer in der Höhe anwachsende) Windungen; die Dicke des Windungsquerschnittes übertrifft beträchtlich dessen Höhe.

Das in Taf. [XLVII], Fig. 3 abgebildete Exemplar (F) hat ebenfalls niedrige, aber auch minder dicke Windungen, der Querschnitt ist dennoch dicker als hoch, die Rippen sind weniger kräftig und ein wenig zahlreicher. Ebenso beschaffen ist das ebenda, Fig. 2 abgebildete kleine Exemplar; an diesem konnte die Kielentwicklung am weitesten zurückverfolgt werden, die inneren Windungen wurden in Taf. [XLVIII], Fig. 2 a-e dargestellt. Die Kielentwicklung erfolgt viel langsamer als bei dem in Taf. [XLVIII], Fig. 1 abgebildeten Exemplare. Dennoch sind bei einem Durchmesser von 14 mm bereits deutlich eingetiefte Externfurchen vorhanden (Taf. [XLVII], Fig. 2 c), und bei einem Durchmesser von 9 mm ist schon ein breiter, deutlich abgesetzter Kiel entwickelt (Taf. [XLVIII], Fig. 2 b); ja selbst auf der nächstvorhergehenden Windung, welche auf den Flanken statt der Rippen kräftige (dicke und hohe) stumpfe Knoten trägt, ist die Externseite bei einem Schalendurchmesser von kaum 4 mm nicht gleichmässig gerundet, sondern schwach zugeschärft oder gebuckelt, weist also die erste Spur der beginnenden Kielbildung. Die Lobenlinie ist schon auf diesen inneren Windungen unsymmetrisch (l. c., Fig. 2 e) und bleibt es, soweit man sie nach aussen verfolgen kann; der rechtsseitige1) Zweig des Siphonallobus verläuft in der linken Externfurche, und der Sipho im linken Nebenkiele. Dieselbe Eigenthümlichkeit ist an einem anderen (mittelgrossen) Exemplare an einer Stelle zu beobachten, welche einem Schalendurchmesser von etwa 50 mm entspricht.

Die in Taf. [XLVII], Fig. 4, abgebildete Lobenlinie ist dem Bruchstücke eines grossen Exemplars entnommen, dessen Windungshöhe 21 mm und dessen Dicke etwa 22 mm an dieser Stelle betragen.

Nachfolgend ist für eine Reihe von Exemplaren die Anzahl der Rippen verzeichnet, welche dieselben auf der dem angegebenen Durchmesser entsprechenden Windung und den nach innen folgenden Umgängen tragen.

	Durchmesser	Rippenzahl
A. Hau. Orig. Taf. II, Fig. 1—3	. 93 mm	50, 43
B. Taf. [XLVII], Fig. 1	. 72 " 2)	55, 47
C. " [XLVIII], Fig. 1	. 66 "	44, 39, 34, 24
D. Hau. Orig. Taf. II, Fig. 4-6	- 57 ,	49, 39, 34
E. Taf. [XLVIII], Fig. 3	• 45 ",	42, 38, 33, 23
F. , [XLVII], Fig. 3	. 33 "	41, 37, 26

Der in Taf. [XLVIII], Fig. 5 abgebildete kleine Ariet ist auf den inneren Umgängen glatt, auf dem äusseren Umgange entwickelt sich die Sculptur aus feinen Streifen allmälig zu kräftigen Rippen, welche im letzten Drittel der äusseren Windung so vollkommen jenen der hier besprochenen alpinen Form gleichen, dass man den Ammoniten von dieser nicht trennen kann. Wahrscheinlich haben wir es mit derselben Erscheinung zu thun, welche in der Gruppe des Ariet. semicostatus Y. & B. auftritt, wo die Innenwindungen häufig bis zu ziemlich ansehnlicher Grösse glatt bleiben. Das

¹⁾ Vgl. die Anmerkung auf S. 244 [187].

²⁾ Viertletzte Windung.

Exemplar besitzt ziemlich hohe Windungen, der Kiel ragt deutlich über die Externseite empor, die ihn begleitenden Furchen sind schwach eingesenkt.

Die bisher beschriebenen alpinen Exemplare stammen aus dem gelben Kalke mit Ariet. rotiformis von niederösterreichischen Fundorten, also aus dem höheren Horizonte der Enzesfelder Kalke, welcher den eigentlichen Arietenschichten gleichsteht. Als Seltenheit kommt die Form aber auch in dem nächst tieferen Horizonte der Schloth. marmorea vor. Das in Taf. [XLVIII], Fig. 6 abgebildete Exemplar ist ein Beispiel für dieses Vorkommen aus dem brauneisenreichen Horizonte vom Schreinbach. Es gleicht in den Windungsverhältnissen den langsamer anwachsenden Formen von Enzesfeld, trägt aber sehr hohe, schneidige, haarscharfen Kämmen gleichende Rippen, welche durch breite Zwischenräume getrennt sind, so dass die Rippenzahl eine geringere ist. Bei einem Durchmesser von etwa 32 mm zählt man 33 Rippen auf dem äusseren, 30 und 26 Rippen auf den nach innen folgenden Umgängen. Während dieses und andere Exemplare aus dieser Zone den jüngeren Vorkommnissen in allen wesentlichen Merkmalen vollkommen gleichen, steht das in Taf. [XLVIII], Fig. 4 abgebildete Exemplar etwas ferner. Dasselbe stammt aus dem bunten Kalke mit Schloth, marmorea von der Hinter-Mandling und ist gewissen schwäbischen Vorkommnissen dadurch sehr ähnlich, dass der Externkiel hoch über die Nebenkiele emporragt und die ihn begleitenden Furchen nur schwach eingetieft sind; auch sind die Rippen an der Externseite verhältnissmässig schwach nach vorwärts gebogen. Eine Verwechslung mit der ausseralpinen Formengruppe ist indessen dadurch ausgeschlossen, dass der Externkiel schon auf den inneren Windungen (Fig. 4c) gut entwickelt ist, und dass hier ferner die Rippen schon deutlich nach vorwärts gebogen sind. Das Exemplar wächst sehr langsam in Höhe und Dicke und trägt - insbesondere aut den inneren Windungen - sehr zahlreiche Rippen. Die Lobenlinie unterscheidet sich von jener der typischen Exemplare durch die geringere Breite des Externsattels, was mit der geringen Dicke der Windung zusammenhängt. Bei einem Durchmesser von 74 mm (= 1), welcher eine Drittel-Windung hinter dem Ende des äusseren Umganges gemessen wurde, ergeben sich die weiteren Dimensionen: Nabelweite 47 mm (= 0.64), Windungshöhe 14 mm (= 0.19), Dicke 14 mm (= 0'19). Der äussere Umgang trägt bei einem Durchmesser von ungefähr 85 mm 55 Rippen, die nach innen folgenden Windungen 49, 47 und 39 Rippen.

Herr Dr. Canavari hat mir vor einiger Zeit einen kleinen Arieten aus dem unteren Lias von Spezia vorgelegt, den er als eine neue Art betrachtete, und den ich sofort als mit der hier besprochenen alpinen Form identisch erkannte. Inzwischen hat Canavari den Ammoniten beschrieben und abgebildet und mit einigem Bedenken, da ihm nur ein unvollständiges Exemplar vorlag, für die neue Art den Namen Ariet. Cordieri vorgeschlagen, welchen ich hier annehme. Es könnte auffallen, dass ich, nachdem ich die Unterschiede gegen die Gruppe des Ariet. Conybeari so eingehend hervorgehoben, nun so leichthin die Gleichstellung mit der unvollkommen bekannten Spezianer Form vornehme. Aber so liegt die Sache nicht; ich identificire vielmehr das Spezianer Exemplar, welches ich selbst in der Hand hatte, mit der mir wohlbekannten alpinen Form und nehme für letztere den von Canavari vorgeschlagenen Namen an. Das Spezianer Exemplar scheint in den Windungsverhältnissen mit den oben als typisch bezeichneten alpinen Exemplaren übereinzustimmen, trägt aber sehr zahlreiche Rippen.

Eine mit Ariet. Cordieri nahe verwandte Art ist "Ariet. Conybeari" Herbich; 1) dieser unterscheidet sich aber durch das raschere Höhenwachsthum (minder zahlreiche Umgänge) und die weniger zahlreichen, viel kräftigeren Rippen und nähert sich dem Ariet. Bucklandi Sow.

Ariet. Bonnardii Orb. 2) scheint der Gruppe des Ariet. Conybeari nahezustehen, ein Vergleich ist erschwert durch die stark verkleinerte Abbildung. Nach Abbildung und Beschreibung sind die

¹⁾ Herbich, Széklerland, Mittheil, a. d. Jahrb. d. k. ung. geol. Anst., V, 2 (1878), S. 106, Taf. XX B, Fig. 1.

²⁾ Orbigny, Pal. franç., Terr. jurass., I., p. 196, pl. 46.

Rippen mit leichten, aber deutlich ausgesprochenen (auf der Schale vorspringenden) Knoten versehen, der Siphonallobus ist nur so lang als der erste Lateral. Wright 1) scheint eine davon verschiedene Form mit Ariet. Bonnardi zu identificiren. Der englischen Form fehlen deutliche Knoten auf den Rippen, welch' letztere an der Externseite stark nach vorwärts gebogen sind. Dadurch und durch die tief eingesenkten Externfurchen entsteht eine sehr grosse Aehnlichkeit mit Ariet. Cordieri. Die Loben sind an der englischen Form, welche nach Wright der Zone des Ariet. Turneri angehört, nicht sichtbar. Diese Form wird zu weiterer Vergleichung mit Ariet. Cordieri im Auge zu behalten sein.

An unsere Form erinnern auch sehr Ariet. Falsani Dum.²) und Ariet. Arnouldi Dum.³), beide aus der Zone des Ariet. Bucklandi. Der erstere ist viel hochmündiger als Ariet. Cordieri, der letztere hat einen sehr schneidigen, hoch emporragenden Kiel, welcher freilich in hohem Alter nicht mehr über die undeutlich markirten Nebenkiele emporragt. Beide Formen unterscheiden sich wesentlich dadurch, dass der Verlauf der scharf markirten, hohen und schneidigen Rippen über die Flanken ein sehr gerader ist, und dass die Vorwärtsbeugung erst unmittelbar vor dem Uebertritt auf die Externseite eintritt; sie besitzen den Sculpturtypus der Gruppe des Ariet. semicostatus Y. & B. (A. geometricus Opp.) —

Vorkommen: Hauptverbreitung im Horizonte des Arict. rotiformis der niederösterreichischen Fundorte, insbesondere von Enzesfeld, ferner von Gainfarn, Rohrbach und von der Hinter-Mandling, als Seltenheit in dem nächst tieferen Horizonte mit Schloth. marmorea von Enzesfeld und vom Schreinbach.

Man sollte glauben, es könne bei dem reichen vorliegenden Materiale nicht schwer fallen, eine Form zu nennen, welche wir mit einiger Wahrscheinlichkeit als die Stammform von Ariet. Cordieri ansehen könnten. Und dennoch lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sich unter den bisher bekannten Arieten diese Stammform nicht befindet. Betrachten wir die so nahestehende ausseralpine Gruppe des Ariet. Conybeari, so liesse sich leicht vorstellen, dass bei dieser die Vorwärtsbeugung der Rippen an der Externseite zugenommen habe, die Ausbildung der Radialsculptur überhaupt sowie des Externkieles weiter vorgeschritten, und so die alpine Form aus jener hervorgegangen sei. Aber diese Formengruppe gehört demselben Horizonte an wie der alpine Ammonit und scheint im alpinen Lias gänzlich zu fehlen. Wenn auch die Zone des Ariet. Bucklandi in ihrer alpinen Entwicklung bisher gegenüber den vorhergehenden alpinen Zonen weniger gut bekannt ist, so lässt sich doch aus manchen Analogien schliessen, dass ihre Fauna gleich den ihr vorangehenden alpinen Cephalopodenfaunen eine reichere gewesen ist als die gleichzeitig lebende mitteleuropäische Cephalopodenfauna. Zweifellos war dies bei den älteren alpinen Liasfaunen der Fall. Es ist nun wenig wahrscheinlich, dass im mediterranen Meere, in welchem für Cephalopoden offenbar viel günstigere Lebensverhältnisse herrschten, in welchem die Arieten schon in weit älterer Zeit reich entwickelt waren, die eingeborenen Formen ausgestorben wären, um den Abkömmlingen der Fremdlinge aus der mitteleuropäischen Provinz Platz zu machen. Wir haben übrigens gesehen, dass uns bereits in der nächst älteren alpinen Zone der Schloth. marmorea einige vollkommen entwickelte Exemplare von Ariet. Cordieri entgegentreten.

Wenden wir uns zu den alpinen Arieten der älteren Zonen, so kennen wir in Ariet. Coregonensis, dessen Hauptverbreitung in die Zone der Schloth. marmorea fällt, welcher aber auch schon

¹⁾ Wright, Lias Ammonites, p. 287, pl. XI, fig. 1-3.


²⁾ Dumortier, Dép. jurass., II., p. 25, pl. IV, fig. 1, 2.

³⁾ Ebenda, p. 27, pl. V, fig. 1, 2; pl. VI, fig. 1-6. Vgl. auch die auf diese Form bezügliche Anmerkung 2 auf S. 252 [195].

in der nächst vorhergehenden Zone des Psil. megastoma vorkömmt, eine Form, welche in den äusseren Windungen grösserer Exemplare dem Ariet. Cordieri so ähnlich ist, dass sie wohl alle Anforderungen erfüllt, welche man diesbezüglich an eine Stammform stellen mag. Dies gilt ganz besonders von den langsam anwachsenden Exemplaren des Ariet. Coregonensis, an welchen die Kielentwicklung rascher vor sich zu gehen pflegt. Wären von Ariet. Coregonensis nur solche äussere Windungen mit tief eingesenkten Externfurchen und kräftigen, an der Externseite stark vorwärtsgebogenen Rippen bekannt, so dürfte es recht schwer, wenn nicht unmöglich sein, dieselben von Ariet. Cordieri zu unterscheiden. Dennoch stehe ich an, Ariet. Coregonensis schlechthin als die Stammform von Ariet. Cordieri zu bezeichnen. Wenn man die inneren Windungen des letzteren untersucht und sieht, ein wie vollkommen entwickelter Ariet dieser schon in der frühesten Jugend ist, so sträubt man sich gegen die Annahme, dass von der charakteristischen Gestalt des jungen und mittelgrossen Ariet. Coregonensis nicht eine Spur mehr auf den inneren Windungen erhalten geblieben sein soll. Im Hinblick auf die gewaltigen Veränderungen, welche manche Formen, wie gerade Ariet. Corego. nensis, in der individuellen Entwicklung erleiden, wird mancher vor einer solchen Annahme nicht zurückschrecken. Andererseits aber sehen wir, dass eine Form in zwei aufeinanderfolgenden Zonen auftritt, ohne dass sich eine Abänderung nachweisen liesse, und in weiteren Fällen sehen wir derartige, aber verhältnissmässig geringfügige Formveränderungen nach Verlauf einer Zone eintreten, so dass man mehr zur Annahme gedrängt wird, dass solche Umwandlungen in der Zeit sehr allmälig vor sich gehen, und dass gerade deshalb in der individuellen Entwicklung die Gestalten früherer Perioden noch zu erkennen sind. Danach hätten wir uns also beispielsweise den unmittelbaren Vorfahren von Ariet. Coregonensis nicht als einen ungekielten Aegoceraten von der Gestalt der inneren Windungen des Arieten vorzustellen, sondern als einen Arieten mit im individuellen Leben noch später beginnender, und nicht so weit fortschreitender Kielentwicklung. Solche Fragen lassen sich indessen durch Aufstellung von Vermuthungen nicht entscheiden. In unserem Falle möchte ich nur auf die Schwierigkeiten hinweisen, welche stammesgeschichtlichen Untersuchungen selbst unter so günstigen Umständen entgegenstehen.

Wenn Ariet. Cordieri zu Ariet. Coregonensis wirklich in einem engeren Verwandtschaftsverhältnisse steht, so könnte man sich den Vorgang so vorstellen, dass sich schon während der Zeit des Psil. megastoma von Ariet. Coregonensis eine Varietät mit weiter vorgeschrittener (rascher erfolgter) Entwicklung des Kieles und der Radialsculptur abgetrennt habe, und dass sich aus dieser bis jetzt unbekannten Varietät in der Zeit der Schloth. marmorea unser Ariet. Cordieri herausgebildet habe. Es könnte aber auch sein, dass dieser vermuthete Vorläufer schon vor der Zeit des Psil. megastoma von der Stammform des Ariet. Coregonensis oder von einer dieser Stammform ähnlichen Art sich abgezweigt hat.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die inneren Windungen der Formen aus der Gruppe des Ariet. Conybeari den inneren Windungen von Ariet. Coregonensis sehr ähnlich sind. Es wäre jedoch unstatthaft, die erstere Gruppe von dem letzteren herleiten zu wollen. Bei ausgewachsenen Exemplaren von Ariet. Coregonensis sind die Rippen stark nach vorwärts gebogen, bei den meisten Vorkommnissen der jüngeren ausseralpinen Gruppe erhält sich die steife Endigung der Rippen gegen die Nebenkiele bis in hohes Alter, die jüngeren Formen bleiben also in der Radialsculptur auf einem älteren Entwicklungsstadium stehen und können daher nicht von der weiter vorgeschrittenen älteren Form herstammen. Dagegen ist es sehr wahrscheinlich, dass beide eine gemeinsame Stammform besitzen, oder dass sie von naheverwandten Formen abstammen. Zum leichteren Verständniss dieser stammesgeschichtlichen Betrachtungen möge nachfolgende Uebersicht dienen.



Arietites rotiformis Sow.

```
(Taf. XIX[XLIX]; Taf. XX[L], Fig. 1-4; Taf. XXI[LI], Fig. 1-6.)
```

```
1824. Ammonites rotiformis, Sowerby, Mineral Conchology, tab. 453.
                       Zieten, Die Versteinerungen Württembergs, S. 35, Taf. XXVI, Fig. 12-1d.
1830.
              Conybeari, Quenstedt, Die Cephalopoden, S. 77, Tab. 3, Fig. 13.
1846.
              bisulcatus, Hauer, Ceph. a. d. Lias d. nordöstl. Alpen, Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss., XI, S. 14, Taf. I, Fig. 3, 4
1856.
                       Wright, Lias Ammonites, Palaeontogr. Soc., vol. XXXII (1878), pl. V, fig. 1-4; pl. VII, fig. 1;
                       vol. XXXIII (1879), pl. IX, fig. 1-3; vol. XXXV (1881), pag. 278.
1879. Ammonites rotiformis, Reynès, Monographie des Ammonites, pl. VIII, sig. 1-7.
             rotator, Reynès, ebenda, pl. IX, fig. 3-8.
1879.
        99
              rotiformis Zieteni, Quenstedt, Ammoniten des schwäb. Jura, I., S. 45, Taf. 5, Fig. 1.
1882.
              Conybeari, Quenstedt ebenda, S. 118, Taf. 15, Fig. 1.
1884.
                                                         Taf. [L], Fig. 3. Taf. [XLIX], Fig. 2. Taf. [L], Fig. 2.
                         Taf. [XLIX], Fig. 1. Taf. [L], Fig. 1.
                                                                            mm
                                                                                            mm
50 (= I )
                                                           37.5 (= 0.60) 31 (= 0.59)
Nabelweite . . . . . . 108 (= 0.61)
                                          4I (= 0.20)
                                                                                            26 (= 0.52)
                                                           13.2 (= 0.55) 11.2 (= 0.55)
                                                                                           13.5 (= 0.27)
Windungshöhe . . . . . 38 (= 0.22)
                                          15'5 (= 0'22)
Dicke . . . . . . . . . . . . 40 (= 0.23) | 19.5 (= 0.28) | 16 (= 0.26) | 15 (= 0.29) | 16 (= 0.32)
```

In Folge der Verminderung der Bogenzahl und der Anzahl der Tafeln, welche für den hier ausgegebenen VI. Theil dieser Arbeit bestimmt waren, kann nicht nur die Beschreibung der Gattung Arietites jetzt, wie es beabsichtigt war, nicht abgeschlossen werden, sondern der Verfasser kommt auch in die unangenehme Lage, die Besprechung der engeren Formengruppe des Ariet. rotiformis in zwei Theile zerreissen zu müssen.

Diese überaus charakteristische und doch sehr veränderliche, altbekannte Art kommt im englischen und französischen Lias sehr selten vor, scheint auch im deutschen Lias trotz der gegentheiligen Angabe Quenstedt's zu den selteneren Formen zu gehören, tritt aber im alpinen Lias, soweit die bisherigen Funde ein Urtheil gestatten, in grosser Zahl auf; an den niederösterreichischen Fundorten, an welchen die echten Arietenschichten entwickelt sind, herrscht Ariet. rotiformis unter allen übrigen Formen vor.

In das vorstehende Verzeichniss wurden nur solche Literaturangaben aufgenommen, welche sich nach der Abbildung zweifellos auf die typische Form beziehen oder auf Exemplare, welche derselben sehr nahe stehen. Als Typus der Art müssen wir das Original-Exemplar Sowerby's betrachten, welches von Wright neuerdings (l. c., pl. V, fig. 1—3) abgebildet wurde. Auch die verzeichneten Formen zeigen manche Verschiedenheiten, der dadurch zusammengefasste Kreis ist keineswegs ein sehr enger. Der auffallendste Unterschied tritt in dem Verlaufe der Rippen über die Flanken hervor. Während an Sowerby's Exemplar die Rippen in radialer oder in von dieser nur schwach nach

rückwärts abweichender Richtung über die Flanken verlaufen, zeigen die von Wright auf Taf. VII, Fig. 1, und Taf. IX abgebildeten Exemplare (insbesondere das letztere) sehr schräg nach rückwärts verlaufende Rippen. Auf diesen Unterschied hat wahrscheinlich Reynès die Trennung seines A. rotator (l. c., pl. IX, fig. 1—9) von A. rotiformis Sow. begründet. Den ersteren bezeichnet er (l. c., Text, p. 3) als synonym mit A. rotiformis Orb.¹) Der von d'Orbigny abgebildete und beschriebene Ammonit scheint sich aber noch durch andere Merkmale von der typischen Form zu unterscheiden. Die Beurtheilung ist dadurch erschwert, dass die Abbildung verkleinert ist²); immerhin erkennt man, dass d'Orbigny's Exemplar langsamer anwächst, indem die inneren Windungen niedriger und entsprechend zahlreicher sind, und dass diese mit sehr zahlreichen Rippen bedeckt sind.³) Diesen Eigenthümlichkeiten entspricht nur das von Reynès in Taf. IX, Fig. 1, 2, unter dem Namen A. rotator abgebildete kleine Exemplar, während die beiden grossen, ebenso bezeichneten, auf derselben Tafel in Fig. 3, 4 und 5, 6 abgebildeten Exemplare, abgesehen von dem Verlauf der Rippen, trefflich mit dem typischen A. rotiformis Sow. übereinstimmen.

Es ist möglich, dass nach dem Verlaufe der Rippen zwei hiehergehörige Formenkreise gut zu trennen sind; dafür würde sprechen, dass die überwiegende Mehrzahl der mir vorliegenden alpinen Exemplare nur radial oder nahezu radial verlaufende Rippen trägt (auch Exemplare mit schräg nach vorwärts verlaufenden Rippen kommen vor), wogegen das grösste und schönste bis jetzt bekannte alpine Exemplar (Taf. [XLIX], Fig. 1) nur mit sehr schräg nach rückwärts verlaufenden Rippen versehen ist. Das mir vorliegende Material ist aber nicht gross genug, um einen so scharfen Gegensatz im Allgemeinen festzustellen, es zeigt sich vielmehr, dass Exemplare vorhanden sind, deren innere Windungen schräg nach rückwärts verlaufende Rippen tragen, während die letzteren auf den äusseren Umgängen radial gestellt sind. Wenn also auch hier wie bei anderen Ammoniten dieses Merkmal bei einem und demselben Individuum wechselt, so ist Vorsicht dringend geboten. Vergleicht man die drei bei Wright in Flankenansichten wiedergegebenen Ammoniten mit einander, so nimmt der in Taf. VII, Fig. 1, abgebildete mit Bezug auf das erwähnte Merkmal unverkennbar eine Mittelstellung ein zwischen dem Exemplare Sowerby's und dem in Taf. IX abgebildeten Exemplare, welch letzteres ein Extrem in dieser Richtung darstellt.

Nach der heute bekannten Sachlage halte ich es für zweckmässig, die oben angeführten Formen unter dem Namen Ariet. rotiformis zusammenzufassen. Wünscht jemand durch einen Varietätsnamen auf Exemplare mit schräg nach rückwärts verlaufenden Rippen hinzuweisen, so bleibt dies unbenommen; es wäre nur, um Verwechslungen vorzubeugen, davor zu warnen, dafür den naheliegenden Namen rotator Reynès zu verwenden, da dieser Autor damit zugleich die Form d'Orbigny's bezeichnen wollte, welche eine Varietät mit langsam anwachsenden Windungen und zahlreichen Rippen darstellt.

Auch nach den letzterwähnten Eigenschaften lässt sich gegenwärtig eine besondere Art von dem typischen Ariet. rotiformis nicht abtrennen. Das von Wright in Taf. VII, Fig. 1, abgebildete Exemplar hat niedrigere innere Windungen, die mit zahlreichen Rippen besetzt sind, die äusseren Windungen sind aber ebenso hoch und mit ebenso kräftigen Rippen besetzt wie bei der typischen

^{1) 1843.} A. d'Orbigny, Pal. franç., Terr. jurass., I, p. 293, pl. 89.

²) Aus einem auf der Tafel enthaltenen Vermerk sowie aus dem Wortlaute der im Text stehenden Tafelerklärung würde sich ergeben, dass das Exemplar d'Orbigny's in einem Drittel der natürlichen Grösse dargestellt ist. Die angegebenen Dimensionen, welche sich bei d'Orbigny stets auf ein abgebildetes Exemplar beziehen, weisen aber darauf hin, dass die Abbildung genau um die Hälfte verkleinert ist. Durch diese Unsicherheit wird jede Vergleichung noch schwieriger.

s) Der Verlauf der Rippen weicht von der radialen Richtung nur im Aufsteigen von der Naht sehr stark, auf den Flanken mässig ab. Hie und da, insbesondere am Ende des äusseren Umganges, gehen die Rippen auf den Flanken in die radiale Richtung über.

Form. An dem Exemplare d'Orbigny's wird erst noch zu untersuchen sein, wie sich in dieser Hinsicht die äusseren Windungen verhalten; nach den für den letzten Umgang angegebenen Dimensionen besteht ein — wenn auch geringer — Unterschied gegenüber typischen Exemplaren.

Zunächst haben wir es nur mit der durch die obenstehenden (und die dort fehlenden) Literaturangaben abgegrenzten engeren Formengruppe zu thun. Zu diesen Angaben mögen noch einige Bemerkungen folgen. Zieten's Exemplar unterscheidet sich von dem Original Sowerby's im Wesentlichen nur durch die viel geringere Anzahl der weit von einander abstehenden Rippen; im Uebrigen kann es als typisch gelten. Quenstedt hat von jeher unter A. rotiformis etwas Anderes verstanden als die übrigen Paläontologen. Er hielt Zieten's A. rotiformis für "nicht ganz normal"1) und bezeichnete jene Form, welche ihm als der "echte" rotiformis erschien, als einen der häufigsten schwäbischen Ammoniten. Neuestens 2) erkennt Quenstedt, dass Zieten mit Bezug auf Sowerby "das Richtige getroffen hat", verharrt aber im Uebrigen auf seinem alten Standpunkte. Dem Quenstedt'schen A. rotiformis 3) fehlt vor Allem die ungemein charakteristische Knotung der Rippen. Hingegen hat Quenstedt unter "A. Conybeari" stets jene Form verstanden, welche sonst allgemein als A. rotiformis bezeichnet wird. Ein Prachtexemplar dieser Form ist in den "Ammoniten", Tab. 15, Fig. 1, dargestellt; es unterscheidet sich von dem Exemplar Sowerby's dadurch, dass die Rippen auf den Flanken in von der radialen nach vorwärts abweichender Richtung verlaufen; ausserdem sind die den Kiel begleitenden Furchen sehr schwach eingesenkt. Dennoch steht diese Form dem typischen A. rotiformis ausserordentlich nahe. Dies konnte einem Beobachter wie Quenstedt nicht ganz entgehen, er selbst spricht sich (Ammoniten, S. 118) darüber aus: "Am nächsten kommt ihm rotiformis, . . . namentlich die seltene Abänderung . . ., welche ich von Ziet en copirte." Der typische A. rotiformis Sow. ist eben auch in Schwaben ein äusserst seltener Ammonit, wie in England und Frankreich.

Unter den oben gegebenen Citaten findet sich nicht: A. rotiformis Hauer, Ceph. a. d. Lias d. nordöstl. Alpen, Denkschr. d. k. Ak. d. Wiss., XI, S. 13, Taf. I, Fig. 1, 2. Eine genaue Untersuchung des Original-Exemplars hat ergeben, dass der Siphonallobus viel kürzer ist als der ungemein lange erste Seitenlobus. Auch in dem Falle, dass wir es hier nur mit einer individuellen Abnormität zu thun haben sollten, konnte das Exemplar nicht unter jenen Formen angeführt werden, welche wir als dem Typus am nächsten stehend betrachten. Die von Hauer a. a. O., Fig. 5, abgebildete Lobenlinie ist offenbar einem anderen Exemplare entnommen. Auch der ebenda, Taf. II, Fig. 7—9, unter demselben Namen abgebildete Ammonit wurde nicht genannt. F. v. Hauer betrachtet denselben als eine eigenthümliche Varietät des A. rotiformis. Indem ich dieser Anschauung mich anschliesse, sei an dieser Stelle vorläufig nur auf die niedrigen Windungen und die selbstständige Stellung des den Externsattel zertheilenden Secundärlobus hingewiesen. Dagegen stimmt der von F. v. Hauer a. a. O., Fig. 3, 4, unter dem Namen A. bisulcatus Brug. abgebildete Ammonit in allen wesentlichen Merkmalen mit dem typischen A. rotiformis Sow. überein, dessen wahre Gestalt uns heute aus der trefflichen Abbildung Wright's viel besser erkennbar ist. Das Exemplar v. Hauer's wurde hierin Taf. [L], Fig. 2, nach einem Bruchstücke der äusseren und nach den inneren Windungen neu abgebildet.

¹⁾ Quenstedt, Jura, S. 67.

²⁾ Quenstedt, Ammoniten, S. 45.

³⁾ Als Typus der Quenstedt'schen Form muss das in den "Ammoniten", Tab. 5, Fig. 3, abgebildete Exemplar gelten, von dem im "Jura", Tab. 7, Fig. 1, ein Ausschnitt dargestellt war. Die dem "A. rotiformis Zieteni" in den "Ammoniten". Tab. 5, Fig. 1 (Copie der Original-Flankenansicht), beigegebene Externansicht c gehört nicht zu dem Exemplar Zieten's, sondern zu einem ebenfalls aus Vaihingen stammenden grösseren Exemplar Quenstedt's.

Ob Ariet. rotiformis Herbich¹) dem typischen A. rotiformis Sow. entspricht, vermag ich nach der Abbildung und Beschreibung nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

A. obliquecostatus Zieten gehört nicht hieher, wie manche Autoren angeben, sondern in die Gruppe des Ariet. Conybeari. Vgl. Anmerkung 4 auf S. 251 [194].

Der von Canavari²) aus dem Lias von Spezia abgebildete kleine Ammonit kann nicht zu Ariet rotiformis in Beziehung gebracht werden. Ein Blick auf die in unseren Tafeln vielfach abgebildeten inneren Windungen dieser Form zeigt, dass das Spezianer Vorkommen eine ganz andere Form darstellt. Obwohl es nur einen Durchmesser von 12 mm erreicht, ist bei dieser geringen Grösse schon ein von tief eingesenkten Furchen begleiteter schlanker Externkiel entwickelt; die Dicke ist eine weit geringere, die zahlreichen Rippen sind sehr eng aneinandergereiht. Man sieht, dass das Bemühen, innere Windungen nach den Abbildungen ausgewachsener Exemplare bestimmen zu wollen, selbst bei so wenig involuten Formen wie den Arieten ein vergebliches ist.

Für ausgewachsene Exemplare von Ariet. rotiformis Sow. mögen folgende Merkmale hervorgehoben werden. Der Mediankiel ragt deutlich über die wohlentwickelten Nebenkiele empor³), die denselben begleitenden Furchen sind tief eingesenkt. Die Rippen schwellen gegen die Externseite zu kräftigen Knoten an und erreichen hier ihre grösste Höhe und Dicke. An der Stelle der Knoten ist in der Regel auch die grösste Dicke der Windungen gelegen. An der Innenseite der Knoten sind die Rippen schwächer ausgebildet, es ist hier eine schwache Abplattung oder sogar eine leichte Einbuchtung vorhanden, wodurch die Knoten noch mehr hervortreten. Weiter nach innen, zwischen der Mitte der Flanke und dem Abfall gegen die Naht, zeigen die Rippen eine zweite Anschwellungsstelle, an welcher in anderen Fällen die Windungen die grösste Dicke erreichen. Der Knoten ragt an der Rückseite stärker über den Zug der Rippe hervor als an ihrer Vorderseite, er bildet eine nach rückwärts herausspringende Ecke, an welche sich der nach vorn gegen die Kielregion gerichtete Zug der abgeschwächten Rippe anschliesst. Wenn die Sculptur recht deutlich und charakteristisch ausgebildet ist, sieht man, dass der Kamm der Rippe innerhalb des Knotens an der früher erwähnten Abschwächungsstelle einen schwachen, nach rückwärts offenen Bogen ausführt. Es ist dann hier in doppeltem (in verticalem und in horizontalem) Sinne eine Einbuchtung ausgeprägt, im Sinne der Höhe der Rippe (der Dicke der Windung) und im Verlaufe des höchsten Kammes der Rippe. Der Verlauf der Rippe ist daher häufig ein mehrfach gewundener. Im Aufsteigen von der Naht stets stark nach rückwärts geneigt, vollführt die Rippe auf der Flanke, indem sie die erste Anschwellungsstelle überschreitet, einen nach vorne offenen Bogen, hierauf an der Abschwächungsstelle einen nach rückwärts offenen Bogen und erreicht am Ende des letzteren im Knoten ihre grösste Dicke und Höhe. Der höchste Punkt des Knotens kann als die Grenze zwischen Flanke und Externseite betrachtet werden; von hier aus erfolgt der schroffe Abfall der Rippe gegen die Kielregion. Die Rippe bricht im Knoten nicht plötzlich ab, sie verlöscht nicht vollkommen, wie man bei oberflächlicher Betrachtung und schlechter Erhaltungsweise der Externseite glauben könnte, sondern sie ist vom Sockel des Knotens an als mehr oder minder feiner Streifen und in mehr oder minder kräftiger Vorwärtsbeugung bis zum Nebenkiele zu verfolgen. Ausserdem sind hier bei wohlerhaltener Schalenoberfläche zahlreiche feine Anwachsstreifen zu beobachten, welche in einem kräftig nach vorne gewölbten Bogen über die ganze Kielregion sich fortsetzen. (Vgl. Wright, l. c., pl. V, fig. 4.) - Der Siphonallobus reicht tiefer herab als der erste Seitenlobus.

¹⁾ Herbich, Széklerland, Mittheil. a. d. Jahrb. d. ungar. geol. Anst., V., 2 (1878), S. 104, Taf. XX A, Fig. 1.

²) Canavari, Unt. Lias v. Spezia, Palaeontographica, XXIX, S. 176, Taf. XX, Fig. 12; Lias inf. di Spezia, Mem. R. Comit. Geol. d'Italia, III, 2, p. 121, tav. VI, fig. 12.

³⁾ Auch bei Zieten's Exemplar ist dies nach der Original-Abbildung in mässigem Grade der Fall, während in Quenstedt's Copie die Nebenkiele den Mediankiel überragen.

Diese Schilderung lässt sich fast wörtlich auch auf typisch ausgebildete Exemplare des nahe verwandten Ariet. multicostatus Sow. anwenden. Es ist darum nöthig, hier sogleich auf die Unterschiede aufmerksam zu machen. Die letztgenannte Form unterscheidet sich von Ariet. rotiformis durch die höheren (rascher anwachsenden) Windungen, durch die enger aneinandergereihten, schlankeren schneidigere Kämme bildenden Rippen, durch die stärkere Vorwärtsbeugung und kräftigere Ausbildung der Rippenenden zwischen Knoten und Nebenkiel und durch die raschere Entwicklung der schärfer markirten und höheren Nebenkiele.

Das in Taf. [XLIX], Fig. 1, abgebildete grosse Exemplar zeichnet sich durch stark nach rückwärts geneigte, ungemein kräftige Rippen aus, welche mit sehr hohen, stumpfen Knoten besetzt sind. Die Nebenkiele sind auf dem äusseren Umgange sehr kräftig markirt. Die eine Flanke ist vollständig mit der sehr dicken Schale bedeckt, während auf der anderen Seite die Schale schon bei der Sedimentbildung zerstört wurde. Trotzdem ist hier die Lobenlinie nur an wenigen Stellen erkennbar. Mindestens ein Viertel des äusseren Umganges ist gekammert. Die Lobenlinie scheint sehr schwach verzweigt zu sein, die Lobenkörper sind verhältnissmässig niedrig, der Siphonallobus ist nur wenig tiefer als der erste Seitenlobus.

Die in Taf. [XLIX], Fig. 2, Taf. [L], Fig. 1 und 2, abgebildeten Exemplare können als typisch bezeichnet werden. Die beiden ersteren scheinen in der Windungshöhe ein wenig langsamer anzuwachsen als das Original Sowerby's, das dritte Exemplar hat ein wenig höhere Windungen als jene und dürfte auch in dieser Hinsicht dem Typus entsprechen. Die Falten sind im Allgemeinen radial gerichtet. Der Siphonallobus ist bei allen drei Exemplaren tiefer als der erste Lateral, doch scheint das Verhältniss kein feststehendes; nur bei dem erstgenannten Exemplar ist die Ueberragung eine sehr beträchtliche, indem der Siphonallobus mit Rücksicht auf den Scheitel des Externsattels etwa doppelt so tief ist als der erste Seitenlobus.

Bei demselben Exemplar beginnen die Externfurchen auf der vorletzten Windung eingetieft zu werden. Auf dieser Windung sowie in der ersten Hälfte des äusseren Umganges spaltet sich jede Rippe vom Knoten an in zwei feine Rippen, von welchen die rückwärts gelegene, weniger stark nach vorwärts geneigte in der Regel die kräftigere ist; in einzelnen Fällen ist aber die vordere Rippenfortsetzung kräftiger ausgebildet. Diese zwei feinen Rippenstücke entsprechen zwei alten Mundrändern. Spuren einer solchen Rippenspaltung sind hie und da noch in der zweiten Hälfte des äusseren Umganges sichtbar; es zeigt sich, dass bei den ungespaltenen Rippen deren ausserhalb des Knotens gelegene Fortsetzung dem rückwärtigen jener beiden Rippenstreifen entspricht.

Bei dem zweiten Exemplar (Taf. [L], Fig. 1) ist die Entwicklung des Kieles auf den inneren, noch ungefurchten Windungen gut zu verfolgen. Die innersten rippenlosen Windungen, welche gewöhnlich als glatt bezeichnet werden, aber bereits feine Streifen tragen, zeigen noch keine Spur eines Kieles. Bei einem Durchmesser von etwa 5.5 mm stellt sich die erste deutliche Rippe ein, gleich darauf, bei einem Durchmesser von etwa 7.5 mm, werden die Rippen kräftig, und zugleich damit erscheint auch die erste Spur einer schwachen Buckelung in der Medianregion der hier sehr flach gewölbten, breiten Externseite. An den Knoten treten hier keine Rippenspaltungen ein, erst ausserhalb des Knotens zweigt sich sehr selten von der Rippenfortsetzung ein Streifen ab, welcher etwas stärker ist als die übrigen zahlreichen Anwachsstreifen.

Das dritte Exemplar ist das Original von A. bisulcatus Hauer (vgl. oben S. 261 [204]). Ein Ausschnitt der beiden äusseren Windungen ist in Taf. [L], Fig. 2a—b, neu abgebildet. Fig. 2e—l geben die inneren Windungen, einen Querschnitt und die Lobenlinie wieder. Auf den Flanken der inneren Windungen sind die Rippen sehr stark nach rückwärts geneigt, auf der vorletzten Windung stellen sie sich allmälig radial, und auf dem äusseren Umgange nehmen sie schliesslich eine schwache Neigung nach vorwärts

an. Die Externfurchen sind am Ende des äusseren Umganges kaum merklich eingetieft; dennoch ist die Anlage der Nebenkiele schon frühzeitig angedeutet, schon zu Beginn der in Fig. 2e-2f dargestellten Windung, ja selbst noch weiter innen. Man kann sagen, dass sich die ersten Spuren der drei Kiele ziemlich gleichzeitig einstellen; bei einem Durchmesser von etwa 6 mm sind sie mit der Lupe bereits erkennbar, weiter innen wird die Sache zweifelhaft, da diese äusserst feinen Spuren von einer auf der stark gewölbten glatten Externseite sichtbaren feinen Spiralstreifung nicht zu unterscheiden sind. Die Rippen entwickeln sich hier früher als bei dem in Fig. 1 abgebildeten Exemplar. Sie sind auf den inneren Windungen sehr schlank und schneidig und verlaufen hier in von der radialen stark nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanken. Ein eigentlicher Sculpturknoten ist in diesem Stadium noch nicht ausgebildet, die Rippen erreichen an der Grenze von Flanke und Externseite ihre grösste Höhe und Dicke und vollführen hierauf eine sehr scharfe Biegung nach vorwärts. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass an der Stelle des sich entwickelnden Knotens jede Rippe gespalten ist; der rückwärtige, radial verlaufende oder schwach nach vorne geneigte Streifen ist so fein, dass er der Beobachtung sehr leicht entgeht, der vordere, sehr stark nach vorwärts geneigte Streifen bildet eine ungemein scharfe Kante, durch welche das Rippenende von dem vor der Rippe gelegenen Zwischenraum abgegrenzt wird. Zu Beginn der vorletzten Windung (letztes Viertel der in Fig. 2 d dargestellten äusseren Windung), wo sich die Rippen allmälig radial zu stellen beginnen, kommen die Knoten zu deutlicher Entwicklung, indem sich an Stelle des Rippenwinkels, an welcher sich die starke Beugung vollzog, hohe dornenähnliche Gebilde erheben, welche später breiter und stumpfer, zu eigentlichen Knoten werden. Zugleich mit der Bildung der Dornen verschwinden die Rippenspaltungen ziemlich rasch, bald bildet nur mehr ein Streifen die Fortsetzung der Rippe, welcher keineswegs stark nach vorwärts geneigt ist, sondern die Richtung des rückwärtigen, schwächer markirten Streifens annimmt. Der Abfall der Rippe vom Knoten gegen die Kielregion erfolgt zunächst in einer Richtung, welche dem radialen (oder nahezu radialen) Verlauf der Rippe auf der Flanke entspricht; der innerhalb des Knotens gelegene Theil der Rippe und der ausserhalb des Knotens gelegene Theil, welcher dem steilen Abfall des Knotens gegen die Kielregion entspricht, schliessen miteinander einen rechten Winkel ein und liegen in derselben Radialebene. Denkt man sich weiter innen, wo die Rippen schief nach rückwärts verlaufen, eine Ebene durch die rückwärts geneigte Flankenrippe und den schief nach vorwärts verlaufenden externen Rippenstreifen gelegt, so steht diese Ebene nicht senkrecht auf der Medianebene des Ammoniten, sondern schliesst mit ihr einen schiefen Winkel ein. Man kann sich nun die auf den äusseren Windungen eingetretene Veränderung so versinnlichen, dass man sich vorstellt, diese Ebene stelle sich allmälig senkrecht gegen die Medianebene und radial. Erst sehr nahe an dem Nebenkiele, wo sich der radial (oder äusserst schwach nach vorwärts) geneigte äussere Theil der Rippe schon stark verflacht hat, wendet sich derselbe nach vorwärts, und in nach vorwärts geneigter Richtung ziehen auch die zahlreichen Anwachsstreifen gegen und über die Kielregion.

Das in Taf. [L], Fig. 3, abgebildete Exemplar zeichnet sich durch die geringe Anzahl der durch weite Zwischenräume getrennten Rippen aus und erinnert daher in dieser Hinsicht an das Exemplar Zieten's. Die Externfurchen entwickeln sich sehr langsam, erst am Ende des äusseren Umganges sind sie deutlich, und auch hier noch schwach eingetieft. Die Rippen verlaufen auf den drei erhaltenen Windungen der Hauptsache nach in radialer Richtung über die Flanken. Die Radialsculptur der Externseite steht noch auf dem äusseren Umgange auf dem Jugendstandpunkte anderer Exemplare. Die Knoten sind noch nicht zu runden Knöpfen abgestumpft, sie sehen nur von innen und rückwärts dornenähnlich aus, sind aber nach vor- und auswärts zu scharfen dünnen Rippen verlängert. Bis zum Schluss des äusseren Umganges ist jede Rippe am Knoten in zwei Theile gespalten, von welchen der

vordere eine scharf markirte Rippe, der rückwärtige einen schwachen Streifen darstellt. Der vordere Streisen ist sehr stark nach vorwärts geneigt, der rückwärtige ist nahe am Knoten schwach geneigt, zieht aber weiterhin oft nahezu parallel mit dem vorderen Streifen gegen den Nebenkiel. Erst gegen Ende des äusseren Umganges scheint sich bei einzelnen Rippen eine Annäherung an die Sculpturverhältnisse des ausgewachsenen Stadiums vorzubereiten. Dass die beiden Streifen, in welche sich jede Rippe am Knoten spaltet, zwei alten Mundrändern entsprechen, ergibt sich zweifellos aus der Betrachtung der zahlreichen feinen Anwachsstreifen, welche mit denselben auf der Schalenoberfläche in Verbindung stehen. Die zwischen den beiden Rippenfortsetzungen eingeschalteten Anwachsstreifen sind weitere alte Mundränder der Externseite, an welchen die allmälige Verlängerung des Externlappens deutlich zu beobachten ist. (Vgl. Fig. 3 g und die darauf bezügliche Bemerkung auf S. 245 [188].) — Auch auf den Flanken finden sich an vielen Stellen alte Mundränder. Bei guter Erhaltungsweise ist fast vor jeder Rippe ein feinerer oder stärkerer Streifen zu beobachten, welcher meist schief nach rückwärts verläuft und sich stets an den Rippenknoten anschliesst; hier, nahe am Knoten, ist der Streifen kräftiger ausgebildet, während er sich in der Richtung gegen die Naht allmälig verliert. Von jedem Knoten geht also sowohl nach aussen als nach innen je ein Paar von radialen Sculpturstreifen aus1). Aus einer aufmerksamen Verfolgung dieser Verhältnisse ergibt sich, dass der Mundrand im Laufe des Wachsthums periodisch seine Gestalt geändert hat. Je zwei Stadien, welche sich an einen Sculpturknoten anschliessen, sind deutlich markirt. Das ältere Stadium zeigt einen einfacheren, ungefähr radialen Verlauf; es ist dargestellt durch den kräftigen Zug der Flankenrippe und durch den schwächeren, rückwärtigen Rippenstreifen der Externseite. Dieser Mundrand hatte nur einen kurzen nach vorn gezogenen Externlappen und einen kurzen nach vorn gezogenen Internlappen. Das jüngere Stadium ist dargestellt durch den schwachen Streifen der Flanke und den kräftigeren, vorderen Rippenstreifen der Externseite. Dieser Mundrand zeigt eine tiefe Einbuchtung, welche bis zum Rippenknoten zurückgeht, begrenzt durch einen weit vorgezogenen Externlappen und einen ebenfalls weit vorgezogenen Internlappen. Der jüngere Mundrand entspricht genau dem Verlaufe der auf den Falten stark nach rückwärts geneigten Rippen, wie wir sie auf den inneren Windungen des in Fig. 2 abgebildeten Exemplars kennen gelernt haben.

Im Nachfolgenden ist die Anzahl der Rippen angegeben, welche die bisher besprochenen Exemplare auf dem äusseren und den nach innen folgenden Umgängen tragen.

				Durchmesser							Rippenzahl					
Taf.	[XLIX],	Fig.	I		٠					٠	176 mm	40	, 39			
29	[L],	77	1								69 "	32	26,	21,	16	
17	[L],	22	3		٠		4				62 "	23	3, 19			
29	[XLIX],	77	2						٠		52.5 "	20)			
22	[L],	29	2								50 ,,	28	3, 20,	15,	12	

Die in Taf. [L], Fig. 4, und Taf. [LI], Fig. 4, abgebildeten Exemplare wachsen sehr rasch an, erreichen eine bedeutende Dicke, die Rippen sind mit sehr hohen, dornenartigen Knoten versehen; der Externkiel ist sehr kräftig (breit und hoch), die ihn begleitenden Furchen sind sehr schmal und bei der geringen Grösse der Exemplare noch nicht eingetieft, die Anlage der Nebenkiele ist erkennbar. Bei dem zweiten, etwas grösseren Exemplare nehmen die Rippen gegen Ende der äusseren Windung auf den Flanken eine deutliche Neigung nach vorwärts an. — Das in Taf. [LI], Fig. 1, abgebildete

¹⁾ Die eigenthümlichen zu einem Knoten gehörigen Doppelrippen, welche sich auf der Flanke mancher Arieten finden sind eine analoge Erscheinung. (Vgl. A. sinemuriensis Orb., A. Aussoniensis Reynès, A. meridionalis Reynès.)

Exemplar gleicht in den Windungsverhältnissen dem in Taf. [L], Fig. 2, abgebildeten, die Externfurchen sind in der zweiten Hälfte des äusseren Umganges kaum merklich eingetieft, die Nebenkiele bereits deutlich markirt, die Falten sind gegen Ende der vorletzten und auf der äusseren Windung stark nach vorwärts geneigt.

Die in Taf. [LI], Fig. 5 und 6, abgebildeten kleinen Exemplare entsprechen ungefähr dem in Taf. [L], Fig. 1, abgebildeten. Das zweite erinnert durch die etwas geringere Dicke, durch die Knotenbildung und durch die schwache Kielentwicklung an die nachfolgend unter dem Namen tardesulcatus zu beschreibende Varietät.

Die in Taf. [LI], Fig. 2 und 3, abgebildeten kleinen Exemplare sind mit schart markirten Rippen versehen, welche sehr schräg nach rückwärts über die Flanken verlaufen und an der Externseite sehr kräftig nach vorwärts gebogen sind. An die Rippen schliesst sich an deren Rückseite häufig sowohl auf der Externseite als auf der Flanke je ein schwächer ausgebildeter Rippenstreifen (alter Mundrand) an, der einen mehr radialen Verlauf hat, insbesondere an dem kleineren Exemplare (Fig. 3) ist dies fast an jeder Rippe deutlich zu beobachten. Manchmal lenkt auf der Flanke der rückwärtige Streifen nicht am Knoten, sondern weiter innen in die kräftige Rippe ein. Wir haben hier ein Gegenstück zu der Erscheinung, welche wir an dem in Taf. [L], Fig. 3, abgebildeten Exemplare beobachtet haben. Dort sahen wir auf der Flanke den älteren (rückwärtigen), radial gestellten der beiden zu einem Knoten gehörigen Mundränder als kräftige Rippe entwickelt, hier ist der jüngere (vordere), schräg über die Flanke verlaufende Mundrand die scharf markirte, kräftige Rippe. An den beiden Exemplaren sind noch keine wahren Rippenknoten entwickelt, bei dem grösseren Exemplar sind die Externfurchen weit in der Entwicklung zurück, und trotzdem ist die Anlage der Nebenkiele bereits angedeutet.

Aehnliche Sculpturverhältnisse zeigt das in Taf. [L], Fig. 5, abgebildete kleine Exemplar, alle Merkmale sind jedoch ungemein scharf ausgeprägt. Die Windungen wachsen ziemlich rasch an, besonders die Dicke ist beträchtlich, die Externfurchen sind schon zu Beginn des äusseren Umganges leicht eingesenkt und vertiefen sich sehr rasch, die Nebenkiele sind fast ebenso scharf markirt als der Mediankiel. Die Rippen sind ausserordentlich scharf markirt, besonders bei der Umbiegung an der Externseite, die Knoten stark erhaben. Auch der innere Theil der Rippe ist sehr wulstig, und zumeist ist hier der rückwärtige der beiden zu einem Knoten gehörigen Sculpturstreifen als kräftige Rippe entwickelt. An der Innenseite des Knotens und der Rückseite der Rippe ist eine sehr ausgesprochene Einbuchtung vorhanden, und der Winkel, in welchem am Knoten sich die kräftige Vorwärtsbeugung vollzieht, springt sehr stark nach rückwärts heraus. Der Zug der kräftigen Rippe ist daher ein sehr gewundener. Der ältere der beiden zu einem Knoten gehörigen Mundränder besass auf der Flanke eine Ausbuchtung nach vorwärts. Der kleine Ammonit sieht ganz anders aus als andere Jugendexemplare von Ariet rotiformis, unter welchen wir schon sehr verschiedene Ausbildungen kennen gelernt haben, dennoch zeigt er die engsten morphologischen Beziehungen zu diesen Formen. Immerhin ist es wahrscheinlich, dass die ausgewachsene Form, welche diesem Jugendexemplar entspricht, sich ebenfalls durch stark ausgeprägte Merkmale (weit vorgeschrittene Kielentwicklung und ausserordentlich kräftig markirte Rippen) von der typischen Form unterscheidet. Durch die Kielentwicklung und die kräftige Vorwärtsbeugung der Rippen erinnert das kleine Exemplar an Ariet. multicostatus Sow.

Vorkommen: Ariet. rotiformis Sow. in der hier vertretenen Fassung findet sich hauptsächlich in dem gelben unterliasischen Kalke (dem eigentlichen Arietenkalke) von Enzesfeld, ferner in dem gleichen Horizonte von der Hinter-Mandling und von Rohrbach.

Es erweist sich als zweckmässig, mit einem besonderen Namen auf die nachfolgend verzeichnete Varietät von Ariet. rotiformis hinzuweisen:

Arictites rotiformis Sow. var. tardesulcatus n. f. (Taf. XXI [LI], Fig. 7—8.)

1856. Ammonites Kridion, Hauer, Ceph. a. d. Lias d. nordöstl. Alpen, Denkschr. k. Ak. d. Wiss., XI., S. 19, Taf. III, Fig. 4-9 (non Hehl in Zieten).

Diese Form unterscheidet sich durch die geringere Dicke, durch die etwas mehr zugeschärfte Gestalt der Externseite, durch die langsamere Entwicklung des Kieles und durch die weniger charakteristisch ausgebildete Knotung der Rippen von dem typischen Ariet. rotiformis Sow. Der Zug der Falten ist ein mehr gleichmässiger; sie verlaufen in radialer oder sanft nach vorn geneigter Richtung über die Flanken, wobei sie auf den äusseren Windungen einen schwach gekrümmten, nach vorne offenen Bogen vollführen. In Folge der geringeren Dicke fallen die Flanken weniger steil gegen die Naht ab, und es fehlt hier die starke Neigung nach rückwärts, in welcher die Falten bei dem typischen Ariet. roliformis im Aufsteigen von der Naht beginnen. Die Knoten sind zumeist weniger kräftig, und an ausgewachsenen Exemplaren setzen die Rippen nach dem Ueberschreiten des Knotens mit unverhältnissmässig geringer Abschwächung die sanfte Biegung nach vorwärts fort, um in der Nähe des Nebenkiels eine stärkere Neigung nach vorwärts anzunehmen. Selbst an Exemplaren, wo kräftigere (höhere und breitere) Knoten vorhanden sind (Fig. 8), zeigen diese doch nicht das eigenthümliche Hervorspringen nach rückwärts über den Zug der Rippe, sondern sie treten im Gegentheile über den vorderen Rand der Rippe hervor. Die Kielentwicklung beginnt später, der dicke Kiel ragt aber in der Regel nicht stärker hervor als bei Ariet, rotiformis, und wenn auch die Externfurchen sich langsamer vertiefen, so ist bei grösseren Exemplaren der kräftige Mediankiel doch stets von deutlich eingetieften Furchen und gut markirten Nebenkielen begleitet. In der Seitenansicht sind die Knoten gewöhnlich weiter vom äusseren Rande entfernt, weil die Externseite von den Knoten allmäliger gegen den Nebenkiel abfällt als bei der typischen Form.

Diese Merkmale scheinen auch A. caprotinus Orb.¹) zuzukommen. Da das grosse Exemplar d'Orbigny's verkleinert abgebildet ist, die inneren Windungen und die Lobenlinie unbekannt sind, und die Beschreibung nicht genügt, lässt sich über eine etwa vorhandene Identität keine Entscheidung treffen; die Windungen der französischen Form scheinen niedriger, der Nabel weiter zu sein als bei den hier besprochenen Formen.

Die inneren Windungen der alpinen Form sind von F. v. Hauer unter dem Namen A. Kridion Hehl beschrieben und abgebildet worden. Bei den inneren Windungen tritt, insbesondere wenn der Kiel weniger stark emporragt als bei dem grösseren von Hauer abgebildeten Exemplare (l. c., Fig. 4, 5; vgl. dagegen unsere Abbildungen in Taf. [LI], Fig. 8c-f), die Aehnlichkeit mit den entsprechenden Windungen von Ariet. rotiformis (Taf. [L], Fig. 1c-h, u. s. w.) sehr deutlich hervor. Die Aehnlichkeit namentlich des erwähnten Exemplares v. Hauer's mit A. Kridion²) ist unverkennbar. Hauer selbst hat jedoch die mehr trapezförmige Gestalt des Windungsquerschnittes von A. Kridion hervorgehoben. Der Kiel des letzteren ist viel höher und schneidiger, die Externfurchen sind noch schwächer ausgeprägt, die stärker erhabenen Knoten fallen steiler gegen den Nebenkiel ab.

¹⁾ Orbigny, Pal. franç., Terr. jurass, I., p. 240, pl. 64, fig. 1, 2.

²⁾ Zieten, Versteinerungen Württembergs, Tab. III, Fig. 2.

Das in Taf. [LI], Fig. 7, abgebildete Exemplar hat folgende Dimensionen: Durchmesser 77.5 mm (= 1), Nabelweite 43.5 mm (= 0.56), Windungshöhe 19 mm (= 0.25), Dicke 21 mm (= 0.27). Der äussere Umgang trägt 32, die nach innen folgenden Windungen 24, 18 und 16 Rippen.

Der Siphonallobus ist stets beträchtlich tiefer als der erste Seitenlobus.

Unsere Form ist durch Uebergänge mit Ariet. rotiformis Sow. verbunden und kann als eine Spielart desselben betrachtet werden. Auch der echte Ariet. Kridion gehört in die Formengruppe des Ariet. rotiformis.

Vorkommen: Die spätgefurchte Varietät des Ariet. rotiformis findet sich zusammen mit der typischen Form im gelben Arietenkalke von Enzesfeld und in dem gleichaltrigen blassröthlichen Kalke von Rohrbach.

TAFEL I.

Weithofer, Die fossilen Proboscidier des Arnothales.

TAFEL I.

T.I



Brogi - phot. Florenz.

Lichtdruck Calzolari e Ferrario-Mailand



TAFEL II.

Weithofer, Die fossilen Proboscidier des Arnothales.

TAFEL II.

Fig. 1. Elephas meridionalis Nesti; Cranium \mathcal{C} ; oberes Arnothal; von rechts.

" 2. " antiquus Falconer (= Cranium B Falconer, Pal. Mem.); oberes Arnothal; von vorne (= Taf. III, Fig. 1).


Beide Figuren in \(^{1}/_{7}\) der natürl. Grösse.

Weithofer-Foss.Probosc



Brogi - phot. Florenz.

Lichtdruck Calzolari e Ferrario-Mailand



TAFEL III.


TAFEL III.

Fig. 1. Elephas antiquus Falconer (= Cranium B Falconer, Pal. Mem.); oberes Arnothal; von rechts; $^{1}/_{7}$ der natürl. Grösse (= Taf. II, Fig. 2).

, 2. Elephas lyrodon Weithofer; Exemplar b; oberes Arnothal; von rechts-oben-vorne; $^1/_8$ der natürl. Grösse.

3. Mastodon Arvernensis Croizet et Jobert; linker unterer M_2 ; oberes Arnothal; $^1/_2$ der natürl. Grösse (zum Kiefer Taf. XIV, Fig. 6 gehörig).

Weithofer-Fcss.Probosc



Brogi - phot Florenz.

· Lichtdruck Calzolari s Ferrario-Mailand



TAFEL IV.

TAFEL IV.


Fig. I. Mastodon Arvernensis Croizet et Jobert; Schädel; Percussina, Villa Fenzi (Prov. Florenz); 1/10 der natürl. Grösse (= Taf. V, Fig. 2).

" 2. Elephas lyrodon Weithofer; Schädel α ; oberes Arnothal; $^{1}\!\!/_{10}$ der natürl. Grösse (= Taf. V, Fig. 1).

" 3. " meridionalis Nesti; linker Unterkieferast mit M_3 ; oberes Arnothal; $^{2}\!\!/_{7}$ der natürl. Grösse.

" 4. Mastodon Arvernensis Croizet et Jobert; linker unterer M_3 ; oberes Arnothal; $^{1}\!\!/_{2}$ der natürl. Grösse.

Weithofer-Foss.Probosc ? T. IV



Brogi - phot Florenz.

Lichtdruck Calzolari e Ferrario-Mailand

	•
	_
	•
•	
•	
. •	
	- 100
	*

TAFEL V.

TAFEL V.

- Fig. 1. Elephas lyrodon Weithofer; Schädel a; oberes Arnothal; $^1/_{10}$ der natürl. Grösse (= Taf. IV, Fig. 2).

 " 2. Mastodon Arvernensis Croizet et Jobert; Schädel; Percussina, Villa Fenzi (Prov. Florenz); $^1/_{10}$ der natürl. Grösse (== Taf. IV, Fig. 1).
- 3. Mastodon Arvernensis Croizet et Jobert; linker oberer M_2 ; Bisticci bei Rignano (oberes Arnothal); $^3/_5$ der natürl. Grösse.

 4.

 9.

 10.

 11.

 11.

 12.

 13.

 13.

 13.

 14.

 15.

 16.

 16.

 17.

 16.

 17.

 18.

 17.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.

 18.


 18.

 18.

 18.

 1

Weithofer-Foss.Probosc T.V



Brogi - phot. Florenz.

Lichtdruck Calzolari & Ferrario Mailand

	,		
		,	
· ·			
	ŧ		
			*
	•		
		•	
•			
			A.
	•		

TAFEL VI.

TAFEL VI.

Fig. I. $\left.\begin{array}{c} \text{Fig. I.} \\ \text{m} \end{array}\right\}$ Elephus lyrodon Weithofer; junger Schädel mit M_1-M_2 ; oberes Arnothal; $^1\!/_7$ der natürl. Grösse.



Brogi - phot. Florenz.

Lichtdruck Calzolari & Ferrario-Mailand

				•
•				•
		4		
			•	_
			•	
				,
		-		
		•		
				*
	•			
				•
		8		
	•	•		
		-	•	•
		-		

TAFEL VII.


TAFEL VII.

Fig. 1—2a in 1/2, die übrigen in natürl. Grösse.

```
Fig. 1. Elephas meridionalis Nesti; Unterkiefer mit D_3; oberes Arnothal; von aussen.

1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6.
```

Weithofer-Foss.Probosc . T. VII



Bragi - phot. Florenz.

Lichtdruck Calzolari & Ferrario-Mailand



TAFEL VIII.

TAFEL VIII.

Fig. 1. Elephas meridionalis Nesti; linker oberer D_1 ; Costa al Pino (Prov. Siena); natürl. Grösse.

" 2. " " " ganzer Unterkiefer mit M_2-M_3 , von links; oberes Arnothal; $^1/_4$ der natürl. Grösse.

" 3. " " " linker Unterkieferast mit D_2-D_1 ($D_2=$ Taf. VII, Fig. 4); oberes Arnothal; $^1/_2$ der nat. Grösse.

" 4. " lyrodon Weithofer; rechter Stosszahn; oberes Arnothal; $^1/_{12}$ der natürl. Grösse.

Weithofer-Foss.Probosc T. VIII



Brogi - phot.Florenz.

Lichtdruck Calzolari & Ferrario Mailand




TAFEL IX.

TAFEL IX.

```
Fig. 1. Elephas meridionalis Nesti; rechter oberer M_1; Terranuova (oberes Arnothal); von oben.
```

, 4. , linker oberer M_3 (des Cranium E); Peccioli. Alle Figuren in $^2/_5$ der natürl. Grösse.

Weithofer-Fass.Frohese



Brogi - phot Florenz.

Lichtdruck Calzoları & Ferrario Mailand



TAFEL X.

TAFEL X.


Fig. 1. Elephas meridionalis Nesti; rechter unterer M_3 (abnorm); oberes Arnothal; von oben.

n	Ia.	77	7*	27	derselbe; Seitenansicht.

- " 2. " " rechter oberer M_3 (= El. Armeniacus Falc. Pal. Mem. II, S. 250; vergl. oben S. 169 [63]); Vicchio (Sievethal).
- , 3. , rechter unterer M_1 ; Malafrasca (oberes Arnothal); von oben.
- r 3 a. , derselbe; Seitenansicht,
- , 4. , linker unterer M_2 ; Figline (oberes Arnothal); von oben.
- " 4a. " derselbe; Seitenansicht.

Alle Figuren in 2/5 der natürl. Grösse.

Weithofer-Foss.Probosc T. X



Brogi - phot Florenz.

Lichtdruck Calzolari & Ferrario Mailand



TAFEL XI.

TAFEL XI.

Fig. 1. $\it Elephas\ lyrodon\ Weithofer;\ linker\ unterer\ M_3;\ Montecarlo\ (oberes\ Arnothal);\ von\ oben.$

" Ia. " derselbe; Seitenansicht.

, 2. , , linker unterer M_3 ; oberes Arnothal; von oben.

" 2a. " derselbe; Seitenansicht.


,, 3. , meridionalis Nesti; linker oberer M_2 ; oberes Arnothal.

" 4. " " rechter unterer M_3 ; oberes Arnothal.

", 5. ", " linker unterer M_3 (= Kiefer, Taf. IV, Fig. 3); oberes Arnothal.


Alle Figuren in $^2/_5$ der natürl. Grösse.

Weithofer-Fass.Probase T. XI



Brogi - phot Florenz.

Lichtdruck Calzolari & Ferrario Mailand



TAFEL XII.

Weithofer, Die fossilen Proboscidier des Arnothales.

TAFEL XII.

Fig. 1. Elephas antiquus Falconer; rechter unterer M_3 (= El. Ausonius Major); S. Romano (unteres Arnothal); von oben.

Ia. derselbe; Seitenansicht.


linker unterer M_3 ; Chianathal; von oben. 2.

derselbe; Seitenansicht. 2a,

3.

linker oberer M_1 (?); Montopoli (unteres Arnothal). Fig. 1—2a in $^2/_3$ der natürl. Grösse, Fig. 3 in natürl. Grösse.

Weithofer-Fess.Frobosc



Brogi - phot Florenz.

Lichtdruck Calzoları & Ferrario Mailand

TAFEL XIII.

Weithofer, Die fossilen Proboscidier des Arnothales.

TAFEL XIII.

Fig. I. Mastodon Arvernensis Croizet et Jobert; linke untere $D_3 - D_1$ (= Exemplar B; die auf Taf. XIV, Fig. 1-3 abgebildeten oberen D gehören demselben Individuum an); Montopoli; Seitenansicht.


, Ia. , , , , , , , dasselbe; Kaufläche.

, 2. Elephas meridionalis Nesti; Gaumenfragment mit $D_3 - D_2$ (zu demselben Individuum wie Taf. VII, Fig. 2 gehörig); Kaufläche.

, 2a. , , , dasselbe; Seitenansicht.

Alle Figuren in natürl. Grösse.

Weithofer-Foss.Probosc T. XIII



Brogi - phot Florenz.

Lichtdruck Calzoları & Ferrario Mailand

	·	
	1	
	•	
•		

TAFEL XIV.


Weithofer, Die fossilen Proboscidier des Arnothales.

TAFEL XIV.

Fig.	1.	Mastodon	Arvernensis	Croiz.	et	Jobert	; linker oberer D_1 ; Montopoli (unteres Arnothal); von oben.
,,	īa.	11	17	37	,,	71	derselbe; Seitenansicht.
,,	2.	22	29	91	j)	17	rechter oberer D_2 ; Montopoli; von oben.
**	2 a.	,,,	17	,-	,,	r	derselbe; Seitenansicht,
,,	3.	27	17	77	,.	"	linker oberer D_3 ; Montopoli; von oben.
**	3 a.	,,,	97	,,	71	11	derselbe; Seitenansicht.
,,	4.	"	**	*1	,*	**	linker oberer D_2 (eines anderen Individuums); Montopoli; von oben.
**	4a.	11	37	91	,,	27	derselbe; Seitenansicht.
17	5-	>>	25	**	**	35	linker oberer M_2 ; oberes Arnothal.
17	6.	73	,11	37	11	27	linker Unterkieferast mit M2 (letzterer Taf. III, Fig. 3); oberes Arnothal.
,,	7.	,,	17	37	11	27	Unterkieferfragment ohne Zähne (Original Cuvier's, Nesti's etc.); oberes
							Arnothal; Seitenansicht.
**	7 a.	. ,,	35	77	,,	22	dasselbe; von oben.
		Trit		C "	T.*		81 Time Community 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Fig. 1—4a in natürl. Grösse; Fig. 5 in $^3/_5$, Fig. 6—7a in $^1/_6$ der natürl. Grösse. Die Originale zu Fig. 1—3, sowie das zu Taf. XIII, Fig. 1, gehören demselben Individuum an.

Weithofer-Foss.Probosc T. XIV



Brogi - phot.Florenz.

Lichtdruck Calzolari & Ferrario Mailand



TAFEL XV.

Weithofer, Die fossilen Proboscidier des Arnothales.

TAFEL XV.

Weithofer-Frankrubuse T. XV



Brogi - phot.Florenz.

Lichtdruck Calzolari & Ferrario Mailand



TAFEL XVI (XLVI).

Wähner, Unterer Lias.

Zur Beachtung. — Mit Bezug auf die unter gleicher Ueberschrift auf dem Erläuterungsblatte zu Taf. (XXXI) dieser Arbeit (Bd. V der Beiträge, Taf. XVI) befindliche Bemerkung ist zu erwähnen, dass der Zeichner sein Verfahren rücksichtlich der Stellung der Figuren abermals geändert hat. In Taf. (XLVII) und (XLIX) sind die Figuren noch Spiegelbilder der Objecte; auf den übrigen Tafeln erscheinen die Abbildungen in der den Objecten entsprechenden Orientirung.


- Fig. 1a-l. Arretites subsalinarius n.f. Bunter Kalk mit Schloth, marmorea von der Hinter-Mandling. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1a. Flankenansicht unrichtig; auf dem erhaltenen Theile der Schale an der Externseite sind um zwei Rippen mehr gezeichnet als auf der unbeschalten Flanke. In Wirklichkeit treten hier keineswegs Rippenspaltungen ein. Die Externansicht 1b gibt diese Verhältnisse richtig wieder. 1c. Externansicht eines Stückes der vorletzten Windung, entsprechend 1b. 1d. Externansicht (ungenau) eines Stückes der drittletzten Windung, entsprechend 1b und 1c. 1e, 1g. Externansichten der drittletzten und viertletzten Windung; 1f, 1h Vergrösserungen von Theilen der darüberstehenden Ansichten. 1e und 1f ungenau; die Rippen biegen sich stärker nach vorwärts und sind feiner; der Kiel sollte in allen vier Ansichten deutlich zu sehen sein. 1i. Querschnitt, entsprechend den Windungsstücken 1b, 1c, 1d; äussere Windung zu dick und zu hoch gezeichnet. 1k, 1l. Lobenlinien der Windungsstücke 1b und 1d. S. 241 (184).
- Fig. 2a—d. Arietites subsalinarius n. f. Rother Kalk mit Brauneisenconcretionen (Horizont der Schloth. marmorea) vom Schreinbach. Geologische Sammlung der Wiener Universität. 2d. Vergrösserung eines Theiles der Externansicht 2b. S. 241 (184).

- Fig. 3a-b. Arietites anastreptoptychus n. f. Tiefliasischer rother Kalk mit Brauneisenconcretionen von Adnet. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. 3b. Windungshöhe zu gross gezeichnet. S. 243 (186).
- n 4a-f. Arietites anastreptoptychus n. f. Rother Kalk mit Brauneisenconcretionen (Horizont der Schloth. marmorea) vom Schreinbach. Palaeontologische Staatssammlung in München. 4a. Die Rippen verlaufen am Original zumeist in von der radialen stärker nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanken. 4c, 4d. Innere Windungen mit einem Theile des drittletzten Umganges. 4e. Externansicht (ungenau) eines Theiles der vorletzten Windung, entsprechend einem Durchmesser von 16 mm. 4f. Lobenlinie des Windungsstückes 4e. S. 243 (186).
- " 5a-b. Arietites anastreptoptychus n.f. Rother Kalk mit Brauneisenconcretionen (Horizont der Schloth. marmorea) vom Schreinbach. Palacontologische Staatssammlung in München. 5a. Die Rippen verlaufen am Original zumeist in von der radialen stärker nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanken. S. 243 (186).
- " 6a-c. Arietites, Jugendform aus der Gruppe des Ariet. Haueri Gümb. Tiefliasischer rother Kalk mit Brauneisenconcretionen von der Kammerkaralpe. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 6a. Die Rippen
 verlaufen am Original stets in von der radialen stark nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanke,
 ausgenommen vielleicht am Beginn des äusseren Umganges, wo sie undeutlich erhalten sind; am vorletzten Umgange
 sind am Original keine Rippen erkennbar. Am äusseren Umgange des Originals sind die Rippen enger aneinandergereiht; in der Abbildung sind um drei Rippen zu wenig gezeichnet. 6c. Der Windungsquerschnitt ist am
 Original niedriger und dicker. S. 246 (189).
- 7a-c. Arietites ligusticus Cocchi (Canav.). Röthlicher Kalk mit Brauneisenconcretionen (Horizont der Schloth. marmorea) vom Schreinbach. Geologische Sammlung der Wiener Universität. 7a. Die Rippen verlaufen am Original in von der radialen stärker nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanke. 7c. Die Rippen verlaufen am Original zu Beginn der vorletzten Windung nahezu senkrecht (mit äusserst geringer Neigung nach vorwärts) gegen die Kielregion; der Kiel ragt hier stärker, am Ende dieser und der letzten Windung (in den Querschnitten) jedoch schwächer empor als in der Abbildung. Zwischen der Kielregion und den Flanken ist die Schale gerundet; eine starke und weit ausgedehnte Abplattung, wie in den Querschnitten gezeichnet, ist am Original keineswegs vorhanden. S. 248 (191).
- , 8a-b. Arietites ligusticus Cocchi (Canav.). Röthlicher Kalk mit Brauneisenconcretionen (Horizont der Schloth. marmorea) vom Schreinbach. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. 8b. Rippen auf der Externseite zu kräftig gezeichnet, Begrenzung oben und unten am Original mehr gerundet, der Kiel ragt insbesondere unten nicht so stark hervor, und die Furchen sind hier nicht so stark eingetieft. S. 248 (191).
- 9a—e. Arietites n. f., Jugendform. Tiefliasischer rother Kalk mit Brauneisenconcretionen von der Kammer karalp e. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 9a. Windungshöhe des den Externansichten entsprechenden Theiles der Flankenansicht zu gross gezeichnet, die Rippen daselbst sind auf dem Originale wulstiger und an der Externseite bei plötzlicher Abschwächung kaum merklich nach vorwärts gebogen, wie dies in der Externansicht 9b viel richtiger dargestellt ist (auf der vorhergehenden Windung sind am Original keine Rippen erkennbar); erst in dem bei 9a unten angefügten Windungsstücke, an welchem einige Rippen mehr dargestellt sind, als erhalten sind, biegen sich diese stark, wie in der Abbildung, nach vorwärts. 9c. Der Windungsquerschnitt ist ein wenig zu hoch gezeichnet. Die zwei Linien auf der Externseite haben mit der Kielbildung, welche hier noch nicht begonnen hat, nichts zu thun; sie rühren wahrscheinlich von einer Hülle des Sipho her. 9d. Vergrösserung eines Theiles der Externansicht 9b. 9e. Lobenlinie vom Beginne des den Externansichten entsprechenden Umganges. S. 247 (190).
- " 10 a-c. Arietites n.f. aff. ligusticus Cocchi (Canav.). Gelbgrauer Kalk mit Brauneisenconcretionen (Horizont der Schloth. marmorea) vom Breitenberg. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. 10 a. Die Rippen verlaufen am Original in von der radialen stärker nach rückwärts abweichender Richtung über die Flanke. 10 c. Lobenlinie vom Ende der ersten Hälste des äusseren Umganges. S. 250 (193).
- " 11 a-d. Arietites n. f., Jugendform. Tiefliasischer rother Kalk mit Brauneisenconcretionen von der Kammerkaralp e. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 11 a. Oben die Rippen an der Externseite zu kräftig gezeichnet, am Original befinden sich um zwei Rippen mehr auf dem äusseren Umgange. 11 b. Die Rippen auf der Externseite zu kräftig gezeichnet. 11 c. Der Windungsquerschnitt zu hoch gezeichnet; die Furchen sind am Original zu Beginn des äusseren Umganges noch nicht eingetieft. 11 d. Vergrösserung eines Theiles der Externansicht 11 b. S. 246 (189).
- " 12a—d. Arietites, Jugendform aus der Gruppe des Ariet. Haueri Gümb. Tiefliasischer rother Kalk mit Brauneisenconcretionen von der Kammerkaralpe. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 12b. Windungsquerschnitt zu dick und ein wenig zu hoch gezeichnet, der Kiel ragt am Original stark über die Externseite empor; diese fällt mehr steil dachförmig gegen die Flanken ab. Die Furchen sind am Original nur angedeutet, keine eingetieften Rinnen. Dasselbe gilt für 12c. 12d. Vergrösserung eines Theiles der Externansicht 12c; ungenau, vgl. die Beschreibung. S. 245 (188).
- s =Sipho, n =Nahtlinie, N =Nahtlinie des nach aussen folgenden Umganges, i =Internlobus (Medianlinie der Internseite), k =Kiel (Medianlinie der Externseite).



^{*} Beiträge zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients, herausgegeben von Edm.v.Mojsisovics u.M.Neumayr, Bd.VIII, 1890. Verlag v. Alfred Hölder k.v.k.Hof-u. Universitäts-Buchhändler in Wien.

Lith.Anst.v. Joh.Haupt,Wien.




TAFEL XVII (XLVII).

Wähner, Unterer Lias.

TAFEL XVII (XLVII).

- Fig. 1a—b, Arietites Cordieri Canav. Gelber Kalk mit Ariet. rotiformis von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 1a. Die an zwei Stellen undeutliche Rippenzeichnung der inneren Windungen rührt von einer Correctur her und entspricht keineswegs einer dort etwa vorhandenen Rippenspaltung. S. 250 (193).
- " 2a-c. Arietites Cordieri Canav. Gelber Kalk mit Ariet. rotiformus von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 2c. Vergrösserte Externansicht bei c in 2a. Die Rippen stehen im Verhältnisse zur Dicke der Windungen in zu weiten Abständen; die Dicke ist ungefähr dreimal vergrössert, die Rippenabstände ungefähr viermal. An der Grenze zwischen Flanke und Externseite verlaufen die Rippen am Original bei weitem nicht so schräg, dort erfolgt erst die Umbeugung nach vorwärts. Die über die Kielregion verlaufenden feinen Streifen sind durch schwarze Linien ganz schematisch und der Wirklichkeit nicht entsprechend wiedergegeben. Am Original sind die Externfurchen und die Nebenkiele bereits deutlich markirt. Zu demselben Exemplar gehören die in Taf. (XLVIII), Fig. 2, abgebildeten Jugendwindungen. S. 250 (193).
- " 3a-b. Arietites Cordieri Canav. Gelber Kalk mit Ariet. rotiformis von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. — S. 250 (193).
- , 4. Arietites Cordieri Canav. Lobenlinie von dem Bruchstücke eines grossen Exemplares aus dem gelben Arietenkalk von Gainfarn. M = Medianlinie der Externseite m = Medianlinie der Internseite, n = Nahtlinie. S. 250 (193).






TAFEL XVIII (XLVIII).

Wähner, Unterer Lias.

TAFEL XVIII (XLVIII).

- Fig. 1a-h. Arretites Cordieri Canav. Gelber Kalk mit Ariet. rotiformis von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. - 1 a. Die Rippen sind in der Flankenansicht zu gerade gezeichnet; abgesehen von den an der Naht und an der Externseite eintretenden Biegungen sind die Rippen auch im übrigen Verlaufe über die Flanke leicht, aber deutlich geschwungen. - 1 b. Externansicht, 1 c ein Theil derselben vergrössert; in beiden sollten die Intercostalräume im Umriss weit tiefer gehalten sein; die den Externkiel begleitenden Furchen sind unten im Umriss ebenfalls nicht tief genug gezeichnet. — 1 d. Externansicht des gegenüberliegenden Windungsstückes von 1 a auch hier die Rippen-Zwischenräume viel zu seicht gezeichnet. - 1 e. Externansicht des vierten Fünftels der drittletzten Windung und dazugehöriger Querschnitt der vorletzten Windung; auf der ersteren sind die Nebenkiele am Original kräftiger markirt. - 1 f. Internansicht (mit Internlobus) des in 1 e aufgesetzten Stückes der vorletzten Windung; die innerhalb der Nahtlinie schräg nach vorn verlaufenden erhabenen Streifen entsprechen den Rippen-Zwischenräumen an der Externseite des vorhergehenden Umganges, die Anzahl derselben ist am Original um I geringer, sie liegen nicht immer in der Fortsetzung der ausserhalb der Naht beginnenden Rippen. Die von den zwischen den Rippen gelegenen Vertiefungen Nebenkielen der vorhergehenden Windung herrührenden Furchen sind in der Zeichnung nicht wiedergegeben. — 1 g. Externansicht der zweiten Hälfte der viertletzten Windung und zugehöriger Theil der drittletzten Windung; die Kielregion oben im Querschnitt zu schmal gezeichnet, der Mediankiel überragt am Original die Nebenkiele. - 1 h. Lobenlinie des Windungsstückes 1 f. - S. 250 (193).
- , 2a-e. Arietites Cordieri Canav. Innere Windungen des in Taf. (XLVII), Fig. 2 abgebildeten Exemplares. 2d. Oberer Theil der Externansicht 2c, vergrössert; am Original ist bereits ein breiter Kiel angedeutet.
- " 3a-d. Arietites Cordieri Canav. Gelber Kalk mit Ariet. rotiformis von Enzesfeld. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. S. 250 (193).
- ... 4a-d. Arietites Cordieri Canav., Exemplar mit weniger vorgeschrittener Kielentwicklung aus dem bunten Kalke mit Schloth. marmorea von der Hinter-Mandling. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. 4b. Der Kiel ragt am Original stärker empor, die Furchen sind schwächer eingetieft. 4c. Querschnitt hinter dem ersten Sechstel des äusseren Umganges; alle Windungsquerschnitte und die Externansicht unten zu dünn, die beiden äusseren Querschnitte auch zu hoch gezeichnet. Die Externfurchen der vorletzten Windung sind am Original deutlich eingetieft; in der zweiten Hälfte der äusseren Windung werden sie allmälig seichter, an der Stelle des Querschnittes sind sie nicht mehr eingetieft, sondern stellen eine flache Abplattung dar, welche sich an den steilen Abhang des hoch emporstrebenden Kieles anschliesst; ganz ähnlich ist am Original der Querschnitt der drittletzten Windung in der Kielregion gestaltet. Die allmälige Abflachung der Externfurchen auf dem äusseren Umgange leitet die im letzten Sechstel desselben eintretende Verkrüppelung der ganzen Externseite ein. 4d. Lobenlinie vom ersten Viertel der letzten Windung; am Original ist zwischen dem ersten Hilfslobus und der Naht noch ein tiefer Zacken vorhanden S. 256 (199).
- " 5a-b. Arietites Cordieri Canav., Exemplar mit später Entwicklung der Radialsculptur. Gelber Kalk mit Ariet. rotiformis von Enzesfeld. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. Mündung zu hoch, Nabel zu eng gezeichnet. S. 255 (198).
- " 6a-b. Arietites Cordieri Canav. Röthlichgrauer Kalk mit Brauneisenconcretionen (Horizont der Schloth. marmorea vom Schreinbach. Palaeontologische Sammlung der Wiener Universität. Der Mediankiel überragt am Original die Nebenkiele, die Rippen sind schneidiger, die Zwischenräume tiefer. S. 256 (199).
- Universität. 7c. Externansicht von der ersten Hälfte der vorletzten Windung. Der Mediankiel ist am Original kräftig, die Breite der ganzen Kielregion (mit der Anlage der künftigen Furchen und Nebenkiele) aber viel geringer als in der Zeichnung, die Rippen erreichen in steifem Zuge eine kräftige Anschwellung, von welcher sie in kaum merkbarer Neigung nach vorwärts rasch gegen die Andeutung der Nebenkiele abfallen; selten sind in der Fortsetzung der Rippen sehr feine, stärker nach vorn gebogene Streifen durch die Kielregion zu verfolgen. 7d. Querschnitt des in 7c dargestellten Windungsstückes. 7e, 7g. Externansichten der fünftletzten Windung; die knotenähnlichen Rippenendigungen sind am Original kräftiger markirt. 7f, ein theilweise beschaltes Stück von 7e, vergrössert. Der Kiel ist am Original bereits angedeutet; eine ausserordentlich feine peripherische Streifung ist am Original zum Theile deutlicher erkennbar als die feinen radialen Anwachsstreifen. 7h. Lobenlinie des Windungsstückes 7c ungenau wiedergegeben. S. 251 (194); vgl. ferner V. Theil, S. (156—160), Bd. VI, S. 299—303.

s = Sipho, n = Nahtlinie, i = Internlobus (Medianlinie der Internseite), k = Kiel Medianlinie der Externseite).



Beiträge zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients, herausgegeben von Edm.v.Mojsisovics u.M.Neumayr, Bd VIII, 1890. Verlag v. Alfred Hölder k., k. Hof-u. Universitäts-Buchhändler in Wien.

A Swoboda gez.u lith.

Lith.Anst.v Joh.Haupt, Wien.




TAFEL XIX (XLIX).

Wähner, Unterer Lias.

TAFEL XIX (XLIX).

- Fig. 1a-c. Arietites rotiformis Sow. Exemplar mit stark nach rückwärts geneigten Falten. Gelber Arietenkalk von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 1a. Der Kiel ist am Original in der Flankenansicht sichtbar. Der Durchmesser des Originals ist weit grösser als in 1a und 1b; die Windungsverhältnisse sind andere. In 1b ist links die Dicke viel zu beträchtlich, dieselbe nimmt am Original nach dieser Richtung rascher ab, die Furchen sind daselbst tiefer eingesenkt. Von der Basis der Knoten verlaufen am Original feine Rippenstreifen schräg nach vorn gegen die scharf markirten Nebenkiele. S. 259 (202).
 - ", 2a-d. Arietites rotiformis Sow. Gelber Arietenkalk von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 2c, 2d. Die am Original an den Knoten erfolgenden Rippenspaltungen sind nicht wiedergegeben. S. 259 (202).



Surbook noak d Nat gez. u Ath.

Beiträge zur Palaeontologie von Oesterreich Ungarn, herausgegeben von Edm.v.Mojsisovics u.M. Neumayr, Bd.VIII, 1890.

Verlag v. Alfred Hölder, k.u.k.Hof-u. Universitäts-Buchhändler in Wien

Lik Andrich, Reiber & M. Werkner, Nor




TAFEL XX (L).

Wähner, Unterer Lias.

TAFEL XX (L).

- Fig. 1a—h. Arretites rotij ormis Sow. Gelber Arietenkalk von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 1b—1e. Die Dicke ist am Original weit beträchtlicher; die Rippen verlaufen von der Höhe des Knotens oder der knotenähnlichen Anschwellung zunächst in sehr sanfter Neigung (fast senkrecht) gegen die Nebenkiele und nehmen erst in der Nähe der letzteren eine stärkere Vorwärtsbeugung an. 1c—1h Externansichten. 1c von der ersten Hälfte der vorletzten Windung, 1d von der zweiten Hälfte der drittletzten, 1e ungefähr von der ersten Hälfte der drittletzten, 1f von der zweiten Hälfte der viertletzten Windung. 1g. Vergrösserung eines Theiles der Externansicht 1f, ungenau, die feinen Streifen der Externseite schliessen sich an die knotenähnlichen Endigungen der Rippen an. S. 259 (202).
- Arietites rotiformis Sow. Zum Theile erneuerte Abbildung des Originals von A. bisulcatus Hau. Gelber Arietenkalk von Enzesfeld. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. 2a. Flankenansicht des letzten Fünftels des äusseren und vorletzten Umganges. 2c. Externansicht vom Beginn des äusseren Umganges, ungenau, die Furchen sind noch nicht eingetieft, durch die Anlage der Nebenkiele aber deutlich markirt. 2d. Flankenansicht des ersten Drittels der vorletzten Windung und der nach innen folgenden Umgänge. Die dazugehörige Externansicht 2e ist viel zu schmal, 2f unten zu schmal gezeichnet; 2g Vergrösserung eines Theiles von 2f. Kiel und Furchen sind am Original bereits angedeutet, die am Knoten eintretenden Rippenspaltungen wurden nicht gezeichnet, die schwach markirten rückwärtigen Streifen vollkommen vernachlässigt. Das letztere gilt auch für 2i, einer Vergrösserung eines Theiles der Externansicht 2h. 2l. Querschnitt am Ende des äusseren Umganges; an diesem sind die Externfurchen in Wirklichkeit sehr schwach, an der vorletzten Windung gar nicht eingetieft, der Mediankiel ragt hier stärker empor, die viertletzte Windung ist im Querschnitt an der Externseite stärker gewölbt, die Mitte der Externseite ist nahezu glatt. 2m. Lobenlinie vom Ende der ersten Hälfte des äusseren Umganges. S. 259 (202).
- " 3a-h. Arietites rotiformis Sow. Exemplar mit weit voneinander abstehenden Rippen. Gelber Arietenkalk von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 3e, 3f. Die Externfurchen sind am Original nicht eingetieft. 3g. Vergrösserung eines Theiles von 3f. Unterhalb der Knoten, nahe dem äusseren Rande der Zeichnung, sind am Original keine Anwachsstreifen sichtbar; es lässt sich nicht feststellen, ob sich dort die neuen Anwachsstreifen parallel an den am stärksten markirten alten Mundrand anlegen, oder so, wie es der Zeichner willkürlich angenommen hat. Die Art und Weise, wie sich die Anwachsstreifen zwischen den beiden zu einer Rippe gehörigen stärkeren Streifen (zwischen den zwei zu einer Rippe gehörigen alten Mundrändern) anlagern, ist richtig gezeichnet. 3h. Lobenlinie bei h in 3d, vergrössert. S. 259 (202).
- " 4a-d. Arietites rotiformis Sow. Rasch anwachsendes Exemplar. Gelber Arietenkalk von Enzesfeld. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. 4b. Die Furchen sind am Original nicht eingetieft. 4d. Vergrösserung eines Theiles der Externansicht 4c. S. 265 (208).
- w 5a-e. Arietites aff. rotiformis Sow. Blassröthlicher Arietenkalk von Rohrbach. Geologische Sammlung der Wiener technischen Hochschule. 5c. Vergrösserung von 5b; der rückwärtige der beiden von einem Knoten ausgehenden Rippenstreisen ist zunächst viel schwächer nach vorwärts geneigt. 5e. Vergrösserung von 5d; die schwächeren rückwärtigen Streisen sind ganz vernachlässigt. S. 266 (209).



A Swoboda gez.u.lith.

Beiträge zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients, herausgegeben von Edmv. Mojsisovics u. M. Neumayr, Bd. VIII, 1890. Verlag v. Alfred Hölder, k., k. Hof-u. Universitäts-Buchhändler in Wien

Lith.Anst.v. Joh.Haupt,Wien.




TAFEL XXI (LI).

Wähner, Unterer Lias.

TAFEL XXI (LI).

Arietites.

- Fig. 1a-c. Arretites rotiformis Sow. Blassröthlicher Arietenkalk von Rohrbach. Geologische Sammlung der Wiener technischen Hochschule. 1b. Die Externfurchen sind am Original seichter, die Dicke der Windung ist etwas grösser: 1c. Lobenlinie bei c in 1a. vergrössert. S. 265 (208).
- " 2a-d. Arietites rotiformis Sow. Blassröthlicher Arietenkalk von Rohrbach. Geologische Sammlung der Wiener technischen Hochschule. 2a. Flankenansicht; die letzte Lobenlinie ist eingezeichnet, der grössere Theil des äusseren Umganges ist Wohnkammer. 2c. Vergrösserung des gegenüberliegenden Theiles von 2a. 2d. Vergrösserte Externansicht von 2c, ungenau; die feinen Streifen schliessen sich an die Knoten an. S. 266 (209).
- " 3a-e. Arietites rotiformis Sow. Blassröthlicher Arietenkalk von Rohrbach. Geologische Sammlung der Wiener technischen Hochschule. 3a. Die Hälfte des äusseren Umganges gehört der Wohnkammer an. 3d. Vergrösserung des gegenüberliegenden Theiles von 3a. 3e. Lobenlinie bei e in 3a. S. 266 (209).
- " 4a-b. Arietites rotiformis Sow. Rasch anwachsendes Exemplar. Blassröthlicher Arietenkalk von Rohrbach. Geologische Sammlung der Wiener technischen Hochschule 4b. Die Externfurchen sind am Origenal noch nicht deutlich eingetieft. S. 265 (208).
- 5a-f. Arietites rotiformis Sow. Gelber Arietenkalk von Enzesfeld. Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt. 5e. Vergrösserung der Externansicht 5d S. 266 (209).
- ., 6a-f. Arietites rotiformis Sow. -- Blassröthlicher Arietenkalk von Rohrbach. -- Geologische Sammlung der Wiener technischen Hochschule. -- 6a. Der grössere Theil der äusseren Windung gehört der Wohnkammer an. -- 6d, 6f
 Externansichten der vorletzten Windung. -- 6e. Vergrösserung eines Theiles von 6d, ungenau. -- S. 266 (209).
- , 7a-c. Arietites rotiformis Sow, var. tardesulcatus n.f. Blassröthlicher Arietenkalk von Rohrbach. Geologische Sammlung der Wiener technischen Hochschule. 7c. Lobenlinie bei c in 7a. S. 267 (210).
- 8a-g. Arietites rotiformis Sow. var. tardesulcatus n. f. Gelber Arietenkalk von Enzesfeld. K. k. naturhistorisches Hofmuseum in Wien. 8b. Externansicht des gegenüberliegenden Theiles von 8a; die Furchen sind noch nicht eingetieft. 8c. Externansicht der vorletzten Windung; im Querschnitt (oben) tritt der Kiel am Original deutlicher hervor. 8d. Externansicht von der ersten Hälfte der drittletzten Windung. 8c. Vergrösserung zu 8d. 8f. Querschnitt mit Externansicht vom Ende der fünftletzten und Beginn der viertletzten Windung. 8g. Lobenlinie bei g in 8d, vergrössert; s = Sipho, m = Medianlinie der Externseite. S. 267 (210).



A Swotoda gez.u lith.

Beiträge zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. herausgegeben von Edm.v.Mojsisovics u.M.Neumayr, Bd.VIII. 1890. Verlag v. Alfred Hölder, k.a.k. Hof-u. Universitäts-Buchhändler in Wien

Lith Anst.v. Joh Haupt Wien



BEITRÄGE

7744.

ZUR

PALÄONTOLOGIE ÖSTERREICH-UNGARNS

UND DES ORIENTS

HERAUSGEGEBEN VON

E. V. MOJSISOVICS UND M. NEUMAYR.

BAND VIII. HEFT I BIS III. MIT TAFEL I-XV.

AUSGEGEBEN AM 1. NOVEMBER 1890.

HERAUSGEGEBEN MIT UNTERSTÜTZUNG DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

INHALT:

MAX SCHLOSSER: Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Marsurpialier, Creodonten und Carnivoren des europäischen Tertiärs und deren Beziehungen zu ihren aussereuropäischen Verwandten. III. Theil. (Schluss.)

ANTON WEITHOFER: Die fossilen Proboscidier des Arnothales in Toskana.

(DIE AUTOREN SIND ALLEIN FÜR FORM UND INHALT DER AUFSÄTZE VERANTWORTLICH.)

WIEN, 1890.

ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER.
ROTHENTHURMSTRASSE 15.

Soeben ist erschienen:

DIE GASTEROPODEN

Meeresablagerungen der ersten und zweiten miocanen Mediterranstufe

OESTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE

R. Hoernes und M. Auinger.

Lieferung VI mit 8 lithographirten Tafeln

Früher erschienen:

Lieferung I mit 6 lithographirten Tafeln M. 15.60 | Lieferung III mit 4 lithographirten Tafeln M. 10.80 Lieferung V mit 6 lithographirten Tafeln M. 16.—

Die liburnische Stufe und deren Grenz-Horizonte.

EINE STUDIE

über 'die

Schichtenfolgen der cretacisch-eocänen oder protocänen Landbildungsperiode im Bereiche der Küstenländer von Oesterreich-Ungarn.

GUIDO STACHE.

I. Heft. Erste Abtheilung: Geologische Uebersicht und Beschreibung der Faunen- und Florenreste. Mit einer geologischen Uebersichtskarte und 8 lithographirten Tafeln.

(Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Band XIII, Heft 1.)

Preis M. 32.-.

Ueber die liasischen Brachiopoden des Hierlatz bei Hallstadt.

GEORG GEYER. Mit 9 lithographirten Tafeln.

(Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Band XV, Heft r.)

Preis M. 24.-.

Zur Kenntniss der Fauna der "Grauen Kalke"

SUD-ALPEN.

Dr. Leopold Tausch v. Gloeckelsthurn.

Mit 9 lithographirten Tafeln.

(Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Band XV, Heft 2)

Preis M. 16.-.

Bilder von den Kupferkies-Lagerstätten

bei Kitzbühel

Schwefel-Lagerstätten bei Swoszowice.

Nach der Natur aufgenommen von den k. k. Bergbeamten.

Redigirt von dem k., k. Ministerialrathe Herausgegeben auf Befehl Seiner Excellenz des Herrn k. k. Ackerbau-Ministers

F. M. Ritter von Friese.

Julius Grafen Falkenhayn.

Mit 78 Lagerstätten-Bildern in ½ Naturgrösse.

Preis M. 16.-.

Verlag von ALFRED HÖLDER, k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in Wien - I. Rothenthurmstrasse 15.

BEITRÄGE

7744.

ZUR

PALÄONTOLOGIE ÖSTERREICH-UNGARNS

UND DES ORIENTS

HERAUSGEGEBEN VON

E. v. MOJSISOVICS UND M. NEUMAYR.

BAND VIII. - HEFT IV.

AUSGEGEBEN AM 15. MÄRZ 1891.

HERAUSGEGEBEN MIT UNTERSTÜTZUNG DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

INHALT:

FRANZ WÄHNER: Beiträge zur Kenntniss der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. VI. Theil,

(DIE AUTOREN SIND ALLEIN FÜR FORM UND INHALT DER AUFSÄTZE VERANTWORTLICH.)

WIEN, 1891.

ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER.

ROTHENTHURMSRTASSE 15.

Soeben erschien:

DIE GASTEROPODEN

der

Meeresablagerungen der ersten und zweiten miocänen Mediterranstufe

OESTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE

von

R. Hoernes und M. Auinger.

Früher erschienen:

Liefer	ung I	mit	6	lithographirten	Tafeln			M.	15.60	Lieferung	IV	mit	6	lithographirten	Tafeln		 	M.	16
27	11	22	6	27	22			17	16.—	**	V	44	6	.,	22			27	16
27	III	22	4	11	77			91	10.80	37	VI	17	8	f 99					

Die liburnische Stufe und deren Grenz-Horizonte.

EINE STUDIE

über die

Schichtenfolgen der cretacisch-eocänen oder protocänen Landbildungsperiode im Bereiche der Küstenländer von Oesterreich-Ungarn.

Vor

GUIDO STACHE.

I. Heft. Erste Abtheilung: Geologische Uebersicht und Beschreibung der Faunen- und Florenreste.

Mit einer geologischen Uebersichtskarte und 8 lithographirten Tafeln.

(ABHANDLUNGEN DER K. K. GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT, BAND XIII, HEFT 1.)

Preis M. 32.—.

Ueber die liasischen Brachiopoden des Hierlatz bei Hallstadt.

Von GEORG GEYER.

Mit 9 lithographirten Tafeln.

(ABHANDLUNGEN DER K. K. GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT. BAND XV, HEFT 1.)

Preis M. 24.-.

Zur Kenntniss der Fauna der "Grauen Kalke"

SÜD-ALPEN.

Von

Dr. Leopold Tausch v. Gloeckelsthurn.

Mit 9 lithographirten Tafeln.

(ABHANDLUNGEN DER K. K. GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT. BAND XV. HEFT 2.)

Preis M. 16.—.

Bilder von den Kupferkies-Lagerstätten

bei Kitzbühel

Schwefel-Lagerstätten bei Swoszowice.

Nach der Natur aufgenommen von den k. k. Bergbeamten.

Redigirt von dem k. k. Ministerialrathe

Herausgegeben auf Befehl Seiner Excellenz des Herrn k. k. Ackerbau-Ministers

F. M. Ritter von Friese.

Julius Grafen Falkenhayn.

Mit 78 Lagerstätten-Bildern in 1/20 Naturgrösse.

Preis M. 16.-.

Verlag von ALFRED HÖLDER, k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in Wien 1. Rothenthurmstrasse 15.

	·	



• 4		
 4	,	



3 2044 110 320 066

Date Due

JUL 10 1968

